


with 11th 167-170

D. IV

18/P



Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b30521695>



HEELKONSTIGE 45722
ONTLEEDING

V A N

's **MENSCHEN LIGHAAM;**


Waar in klaar en onderscheydentlijk worden beschre-
ven de zelfstandigheyt, plaats, groote, gedaante,
getal, maaksel, t' samenhang, en gebruyk der
Deelen, benevens hun Ziekten: met
noodige Aanmerkingen ontrent
derzelver Genezing.

Opgeheldert met konstryke Figuren.

D O O R

JOHAN PALFYN,

*Gezworen Heelmeeſter, Ontleeder, en Lector
in de Heelkonſt te GENT.*



T E L E Y D E N,

By **JAN VANDER DEYSTER,**
Boekverkooper op de Nieuw-ſtraat by de Hoy-graft.

MDCCXVIII.



V O O R R E D E N.



Oit had ik , waarde Lezer, gedacht om deze HEELKONSTIGE ONTLEDING te schrijven, veel min aan de Wereld te doen zien; maar tijd en voorvallen veranderen dikwils onze voornemens.

Onlangs met een zeker goed Vrind, met wien ik vele Jaren nauwe kennis heb gehad, spreken- de, dat mijn Werk over de beschryving der Beenderen zeer goeden aftrek in Holland had, noopte hy my aan, om mijn gedagten te willen laten gaan om een Ontleding van 's Menschen Lighaam te beschryven, en wel zo, dat jonge Heelmeesters, en die zig in de Heelkonst oefenden, daar hun nut uyt konden trekken; en wel zo, dat men alle twisten, die in de Ontleed-kunde mogten wezen, voor by gaande, ik dat oogmerk had om klaar, en na waarheyt den Lezer de deelen van 's Menschen-Lichaam, hun maakfel, gebruyk, en al wat verder tot de Ontleed-kunde behoort, voor ogen te stellen.

Ja Hy meende, dat men de gebreken van de deelen daar moest byvoegen, om zo de Leerlingen te tonen, hoe Ziektens in dezelve ontstaande, zouden genezen kunnen werden.

Dit my mijne Vrind voordragende, zag ik 'er grote zwarigheyt in, om zo een arbeid op mijne Schouders te nemen; nadien de Ontleed-kunst noit zodanig beschreven was; daar by quam, dat 'er Platen moesten by komen, die voor al hier nodig waren om den Lezer een klare bevatting van de Ontleed-kunst te geven, en hem tot het regt bezef van 's Menschen-Lighaam te leiden.

Egter heb ik mijn werk gemaakt, om verscheyde ziekten van de deelen, die in 's Menschen-Lighaam

geboren kunnen worden, onderscheidentlijk en kort aan te tonen, om zo, die zig in de Heel-konst oefenen, en toeleggen om de Ontleding te kennen, by deze bequame gelegentheyd een beschrijving van de ongemakken, die 's Menschen-Lighaam onderworpen zijn, aan te wyzen.

De Platen, die dit Werk versieren, zijn gevolgt na die van de Ontleed-kunst van den Heer *Verheyen*, die wy egter, om dat in dezelve eenige fouten, ten opzigte van de niet wel gestelde Letteren in de Figuren waren, verbeterd hebben.

Wy twyfelen niet, of wy zullen ons oogmerk bereykt hebben; 't welk is den Lezer een nette Ontleed-kunst te geven, en daar in de jonge Heelmeefters, en hunne Quekelingen de ziekten van veele delen, die komen in onze Lighamen, voor ogen te stellen, en hoe die gelukkig geholpen kunnen werden.

Een uytvoerige Bladwyzer tot gemak van die geen, welke iets in het zelve zouden willen opzoeken, is hier by gevoegt; en zal men onder het woord *Ader*, *Been*, *Slag-ader*, *Spieren*, *Zenuwen*, dezelve alle, zo als die volgen, kunnen vinden.

Dus wenschen wy U voordeel met ons Werk, en wel te varen.

HEELKONSTIGE ONTLEEDING

van 's Menschen-Lighaam.

Niet is zo moeyelijk als een ziekte te geneezen, waar van men de oorzaak niet kent; maar nog is 't moeyelijker de oorzaak te weten, zonder kennis der Ontleeding: hierom is 't zeer noodzakelijk voor een Genees- of Heelmeeſter, dat hy verſta de Ontleeding van 's Menschen-Lighaam.

Het woord *Anatomie* komt van de Grieken, en beteekent in onze taal *Ontleeding*: men beſchrijft daar ^{Hand-} door een konſtige opening van doode Menſchen, of ^{weikige} Beeſten, om tot kennis der zelfſtandigheyt, plaats, ^{Ontlee-} gedaante, getal, groote, maakſel, t'ſamenhang, en ^{ding.} gebruyk der Deelen, te komen.

Zomtijds word het genomen voor een enkele kennis ^{Befpiege-} der voorgemelde dingen, en zo zegtmen, dat iemand ^{lende Ont-} in de Ontleeding is ervaren, ſchoon hy niet geoeffent ^{leeding.} is in 't Handwerk; en die laaſte kennis kan ¹ Beſpiegelende, en de eerſte ² Handwerkige genaamt worden.

Het Menſchen-Lighaam is 't onderwerp der Ontlee- ^{Onder-} ding: want ſchoon de Ontleeder zomtijds bezig is in ^{werp der} 't openen van Beeſten; zo geſchied dit met inzicht, ^{Ontlee-} dat, wat hy daar in ondervind, door gelijkenis zou ^{ding.} toegepaſt worden aan den Menſch, in wien veel dingen, noodig te weeten, na de dood verdwijnen; en het niet geoorloft is, een levend Menſch te gebruyken; ook dat hy dikwils een dood Menſch niet kan bekomen.

Op dat men in 't Ontleeden met order zou voortgaan, word 's Menſchen-Lighaam verdeeld in den *Tronk* en de *Ledenmaten*.

Men verſtaat door den *Tronk*, al wat begrepen ^{Den} word van 't opperſte des Hoofds, tot aan de Scha- ^{Tronk} ^{van 's} ^{Lighaam.}

¹ Anatomia Speculativa.² Practica.

melheyt, en Lieffen, die ook daar in begrepen zijn, uytgenomen de Armen.

De Lede-
maten.
Armen.
Beenen.
Drie hol-
ligheden
in 't Lig-
haam.

Men verstaat door de *Ledematen*, de Armen en Beenen, die verder zullen verdeeld worden.

In den *Tronk* zijn gemeenlijk drie groote hollighe- den, die ook Buyzen genaamt worden, en yder hol- ligheyt bevat in zig verscheyde deelen.

Die holligheden worden genaamt, volgens de or- der, of de plaats, die ze in 't Lighaam hebben, en zo zegmen de eerste, tweede, en derde, of wel de opperste, middelste, en onderste.

De opper-
ste.

De opperste holligheyt is, die gemaakt word door de Beenderen van 't ¹ Bekkeneel, en bevat in zig de Herffenen, en haar Vliezen.

De mid-
delste.

De middelste holligheyt is, die zig uytstrekt van de ² Sleutel-beenderen tot aan 't ³ Midden-rift, en be- sluyt in zig 't Hart, Longen, ⁴ Midden-schor, een deel van den ⁵ Slok-darm, en ⁶ Longe-pijp met haar Vaten.

De onder-
ste.

De onderste holligheyt is, die zig uytstrekt van 't Midden-rift tot aan 't ⁷ Schaam- en ⁸ Staart-been, en bevat in zig de Maag, Darmen, Lever, Milt, en eenige andere deelen, die op hun plaats beschreven worden.

De voorgemelde holligheden worden zomtijds ge- nomen met de deelen, die ze uytmaken; en worden verdeeld in 't Hoofd, Borst, en Buyk: boven dien word yder dezer deelen door byzondere namen onder- scheyden: want het voorste deel des Hoofds, dat in de ongebaarden glad is, word Aangezigt genaamt; welker bovenste deel A het Voorhoofd, 't opperste B 't Opperhoofd, 't agterste, en onderste C 't Agter- hoofd, en de zydelijke deelen D de Slapen des Hoofds genaamt worden.

Aange-
zigt.
Voor-
hoofd.
Opper-
hoofd.
Agter-
hoofd.

Slapen des
Hoofds.
Hals.
Nek.
Keel.
Rug.

Het deel gelegen tusschen 't Hoofd, en de Borst E R is de Hals, 't agterste E de Nek, en 't voorste F de Keel.

'T agterste deel der Borst, word de Rug, 't voor-

¹ Cranium. ² Claviculae. ³ Diaphragma. ⁴ Mediastinum.
⁵ Oesophagus. ⁶ Aspera arteria. ⁷ Os pubis. ⁸ Os coccygis.

I N L E Y D I N G.

ste de Borst, en de zydelijke deelen, enkelijk zijden Borst.
 genaamt, de holligheyt in 't midden G is de Harte- Zyden.
 put, en beyde Verheventheden a a, voornamelijk in Harte-put.
 de Vrouwen, worden Borsten, of Mammen genaamt. Mam-

De Buyk word verdeeld in drie deelen 1. 2. 3., het men.
 bovenste deel 1 is de 1 Boven-buyk, en eyndigt on- Boven-
 trent twee dwerse Vingeren boven den Navel 1: het buyk.
 middelste 2 is 't Navel-deel, en eyndigt ontrent twee Navel-
 dwerse Vingeren onder den Navel: en 't onderste deel deel.
 word de Onder-buyk geheten 3. Onder-
 buyk.

De zydelijke deelen des Boven-buyks H H, zijn de
 zyde-Boven-buyken, een regter, en een linker. Zyde-
 Boven-
 buyken.

De bovenste zydelijke deelen des Onder-buyks K
 zijn de Heupen, en 't onderste deel onmiddelijk bo- Heupen.
 ven de Schamelheyt L, dat met Wol, of Hayr be-
 kleed is, word het Schaam-heuvelken genaamt: zom- Schaam-
 migen stellen op die plaats 't vierde deel des Buyks. heuvel-
 ken.

De deelen nevens de Schamelheyt, in den vouw der
 Dye M, zijn de Lieffen. Lieffen.

Onder de agterste deelen des Buyks, is 't bovenste
 deel N de Lenden, en 't onderste de Billen O. Lenden.
 Billen.

Het laagste deel van de holligheyt des Buyks, daar
 de Blaas, de Endel-darm, en in de Vrouwen de Lijf-
 moeder legt, word genaamt het Bekken. Bekken.

De Schaam-deelen hebben hun eygene, en byzon-
 dere namen, na dat 't Geslacht verscheyden is, die
 in hun Beschryving zullen aangewezen worden.

De bovenste Ledematen worden verdeeld in den Op- Verdee-
 per-arm, Onder-arm, en Hand. ling der
 Ledema-
 ten.

De Opper-arm strekt zig uyt van des Schouder P, Opper-
 opperste deel, tot aan den vouw van den Elleboog Q. arm.

De Onder-arm strekt zig uyt van den vouw van den Elleboog tot aan de Voor-hand R. Elleboog.
 Onder-
 arm.

De Hand word verdeeld in drie deelen: de Voor-
 hand R, waar door de Hand bewogen word, en De Hand.
 strekt zig uyt ontrent twee dwerse Vingeren. Voor-
 hand.

De Na-hand S T, strekt zig uyt van 't eynde der Na-hand.
 Voor-hand tot aan de Vingeren, welker binnenste de

1 Epigastrium. 2 Regio umbilicalis. 3 Hypogastrium.

H H Hypochondria. R Carpus. S T Metacarpus.

* 4

Palm.

I N L E Y D I N G.

- Palm.** Palm, en 't buytenste de rug der Hand genaamt word.
- Rug der Hand.** Het derde deel der Hand bestaat in vyf Vingeren:
- Vingeren.** de eerste, die de dikste is, en buyten de rye staat, is
- Duym.** de Duym: de tweede is de Wys-vinger, om dat hy
- Wys-vinger.** word gebruykt als men iet wil wyzen: de derde, of
- Middelste vinger.** middelste, is de langste: de vierde is de Ring-vinger,
- Ring-vinger.** om dat de Vrouwen daar een Ring aan dragen: en
- Oor-vinger.** de vyfde is de kleine, of Oor-vinger.
- Verdeeling der onderste Ledematen.** De onderste Ledematen worden, gelijk de bovenste, verdeeld in drie deelen: in de Dye, Scheen, en Voet.
- Dye.** De Dye V strekt zig uyt, van de Lies M, tot aan
- Knye.** de Knye U; de Scheen of 't Been strekt zig uyt, van
- Scheen.** de Knye tot aan den Voor-voet W, en word 't agter-
- Kuyt.** ste, en dikste deel U Kuyt genaamt. De verhevent-
- Enklauw.** heyt aan 't onderste eynde der Scheen, word de En-
- De Voet.** klauw genaamt, en is een inwendige X, en een uyt-
- Voor-voet.** wendige.
- Hiel.** De Voet, gelijk de Hand, word verdeeld in drie
- Na-voet.** deelen: in den Voor-voet, Na-voet, en Teenen.
- Teenen.** De Voor-voet W volgt onmiddelyk op de Scheen, en word de Voet daar door bewogen.
- Verdeeling van 't Werk in VII. Verhandelingen.** 'T agterste deel des Voor-voets is de Hiel Y, en 't overige Z tot aan de Teenen, de Na-voet.
- Vogten en geesten zullen niet verzuymt worden.** Het derde deel des Voets, zijn de vyf Teenen, die geene byzondere namen hebben.
- X Malleolus.** Dit Werk bestaat in VII. Verhandelingen.
- W Tarsus.** De eerste is van de Enkele, of Eendaantige deelen.
- Z Metatarsus.** De tweede van de deelen des Buyks.
- I Partes similes.** De derde van de deelen der Borst.
- De vierde van de deelen des Hoofds.
- De vyfde van de Beenderen.
- De zesde van de Spieren.
- De zevende van de verdeeling der Vaten.
- En op dat men de beschryving der vaste deelen te beter zou verstaan, zo zal op verscheide plaatsen van de vogten, en geesten iet gezegt worden.
- Als een Mensch zal ontleed worden, word zulks gemeenlyk van den Buyk begonnen, op dat deszelfs deelen,

len,

I N L E Y D I N G.

len, de verrotting onderworpen, vertoont zijnde, ten eersten zouden uytgenomen worden.

Om iemand in de Ontleeding te onderwyzen, ſchijnt beſt te wezen de Borſt, en Buyk te openen, op dat de Bloed-vaten tot aan 't Hart, en vereeniging der Maag, met den ¹ Slok-darm, vertoont zouden konnen worden; ook om dat de deelen, voor de Lugt bloot gelegd, aanſtoncs bederven, en zo blijft de Borſt gemeenlijk geſloten, tot dat de deelen van den Buyk vertoont zijn.

In 't ontleeden van een Menſch is de ² Opper-huyd Van waar de Ontleeding be- 't eerſte deel, dat doorgesneden word; waarom veele gonnen word. Ontleeders de beſchryving der deelen eerſt van de Opper-huyd beginnen, hoewel dit niet noodzakelijk is: want dewyl 'er zekere deelen zijn, die tot maakſel der andere by na altijd t'samen komen, welker kennis eenigſints noodig is, om 't overige te verſtaan, zal 't beter wezen dezelve hier eerſt te beſchryven.

Zodanige deelen zijn de Vezelen, Been, Kraak- Eendaantige deelen. been, Band, Ader, Slag-ader, Water-vaten, Zenuwen, Vlees, Peezen, en Vet, gemeenlijk van de Ontleeders ³ Eendaantige deelen genaamt; maar om dat de verdeeling, in Eendaantige, en Meerdaantige deelen, veel twiſt is onderworpen, zo wil ik daar niet lang op ſtaan blyven, als voor hebbende die alleen te beſchryven, welke tot ons oogmerk dienen.

1 Oefophagus.

2 Epidermis.

3 Partes ſimilares.

H O O F D - S T U K K E N.

DE EERSTE VERHANDELING.

Begrijpende een korte beschrijving der deelen, gewoonlijk Een-daantige of *Similaire* deelen genaamt, en waar uyt 't maakfel der andere voor 't grootste deel bestaat.

H et I. Hoofdstuk van de Vezelen, pag. 2	en de natuurlijke plaats van eenige deelen des Buyks, 53
Het II. Van 't Been en Kraak- been, 3	Het VI. Van 't Net, 54
Het III. Van de Vliezen en Ban- den, 7	Het VII. Van de Maag, 57
Het IV. Van de Aderen en Slag- aderen, 9	Het VIII. Van de Darmen, 63
Het V. Van de Water-vaten, 15	Het IX. Van 't Darm-scheyl, 77
Het VI. Van de Zenuwen, 16	Het X. Van de Chyl-wegen, Melk-aderen, Chyl-zakjen, en de Chyl- of Borst-buys, daar ook een weynig van de Water-vaten word gespro- ken, 82
Het VII. Van 't Vlees en Klie- ren, 19	Het XI. Van de plaats, waar in de overige deelen des Buyks leggen, 94
Het VIII. Van de Spieren, 21	Het XII. Van 't Alvlees of Pancreas, 99
De II. Verhandeling van de deelen des Buyks.	Het XIII. Van de Milt, 101
Het I. Hoofdstuk. Van den Buyk en zijn deelen, als me- de van de Opperbuysd, 31	Het XIV. Van de Lever, Gal- blaas, en Gal-buizen, 103
Het II. Van de Huyden 't Vet, 33	Het XV. Van de Nieren, en Pis-leyders, 113
Het III. Van de Spieren des Buyks, 38	Het XVI. Van de zwarte Gal- doosjes, 117
Het IV. Van den Pens-zak, 49	Het XVII. Van de Blaas, en Pis-schagt, 118
Het V. Van de Navel-vaten,	Het

AANWYZING DER HOOFDSTUKKEN.

Het XVIII. Van de Mannely-	
ke Teel-deelen,	123
Het XIX. Van de Opper-kloot-	
jes, of Bystaanders, en Zaad-	
dragende Vaten,	129
Het XX. Van de Zaad-blaas-	
jes, en Voorstaanders,	131
Het XXI. Van de Mannelyke	
Roede,	136
Het XXII. Van de Lyf-moe-	
der, en haar banden,	152
Het XXIII. Van de Balle-	
kens, of Eyer-nesten der	
Vrouwen, en de Eyeren,	158
Het XXIV. Van de Trompet-	
ten der Lyf-moeder,	160
Het XXV. Van de scheede der	
Lyf-moeder,	162
Het XXVI. Van de Bloed-	
vaten, Zenuwen, en Wa-	
ter-vaten der Lyf-moeder,	166
Het XXVII. Van de uytwen-	
dige Vrouwelijke deelen, die-	
nende tot de Voort-teeling,	168

De III. Verhandeling van de deelen der Borst.

Het I. Hoofdstuk. Van de	
Borst, en haar deelen,	180
Het II. Van de Mammen,	181
Het III. Van 't Midden-rift	
of Diaphragma,	148
Het IV. Van 't Ribbe-vlies, en	
Midden-schot,	187
Het V. Van de Borst-klier,	
	192
Het VI. Van 't Harte-zakjen,	
	193

Het VII. Van 't Hart,	194
Het VIII. Van de Longe-pijp,	
Strot- en Lugt-pijp genaamt,	213
Het IX. Van de Long,	221
Het X. Van de Klier en der	
Longe-pijps takken.	231
Het XI. Van den Slok-darm,	
	233

De IV. Verhandeling.

Het I. Hoofdstuk. Van het	
Hoofd en zijn deelen,	239
Het II. Van de Hayren, en 't	
Panne-vlies,	240
Het III. Van de inwendige dee-	
len des Hoofds, en eerst van	
de Herffen-vliezen,	242
Het IV. Van de groote Herf-	
senen, en hun holigheden,	
als mede van 't Welssel, en	
't Helder-scheydsel,	247
Het V. Van 't verlangde Herf-	
sen-merg, de Zenuwen, Slag-	
aderen, gestreepte Lighamen,	
Net-wyze vlegting, en wat	
verders tot 't verlangde Herf-	
sen-merg behoort,	250
Het VI. Van de kleine Herffe-	
nen,	260
Het VII. Van den dienst der	
Herffenen, en der zelve voor-	
naamste deelen,	265
Het VIII. Van 't Rug-merg,	
	267
Het IX. Van de Spieren des	
Voor- en Agter-hoofds,	274
Het X. Van de voorste deelen	
des Monds, en van de Lip-	
pen	

AANWYZING DER HOOFD-STUKKEN.

pen en Wangen ,	275
Het XI. Van de Spieren van 't onderſte Kaak-been ,	278
Het XII. Van de Klieren der Keel , Kaken , Lippen , en Oor-klieren ,	280
Het XIII. Van de Oogen , en derzelver deelen ,	282
Het XIV. Van den Neus ,	297
Het XV. Van de holligheden van het Voorhoofds-been , Zeef- , Wigge- , en Kaak-beenderen , en derzelver Vliezen , &c.	307
Het XVI. Van de Ooren ,	314
Het XVII. Van 't Tong-been ,	327
Het XVIII. Van de Tong ,	330
Het XIX. Van de Klieren des onderſte Kaak-beens , en die onder de Tong leggen , als mede van 't Tand-vlees , Lelicken , en de Amandelen ,	333

De V. Verhandeling van de Beenderen.

Het I. Hoofdstuk. Van de natuurlijke gestaltenissen der Beenderen , tot yder in 't byzonder behoorende ,	341
Het II. Van de t'samenvoeging der Beenderen ,	346
Het III. Van 't Merg der Beenderen ,	353
Het IV. Van 't Bekkeneel , en zijn eyge Beenderen ,	358
Het V. Van 't Wigge-been , en Zeef-been ,	376

Het VI. Van de Kaak-beenderen ,	383
Het VII. Van de Tandten ,	390
Het VIII. Van de Rug-graat in 't gemeen ,	409
Het IX. Van de Wervel-beenderen des Hals , Rugs , en Lenden , of waare Wervel-beenderen ,	415
Het X. Van de valsche Wervel-beenderen , of 't Heylig-been , en Staart-been ,	421
Het XI. Van 't Borst-been ,	425
Het XII. Van de Ribben ,	427
Het XIII. Van de Schouder-bladen , en Sleutel-beenderen ,	431
Het XIV. Van de Naamlooze Beenderen ,	435
Het XV. Van 't Opper-arm-been , en Onder-arm-beenderen ,	439
Het XVI. Van de Hand ,	446
Het XVII. Van 't Dye- Scheenen Kuyt-been , en de Knyeschijs ,	449
Het XVIII. Van den Voet ,	460
Het XIX. Van de Zaad-beentjes ,	469
Het XX. Van 't onderscheyd tusschen de Beenderen van een Vrouw en Man ,	476

De VI. Verhandeling van de Spieren.

Het I. Hoofdstuk. Van de Spieren des Opper-arms ,	475
Het	

AANWYZING DER HOOFDSTUKKEN.

Het II. Van de Spieren des Schouder-blads,	479
Het III. Van de Spieren des Hoofds,	480
Het IV. Van de Spieren des Hals,	482
Het V. Van de Spieren der Len- den en Rug,	483
Het VI. Van de Spieren der Dye,	484
Het VII. Van de Spieren der Borst,	489
Het VIII. Van de Spieren des Onder-arms, en der Voor- band,	494
Het IX. Van de Spieren der Vingeren,	498
Het X. Van de Spieren des Scheen-beens, en Voor-voets,	507
Het XI. Van de Spieren der Teenen,	512

De VII. Verhandeling van de verdeeling der Vaten.

Het I. Hoofdstuk. Van de ver- deeling der groote Slag-ader,	518
Het II. Van de verdeeling der holle Ader,	531
Het III. Van de verdeeling der Poort-ader,	538
Het IV. Van de verdeeling der Zenuwen, en eerst van die on- middelijk uyt het Bekkeneel voortkomen,	544
Het V. Van de verdeeling der Zenuwen van 't agtste, vijfde, en zesde paar na de onderste deelen,	546
Het VI. Van de verdeeling der Zenuwen, die uyt 't Rug-merg voortkomen,	557
Het VII. Van de Nagelen,	560

Obtulit mihi *Joannes Palsyn*, *Chirurgus juratus*, *Anatomic.*
& *Lector Osteologiae & Chirurgiae Gandavi*, Librum, cui
titulus *Heelkonstige Anatomie &c.* addita petitione, ut cum
evolverem, & quid de illo sentirem testarer. Legi illum &
animadverti in eo Anatomiam, quatenus Chirurgiae inservit,
succinctè tradit; morborum, qui Chirurgiae objectum sunt,
sedes ostendi, quid Chirurgus circa illos agendum doceri, atque
ita Anatomiam & Chirurgiam combinari. Quam metho-
dum cum primum sit molitus, Chirurgis utilissimam operam
praestitit, & ideo dignari judico ut imprimatur. In fidem
horum gentis mea insignia adpressi, & nomen meum sub-
scripsi. Actum Lugduni in Batavis die 20 Augusti anno
Christi 1716.

BERNHARD. ALBIN. *Phil. & Med. Doctor.*
Sacrae Regiae Majest. in Pruss. Consil. Aulic. &
Archiat. & in Acad. Lugd. Batav. Me-
dic. Theoret. & Practic. Professor.

TEn verzoeken van *Joannes Palsyn*, vermaard Leeraar der
Ontleed-konst, en der Handwerkende Heel-konst, heb
ik doorgelezen het Boek, dat hy heeft geschreven over deze
twee Konsten, verstandig te samen gevoegt. Ik meen, dat
de uytgeevening van dit Boek zeer veel nut zal geeven aan al-
le, die deze Wetenschap grondig willen leeren verstaan, of
konstig oeffenen: voor al, dewyl alhier de voornaamste
Ziekten volgens haar aard, zit-plaats, gevolgen, en ver-
eyschte genezing gedurig wyzelijk werden gevoegt onmidde-
lijk aan de nette beschryving van de eyge gestalte der dee-
len, het welk waarlijk van de uyterste nuttigheyt zynde;
tot nog toe evenwel door niemand openbaar op zo een wijs
is uytgevoerd.

H. BOERHAVE, *A. L. M. Phil. & Med. Doctor,*
hujus, & Botanices, ut & Collegii Pra-
etici in Academia Lugd. Batav.
Professor publicus.

Leyde 1716 ^{8.} 18.

OP 't verzoek van *Johan Palfyn*, geadmitteerde Heelmeester der Stad Gent, en aldaar aangestelde Prælector in de Osteologie, ende in de Manuale Operationen der Chirurgie, tot onderwyfing van de Leerlingen derzelver Stad Gent, hebbe doorfien een Boek, t'famen gestelt, en van den Schryver genaamt, *Heelkonstige Anatomie*, het welke Ik bevindende uyt zeer ervarende, en geapprobeerde, zo oude als nieuwe Schryvers, in deze beyde Wetenschappen getrokken te zijn. Oordeele Ik uyt de goede en de beknopte wyze, die den Auteur in 't schryven van het zelfde Boek gehouden heeft, dat de Leerlingen veel nut en voordeel uyt de Leefing zullen verkrygen. Actum 29 Aug. 1716.

J. J. RAU, *Med. Doctor. in Leyd. Academia Anatomies & Chirurgia Professor ordinarius, Civitatis Leydensis & Amstelodamensis Operator & Lithotomus ordinarius.*

Subfignatus Anatomix & Chirurgix in Lovaniensium Universitate Professor Regio-Cæsareus ac Nosocomiatæ attente examinavi Chirurgico-Anatomicum opus Magistri *Joannis Palfyn*, *Chirurgia apud Gandavenses publici Lectoris*, quod usque adeo curiosum, & Authoris scopo conforme repereri, ut putem Authorem per hoc cum excellentissimis antè hac Anatomicis pro palma acriter disputaturum; nam præterquam quod accuratæ partium descriptioni & delineationi earundem Chirurgicos defectus, secus ac Anatomici consuevere, appropriatè utrobique conjungat, ita inutiles ambages, & inanes monologias præterivit, ut in eo nihil superfluum, simul & nihil imprudenter relictum, adeoque in compendio abundantiam Lector sit detecturus, ita ut hunc Librum non solum Chirurgix tyronibus, sed & ea in arte Magistris, quin & quibusvis Medicinæ cultoribus per utilem planè, adeoque & prælo dignissimum judicem. In fidem &c. Lovanii 1 Septembris 1716.

J. F. Favelet. *M. P. R. C. & Nosocomiat.*

WY Prior van 't strikt Collegie der Faculteyt der Medicyne van d'Universiteyt van Loven, hebben geëxamineert zeker Boek, dragende voor tytel *Heelkonstige Anatomie*, of Ontleeding van 's Menschen Lighaam &c. saamgesteld door *Johan Palfyn*, *gesworen Meester Chirurgyn*, *Anatomicus*, en *Lector van de Osteologie*, en *Chirurgye binnen Gent*: waar in wy bemerken, dat niet alleen zeer naauwkeurig beschreven staan alle de deelen van 's Menschen Lighaam, zo als ze tegenwoordig by de aldervermaardste Anatomisten bekend zijn; maar bevinde ook dat onmiddelijk na derzelver nette beschryving, zeer verstandig bygevoegt zijn de voornaamste Chirurgicale Ziekten, benevens de Operatien, dienstig tot haar genezing, dat waarlijk tot nog toe noyt van iemand, zo veel ons bekend is, op zo een wyze is uytgevoert, waarom wy oordeelen dit Boek van de aldergrootste nuttigheyt te wezen, niet alleen voor de jonge Chirurgijns; maar ook voor alle de geene, die hen in de Anatomie, en Chirurgye willen perfectioneren, en daarom alderweerdigst (tot welvaart van 't publyk) om gedrukt te worden. In teeken der waarheyt hebben wy alhier bygevoegt onzen gewoonlijken Zegel op heden binnen Loven den laatsten Augusti dezer Jaare zeventien hondert zeventien.

J. SOMERS *Medicinae Doctor, & Professor*
Regis Primarius, nec non stricti
Collegii Prior 1716.

Plaats van den  Zegel.

UYT-





UYTLEGGING

VAN d'EERSTE

FIGUUR.

d'EERSTE TAFEL.

In welke afgebeeld word een leevend Mensch, met aanwysing van 't meeste deel der uytwendige deelen.

A	Het Voorhoofd.	O	De Billen.
B	Het Opperhoofd.	P	d' Opper-arm.
C	Het Agterhoofd.	Q	De Vouw van d'Elleboog.
D	De Slapen des Hoofds.	R	De Voorhand.
E	De Hals.	S T	De Naarhand.
F	De Keel.	S	De Palm des Hands.
G	Het Herte-putje.	T	De Rug des Hands.
1	De Boven-buyk.	V	De Dye.
2	Het Navel-deel.	U	De Knye.
3	d' Onder-buyk.	U	De Kuyt.
H	De Zyde-boven Buyken.	W	De Voorvoet.
I	De Navel.	X	De Enklauw.
K	De Heupen.	Y	De Hiel.
L	Het Schaam-heuvelken.	Z	De Naarvoet.
M	De Lieffen.	1. 2. 3. 4. 5.	De Vingeren, en Teenen.
N	De Lenden.	A	d'Eere

D'EERSTE VERHANDELING

DER

HEELKONSTIGE ONTLEDING

VAN 'S MENSCHEN LIGHAAM:

Begrypende een korte beschryving der deelen, die gemeenlijk Eendaantige of Similaire genaamt worden, en waar uyt het maakfel der andere, voor 't grootste deel, bestaat.

HET EERSTE HOOFDSTUK.

Van de Vezelen.

2. Tafel.
1. Fig.
Vezelen
wat
zijn.

Verdee-
ling der
Vezelen
in Vleezi-
ge &c.

DE Vezelen zijn zeer fijne deelen, langer als dra-
den, uyt welke by na al d'andere deelen van 't
lighaam t'samen gestelt zijn, en volgens hun
verscheyde stoffe, verschillen ook de deelen in zelf-
standigheyt: daar zijn vleezige, peezege, en
zommige, die zenuwagrig zijn &c. En volgens de ge-
steltens, dieze in de deelen behouden, zijn'er, die regt,
en andere, die kromloopende zijn.

De regtloopende kunnen vorder verdeeld worden in
zulke, die volgens de langte, dwers, of schuyns loo-
pen, welke loop van Vezelen moet aangemerkt
worden in de Tafel zo gestelt te zijn, als of het deel
zelf uyt de voorgemelde Vezelen bestond.

De kromloopende Vezelen kan men onderschey-
den in zulke, die in 't rond loopen, boogwijs, of met
hoeken zijn, by welke *Stenon* voegt de slangrings-
wijze, *Spirales*, waar uyt de vleezige rok der flokdarm
bestaat, maar dit is in den Mensch niet te vinden: de
gene, die boogwijs loopen, ziet men in 't agterste
deel der longepijp.

1. *Aspera arteria.*

Bo

HEELKONSTIGE ANATOMIE. I. VERHAND. 3

Boven dien zeggen d'Ontleeders, dat de deelen regt, schuyns, en dwers loopende Vezelen hebben, waar uyt schijnt te volgen, dat de twee laatste onder de regt loopende niet gestelt konnen worden; maar weet dat se dan meest altijd spreken van deelen, die hol zijn, als een pijp; by voorbeeld, de flokdarm, en darmen, in welke geen regt loopende Vezelen zijn, ten zy, die volgens de langte loopen; en die ze in de voorgemelde deelen dwers loopende noemen, moeten onder die in 't rond loopen gestelt worden. Ziet den loop van die Vezelen in de 1. Figuur, de 2. Tafel. A. B. C. D. d. E. F.

Vorders moet men ook niet denken, dat de Vezelen t' eenemaal vast van maakzel zijn, dewijl de Geleerde meenen, dat de Geesten vloeyen door de Vezelen der Spieren, 't welk niet kan geschieden zonder holligheyt: ook leert d'ondervinding, dat het bloed loopt door de vleezige Vezelen der Spieren; en dat door de Vezelen, die de maag, darmen, en ander vleezige deelen bewegen, een sijne stoffe vloeyt, niet zeer ongelijk aan 't water, zonder welke zig die deelen niet bewegen konnen. 't Is ook zeer waarschijnlijk dat de Geesten vloeyen door de kleyne Vezelkens, die de vleezige Vezelen der Spieren aan een hegten, al het welk beter zal verstaan worden, uyt 't gene in 't VIII. Hoofdstuk van de verhandeling der Spieren zal gezegt worden.

Veel Vezelen zijn hol.

Gebruik der Vezelen.

De Vezelen dienen voornamelijk tot maakzel en vastigheyt der deelen, en om de beweging te verrigten, dat nog klaarder blijken zal, als 't maakzel der deelen, die'er uyt bestaan, onderzocht zal worden.

HET II. HOOFDSTUK.

Van 't Been, en Kraakbeen.

Het Been is 't hardste deel van 't lighaam; uytwendig meest over al wit: veele zijn inwendig
1. Oesophagus.

Been wat is.
Is natuurlijk wit.

eenigfints rood, en daar wat weeker: zo dan, indien 't Been zagt, geel, fwart, of anders van kouleur is, is dat niet natuurlijk; maar voor een ziekte te rekenen.

Welke
Beenderen
rooder
zijn.

De Beenderen, die zeer spongieus, met een dunne beenige korst bekleed, en van veel bloed-vaten voorzien zijn, gelijk de ribben, sleutelbeenderen, en d'uyt-einden der groote, en lange Beenderen, zijn rooder, als die binnen hol, en vast van maakfel zijn, gelijk in 't midden, van de 1 Dye, en 't 2 Opperarm-been.

En die kouleur verandert volgens de jaren: want in jonge kinderen zijn ze rooder, als in bejaarde, om dat d'eerste voorzien zijn met meer bloedvaten, die in bejaarde verdroogen, en verdwijnen; om dat de beenige Vezelen zig uytzettende, de vaten toedrukken, dat se geen bloed meer doorlaten, en niet meer gezien worden.

Aangaande 't gevoel der Beenderen, zo men die aanmerkt t' samen gestelt van been, aderen, slagaderen, zenuwen, en vliezen, die ze bekleeden, zijn ze zeer gevoelig; anders is de eyge zelfstandigheyt van 't Been alleen genomen ongevoelig.

Beenvlies
bekleed
meest al
de Beenderen.

De Beenderen zijn bekleed met een dun, en zeer gevoelig vlies, 3 Beenvlies genaamt, behalven de tanden, zaadbeentjes, die der 4 Voorhand, en ter plaats, daar veel Beenderen de 5 Geledingen maken, op welke laatste dit Vlies niet is, om dat geen pijn zou ontstaan, door 't gedurig tegen een vryven van 't zelve, in de beweging der Beenderen. In de Pokkige ontstaat zomtijds groote pijn in dit Vlies, voornamelijk des nagts, als se warm zijn.

Worden
gemaakt
van Vezelen.

De Beenderen bestaan uyt een vergadering van Vezelen, en kleyne cellekens, en schoon men d'eerste uyt reden van de hardigheyt niet kan bemerken, zo nogtans de Beenderen in nieuw gebore kinderen, nog zagt zijnde, met de hand gebroken worden, zal men de Vezelen in 't midden der breuk klaarlijk zien.

Merg der
Beenderen.

In de holligheyt der Beenderen, is een zeker vette stoffe, die merg genaamd word, dienende zo om de

1 Os femoris. 2 Os humeri. 3 Periostium. 4 Carpus.
5 Articulatio.

zelve te vullen, als om 't Been over al te doordringen, op dat het door zijn droogte niet te ligt zou breken. De natuur, en gebruyk van 't zelve zal nauwkeuriger beschreven worden, in 't III. Hoofdstuk van de vijfde verhandeling.

De Beenderen verschillen in groote, gedaante, hardigheyt, gelegentheyt, t' samenvoeging, en gebruyk, van welk in 't bysonder zal gesproken worden, in verscheyde Hoofdstukken van de vijfde verhandeling.

Verschey-
dentheyt
der Beenderen.

Aangaande 't gebruyk der Beenderen, zo dienenze, eerst tot vastigheyt van 't gansche Lighaam, en steunfel van de deelen, gelijk men ziet in d' onderste Ledematen, en Ruggraat. Ten tweeden tot oorspronk, en inplanting der Spieren, en om haar langte te bepalen. Ten derden om eenige deelen te bevatten, en te bevryden voor uytwendige ongemakken, gelijk men ziet in 't Bekkeneel. Ten vierden, om de spijs te verbreken. En ten vijfden, dienen eenige om de lugt op een zekere manier te bewegen, tot het gehoor, gelijk geschied door de kleyne beenderkens, die in den trommel van 't Oor geplaatst zijn.

Gebruyk.

Rakende 't gebruyk der Beenderen in 't bysonder, hun t' samenvoeging, en meer andere dingen, zal voornamelijk gesproken worden in de vijfde verhandeling.

De Beenderen worden zomtijds zo zagt, dat se buygen als leer, 't welk zeer gemeen is in kinderen, die een Lendevang of Rachitis hebben, dat een landziekte is in Engeland, waar van ik te Parys een geraamte gezien hebbe van een kind, aldus. Het Bekkeneel was veel grooter, als natuurlijk. Op 't Voorhoofdsbeen waren twee verheventheden; een aan elke zijde. Ook was'er een verheventheyt op 't agterhoofdsbeen, ontrent de t' samenvoeging des hoeks met de pijnnaad. De sleutelbeenderen waren krommer als natuurlijk. De zyden der ribben waren na de borst ingedrongen, en zo gebogen niet, als natuurlijk, en daar ze met de Kraakbeenige deelen vereenigden, was een dikte gelijk een hazelnoot: de binnenste oppervlakte was oneffen, gelijk gefronst. De ruggraat was

gekromt als een Roomfche S. aan 't eerste wervelbeen der lendenen, en zo waren ook gebogen d' opper-, en onder-Arm beenderen, de Dye, Scheen-, en Kuytbeenderen.

Kraak-
been wat
is.

Veel ver-
anderen
in Been-
deren.

Het Kraakbeen is een deel, dat buygzaam, wit, glad, en ongevoelig is, niet zo hard als 't Been, en by gevolg zo breekzaam niet, Daar zijn'er meer in kinderen, als in bejaarde menschen, om dat'er veel in d'eerste, allengskens in Been moeten veranderen, en ze worden by gebrek van goet voedzaam zap, waar door ze buygzaam blyven, dikwils hard, en beenig, gelijk men ziet in oude luyden, aan de Kraakbeenige deelen der Ribben, Schaambeenderen &c.

Men vind het meeste deel aan d'uyteinden der Beenderen: eenige zijn dik, en sterk, gelijk de Kraakbeenige deelen der ribben, en der schaambeenderen, andere zijn dun en buygzaam, gelijk de ringen der Longepijp: ook zijn ze zeer verscheyden vangedaante &c.

Die aan d'uyteinden der Beenderen zijn, dienen om ze ligter, en gemakkelijker te doen bewegen, en daarom zijn ze glad, en effen; en word in de Geledingen, in welke een openbare beweging is, een slymig vogt, door zekere kliertjes of vliezige zakjes, van 't bloed afgescheyden, die in de Geledingen gevonden worden: en als dit vogt ontbreekt, worden de Kraakbeenderen hard, droog, en oneffen, waar uyt een gekraak ontstaat in die ' Geledingen, als men de Beenderen beweegt; waar aan de Pokkige, en Scheurbuykige onderworpen zijn, volgens getuygenis van den vermaarden *Willis*.

Gebruik
der Kraak-
beenderen

Het gebruik der andere Kraakbeenderen is veeldeley: eerst dienen se, om zekere wegen altijd open te houden, gelijk in de ' Longepijp. Ten 2. om de gedaante te geven aan zommige deelen, gelijk de Ooren en Neus. Ten 3. tot steunfel, en bescherming, gelijk de Kraakbeenderen der Ribben de Tusschenribbige Spieren op die plaats ondersteunen, en dienen

1 Articulationes. 2 Aspera arteria.

om

om d'Ingewanden der borst te beschermen; maar 't aldergemeenste gebruyk is, datse dienen voor een middel, in de t' samenvoeging der Beenderen.

HET III. HOOFDSTUK.

Van de Vliezen, en Beenderen.

Het Vlies is een deel, dat wit, buygsaam, dun, II. Tafel.
 en uytgespreyd is A. B. bestaande uyt zekere 2. Fig.
 Vezelen, die als een webbe van draden door malkan- Vlies wat
 der zijn gevlogten. is.

Het onderscheyd der Vliezen is veelderley.

Daar zijn'er, die uytwendig, andere, die inwendig Onder-
 zijn gelegen: eenige zijn zeer gespannen, dun en van scheyd.
 een scherp gevoel: andere zijn slap, dik en zo gevoe-
 lig niet: daar zijn'er breede, lange, en smalle, drie-
 of vierkant, van gedaante plat, of krom, &c.
 volgens de deelen, die ze bekleeden: eenige zijn door-
 weven met menigte van zichtbare bloedvaten, en an-
 dere zijn doorzigtig.

De voornaamste Vliezen, die gevonden worden, zijn
 't 1 Ader-, en 2 Lammer-vlies, waar mede de Vrucht
 omwonden word, en in bejaarde menschen d'Opper-
 huyd, de Huyd, 't Vetvlies, de Vliezen, die de spieren
 bekleeden, 't Beenvlies, en de Vliezen, waar uyt de
 vaten bestaan, die rokken genaamt worden. Uyt- Rokken.
 wendig op 't Hoofd zijn 3 't Panvlies, en inwendig het
 dikke, en dunne Herffenvlies, die ook Moeder-vlie-
 zen of Meninges in 't latijn genaamt worden, en die
 zig met een derde door gansch de holligheyt der Rug-
 graat uytstrekken. In de Borst 't Borst-vlies, 4 't Mid-
 delschor, 't Herte-zakjen, 't Vlies der Longen, en
 Longepijp. In d'Onderbuyk de 5 Pens-zak, het 6
 Net, 7 Darmscheyl, en Vliezen, die d'Ingewanden
 bekleeden, gelegen in d'Onderbuyk, gelijk de Lever,
 Milt, Darmen, en Blaas, &c.

1 Chorion. 2 Amnios. 3 Pericranium. 4 Mediastinum
 5 Peritonaeum. 6 Omentum. 7 Mesenterium.

De Vliezen dienen eerst om deelen te bekleeden, gelijk de Herffenvliezen de Herffenen bekleeden. Ten 2. om de vaten, en zekere buyzen te maken, gelijk de Maag en Darmen. Ten 3. om de deelen aan een te heggen, en zo hegt het 1 Darmfcheyl de darmen aan 't eerste, en derde Wervelbeen der Lendenen. Ten 4 om de holligheyt der Borst in een regter, en linker zijde te fcheyden, gelijk 't Middelschot. Ten 5. dienen de Vliezen tot een werktuyg van d'uytwendige zinnen, &c.

Gebruyk
der Vliezen.

De Vliezen zijn de deelen, waar in d'ontstekingen gemeenlijk geschieden; en volgens de plaats, daar d'ontsteke Vliezen leggen, ontfangen d'ontstekingen verscheyde namen. By voorbeeld in d'Oogen Ophthalmia. In de Keel Angina. In de Zyde der Borst Pleuritis, of Zyde-wee.

Band.

De Band is een deel, dat wit, en buygsaam is: eenige worden Kraakbeenige, ander Vliezige, en zommige Zenuwagtige genaamt, na datse in selfstandigheyt, en gedaante met een Kraakbeen, Vlies, of Zenuw over een komen. Eenige zijn zeer gevoelig, gelijk die voortkomen van peezige, of vliezige deelen, andere hebben weynig, of geen gevoel, gelijk de banden, die de beenderen t'famen binden, en zijn daarom ook harder, dikker, en sterker: want gelijk de Beenderen sterk zijn, en veel bewogen worden, moetenze ook met sterke banden t'famen gebonden zijn.

Gebruyk
der Banden.

Behalven dat de Banden dienen, om de beenderen t'famen te binden, worden daar door ook eenige deelen opgeschort, gelijk de Lijfmoeder, de Lever &c. andere dienen als een scheede of ring, tot doorgang van de peezen gelijk de ring-wyfe bandaan de Voorhand &c.

De Banden worden zomtijds doordronken door overvloed van vogten, waar door ze verflappen, zo dat de beenderen, en zommige zachte deelen, wel uyt hun plaats vallen.

1 Mesenterium.

HET

HET IV. HOOFDSTUK.

Van d' Aderen, en Slagaderen.

II. Tafel

3. Fig.

Wat een
Slag-ader
is.

DE Slagader is een Vat, waar in men een klopping gevoelt, dienende om 't bloed uyt de holligheden van 't herte te voeren naar alle deelen van 't lighaam.

Hoe veel

Slag-ade-
ren.

Haar oorsprong.

Daar zijn niet meer als twee voornamen Slag-aderen, te weten: de groote Slag-ader, en Long-slag-ader, de laatste neemt haar begin van de rechter holligheyt van 't hert, en brengt het bloed in de Longen; en d'eerste neemt haar oorsprong van de linker holligheyt, en voert het naar alle deelen van 't Lighaam.

De klopping der Slag-aderen ontstaat, om dat se gedurig met bloed gevult, in d' Aderen ontlasten, en die word voornamelijk gevoelt in Slag-aderen, die niet diep leggen, gelijk daar de Genees-heeren de Pols voelen, en aan de slaap van 't Hoofd.

In welke
Slag-ade-
ren de
klopping
gevoelt
word.Ader wat
is.

De Ader is een Vat, waar door 't bloed wederkeert uyt alle deelen van 't lighaam naar de holligheyt van 't hert, A.

Hoe veel

Aderen.

Holle-
Ader.

Daar zijn drie voornamen Aderen, te weten de Holle-ader, de Long-ader, en Poort-ader: de Holle-ader is met een wyde opening vast aan de rechter holligheyt van 't hert, waar in ze haar bloed gedurig ontlast. De Long-ader is met een wyde opening vast aan de linker holligheyt van 't hert, en ontlast van gelyken gedurig haar bloed in de zelve. Deze twee Aderen zijn verdeelt in verscheide takken, by na gelijk de Slag-aderen, en brengen 't bloed te rug uyt de takjes der Slag-aderen naar de holligheden van 't hert.

Long-
Ader.

De Poort-ader is van een geheel ander maakfel: als de twee andere: want die begint met veel kleynen takjes, welke in een menigte deelen des buyks verspreyd leggen, en alle tot een grooten tronk geworden zijnde

Poort-
Ader.

verdeelt ze zig weder door de Lever in een meenigte kleyne takjes.

Gebruik
der Slag-
Aderen.

Het voornaamste gebruik der Slag-aderen, en Aderen, gelijk te voren in de bepaling gezegt is, is, dat de Slag aderen dienen om het bloed te voeren naar alle deelen van 't lighaam, zo om ze te voeden, te doen aanwassen, en verwarmen, als mede tot af-scheyding van verscheide vogten &c. End' Aderen dienen, om 't bloed te rug te brengen naar de holligheden van 't hert, op dat het met nieuwe Lugt-deeltjes bezwangert zijnde, weder tot de vorige diensten zou bequaam wezen.

Gebruik
der Ade-
ren.

Uyt het gene van den dienst der Aderen, en Slag-aderen gezegt is, blijkt klaar, dat het bloed gedurig door de zelve omloopt, 't welk ligtelijk te zien is; als men in een levenden hond, de Been-ader, en Slag-ader ontbloot, en toebind; zal men de Ader, van den band tot 't uysterste van 't been zien opswellen, en vanden band naar 't herte toe ontswellen; maar in de Slag-aderen zal het tegendeel geschieden.

Gaande door de Stadt Delft, ben ik gebragt geweest door den Heer Bleyfwyk, Lector van d' Ontleed-en Heelkonst, in de gemelde Stadt, by den vermaarden Heer Leeuwenhoek, die my door een vergroot glas zeer klaar getoont heeft d' omloop van 't bloed, in de staart van een Aal.

En om dat de takjes der Aderen, het bloed uyt de Slag-aderkens ontfangen, zo is 't, dat se malkander over al ontmoeten, of versellen; maar de groote takken zijn nu vereenigt, dan weder gescheiden; ja d' Aderen klimmen dikwils boven de Slag-aderen; het gene schijnt te geschieden, om de Slag-aderen te bevryden tegen d' uytwendige ongemakken, dewijl haar quetsing om de geweldige drift des bloeds gevaarlyker is, als die der Aderen.

Samen-
voeging
der Bloed-
vaten van
de zelve
soort,

En niet alleen worden de takjes der bloedvaten van verscheide soortt' samengevoegt, maar ook die van de zelve soort zijn, gelijk Aderen met Aderen, en Slag-aderen met Slag-aderen, en 't gene tot nog 't

mee-

meeste deel der Ontleeders in 't Hooft, en ontrent de Lijfmoeder alleen, voor iet byzonders gehouden hebben. II. Tafel
3. Fig.

Het was zeer nootzakelijk, dat de bloed-vaten in 't lighaam zo vereenigt wierden, op dat de loop van 't bloed niet zou verhiindert worden, en d'eene Slag-ader om de buyging des lighaams gedrukt zijnde, het bloed gemakkelijk door d'andere zou kunnen loopen, en daar van komt het, dat een merkelyke Slag-ader afgesneden zijnde, het deel onder de wonde door d'andere Slag-aderkens gevoed word: gelijk men ziet in d'Operatie van d'Aneurisma, of Slag-ader spat, daar de Slag-ader afgebonden zijnde, het deel onder de wonde gevoed word, door dien de zyde takjes van de Slag-ader met malkander gemeenschap hebben.

De Slag-aderen zijn van zelfstandigheyt veel dikker, als d'Aderen, en bestaan d'eene zo wel als, d'andere, uyt vier rokken: die rokken zijn in groote Slag-aderen zeer zichtbaar: maar in kleyne zo dun, datse eer uyt eenenkele rok, als uyt vier rokken schijnen te bestaan. II. Tafel
4. Fig.
Zo Aderen als Slag-aderen bestaan uyt vier rokken.

D'eerste of buytenste rok der Slag-ader heeft eenige zenuwagtige takjes, en is met menigte Bloed-vaten doorweven, die digt als een net door malkander zijn gevlogten, A. dat zeer wel gezien word in lighamen, die zonder bloedstoring zijn gestorven. Eerste en buytenste rok der Slag-aderen.

De tweede is een klierige rok, omdat die met zeer kleyne witte kliertjes is doorzaayd, B. en heeft ook veel kleyne vaatjens, die in den tronk der groote Slag-ader zichtbaar zijn. Tweede rok.

De derde is de spierige rok, bestaande uyt vleezige vezelen, die digt op malkander zijn gelegen, en in 't rond van de Slag-ader loopen. C. Derde rok.

De vierde en binnenste rok is de dunste, en vlies- of peezagtig: zijn vezelen loopen in de langte, en doorkruyssen de in 't rond loopende vezelen van de derde rok, met regte hoeken, D. digt aan 't hert zijnde dikker en gelijk als vliezig. Vierde rok.

En gelijk die rokken de buys der Slag-ader uytmaken,

Gebruik
der rok-
ken.

II. Tafel.

ken, makenze ook een ronde holle spier, welker binnenste, en buytenste rokken de peezen, en de vleezige vezelen der derde rok den buyk der spier uyt-maken: de zenuwen, en bloed-vaatjes brengen aan de stoffe tot beweging, en voeding, gelijk in d' andere spieren, en zo dient de ronde spier, of Slag-ader, om 't bloed, dat uyt 't hert in de zelve word gedreven, ende klopping maakt, vorders te dryven tot alle deelen van 't lighaam.

Eerste en
buytenste
rok van
d'Ader.

1. Fig.

De rokken van d' Aderen zijn by na van 't zelve maakzel, als de Slag-aderen, behalven dat se dunder, en anders zijn geplaatst: Want d'eerste rok is vliezig, en bestaat uyt verscheyde in 't lang loopende vezelen, die niet gelijk de vierde der Slag-aderen, evenwydig zijn gelegen, maar loopen dikwijls kruyswijls over malkander. A.

Tweede

De tweede rok is vaatig B. gelijk d'eerste van de Slag ader.

Derde.

De derde is klierig C. gelijk de tweede van de Slag-ader.

Vierde.

De vierde, en binnenste D. bestaat gelijk de derde van de Slag-ader, uyt ringwyze vleezige vezelen, maar dunder, en heel enkel gestelt; om dat hier zo veel kragt niet noodig is om 't bloed voort te dryven, als in de Slag-aderen, en dat het niet tot voedsel, nog af-scheyding van eenig vogt, door d' engste wegen moet doordringen, als mede om dat het bloed, 't welk door d' Aderen vloeyd, uyt enger, en meer zydwegen, in regter, en grooter gedurig overgaat.

't Is noo-
dig dat het
bloed tra-
ger loopt
door d'A-
deren.

De reden nu, waarom 't bloed in d' Aderen trager voort gedreven word, geschied, om dat het noodig is, dat 't bloed, 't welk door de Slag-aderen vloeyd, in d' Aderen eenigen tegenstand zou vinden, op dat het gene in verscheyde deelen afgesondert moet worden, te ligter zou geschieden: want zo 't Aderlijk bloed, door zijn trager loop, niet wederstont den snellen loop van 't Slag-aderlijk bloed, zou het agterkomende deel van 't bloed zo haast in de plaats wezen, als 't voorgaande, en zo zou'er nauwelijks eenig vogt tot voedsel, in de klieren kunnen afgescheyden worden.

En

En om dat het bloed van gelyken, door de Poort-ader naar de Holle-ader vloeyd, uyt een grooten, en regten tronk, in kleynder takjes, en de galle in d'enge gaatjens van de de kliertjes der Lever moet afgescheyden worden, zo is die ader van gelijken verzien met dikker rokken, zo dat se eenigfints de middenmaat, tusschen een Ader en Slag-ader schijnt te houden.

En dewijl te voren is gezegt, dat het bloed door d'Aderen zo snel niet moet gedreven worden, als door de Slag-aderen, zo zijn'er nog andere redenen van dien trager loop, en dat zo wel van wegens 't hert, als van 't bloed.

Van wegens 't hert; om dat de beweging, die 't bloed van 't zelve heeft ontfangen, en voornamelijk dat der linker holligheyt, in zijn loop veel vermindert, en mede gedeelt word aan d'omleggende deelen; en dat het bloed, 't welk in d'Aderen gevonden word, vorder van 't herte afgelegen is, als 't gene in de Slag-aderen word gevonden.

Van wegens 't bloed, bestaat dat in de verscheydenheyt van 't zelve: want het Slag-aderlijk bloed heeft veel fijner, en beweeglijker deeltjens, die in verscheyde deelen van 't lighaam afgescheyden worden, en in 't Aderlijk bloed ontbreken.

Dewijl het bloed veel trager loopt door d'Aderen, als door de Slag-aderen (ik spreek niet van de Longvaten), zo zijn d'Aderen daarom ook veel grooter: want daar 't bloed trager loopt, blijft het (als'er anders geen belet is) langer op den weg, en alzo meer ophoepende, beslaat noodfakelijk grooter plaats.

Dit niet tegenstaande, vloeyd meer bloed door de Slag-aderen, als door d'Aderen, behalven door 't deel der Ader gelegen tusschen d'inplanting der Chylbuys, en regter holligheyt van 't hert: want d'andere Aderen ontfangen niet byzonders, als dat se uyt de Slag-aderen ontfangen, welke boven dien het voedsel, en ander vogten voeren, die in verscheyde deelen afgescheyden moeten worden. Ziet d'inplanting der Chylbuis, in 't x. Hoofdstuk van de tweede verhandeling.

De

a Ductus Chyliferus.

De wonde
van de
Slag-ader
is gevaar-
lyker als
die van de
Ader.

Waarom
d'Aderen
in een
dood lig-
haam vol-
ler van
bloed
zijn.

6. Fig.
Klap-vlie-
zen in de
Aderen.

Dewijl dan meer bloed (gelijk getoont is) door de Slag-aderen vloeyd, als door d'Aderen, en ook vloeybaarder is; en 't zelve bloed door de sterker toetrekking der Vleezige vezelen van 't hert kragtiger in de Slag-aderen gedreven word, volgt daar uyt, dat het bloed met grooter geweld uyt de gequettste Slag-aderen moet springen, als uyt de Aderen, en een groote opening veel gevaarlijker is, 't gene de dagelijksche ondervinding bevestigt.

't Is om de zelve reden, dat in doode lighamen by na al 't bloed in d'Aderen word gevonden, en de Slag-aderen by na leeg zijn: om dat in de ster- vende, en mogelijk wat na de dood, de swakke beweging van 't Hert, en de Slag-aderen genoeg is, om 't bloed tot in d'Aderen te dryven, die ophou- dende, niet vorder kan gedreven worden.

Men vind hier en daar in de holligheyt der Ade- ren eenige zeer teere vlieskens, die Klap-vliezen ge- naamt worden: en die zijn met 't een eynde vast aan den binnensten rok, en met 't andere zijn ze los: ze worden gevonden een alleen, of twee, en meer t'famen, geplaatst, eenige afgelegentheyt van malkander, meer- maals daar d'Aderen zig verdeelen: men vind'er meer in d'Aderen van armen; handen, dyen, bee- nen, en voeten, als in d'andere deelen, en ze zijn ge- stelt, op dat se 't bloed, komende uyt de kleyne, naar de groote vaten, toelaten naar 't hert te vloeyen, maar beletten, als 't in de zelve is gekomen, dat 't na de kleyne niet nederzinke, en 't volgende bloed in zijn loop niet vertraagt worde. A. BB.

Dat het bloed uyt een Slag-ader komt, die gequett is, word bekend aan de schoone roode kouleur, en dun- heyt, en dat het met geweld al hortende uyt springt; daar dat van een Ader bruyn rood, en met min ge- weld eenparig uytloopt

HET V. HOOFDSTUK.

Van de Water-vaten.

DE Water-vaten zijn kleyne teere buyskens , II. Taf. 7. Fig. Water-vaten wat zijn. Waar ze gevonden worden. die by na gevonden worden in alle deelen van 't lighaam, uyt 't welk se voortkomen, met vele kleyne takjes, die hier, en daar by malkander komende, grooter vaatjes uytmaken.

Het vogt, dat se in zig behouden, is eenigfints lymig, helder, klaar, als water, en daarom van den Vinder Bartholinus water, of lymphä, en by gevolg de vaten, die 't zelve voeren naar 't bloed, water-vaten genaamt.

Die vaatjes zijn niet ligt te zien, ten zy ze opgevult zijn met water, en daarom is 't zeer moeyelijk die te vinden in den mensch, dewijlze gemeenlijk leeg zijn, eer 't aan d' Ontleeder toegelaten is, het doode lighaam te openen: hoewel Th. Bartholinus schrijft die in een mensch gezien te hebben, in 't Jaar 1654. de zelve zijn gevonden in 't Jaar 1651.

Men vind in die vaatjes zeer veel Klap-vliezen, Hun Klap-vliezen. die zo gestelt zijn, dat het water komende uyt de kleynder takjes, tot de grooter vaatjes altijd kan gaan, maar beletten 't ingeloope water na de kleynder weder te keeren, zo dat dit vogt, 't welk se ontfangen van de deelen, altijd uyt enger, tot wyder wegen overgaat.

Alle Water-vaten ontlasten niet hun vogt onmiddelijk in d' Aderen, want die uyt de deelen des buyks, Hunne inplanting. en onderste ledematen voort komen, brengen 't zelve in de Chijlzak, van waar 't vorder vloeyd door de Chijlbuys in d' onderfleutelbeen-ader, daar 't met 't bloed vermenigt word; van gelijken, die uyt de deelen der borst ontstaan, storten 't water in de Chijlbuys; maar die uyt 't hoofd, en de bovenste ledematen spruyten, ontlasten zig gemeenlijk in d' uytwen-

1 Cisterna. 2 Ductus thoracicus.

di.

dige ¹ Krop-ader, daar ze met d'Oxel-ader word vereenigt. En zonder twyfel zijn'er nog andere plaatsfen, daar ze ingeplant worden, die nog van d'Ontleeders niet ontdekt zijn.

Manier
om die te
vinden.

Die nieuwsgierig is de Water-vaten te vinden, neem een levend, of vers gestorve dier: want het water nog gemeenlijk zijn loop vervolgt, eenigen tijd na de dood; en bind een van de groote Aders, die met een Water-vat verzeld is: 't water hier door belet voort te vloeijen, zullen de Water-vaatjes opswellen, en met vele knoopjes dicht bezet worden, dat de Klapvliezen zijn, die 't ingeloope water beletten weder te keeren. a. a. a. vertoonen zig d' Aderen: die men daarj toe binden moet, zijn de ² Poort-ader ontrent de Lever, de Milt-ader by de Milt &c.

II. Taf.
7. Fig.

Natuur
van 't wa-
ter.

Dit water schijnt een weyagtig vogt te wezen, dat met eenige voedfame deeltjes is vermengt en gebragt tot de deelen om ze te voeden; dewijl 't overschot door d' Aderen niet kan weder keeren, waren die byzondere vaten noodig om 't na bloed te brengen. Van 't water, en zijn vaten, zal nog meer gesproken worden, in 't X. Hoofdstuk van de tweede verhandeling.

HET VI. HOOFDSTUK.

Van de Zenuwen.

II. Tafel.
3. Figuur.
Wat de
Zenuwen
zijn.

DE Zenuwen zijn witte, ronde, langwerpige deelen, die voort komen uyt de hersenen, en dienen, om de geesten na d' overige deelen van 't lighaam te voeren. B.

Hollig-
heyt in de
Zenuwen.

Men kan in de Zenuwen geen holligheyt bemerken: dat nogtans de kleyne draadjes, waar uyt se bestaan, hol zijn, blijkt, om dat een zenuw toe gebonden, de werking van 't deel, waar in ze zig verspreyd, vernietigt word: en dit om reden, dat belet word met de binding, de doorgang van iet, dat noodig is, om

1 Vena jugularis. 2 Vena porta.

die

die werking te verrigten, en van te voren door de zenuw vloeyde; en schoon dit iet lighaamelijks is, word het nogtans om zijn fijnheyt geest genaamt.

Eenige Zenuwen komen door de gaten van 't bek- ^{Haar oorsprong.} keneel, andere door de gaten der wervelbeenderen; maar hebben alle haar oorsprong van de hersenen, behalven weynige, die van 't Rug-merg voort komen, dienende tot de voeding. Van deze zal gesproken worden in 't VIII. Hoofdstuk van de vierde Verhandeling.

De Zenuwen bestaan uyt tweederley zelfstandigheyt, ^{Tweederley zelf-} een inwendige, die mergagtig, en een uytwendige, ^{standigheyt der Zenuwen.} die vliezig is. D' eerste komt van de witte mergagtige zelfstandigheyt der groote, of kleyne hersenen, en mogelijk ook uyt die van 't Rug-merg, en is ongevoelig. De tweede komt van de vliezen der hersenen, en is zeer scherp van gevoel.

De manier, hoe de Zenuwen van die deelen haar ^{Hoe de Zenuwen haar begin nemen.} begin nemen, is, dat'er veel mergagtige draadjes zijn, die bondelwijs van 't witte merg der groote, of kleyne hersenen voort komen, en eerst omkleed worden met het dunne, en dikke Hersen-vlies, welke die draadjes niet yder in 't byzonder; maar alleen den tronk uytwendig bekleeden.

Het buytenste vlies der Zenuwen schijnt voornamelijk te wezen tot een vastigheyt, en verlaat die, als ^{Gebruik van 't buytenste, en binnenste Vlies.} de draadjes, waar uyt se bestaan, van malkander scheyden, en na verscheyde deelen gaan, om ze te verziën van noodige geesten, zo dat waarschynelijk het meeste gevoel van 't dunne Hersen-vlies afhangt.

In de Zenuwen verre van haar begin, kan men geen mergagtige zelfstandigheyt bemerken, en schoon 't mergagtig deel der Zenuw niet gevoelt, moet het ^{Gebruik van 't Merg der Zenuwen.} nogtans de geesten in haar begin, uyt de groote of kleyne hersenen ontfangen, op datse tot de werktuigen der beweging, en het gevoel zouden over gaan; dewijl de vliezige zelfstandigheyt der Zenuwen, niet voort komt van de groote, of kleyne hersenen; maar van de Vliezen, die de zelve omkleeden, zo dat, hoe- wel men in 't mergagtig deel der Zenuwen verre van

zijn begin, niet kan bemerken, zo moet men denken dat yder mergagtig draadjen, nu harder geworden zijnde, zig gedraagt by na gelijk de pijp van een helm, die 't vogt uyt die ontfangt, en 't zelve brengt daar 't moet wezen.

Zenuwen
hebben
eygentlijk
geenen
Stam.

De Zenuwen hebben geen stam of tronk, gelijk de voorgemelde vaten, ten zy oneygentlijk genomen. Want dat in de Zenuwen de tronk genaamt word, is anders niet als vele draadjes, die by een verzamelt zijn, en yder van 't begin der Zenuw tot het eynde toe volherden, en als die van malkander fcheyden, zegt men dat de Zenuw zig verdeelt in verscheyde takken.

De Zenuwen
konnen in
vele draadjes
verdeelt
worden.

En daar van komt het, als 't harde Herffen-vlies afgescheyden is, dat men de tronk van zijn begin tot 't eynde in vele Zenuwkens kan van een fcheyden, gelijk te zien is in de 8. Figuur, en kan die van een fcheyding gemakkelijk geschieden door een fijne naalde: wanneer 't gezigt door een vergrootende bril word geholpen.

Verdeeling
der Zenuwen.
In die die-
nen tot de
beweging,
of der
zinnen.

De Zenuwen worden alderbest verdeelt in die de geesten brengen tot de werktuygen der beweging, of der zinnen.

In Zenuwen
tot de
uytwendi-
ge zinnen.
In Dierly-
ke, en Na-
tuurlyke.

De Zenuwen, die behooren tot de werktuygen der zinnen, worden verdeelt, volgens de uytwendige zinnen, waar in ze zijn verspreyd, in Reuk-, Smaak-, Gezicht-en Gehoor-zenuwen.

Aanmerkt, dat'er Zenuwen zijn, die de geesten voeren tot de Dierlyke, en andere tot de Natuurlyke werktuygen. Van de eerste soort zijn, die tot de werktuygen der zinnen, en vrywillige bewegingen besteed worden: en tot de tweede behooren de Zenuwen, die de geesten brengen tot beweging van 't Hert, Maag, en andere delen.

Het gebruyk der Zenuwen is, om de geesten uyt de groote, en kleyne herffenen te brengen tot de werktuygen der beweging, en der zinnen, zo dat haar verder kennis af hangt van die voorgemelde werktuygen. In het IV. Hoofdstuk van de VII. Verhandeling zal getoont worden, hoe de Zenuwen zig verdeelen.

Als

Als de Zenuwen, die de geesten voeren tot beweging van de deelen, afgesneden zijn, verliezen ze haar beweging: want schoon de wonde geheelt is, zo grœyden d' afgesnede holle draadjes der Zenuwen niet meer aan malkander; maar worden t'eenemaal verstoppt door 't voedsaam zap, dat in de tusschenscheyding vloeyd. Maar schoon een Zenuw, dienende tot 't gevoel, afgesneden word, doet die nog zijn werking in 't deel, dat legt tusschen haar begin, en de wonde: want op dat een Zenuw diene tot 't gevoel, moet ze vervult zijn met geesten, en om dat deze van die Zenuw door 't gequetste deel niet kunnen vloeyen in het ander deel der Zenuw, zo verliest dat deel daarom zijn gevoel.

HET VII. HOOFDSTUK.

Van 't Vlees, en de Klieren.

DE Ontleeders erkennen in 's Menschen lighaam ^{Driederley} driederley soort van Vlees, te weten: het Vlees ^{Vlees.} eygentlijk zo gezegt, 't Vlees der Ingewanden, en 't Klierig-vlees.

Het Vlees eygentlijk zo genaamt is een deel, dat ^{wat het is.} rood, zagt, en vezelagtig is, gelijk de Buyken der Spieren.

Die vleezige Vezelen, zo veel d' ondervinding leerd, zijn binnen hol, en verzien met vele oneffenheden, en hollekens, in welke by geval het bloed word opgehouden.

Het Vlees der Ingewanden, word van *Erastistratus* ^{'t Inge-} Parenchyma, of gestolt bloed genaamt, waar uyt de ^{wand} heeft geen ^{eygen} Vlees, ^{Vlees.} die der Lever, Milt, Nieren, en Longen. Maar zo d' Ontleeders het maakzel der Ingewanden nauwkeuriger doorsnuffelt hadden, zoudenze bevonden hebben, dat 't een Ingewand is, gemaakt van Vlees, eygentlijk zo genaamt, en 't andere van Klieren, Vliezen &c. en zouden by gevolg aan de Ingewanden geen by-

zonder Vlees toege-eygent hebben. Het Klieren-Vlees bestaat uyt de eyge zelfstandigheyt der Klieren.

En om dat de kennis der Klieren feer noodig is, en nergens schijnt gelegentheyt te wesen, om 'er in 't gemeen van te handelen, zo zal men hier een weynig van de Klieren spreken.

Klier.

De Klier is een deel, dat zagt, rond, en spongieus is, om een zeker vogt van 't bloed af te scheyden.

De hedendaagsche Ontleeders verdeelen ze in ¹ronde, en op een ²getaste Klieren.

Ronde Klieren.

Ronde Klieren zijn, die bestaan uyt een eenparige zelfstandigheyt, en een effe oppervlakte hebben, gelijk de onderhuyds Kliertjes.

Op een getaste Klieren.

De op een getaste Klieren zijn, die bestaan uyt vele kleyne Kliertjes, en een oneffe oppervlakte hebben, gelijk de ³Borst-klier, het ⁴Alvlees &c. van welke op zijn plaats zal gehandelt worden.

Getal.

Het getal der Klieren is onzeker, en zo groot, dat het niet is te beschrijven.

Groote.

Haar groote is verscheyden: want de minste der ronde Klieren, die zichtbaar zijn, is zeer kleyn, en de meeste is niet grooter als een amandel; maar de op een getaste Klieren zijn veel grooter: want onder die word gestelt de Lever.

Vaten.

Ider Klier, die wat groot is, heeft ten minsten vier vaten: een Ader, en Slag-ader A. een Zenuw B. en een Vat C. dat zeker afgescheyde vogt na buyten brengt, waar by nog komt een Water-vat, dat in zommige Klieren, 't uytloozende Vat zelf schijnt te wezen.

II. Tafel.
2. Figuur.

Op dat een Klier haar werking zou verrigten, zijn alle die Vaten noodzakelijk: want de Slag-aderen brengen 't bloed aan, waar van dat vogt moet afgescheyden worden, en de Aderen met de Water-vaten, (zo'er eenige zijn onderscheyden van 't uytloozende Vat) voeren het weg, zo dat 't in de Klier niet blyven kan, nog in 't uytloozende Vat ingaan: de gee-

¹ Conglobatz. ² Conglomeratz. ³ Thymus. ⁴ Pancreas.

sten

sten door de Zenuwen gebragt, bevorderen door hun werking des vogts af-scheyding, en beletten dat de gaatjes der Klieren niet verstopt zijn, en eyndelijk ontfangt 't uytvloozende Vat 't afgescheyde vogt, om zig 't ontlasten, als het noodig is.

Maar 't gene de Lever eygen heeft, is datse verzien is met twee voorname Aderen, te weten: de ' Poort-ader, en de ' Holle-ader, welker eerste den dienst doende van een Slag-ader, brengt het bloed in de Klieren tot af-scheyding van 't vogt, zo dat de Slag-aderen van de Lever in vergelyking van de grootte, geheel weynig zijn.

Het gebruyk der Klieren, als blijkt, is datse dienen om een zeker vogt van 't bloed af te scheyden, ^{Gebruyk der Klieren.} zo dan 't gene afgescheyden word in de schorsagtige zelfstandigheyt der Hersenen, word geesten genaamt, en zo ontfangen de andere vogten een anderen naam, volgens de Klieren, waar in ze afgescheyden worden.

HET VIII. HOOFDSTUK.

Van de Spieren.

NU volgt in ordere gehouden in deze Verhandeling, te spreken van de Pees, een deel zo eygen aan de Spier, datse zonder dat niet kan beschreven worden, zo datwe hier genoodzaakt zijn mede van de zelve te handelen.

De Spier is een werktuyg dienende tot de bewe- ^{II. Tafel.} ging, ziet de 10, 12. en 13. Figuur.

Men kan de Spier ook beschrijven, dat het een deel is ^{Wat een Spier is. Deelen van de Spier.} bestaande uyt Vlees, Peezen, vliezige Vezelen, de Zenuw, Ader, Slag-ader, Water-vat, een en Vlies, dat al d' andere deelen omwind.

De Pees is 't witte deel der Spier, bestaande uyt zenuwagtige Vezelen, dienende om de vleezige t'

1 Vena Porta. 2 Vena Cava.

B 3

samen

II. Tafel. famen te binden; en t' famen vergaderende, eyndigen gemeenlijk in de uyt-eynden der Spier, en maken de Peezen.

Daar zijn in 't meeste deel der Spieren, ten minsten twee Peezen, waar door ze meermaals aan de Beenderen vast gehegt worden: de Pees, die vast gehegt is aan 't Been, dat onbewegelijk is, word het hoofd, of begin van de Spier genaamt A. en d' andere, die gemeenlijk geplant is in 't deel, dat moet bewogen worden, is de staart, of 't eynde C. en 't vleezige deel, gelegd in 't midden tusschen beyde Peezen, word de buyk der Spier genaamt B. zo dat een Spier bestaat uyt drie voornamen deelen, te weten: 't Hoofd, de Buyk, en Staart; en een Spier in werking zijnde, word gezien in de II. Figuur van de II. Tafel.

Hoofd der
Spier.
10- en 11.
Fig.
Staart.

Buyk.

Spieren,
die zig
zelven be-
wegen.

Aanmerkt dat'er Spieren zijn van gedaante, als een breede ring, gelijk by voorbeeld, de tweede rok des Slokdarms, en Sluyt-spier, of Sphincter van d' Aars &c. in welke de vliezige Vezelen in d' uyt-einden niet eyndigen, nog t' famen vergadert worden; maar leggen by na verspreyd door de Spier, om dat die Spieren niet zo veel dienen, om andere deelen te bewegen, als wel om zig zelve.

Daar zijn zekere Spieren, welkers Peezen zijn zo kort, dat men ze aanziende, zou zeggen, dat ze met haar vleezig deel ingeplant zijn in de deelen, waarom men zegt, dat zodanige Spieren ('t welk meermaals van 't begin geschied) een vleezig begin of eynde hebben, schoon nogtans de zaak wel na gezien, het peezig is; maar als de Pees zichtbaar, en breed uyt gespreyd is als een Vlies, zegt men datse vleezig is; en zo ze lang en smal is, als een Zenuw, word se gezegt een zenuwagtige Pees te wezen.

De vleezige Vezelen volgens haar lengte aangemerkt, zijn aan beyde uyteinden A. C. peezig; maar 't middenste deel B. is vleezig; en daar is geen eenzame Vezel, die regt uyt loopt; maar zijn alle ten minsten in d'enkele Spieren, welkers uyt-einden regt

te-

tegen over malkander gestelt zijn, uyt drie regte t' samen gestelt, te weten: uyt twee peeze A. C. en 10. Tafel. de middenste vleezige B. en dat zodanig, dat de peeze Vezelen, met de vleezige, twee tegen over malkander staande hoeken maken. Want de peeze Vezelen A. met de vleezige B. maken den hoek D. en de zelfve vleezige Vezelen B. met de peeze C. maken den hoek E. die regt tegen over den ander gestelt is. Hoeken door de't samen koming der Vezelen.

De vleezige Vezelkens, waar door de vleezige t' samen gebonden worden, hebben een geheel anderen loop, als de peeze; want gelijk deze loopen van E. naar C. loopen de vleezige van E. naar F. en zijn hier weynige van die Vezelkens afgebeeld, om datse den loop der vleezige niet zouden verduyfteren. De vleezige Vezelkens. II. Tafel.

Aanmerkt dat'er enkele, en dubbele Spieren zijn, Enkele en dubbele Spieren. d' enkele Spieren zijn, die twee peezen, en maar eenen buyk hebben; en welkers vleezige Vezelen een zelfde order van loop hebben zydelings, van d' een pees, na d' ander, gelijk gezien word in de 10. Figuur. II. Tafel.

De dubbele of t' saamgestelde Spieren zijn zo in gedaante, als menigte ryen van vleezige Vezelen, zeer verscheyden: uyt een groot getal zijn alleen twee der gemeenste soort afgebeeld, en vertoont door de 12. en 13. Figuur. Dobbele Spieren zijn veel derley.

D' eerste dubbele Spier, 12. Figuur. heeft een dubbel rye vleezige Vezelen, bestaande gelijk uyt twee buyken, waar by twee Peezen komen, die zeer verscheyden t' samen gestelt zijn, en waar van d' uytwendige A. B. C. de buytenste eynden van beyde ryen der vleezige Vezelen bevat: d' inwendige Pees D. E. die door 't midden loopt, ontfangt aan beyde zyden de binnenste eynden der vleezige Vezelen, zo dat die Spier uyt twee enkele Spieren bestaat. Want de rye der vleezige Vezelen F. met het deel der uytwendige Pees B. en de helft der inwendige Pees D. E. volgens de lengte in twee gescheyden, maakt een enkele Spier; van gelyken de rye G. en het deel der uytwendige Pees C. met d' ander helft der Pees D. E. maakt d' ander enkele Spier, en zo moet men ook oordeelen. Dobbele Spier begrijp meer als een enkel.

van 't maakfel der Spier, die vertoont word in de 13. Figuur.

Kragt der
Spier van
waar her-
komstig.

Gezien hebbende wat een enkele, en dubbele Spier is, moet men weten, dat de kragt der Spieren is herkomstig van haar dikte, en menigte vleezige Vezelen, en daarom zijn de Spieren, welkers werking niet zeer kragtig is, gelijk 't meeste deel der Spieren van den buyk zijn, voorgesteld in de III. en IV. Tafel. daar ziet men, dat de vleezige Vezelen, van 't een uyteinde van den buyk der Spier, regt naar 't ander loopen, en datse met den buyk by na van de zelfde lengte, dog niet zeer menigvuldig zijn.

Vleezige
Vezelen
zijn niet
altijd zo
lang, als
de Buyk
van de
Spier.

Maar in veele andere Spieren, die groote kragt hebben, zijn de vleezige Vezelen zeer kort, en de buyk der Spier nogtans lang, en daar ziet men, dat de vleezige Vezelen niet volgens de lengte van den buyk der Spier; maar schuyns, en by na dwers naar de Peezen loopen, gelijk men ziet in de 12. en 13. Figuur van de II. Tafel. En door dat middel is voorzien, dat die Vezelen minder plaats beslaan, als datse van 't een uyteinde der Spier tot 't ander waren uyt gestrekt, en ook een veel grooter getal in een Spier van de zelfde grootte onthouden word.

Vleezige
Vezelen
alleenma-
ken de t'
samen-
trekking.

En gelijk 't de vleezige Vezelen alleen zijn, waar door de t' samentrekking der Spier geschied, zijn 't gelijk zo veel mannen aan een koorde vast gemaakt, om een groot gewigt voort te trekken; waar uyt blijkt, hoe een grooter getal vleezige Vezelen in een Spier zijn, hoe zy ook meer kragt heeft, om een deel, waar in zy vast genegt is, na zig te bewegen.

Werkdaad
om de
kragt der
Spieren
te ver-
meerde-
ren.

Boven dien, de t' werkdaad die de Natuur gebruykt, om de kragt der Spieren te vermeerderen, is zeer wonder; want niet alleen zijn de Spieren kort, en dik gemaakt, op datze sterker zouden wezen; maar worden ook ingeplant, verre van de 2 geleding, of 't vaste stip, gelijk men ziet in de Dye, daar de Bil-spieren niet alleen korter, en dikker zijn, als de 3 Lende, en 4 Darm-been-spier;

maar zig nog verder van de geleding, als de zelve inplanten, welke in vergelding van dien langer zijn; waar door geschied, dat de laatste zo veel kragt niet hebben. De drie-hoekige Spier des Opper-arms, die groote kragt moet hebben, om den ganschen Arm op te ligten, is niet alleen zeer dik, en kort, maar ook ingeplant verre van de Geleding.

Men ziet de zelve werkdad in 't onderste Kaak-been, in opfigt van de Slaap-spier, van welke d' aldergrootste kragt af-hangt, en daarom is zy in de Vlees-etende dieren zeer dik, gelijk in Leeuwen, Tygers, en Wolven, welke Dieren zeer sterk van Bek zijn, dewijl de Wolf een dood Peerd in een Dijk vindende, zeer ligt alleen daar uyt zal trekken.

De zelve
in 't on-
derste
Kaak-
been.

De Spieren dienen eygentlijk tot de beweging; de manier, hoe ze zig t'famen trekken, is, dat de dierlijke geesten, gebragt door de Zenuwen, in de vliezige Vezelen, die vervullen, en gelijk opblazen, waar door de vleezige Vezelen in krimpen, de hoeken der Spier regter worden, en 't bloed, dat'er door vloeyt, langer opgehouden word; en hoe de vleezige Vezelen meer in krimpen, hoe de buyk der Spier meer opswelt, verkort, en harder word, om dat hy meer van bloed, en geesten is vervult, en zo worden de Peezen, die gelijk als koorden zijn, met de deelen, daar ze in gehegt zijn, getrokken naar 't begin der Spieren.

Hoe de
t'famen-
trekking
der Spieren
geschied.

Maar hoe de Spieren zig verlangen, of verflappen, geschied om dat de geesten ophouden van werken, of dat het deel door zijn swaarte, of door de tegenwer- kende Spieren word getrokken: want de Spieren zijn altijd eenigfints gespannen, en in werking; dat be- vestigt word door de lammigheyt van de kaak, die lydende, getrokken word naar 't oor van d' andere zyde, om dat de verlamde Spieren, niet meer gelijk te voeren, een tegen gewigt kunnen maken, met de werking der Spieren van d' andere zyde, die ziek schijnt te wezen. Maar de reden, waarom men die

Waar in de
verflap-
ping der
Spieren
bestaat.

1 Deltoides.

B 5

ge-

gedurige werking niet gewaar word, is, om dat se gelijkmatig trekken, en daarom is 't, dat by na alle de Spieren ¹ tegenwerkers hebben; andersints zoudenze altijd gespannen, en in volkome werking zijn, en 't zoude in onze magt niet wezen, die te verflappen.

By voorbeeld; de Sluyt-spier van den Aars, en van de Blaas, heeft voor Tegenwerkers de vleezige Vezelen der Darmen, en Blaas, waar by men kan voegen 't gewigt der stoffen, die ze in zig behouden, als mede de werking der Buyk-spieren, en 't ² *Middenrift*, en daar van komt, dat we de verflapping van die Sluyt-spieren kunnen verhaasten, en vertragen. Het *Middenrift* heeft voor ⁴ Tegenwerkers de Spieren van den Buyk, die in werking zijnde, de Ingewanden na binnen dryven, en 't ³ *Middenrift* noodzaken na boven in de Borst te klimmen. En zo'er eenige Spier is, die geen Tegenwerker schijnt te hebben, heeft zy tot een tegen gewigt van zijn werking de swaarte van 't deel, gelijk de neus, of 't gewigt van 't vogt, gelijk 't hert. De reden, waarom de Spieren altijd in werking zijn, is, om dat de vogten in een gedurigen loop zijn, en van onzen wil niet afhangen, ten zy in de magt, die we hebben, om ze in de Spieren te vermeerderen, of te verminderen: want wy zijn geen meester van de wegen, daar de geesten door vloeyen; maar 't is in ons vermogen de zelve te vernauwen, of te verwyden, dat'er minder, of meerder geesten, in de Spieren kunnen vloeyen, volgt na dat we willen de Spieren kragtiger te samen trekken, of haar werking verminderen.

't Is ligt te begrypen uyt het gene in d' uytleidingen geschied, hoe die beweging vrywillig is: want zo de lyder de werking van de Spieren kon beletten, die altijd gespannen staan, en een tegenstand bieden aan 't geweld, dat men doet, zo zouden de Heelmeesters zo veel moeyte niet hebben om de beenderen in hun plaats te herstellen.

¹ Antagonista. ² Diaphragma. ³ Diaphragma.
⁴ Antagonista.

Wanneer een Spier dwers afgesneden word , zo staat haar werking aanstonts stil , maar zo zy volgens den loop der vleezige Vezelen gesneden is , volhert die daarom , de wonde zijnde geheelt , in haar werking , hoe wel zo volmaakt niet als te vooren ; na dien de vleezige Vezelen niet kunnen van malkander gescheiden worden , ten zy de vleezige Vezelkens , die dwers loopen , en waar door de geesten vloeyen tot de beweging , doorgesneden worden ; maar dit kan tot de werking van de Spier , geen groot belet wezen.

Zo de Zenuw , die de geesten voert tot beweging van de Spier , afgesneden , of gebonden word , dan staat de werking stil , om dat de geesten in de Zenuw-vezelkens niet meer kunnen vloeyen.

Indien ook de Slag-ader van de Spier gebonden , of afgesneden ware , zo staat de werking stil , (hoe wel zo schielijk niet) , om dat de vleezige Vezelen , by gebrek van bloed verslappen , en door de inkrimping niet meer kunnen opgespannen worden.

Maar dit moet verstaan worden van alle Zenuwen , en Slag-aderen , die de Spier ontfangt : want zo'er eenige over blyven , zo zal de werking van de Spier ten deele ophouden ; ja een merkelyke Slag-ader afgesneden zijnde , kan het bloed door een andere aangebragt worden , en men heeft in zo een geval bevonden , dat de overgebleve Slag-ader , door verloop van tijd , wyder is geworden , en bequaam om meer bloed t' ontfangen : maar dit heeft geen plaats in de Zenuwen. Aanmerkt dat de Zenuwen zo wel in 't Hoofd , Blyk , als Staart van de Spier in gaan , hoe wel d'Ouden het regendeel geloofden.

De beweging der Spieren is vrywillig , of natuurlijk : of ze is ten deele vrywillig , en ten deele natuurlijk.

De *Vrywillige* beweging , die ook *Dierlijke* genaamt word , is , die geschied naar den wil , voor zo veel ze de geesten in zekere Spieren (boven die'er altijd in zijn) kan doen vloeyen , en vermeerderen , tot der zelve beweging : als by voorbeeld , wanneer ik mijn Arm ,

Arm, of Hand, vrywillig bewege.

De *Natuurlijke* beweging is, die van onzen wil niet af-hangt, gelijk de beweging van 't Hert, Slag-aderen, Darmen &c. welker geesten, 't zy we slapen, of waken, genoegzaam in vloeyen, om ze te bewegen.


De beweging, die ten deele natuurlijk, en ten deele vrywillig is, moet altijd natuurlijk geschieden: als in de Ademhaling; maar de Ziel heeft magt om die te verhaasten, of te vertragen.

Dit zy genoeg gezegt van de Spieren in 't gemeen, men zal in 't vervolg op zommige plaatsen, en voornamelijk in de VI. Verhandeling van de zelve in 't byzonder spreken,

Daar is nog overig van 't Vet te zeggen, tot volkomenheit der te voren opgetelde ¹ Eendaantige deelen; maar we zullen daar van handelen in 't II. Hoofdstuk van de II. Verhandeling.

a Partes Similares.

U Y T.



U Y T L E G G I N G

der

F I G U U R E N,

van de

T W E E D E T A F E L.

Waar in ver'toond worden eenige Ve-
zelen, Vliezen, Vaten, Klieren.

- De 1. Fig. ver'toont de*
Vezelen.
- A De Vezen, die vol-
gens de lengte der dee-
len loopen.
- B De dwers loopende.
- C De schuyns loopen-
de.
- D De ringwijze.
- d De boogagtige.
- E De hoekige.
- F De slang-rings-
wijze.
- De 2. Fig. ver'toont de*
Vliezen.
- A Een uytgespanne
Vlies.
- B Een Rok.
- De 3. Fig. ver'toon de Tak-
ken der Aderen, en*
Slag-aderen.
- A De Ader.
- B De Slag-ader.
- C De Band aan beyde,
op dat door de op-
swelling van dien,
de loop van 't bloed
gezien zou worden.
- D d'Ader boven den
Band opswellende.
- E De Slag-ader ont-
swellende.
- eee De vereening der
Takjes.
- De 4. Fig. ver'toont de*
Rokken der Slag-aderen.
- A De Vatiege Rok.
- B De Klierige.
- C De Spierige.
- D De Zenuwagtige.
- EEE D'Uytwendige
Rok omgeslagen, op
dat de inwendige zou
gezien worden. De

*De 5. Fig. vertoont de B De Zenuwagtige
Rokken der Aderen. holle draden.*

A De Vliezige Rok.

B De Vatige.

C De Klierige.

D De Spierige.

EEE De uytwendige Rok omgeslagen.

*De 6. Fig. vertoont de
Klap-vliezenineengeo-
pende Ader, op dat
ze zouden gezien
worden.*

A Een Klap-vlies.

BB Twee Klap-vliezen by malkander.

*De 7. Fig. vertoont de
Water-vaten.*

A Een leeg Water-vat.

B De Ader, by welke 't Water-vat legt.

C De Band belettende den loop des Waters.

aaa Water-vaten door 't vogt opgeswollen, in welke yder knoopjen een Klap-vlies betekent.

bb Kleyne takjes der Water-vaten.

*De 8. Fig. vertoont de
Zenuwen.*

A 't Uytwendig omkleedsel der Zenuw.

*De 9. Fig. vertoont een
Klier.*

A De Bloed-vaten.

B De Zenuw.

C Het uytloozende Vat. Het overige is 't lighaam der Klier.

*De 10. Fig. vertoont een
enkele Spier.*

A Het hoofd der Spier, welkers Vezelen van malkander gescheyden, vertoont worden.

B De Buyk der Spier bestaande uyt vleezige Vezelen, of eygentlijk gezegt Vlees.

C De staart der Spier.

D. E De hoeken voortkomende uyt de t' samenkomst der Vezelen.

F De Vezelkens.

abc De Bloed-vaten, Water-vaten, en Zenuw.

*De 11. Fig. vertoont een
t' samengerokke Spier,
of die in werking is.*

A 't Hoofd der Spier.

A Den Buyk.

C De Staart.

*De 12. Fig. vertoont een
dobbele Spier.*

ABC De uytwendige
Pees in twee geschey-
den.

DE d'Inwendige Pees.

FG Twee ryen van
vleezige Vezelen, ge-
lijk twee buyken ma-
kende.

*De 13. Fig. vertoont een
andere dobbele of t'
saamgestelde Spier.*

A De uytwendige t'
samengestelde Pees in
tween gescheyden.

B De inwendige Pees
van gelijke geschey-
den.

CC Den Buyk van
een der Spieren in
twee gescheyden.

DD Den anderen Buyk
der Spier in twee
verdeelt.

DE TWEEDE VERHANDELING

D E R

HEELKONSTIGE ONTLEDING VAN DE DEELEN DES BUYKS.

HET I. HOOFDSTUK.

*Van den Buyk, en zijn deelen; als mede
van de Opper-huyd.*

NA dat men in de eerste Verhandeling van d'
Eendaantige deelen heeft gesproken, gaan we
over tot den Buyk, en zijn deelen. De *Buyk*
is een holligheyt, die zig uytstrekt van 't *Midden-rift*
tot de *Schaam-beenderen*; zie zijn verder Verdeeling
in de Inleyding.

Het

Het voorste deel des Buyks is by na t' eenemaal zagt, en zonder beenderen, om dat het gedurig op, en neder moet bewogen worden. 't Agterste is voor een groot gedeelte beenagtig. De zyden beeniger, als 't voorste, en niet zo beenagtig als 't agterste deel.

Houdende
en gehou-
dene deel-
len.

Gemeene
houdende
deelen.

Eygen
houdende
deelen.

Gehoude-
ne deelen
des Buyks.

Wat de
Opper-
huyd is.

Hoe zo
van de
Huyd
word ge-
scheyden.

Kouleur.

Gebruik
der Opper-
huyd.

De Buyk bestaat uyt twee deelen, te weten: uyt wendige of *houdende*, en uyt inwendige, of *gehoudene* deelen.

d' Eerste zijn gemeen aan 't geheel Lighaam, of eygen aan den Buyk alleen: de gemeene houdende deelen, die men anders de gemeene dekselen van 't Lighaam noemt, zijn de ¹ Opper-huyd, de Huyd, en 't Vet. De houdende deelen, die eygen zijn aan den Buyk, zijn desselfs Spieren, eenige Beenderen, en de ² Pens-zak, &c.

d' Inwendige of gehoudene deelen des Buyks, zijn de Maag, Lever, Gal-blaas, Milt, ³ 't Alvlees, ⁴ 't Darmscheyl, de Darmen, Nieren, Pisleyders, Blaas, en de inwendige ⁵ Teel-deelen, &c.

De Opper-huyd is een deel der Huyd, die de zelve by na over al bekleed, en daar aan vast is, door zeer fijne vezeltjes: ze word door vuur, bleyhmakende middelen &c. van de Huyd afgescheyden, en dan ziet men dat het is een dun, vast, doorzigtigen ongevoelig Vliesken A zie de 1. en 2. Fig. De ⁶ Opper-huyd behalven de groote gaten, die ze heeft, gelijk de Huyd, is doorboort met veel kleyne gaatjes voor de haartjes, en ⁷ sweet-pijpjes, en heeft de zelve voren, en strepen van de Huyd.

De kouleur is verscheyden, volgens de Landen: want eenige hebben ze wit, andere bruyn, en zommige swart &c. Men kan'er geen vaten in bemerken; 't gebeurt zelden, dat iemand geboren word zonder Opper-huyd; zomtijds is se dobbel gevonden, en door eenige uytwendige oorzaak af-scheydende, word se haast herstelt.

De Opper-huyd is om de Huyd te bekleeden, effen en glad te maken, en te beschermen tegen de uytwendige ongemakken: want als de Huyd daar van ont-

¹ Epidermis. ² Peritonæum. ³ Pancreas. ⁴ Mesenterium.

⁵ Partes genitales. ⁶ Epidermis. ⁷ Pori.

bloot is; gelijk de Zenuw-tepeltjes dan bloot leggen, zo is alle gevoel pijnlijk: boven dien dientse ook om de mondekens der vaten van de Huyd te sluyten; want dit Vliesken afgescheyden zijnde, sweet gedurig een weyagtig vogt uyt.

HET II. HOOFDSTUK.

Van de Huyd, en 't Vet.

NA de 1 Opper-huyd volgt onmiddellijk de Huyd, III. Tafel. die 't gansche Lighaam by na over al bekleed, en bestaat uyt verscheide deelen. Ziet de 2. en 3. Fig.

Het binnenste of onderste deel der Huyd be- Wat de Huyd is. staat uyt een vergadering van peezige Vezelen, die wonderlijk door malkander gevlogten zijn, waar by zig voegen vele Zenuwen, en Bloed-vaten, maar in Waar uyt 't buytenste deel, de Opper-huyd afgescheyden zijn- se bestaat. 't buytenste deel, de Opper-huyd afgescheyden zijnde, ziet men een *Netwijs* Lighaam, in welkers menigte van 2 gaatjes by na ontelbare peerwijze Tepeltjes, *Zenuw-tepeltjes* genaamt, uyt-puylen, en eygentlijk 't Werk-tuyg des gevoels zijn, ziet de 2. en 3. Fig. van de IV. Tafel: die *Zenuw-tepeltjes* strekken zig uyt tot d' Opper-huyd, daar ze met verscheide Vezeltjes zig verspreyden.

De Huyd is doorboord met verscheide groote ga- Gaten van de Huyd. ten, gelijk aan de Oogen, Mond, Neus, Schaam-deelen &c. maar behalven die, is'er, als men de Huyd met een Vergroot-glas beziet, een by na on-eyndig getal, dat zeer kleyn is, en welke *Pori* ge- Sweet-gaatjes tweederley. naamt worden; welke tweederley zijn, te weten: zommige grooter, uyt welke gemeenlijk de hayrtjes komen, en andere kleynder, die de voorgaande in getal te boven gaan.

Onder yder gaatjen, of porus, legt een Kliertjen, Kliertjes der Huyd. waar uyt een Sweet-pijpjen voort komt, dat in de uytwendige oppervlakte der Huyd eyndigt. Boven

1 Epidermis. 2 Pori.

C

dien

dien heeft yder Kliertjen een Zenuw, Slag-ader, en zonder twyfel ook een Ader, gelijk in 't zevende Hoofdstuk der eerste Verhandeling van de Klieren gezegt is: de voorgemelde Kliertjes met haar Pijpjes dienen, om 't sweet, en de ongevoelige uytwazeming, van 't Slag-aderlijk bloed af te scheiden, en na buyten te brengen, als mede om de *Zenuw-tepeltjes*, in 't voor by gaan te bevogtigen, op dat se niet zouden verdroogen.

Voren en
vouwen
in de
Huyd.

In de buytenste oppervlakte der Huyd, zijn veele voren, of vouwen, waarom ze niet qualijk vergeleken word by een stuk Land, met verscheide voren omgeploegt, en na dat se diep, ondiep, groot of kleyn zijn, is de Huyd hard, of zagt &c. deze zijn in verscheide deelen verscheidentlijk, gelijk yder in zijn eygen, of in een anders Huyd kan zien.

Dikte der
Huyd.

De Huyd is een tamelijk dik vel; maar dikker op de eene plaats, als op de andere: want op 't hoofd is ze alderdikst, daar na in den hals; dunder aan de palm des hands, en alderdunst aan de lippen; in kinderen, en vrouwen, is de Huyd zagter, als in de mannen, zagter in 't aangezigt, mannelijkheyt, en balzakjen, als op andere plaatsen, harder in den nek, rug, en voetzolen; in de overige deelen, is ze middelmatig.

Vast heg-
sing.

Door allerley soort van vaten, en eenige zeer fijne Vezelen, die de Huyd krijgt van de naast gelege deelen, word se aan d' onder-gelege deelen vast gehegt; maar ze word op veele plaatsen, gelijk op de Borst, Buyk, Armen, en Beenen ligtelijk van de zelve afgescheiden, hoewel ze ontrent de *witte linie*, wat vaster aankleeft; maar in 't voorhoofd, en by na in het gantsche aangezigt, ooren, lippen, palmen der handen, en voetzolen, is ze vast vereenigt. Job van Meek'ren verhaalt van een Spanjaart, die zijn vel ongeloovelijk konde uytrekken.

Gebruik
der Huyd.

De Huyd diend, eerst tot een deksel voor d' onder-gelege deelen van 't lighaam. Ten tweeden tot het werktuyg van 't gevoel, dat voornamelijk geschied door de *Zenuw-tepeltjes*. Ten derden tot doorgang van 't sweet

't fweet, en de ongevoelige uytwazeming.

De wonden der Huyd zijnde genezen, laten altijd een lidteeken na, daarom moet men ze zo net genezen, als mogelijk is, voornamelijk in de Vrouwen, en in 't aangezicht.

De knoop, die ontrent het midden des Buyks uytwendig gezien word, is de *Navel* I. en een lidteeken, dat ontstaat door t' famengroeying der Huyd, en Bloed-vaten, te weten: een Ader, en twee Slagaderen, die van 't lighaam der vrugt, door dezen weg, tot in de Moeder-hoek uytgestrekt leggen, en naar 't baren, twee dwersche vingers van den Buyk afgebonden, en een dwerschen vinger boven de binding, afgesneden worden. Wat de Navel is. 1. Fig.

De Navel is een zeker geswel onderworpen, dat de Grieken *Exomphalos* noemen, en is tweederley: 't een word veroorzaakt door vaste deelen, en 't ander door vogten, en die ziekten ontfangen verscheyde namen, volgens de verscheydentheyt der deelen, of vogten, die ze veroorsaken.

Die van de vaste deelen veroorzaakt worden, noemt men *waare* breuken, en zijn drierley: want als de darm uytgekomen is, word het geswel ¹ *Navel-darm breuk* genaamt, en als 't net uyt komt, is 't een ² *Navel-net breuk*, en zo de darm, en 't niet, dat op die plaats zelden anders is, beyde t' famen uyt komen, word het een ³ *Navel-darm Net-breuk* genaamt.

Die van de vogten veroorzaakt worden, noemt men *valsche* breuken, en zijn vierderley: want als 't geswel van 't water voort-komt, word het ⁴ *Navel-waterbreuk* genaamt, indien 't van wind is, noemt men 't ⁵ *Navel-windbreuk*, en zo 't van verhard vlees veroorzaakt is, word het ⁶ *Navel-vleesbreuk* genaamt, en zo de verwyde of gebroke Bloed-vaten de oorzaak zijn, word het *Navel-aderbreuk* genaamt.

By de twee eerste soorten van Navelbreuken in 't gemeen, voegt men een derde, die uyt de een, en de andere bestaat, te weten: van vaste deelen, en vog-

¹ Enteromphalos. ² Epiplomphalos. ³ Enteroepiplomphalos.
⁴ Hydromphalos. ⁵ Pneumatomphalos. ⁶ Sarcomphalos.

ten te samen: want als 't gefwel van den darm, en 't water komt, noemt men 't ¹ *Navel-darm waterbreuk* en zo 't van 't net, en vlees voortkomt, wort het ² *Navel-net vleesbreuk* genaamt. Ziet aangaande de foorten der Navelbreuk, mijn Verhandeling der voornaamste Handwerken der Heelkonst, het twaalfde Hoofdstuk.

Wat Vet is.

Het Vet is een witte, smeerige, ongevoelige stoffe, die is in zekere kleyne, en vliezige cellekens, dienende om de deelen te verwarmen, en slibberig te maken, C. ziet de 1. Fig.

De Ontleeders begrypen onder 't Vet ook 't roet, maar dit heeft geen plaats in den Mensch, gelijk in Offen, en Schapen, in welke veel roet gevonden word; maar in den Mensch schijnt het anders niet als Vet te wezen.

Waar't Vet gevonden word.

Men vind het Vet, in de uyt-, en inwendige deelen des lighaams; maar meest onder de huyd, ten zy in magere Menschen; en word gehouden in zeker kleyne vliezige blaasjes, of cellekens, die gemeenschap hebben met malkander, en vast zijn aan een dik vlies, waarom 't *Vet-vlies* genaamt word: het Vet strekt zig uyt zo verre als de huyd, behalven onder de huyd der oogschelen, mannelijkheyt, en balzakjen, hoewel op die plaatsen 't *Vet-vlies* word gevonden, gelijk blijkt uyt 't *Lugt-swel* of *Emphysema*.

Die Vlies heeft zeer veel Bloed vaten, die met vele fijne takjes, in die kleyne vliezige cellekens zig verspreyden, zo dat waarschijnlijk 't bloed, verzien met Vet-deeltjes, gebragt door de Slag-aderen, en 't Vet door zekere kleyne Kliertjes onthouden in de zelve, word afgescheyden, terwijl de andere deeltjes van 't bloed, om hun dikte, of ander gesteltenis niet kunnen door gaan, 't zelve moet verstaan worden van 't Vet, dat in de andere deelen van 't lighaam afgescheyden word.

De inwendige deelen van 't lighaam, waar op veel Vet is, zijn 't 3 Net, 4 Darmscheyl, de Darmen,

¹ Hydroenteromphalos. ² Epifarcomphalos. ³ Omentum.
⁴ Mesenterium.

ook ziet men 'trondom de Nieren , binnen op den Pens-zak , en op 't breede deel van 't hert.

Het Vet dient; eerst , om de al te groote uytwa- ^{Gebruik} zeming te beletten , en de onder-gelege deelen te ver- ^{van 't Vet} warmen , of van koude te bevryden. Ten tweeden , om door zijn olyagtigheyt de deelen slibberig , en bequamer tot de beweging te maken. Ten derden , om in hongers nood , tot voedsel te verstrekken ; als ook tot schoonheyt : want die geen Vet hebben , zijn droog van huyd , en gerimpelt. En ten vierden , om de scherpheyte der vogten te matigen ; door een ontsteking van 't *Vet-vlies* tot fweering gekomen , en geopent zijnde , is de etter zomtjids zo menigvuldig , dat men genoodzaakt is de huyd op verscheide plaatsen volgens de lengte van 't lighaam door te snyden , om ze uytgang te geven. Dit geschied voornamelijk in groote ontstekingen , die wijd verspreyd zijn.

Een zekere Heelmeeester , heeft over eenige jaren aan een Vrouw , een geswel , dat op de rug af-hong , en een enge hals hadde , eerst afgebonden , en dan afgesneden , in welk agtentwintig pond Vet was ; waarvan ik de huyd , die als een zak is , nog bewaar , en van welk toeval ze genezen is.

De drie algemeene houdende deelen , of dekselen van 't lighaam beschreven zijnde , voegen de Ouden , en veel hedendaagsche Ontleders daar een vierde by , te weten : 't ^{In den} *Vleezig-vlies* ; maar dat word in den ^{Mensch is} Mensch niet gevonden , en dat men voor 't vleezig ^{geen vlee-} Vlies pleeg te roonen , is anders niet als 't *Vet-vlies* : ^{zig Vlies} want als dit Vlies opgeligt is , ziet men de Vet-blaasjes zeer klaar , en in den Mensch zijn in dit Vlies geen vleezige Vezelen ; maar in de Dieren , daar 't vleezig Vlies gevonden word , ziet men dat van 't Vet-vlies onderscheyden.

De Ouden zeyden , dat het vleezig Vlies diende tot beweging van de huyd : maar over al daar wy de huyd bewegen , zijn'er Spieren : by voorbeeld in 't voorhoofd , de *Voorhoofds-spiere* , in 't agterhoofd , de *Agterhoofds-spiere*.

1 Peritonaeum. 2 Panniculus carnosus.

Ook zeyden ze, dat 't vleezig Vlies de huyd niet over al beweegde; maar alleen op die plaatsfen, daar geen Vet was, tusschen 't vleezig Vlies, en de huyd; maar dit strijd tegen de ondervinding: want niet alleen vind men Vet onder de Huyd aan 't voorhoofd, en 't agterhoofd; maar zelf in Dieren, daar 't vleezig Vlies gevonden word, en de Huyd oogschijnlijk zig beweegt, ziet men Vet, tusschen 't vleezig Vlies, en de Huyd, gelijk blijkt in de Everswynen, Paarden, en in alle Dieren, daar 't vleezig Vlies is: zo dat men veel eer moet zeggen, dat in den Mensch de Huyd niet word bewogen, om dat hy 't vleezig Vlies niet heeft, als dat men zou zeggen, dat het de Huyd in hem niet kan bewegen, om dat'er Vet is tusschen 't vleezig Vlies, en de Huyd.

HET III. HOOFDSTUK.

Van de Spieren des Buyks.

III. Tafel.
1. Figuur.

NAar de algemeene houdende deelen, of dekselen van 't lighaam, volgen de Spieren, van welkers maakfel, en werking, in 't laatste Hoofdstuk, der voorgaande Verhandeling is gesproken, dies zal men tegenwoordig beschrijven de Spieren des Buyks, wezende des zelfs eygene houdende deelen.

Hoe veel
Spieren
des Buyks.

De Spieren des Buyks zijn gemeenlijk *tien*, te weten: vijf aan elke zyde, en die zijn de schuyns nederdalende, de schuyns opklimmende, de dwersche, de regte, en de pyramidwyze Spieren. De vier eerste ontfangen haar naam van den loop der Vezelen, en de laatste van haar gedaante.

De
schuyns
nederda-
lende.

De eerste Spier des Buyks, de *schuyns nederdalende*, word vertoont in de III. Tafel aan de linker zyde GHI in haar natuurlijke plaats, behalven 't onderste deel, 't welk omgeslagen is, op dat men de schuyns opklimmende Spier zou zien.

Die Spier is zeer breed, en bekleed met die van de andere zyde den gantschen Buyk, en neemt haar oorspronk

spionk van de twee laatste waare en alle de valsche ribben, met verscheide vleezige beginselen, gelijk tanden G. die gevoegt zijn tusschen de tanden der groote ¹ Zaagwyze Spier F. zo dat de tanden der schuynse gelegen zijn op de tusschen-ribbige Spieren, en die der zaagwyze Spier op de ribben; de tanden der schuyns nederdalende Spier zijn vijf, welker eerste geplaatst is tusschen de twee laatste waare ribben; de tweede tusschen de laatste waare, en de eerste valsche ribbe, en zo voorts van de andere.

Die Spier heeft geen begin van de dwersche uytsteekfels der wervelbeenderen der lenden, gelijk veel Ontleeders zeggen; maar van den boord van 't ² Darm-been, en brengt een breede pees voort HH. met welke die voor 't grootste deel eyndigt in de witte linie KK. en met een mindere in 't ³ Schaam-been.

De *witte linie* is een plaats, die gemaakt is door de samenkomst der breede peezen, van de schuynse en dwersche Spieren des Buyks, en strekt zig uyt van 't ⁴ sweertwyze Kraakbeen, door 't midden des Buyks KK. tot het Schaam-been. Witte Linie.

In een Mensch van middelbare groote, heeft se boven den Navel de breedte van een dwerschen vinger; onder den Navel is ze smalder, en ontrent het ⁵ Schaam-been, word se nauwelijks gezien, ten zy de pyramijdwyse Spieren weg genomen zijn.

De tweede Spier des Buyks is de *schuyns opklimmen-*De *de V u u*, zo genaamt, om dat ze met haar vleezige ^{schuyns} *Vezelen* of begin, schuyns van onderen na ^{opklim-} *boven* ^{mende.} gaat, strydig met de voorgaande, en ze komt van 't opperste deel des Schaam-beens, als ook van den boord des ⁶ Darmbeens, en niet van de dwersche uytsteekfels der Lenden-wervelbeenderen, niet meer als de voorgaande, en maakt zig vast aan alle de valsche ribben, en aan 't sweertwyze Kraak-been, en eyndigt met een breede Pees in de witte linie u u. Aanmerkt dat 't vleezig deel der schuyns opklimmende

¹ Serratus major ² Os ilium. ³ Os pubis. ⁴ Cartilago eniformis. ⁵ Os pubis. ⁶ Os ilium.

Spier, van onderen verzelt is met 't peezig deel der schuyns nederdalende, en dat in tegendeel, 't vleezig deel der schuyns nederdalende geplaatst is boven op 't peezig deel der schuyns opklimmende, waardoor de uytwendige deelen des Buyks by na over al gelyke dikte hebben.

De derde Spier, is de *dwerfche*, zo genaamt, om dat ze met haar Vezelen dwerssch over 't lighaam, na 't midden des Buyks loopt R S. deze legt onmiddelyk op den 1 Pens-zak, waar aan ze zeer vast is, en komt voort van de dwersche uytsteekfels der Lendenwervelbeenderen; inwendig van de Kraak-beenderen der valsche ribben, en van den binnensten boord van 't 2 Darm-been, ook van 't Schaam-been, en eyndigt met een breede pees in de witte linie.

De dwerfche Spier.

De drie Spieren nu beschreven, zijn ontrent de Lies doorboord; tot doorgang van de uytsteekfels des Pens-zaks, 3 die in Mannen de Zaad-vaten, en in Vrouwen de ronde banden van de Lijf-moeder inzig besluyten; maar met dit onderscheyd, dat de opening in de dwersche, en schuyns opklimmende Spier in 't vleezig deel, een eygentlijk van malkander wyking der vleezige Vezelen is, en dat de opening van de schuyns nederdalende, in 't peezig deel van die Spier, niet volkomen rond is: want die pees ontrent 't 4 Schaam-been gekomen zijnde, verdeeld zig in twee deelen; die gescheyden blyvende, eyndigen zonder weder te vereenigen in 't voorgemelde been, zo dat de opening in die peezen, in opzigt van 't Schaam-been gestelt is, gelijk 't oor van een mande, in opzigt der mande zelf, die geen volkomen ring maakt, zo dat men bepaald gesproken, kan zeggen, dat die pees niet doorboord is door de uytsteekfels des 5 Pens-zaks. Ik heb die opening van buyten altijd bekleed gevonden met een zeer dun vliesken.

In de 1. Fig. van de III. Tafel TT. is een van die alleen, aan de linker zyde, in de 1. Fig. K. van de IV. Tafel, en de zelve aan beyde zyden in de 4. Fig. der

1 Peritonæum. 2 Os ilium. 3 Os pubis. 4 Peritonæum.
5 Peritonæum.

zcl-

zelve Tafel Maar die uytsteekfels des ¹ Pens-zaks vertoonen zig alderbest buyten den Buyk in de V. Tafel DD.

De openingen in de voorgemelde Spieren, zijn zo konstig gemaakt, dat die opening, welke in de dwersche Spier gevonden word, merkelyk hooger is, als die in de opklimmende, en in deze Spier weder hooger, als die in de Pees der schuyns nederdalende, zo dat die drie openingen niet regt tegen over malkander gestelt zijn; maar word de opening, die in de dwersche Spier is, bedekt door een gedeelte der opklimmende Spier, en de opening, die in de opklimmende is, word bedekt door een gedeelte der Pees van de schuyns nederdalende; om zo te beletten, dat de inwendige deelen des Buyks niet ligt na buyten zouden schieten: echter gebeurt het dikwils, dat de Darm, of 't Net uyt komt, of beyde te samen en 't gelijk 't peezig deel der schuyns nederdalende Spier, waar in de opening gevonden word, niet zagt, en buygagtig is, gelijk 't vliezig deel der twee andere Spieren, waar in de opening is, zo is 't daarom, als de Darm door die openingen in de scheurfels uytgekomen is, dat het peezig deel zig toetrekt, en een toestopping maakt in den Darm, waar uyt de ontsteking ontstaat, &c. En gelijk als dan de grove uytsteeffels wederhouden werden, is men om het te genezen, als men de Darm niet kan in brengen, genoodzaakt een operatie te doen, die bestaat, in die opening te vergrooten, op dat men de Darm, en zo'er 't Net by is, dat mede in den Buyk zou kunnen brengen.

Konstig
maakfel
dezer openingen.

En om dat de voorgemelde openingen, in de innerlijkste Spieren, hooger zijn gelegen, zo staanze ook meer ter zyden, en daarom komen de uytsteekfels des Penszaks ook zeer van ter zyden af, gelijk men zien kan in de 1. Fig. van de X. Tafel.

Wanneer men de breede Peezen der drie voorgemelde Spieren, die van wederzyden des Buyks, t' samen in de witte linie met malkander zig vereenigen, den Na- t' samen aanmerkt, zo bevind men, datse in den Na-

Doorbooring in den Na- vel.

vel , door de Navel-vaten doorboord zijn , en 't is daarom , dat de Navel waare fcheurfels heeft , waar van te vooren in 't II. Hoofdstuk van de tegenwoordige Verhandeling is gesproken.

III. Tafel.

I. Fig.

De regte
Spier.

Nu volgt de vierde of *regte* Spier , welkers *Vezelen* regt volgens de lengte van 't ligchaam loopen *QQQ*. Deze komt voort van 't Borst-been , van de laatste waare ribben , en van 't ¹ sweertwijse Kraak-been , en is met 't onderste eynde vast gehegt aan 't ² Schaambe-en. Die Spier heeft de uytwendige oppervlakte anders , als de inwendige ; want men ziet in de uytwendige , verscheyde witte tusschen-scheydsels , zonder vlees *RRR*. die volgens de Ouden zijn gemaakt door de Zenuwen ; maar het zijn waarlijk Peezen , zo dat die Spier niet enkel , maar zomtijds uyt drie , vier , of vijf kleyne Spieren is t'samengesteld , welkers Peezen zig met malkander vermengen , 't gene in haar werking de kragt vermeerdert ; de voorgemelde Spieren , met hare tusschen-scheydsels , worden nauwkeurig verthoont , in de I. Figuur van de IV. Tafel. Aan de inwendige oppervlakte ziet men zomtijds , dat de vleezige Vezelen dezer Spier , van 't een eynde tot 't andere loopen , zonder dat men iet van die tusschen-scheydsels ziet

Peezige
tusschen-
scheydsels.

De regte Spier is besloten in een peezige scheede , die niet gemaakt is van de verdobbeling der breede Pees der schuyns opklimmende Spier , gelijk men altijd heeft geloofd , maar word gemaakt boven van de breede Pees der schuyns nederdalende , en onder van die der schuyns opklimmende Spier. Het gene hen bedrogen heeft , is , als beyde breede Peezen der schuynse Spieren , ontrent de regte Spier t'samen komen , datse malkander met eenige Vezelen doorkruyssen , en deelagtig maken , waar uyt ontstaat een soort van scheydsel , en is die scheede gemaakt , om de regte Spier te vaster in zijn plaats te houden.

Daar onstaat zomtijds een scheurfel , tusschen de regte Spieren des Buyks , in de witte linie , en ook op de zyde van de Spieren , daar de breede Peezen

1 Cartilago. ensiformis. 2 Os pubis.

der

der ſchuynſe, en dwerſche Spieren beginnen: want gelijk 't vleezig deel der Spieren veel ſterker, en bequa- mer is, om 't geweld, dat de Darmen doen, te we- derſtaan, als de breede Peezen, gelijk d' ondervin- ding leerd, zo bevind men ook, dat het Buyk-ſcheurfel, of de Hernia Ventralis, noyt of zeer zelden komt in 't vleezig deel der Spieren; maar meeft altijd, daar de breede Peezen beginnen, of tuſſchen de regte Spieren des Buyks, voornamelijk in ſwangere Vrouwen, om dat de Buyk zodanig uytgezet word, dat de voor- gemelde Spieren genoodſaakt zijn van een te wyken. Een Heelmeester moet voorzigtig zijn, dat hy die geſwellen, of ſcheurfels, meenende dat'er etter in is, door onvoorzigtigheyt niet opene.

De vijfde is de *pyramidwyze* Spier, zo genaamt van haar gedaante, ze is geplaatſt onder de regte Spier, en neemt haar oorspronk van 't bovenſte deel van 't Schaam-been, met een vleezig, en eenigſints breed begin, en opklimmende, word ze allengskens enger, en eyndigt met een dunne Pees in de witte linie, en ſtrekt zig zomtijds uyt tot den Navel.

Die Spieren zijn zomtijds grooter, zomtijds kleyn- der, en meeft altijd ongelijk, zomtijds is'er maar een, en ook wel geen, en dan zijn de regte Spieren op die plaats dikker. Ziet die Spieren in de 1. Fig. van de III. Tafel. S, en in de 1. Fig. van de IV. Ta- fel H. I.

De Spieren des Buyks ontfangen haar Aderen, en Slag-aderen, van de Mam-vaten, die boven ontrent het 2 fweertwyſe Kraak-been, aan beyde zyden uyt komen Y Y 1. Fig. III. Tafel, en P. 1. Fig. IV. Tafel. ook van onderen van d' Opper-buyks-vaten, en van bo- ven ter zyden van de tuſſchen-ribbige, en meeft van de Lenden-vaten T T.

En ſchoon de grootſte takken der Mam-vaten, voor 't meefte deel in de regte Spieren, en de Lenden-va- ten, in de ſchuynſe, en dwerſche zig verſpreyden, zo loopen nogtans hun takjes wijd, en breed, zo dat ie- der Spier (uytgenomen mogelijk de pyramidwyſe Spie-

1 Os pubis. 2 Cartilago enſiformis.

ren,

ren) van elk een der voorgemelde vaten deelagtig word. En worden de takjes van 't een vat, met die van 't andere, van de zelve foort, met vele inmondingen, t'samen gevoegt. Zenuwen hebben ze van de tusschen-ribbige en Lenden-zenuwen, die de Bloedvaten meermaals verzellen.

Gebruik
der Spie-
ren van
den Buyk.

Het gebruik der Spieren van den Buyk, is eerst: tot gemakkelijckheit in 't uytademen. Ten tweeden, (behalven de pyramidwyze Spieren, welkers gebruik zeer duyfter is) om de ingewanden des Buyks gelijckelijck te drukken, wanneer ze t'samen werken, en door 't ¹ Midden-rift geholpen worden; en by vervolg dryvenze de vuyligheden, en andere dingen uyt den Buyk; want schoon ieder deel een zekere kragt heeft, om uyt te dryven dat het schadelijk is, zo dat de Darmen, door hun worm-wyze beweging, de grove vuyligheden, de Blaas, de Pis, en uyt de Lijf-moeder de vrugt met de Nageboorte uyt dryven: nogtans moeten alle die deelen door de voorgemelde Spieren geholpen worden, die daarom verscheydentlijk geplaatst zijn, en meer als eenen loop van Vezelen hebben. En hoewel die Spieren voor den onderbuyk dienen, zo dienen ze ook voor de borst in 't hard roepen, hoesten, en sterke uytademing.

Daar ontstaan zomtjids tusschen de Spieren des Buyks zekere geswellen, waar door ze van een wyken, en groote pijn veroorsaken; als men bemerkt, datse tot sweering komen, moet men de etter daar niet lang in laten; maar haast een opening maken: want 't is te vreezen, dat door 't lang verblijf der etter, de ² Pens-zak doorgeknaagt zou worden, waar uyt een doodelijk quaad zoude ontstaan. Ziet daar van een voorbeeld by Hildanus, in 't tweede deel, de 37. Aanmerking, pag. 158.

't Gebeurt zomtjids in een doorgaande wonde des Buyks, dat de Darm, en 't Net, t'samen uytkomen, of de Darm alleen; zodanig datse om de nauwheit der wonde, niet weder kunnen ingebracht wor-

¹ Diaphragma. ² Peritonaeum.

den, waarom men genoodzaakt is de wonde te verwyden: indien ze aan 't onderste des Buyks waare, moet men die na boven verwyden, en zo ze aan 't opperste is, na beneden, en zo die ontrent de witte linie ware, moet men zig daar van af keeren.

U Y T L E G G I N G .

der

F I G U R E N ,

van de

D E R D E T A F E L.

Waar in vertoond worden de algemeene dekselen des Lighaams, en de meeste Spieren van den Buyk.


- | | |
|--|---|
| 1. <i>Figuur vertoont.</i> | GHI De schuyne nederdalende. |
| A De Opper-huyd. | G Haar vleezig deel of Buyk dezer Spier. |
| B De Huyd. | HH De breede Pees of Staart in zijn natuurlijke plaats, en onder uyt de zelve omgeslagen. |
| C Het Vet. | I Een opening tot doorgang van een der uytsteekfels des Penszaks. |
| D Het Vet-vlies. | |
| E De Borst-spier. | |
| ee Byzondere Vezelen, dezer Spier, die zelden zo veel, en zomtijds niet gevonden worden. | |
| F De groote voorste Zaag-spier. | |

KK

- KK De witte Linie. Spieren doorbooren ,
 L Den Navel. en na 't zakje gaan.
- M De schuyns op- VU De schuyns op-
 klimmende Spier , klimmende Spier in
 voor een gedeelte ont- haar natuurlijke plaats.
- N De algemeene dek- V Haar Buyk.
 •felen omgeslagen, aan UU Haar breede Pees
 de linker zyde. of Staart.
- O De schuyns neder- XX De Lenden-ade-
 dalende Spier omge- ren, en Slag-aderen.
- P De algemeene dek- YY De uytwendige
 felen omgeslagen, aan takken der Mam-ade-
 de regter zyde. ren, en Slag-aderen.
- QQ De regte Spier, 2. *Figuur. Een gedeelte
 al of zy bedekt ware van de Huyd, met de
 met de Staart, of bree- Opper-huyd, haar vo-
 de Pees der schuyns ren of vrouwen.*
- RR Haar peezyge tuf- 3. *Figuur vertoont het
 fchen-scheydsels. maaksel der Huyd,
 r Het bovenste tuf- met een Vergroot-glas
 fchen-scheydsel, dat gezien.*
- S De pyramidwyze A De onder Huyds-
 Spieren in haar na- kliertjes.
- TT De uytsteekfels B De Zenuw-tepelt-
 des Pens-zaks, die de jes.
- C De Sweet-vaatjes.
- D De Hayren.
- E Vaten onder de
 Huyd.



3



U Y T L E G G I N G

der

F I G U R E N ,


van de

V I E R D E T A F E L.

De algemeene deksfelen en de schuynse Spieren weg genomen zijnde , vertoonen zig eenige dieper gelegene deelen.

- i. *Figuur. ABCD. vertoonen de algemeene deksfelen, gelijkse gezien worden, in de*
 i. *Figuur der voorgaande Tafel.*
- EE Beyde de Borstspieren en voor een gedeelte ontdekt , waar de byzonder Vezelen ee in de voorgaande Tafel aange- teekent, niet gevonden worden.
- FF De voorste groote Zaag-spieren ten deele ontdekt.
- GG De algemeene deksfelen onderwaarts omgeslagen.
- H De pyramidwyze Spier aan de linkerzyde geheel ontbloot, die hier de regte Spier van onderen gantsch bedekt.
- I De pyramidwvse Spier aan de regter zyde eensdeels gedekt van de regte Spier OO die ten deele omgeslagen is.
- K Het uytsteekfel des Pens-zaks aan de linker zyde, dat aan de reg-

- regter weg genomen is.
- LM** De regte Spier in haar natuurlijke plaats.
- LL** Haar vleezige deelen.
- MM** De peeze tuf-schen-fcheydsels.
- N** Den Navel.
- OO** De andere regte Spier omgeslagen.
- P** Aderen en Slag-aderen der Mam-vaten.
- p** Haar takken in den Pens-zak X.
- q** Haar takken in de regte Spier OO.
- Q** Aderen en Slag-aderen der Boven-buyks-vaten.
- S** Haar takken in de regte Spier oo die met de takken q inmonden.
- r** Haar takken in den Pens-zak X.
- RS** De dwersche Spier.
- R** Haar vleezig deel of Buyk.
- S** Haar breede Pees of Staart.
- TT** De Aderen, en Slag-aderen der Lenden-vaten.
- VUX** Den Pens-zak in 't midden van den Buyk, en op de regter zyde voor een groot gedeelte ontbloot.
- V** De plaats, daar 't Net doorschijnt.
- U** De plaats, daar de Darmen doorschijnen, om datse onder met het Net niet overdekt zijn.
6. 7. 8. 9. 10, 11. De Ribben van de bovenste afgetelt.
2. 3. Figuur. Deze zijn hier overgezet uyt den Heere Ruysch.
2. *Fig. vertoont het Netwyze Lighaam van Malpigijs, tweemaal grooter als 't natuurlijk is.*
3. *Fig. vertoont eenige Zenuw-tepeltjes der Huyd, de natuurlijke groote tweemaal overtreffende.*
4. *Fig. vertoont het onderste deel des Buyks, op welken maar een pyramidwyze Spier gevonden wierd.*





AA De deelen der regte Spieren.
 dwersche Spieren. D De pyramidwy-
 BB De uytsteekfels ze Spier hier alleen
 des Pens-zaks. en ook kleyn gevon-
 CC De deelen der den.

HET IV. HOOFDSTUK.

Van den Pens-zak.

NAar de Spieren des Buyks, volgt onmiddelijk V. Tafel.
 de ¹ Pens-zak, een vlies, dat dun, en zagt is, en
 ligt uytgerekt kan worden. B. vertoont een gedeelte
 des Pens-zaks in 't midden des Buyks, volgens de
 lengte opengesneden, en aan de zyden gelegd. C. een
 gedeelte ziet men in zijn natuurlijke plaats, gelijk
 ook een groot gedeelte daar van in de 1. Fig. VU.
 van de IV. Tafel.

Hy heeft de zelve gedaante, en groote, als de Gedaante
 Buyk, en word in bevrugte Vrouwen, en in 't ² Buyk-
 water zeer uytgerekt.

Zijn inwendige oppervlakte is effen, en glad, en
 als met een vetagtig vogt bestreken, dat afgeschey-
 den word van 't bloed door zekere kleyne Kliertjes,
 onthouden tusschen zijn verdobbeling, en met haar
 uytloozende vaatjes, ieder met een Sluyt-spiertjen
 verzien, welke aan die oppervlakte cyndigen, maar
 de uytwendige is wat oneffen, met welke hy aan de
 Spieren vast is.

Van voren is hy vast aan de Spieren des Buyks; Vast-heg-
 van boven aan 't ³ Midden-rift, van onderen aan 't ting.
⁴ Schaam- en ⁵ Heupe-been; ter zyden aan 't ⁶ Darm-
 been; van agteren aan 't Heylig-been, en Lenden-
 wervel-beenderen, voornamelijk aan 't eerste, en 't
 derde, daar hy, zo men zegt, zijn oorspronk neemt.

1 Peritonæum. 2 Ascites. 3 Diaphragma. 4 Os Pubis.
 5 Os Ischiū. 6 Os Ilium.

D

Van

Doorboor-
ing.

Van boven, daar hy aan 't ¹ Midden-rift vast is, word hy doorboord van den ² Slok-darm, holle Ader en Zenuwen van 't dwalende paar; van onderen door den ³ Endel-darm, Scheede der Lijf-moeder, en Pis-schagt, en van vooren in de vrugt door de Navel-vaten; dog al die doorbooringen moeten verstaan worden van 't uytwendig, en niet van 't inwendig vlies.

Verdob-
beling.

De 4 Pens-zak bestaat uyt twee vliezen, waar van 't een *uytwendig*, en 't ander *inwendig* is, en 't is tusschen de verdobbeling dezer vliezen, dat alle de Ingewanden, en vaten des Buyks onthouden worden, en met 't binnenste vlies bedekt zijn; zo dat in de vrugt, ter plaats van den Navel, 't uytwendig vlies door de Navel-vaten, die tusschen beyde deze vliezen loopen, doorboord is, terwijl 't inwendig vlies op die plaats daar over gaat, de Vaten bedekt, de doorbooring stopt, en de inwendige oppervlakte van den Buyk maakt; en als naar de geboorte, de Navelstreng is afgebonden, en vanden Navel af valt, groeyt 't uytwendig vlies des ⁴ Pens-zaks aan de zyden der Navel-vaten vast toe, terwijl 't inwendig vlies op die plaats alleen blijft; en gelijk ter plaatse van den Navel de breede peezen der schuynse, en dwersche Spieren des Buyks door de Navel-vaten ook doorboord zijn, zo is daarom die plaats van den Buyk hier swakker; en dat is de reden, waarom door een uytwendige sterke oorzaak dikwils 't binnenste vlies des Pens-zaks op die plaats door de Darmen en 't Net uytgerekt word; waar uyt de waare breuken ontstaan, van welke in 't II. Hoofdstuk, van de tegenwoordige Verhandeling is gesproken.

Uytsteek-
fels of
Processus.

Het buytenste vlies des Pens-zaks, heeft ontrent de Liefen, twee uytsteekfels DD. die in de Mannen nederdalen tot in 't zakjen, daar ze breeder worden, en de Zaad-vaten met de ballekens omvangen, makende zo 't Scheede-vlies, en in Vrouwen omvangen ze de ronde banden der Lijf-moeder. en om dat de Zaad-vaten, en ronde banden der Lijf-moeder,

¹ Diaphragma. ² Oesophagus. ³ Intestinum Rectum.
⁴ Peritonæum. ⁵ Peritonæum.

van ter zyden ſchuyns uyt de holligheyt des Buyks, naar buyten komen, zo is 't, dat deze uytſteekfels, die dezelve omvangen, ook op die manier zig ver-
toonen.

In de honden ſtaan die uytſteekfels in de holligheyt des Buyks open, zo dat men even, gelijk in een vlie-
zige buys, daar in kan blazen, en een redelijke groo-
te priem inſteken; maar in den Menſch is op die
plaats geen de minſte opening: want dewijl de Zaad-
aderen, en Slag-aderen, tuſſchen de verdobbeling der
vliezen van den Pens-zak gelegen zijn, zo wor-
den de voorgemelde uytſteekfels (die de Zaad-vaten
en Ballekens in Mannen, en in Vrouwen de ronde
banden van de Lijf-moeder omvangen) gemaakt door
't uytwendig vlies des Pens-zaks, terwijl 't inwen-
dig vlies geplaatſt word op die openingen, zo dat op
deze plaats de Pens-zak enkel is, en daarom hier
ook ſwakker, als te vooren van den Navel is ge-
zezt; en gelijk de Spieren des Buyks op die plaats
door de voorgemelde uytſteekfels, en Zaad-vaten me-
de doorboord zijn, zo is dat ook de reden, waar-
om op deze plaats door een uytwendige geweldige
oorzaak ligtelijk 't inwendig vlies des Pens-zaks door
de Darmen, en zomtijds door 't Net uytgerekt word,
niet alleen tot in de Lies, dat een *onvolkomen*, maar
dikwils ook tot in 't Zakjen, 't welk een *volkomen* breuk
genaamt word, makende een ſoort van burzeken,
dat zig onthoud in 't uytſteekfel boven de Zaad-vaten,
en ſchoon de Darmen, en 't Net, in den Buyk gebragt
worden, blijft dit burzeken altijd in 't zakjen, en dit
is de reden, dat op de zyde, daar de breuk is, het
bündelken Zaad-vaten altijd dikker, als op d' ande-
re zyde is.

't Voorgemelde inwendig vlies des Pens-zaks,
word zomtijds ook door water, dat in de holligheyt
des Buyks allengskens is vergaderd, tot in 't zakjen uyt-
gerekt; makende een ſoort van ²*Water-breuk*, waar by
door de minſte uytwendige oorzaak de Darmen, en 't
Net zig zomtijds by voegen.

1 Peritonæum. 2 Hydrocele.

Een andere
plaats, daar
de breuk
komt.

Ik heb over eenige jaren aangemerkt, dat nog een doodelijke breuk kan ontstaan, daar de uytwendige ¹ Heup-aderen en Slag-aderen uyt de holligheyt des Buyks naar de Dye loopen: want gelijk 't inwendig vlies des Pens-zaks op die plaats, als in de Lies, van agteren door 't uytwendige niet versterkt word, en daarom swakker is, zo is dat ook de reden, waarom die breuken op die plaats ontstaan. Het zelve is ook aangemerkt door de Heeren Professoren Nuk, en Verheyen.

De plaats, daar die breuken geschieden, is aange- teekent in de X. Tafel in de 1. Fig. door een inge- steke priem M.

Vaten des
Pens-
zaks.

De Pens-zak ontfangt Aderen, en Slag-aderen, van boven van de Mam- en - ² Middenrifts-vaten, en van onderen van des Opper-buyks, en der heylige va- ten, ook eenige takjes van de Zaad-vaten, en ter zy- den, van de tusschen-ribbige, en Lenden-vaten.

Zenuwen.

De Zenuwen komen van 't rug-merg der Lenden, en van 't Heylig-been, ook van de tusschen-ribbige, en Midden-rifts Zenuwen.

Gebruik
des Pens-
zaks.

't Gebruik des ³ Pens-zaks is, eerst om de Inge- wanden des Buyks t' omvangen. Ten tweeden om de Spieren des Buyks t' ondersteunen, en zo t' samen tot de uytdryving der vuyligheden te helpen. Ten derden tot voortbrenging der uytsteekfels, en om in Mannen de ballekens t' omvangen.

't Gebeurt zomtijds, dat'er etter is tusschen de ver- dobbeling des Pens-zaks, welke moeyelijk is te on- derscheyden van die in de holligheyt des Buyks uyt- gestort is.

Men kan dit door twee teekenen weten, eerst: als de etter tusschen de verdobbeling des Pens-zaks legt, zo vertoont zig een geswel op den Buyk, dat eenig- sints door 't gezigt kenbaar is, en niet geschied, als de etter in de holligheyt des Buyks is. Ten tweeden: als de etter in holligheyt des Buyks is, zo is het, dat, als men met deene hand op een der zyden van den Buyk slaat, men met de andere hand gelegd aan

¹ Venæ & Arteriæ Iliacæ. ² Diaphragma. ³ Peritonæum.

de

de tegen overige zyde , de tegenflag gevoelt van de uytgeftorte ftoffe , dat niet gefchied in etter-gefwellen , die omfchreven zijn: dan moet men vroeg een opening maken , als'er etter is tuffchen de Spieren des Buyks , gelijk te voren gezegt is , en moet men dat niet verwaarloozen , als fe is tuffchen beyde vliezen des Pens-zaks.

Daar ontftaat zomtijds een *valsche Water-zugt* tuffchen de verdobbeling des ¹ Pens-zaks , door opfwelling der Kliertjes , die gelegen zijn tuffchen beyde de vliezen , waar door ze van een wyken , zo dat de uytloozende vaatjes breken , en 't water tuffchen beyde vliezen uittort.

De *Keyzerlyke fneede* , die men doet in fwangere Vrouwen , onmiddelyk na datfe gestorven zijn , om 't Kind uyt den Buyk te halen , gefchied met een opening te maken , tuffchen de regte Spieren des Buyks , door den Pens-zak , ontrent het ² fweertwyze Kraak-been , tot aan 't Schaam-been , om de Lijf-moeder met de vliezen , waar in de vrugt is , voorzigtelyk te openen.

De doorgaande wonden des Buyks genezen zijnde , volgt meermaals op die plaats een fcheurfel , om dat de ³ Pens-zak niet geheelt word.

HET V. HOOFDSTUK.

Van de Navel-vaten , en de Natuurlyke plaats van eenige deelen des Buyks.

GEzien hebbende wat de Pens-zak is , laat ons nu v. Tafel. de Navel-vaten befchouwen , die leggen tuffchen beyde de vliezen , en zijn de Navel-ader I. twee Navel-flag-aderen GG. en 't Navel-pis-vat F. de drie eerfte , naa dat de vrugt geboren is , groeyen haast toe , en veranderen in banden ; maar 't Navel-pis-vat is in den Mensch , zo veel bekend is , niet open.

¹ Peritonæum. ² Cartilago eniformis. ³ Peritonæum.

De Pens-zak weg genomen zijnde in de bereyding der Navel-vaten, vertoonen zig eenige gehoudene deelen des Buyks, en onder andere de Darmen OPP. deze leggen meest onder 't Net KKK. dat van boven nederdalende, op de zelve is gelegen, en weg genomen zijnde, ziet men de Darmen, die aan 't Darm-scheyl vast zijn, verscheydentlik in een gedraayt bloot: van boven ziet men zommige dikke Darmen O. van onderen de dunne PP. die het meeste gedeelte van den Navel, en Onder-buyk beslaan; maar de andere dikke Darmen kan men van onderen niet wel zien, ten zy men de dunne wat aan de zyde doet wyken.

De Maag. De Maag L. is geplaatst in den 2 Boven-buyk, onmiddelijk onder 't 3 Midden-rift, maar beslaat met zijn breedste deel by na de geheele linker 4 zyde van den Boven-buyk; op de linker zyde van de Maag vindt men de Milt M. welke gemeenlijk, ten zy die boven maten groot is, niet gezien word, zo dat het deel in de plaat verbeeld, uyt zijn natuurlijke plaats is getrokken: in de regter zyde van den Boven-buyk legt de Lever N. beneden onder 't Schaam-been legt de Blaas E. tusschen de verdobbeling des 5 Pens-zaks, en in de Lenden op beyde zyden de Nieren.

HET VI. HOOFDSTUK.

Van 't Net.

Net wat is. **H**et Net in 't Latijn *Omentum*, en by de Grieken *Epiploon* genaamt, is een vliezig deel, dat onmiddelijk op de Darmen gelegen is: van boven is het vast aan zekere deelen, en van onderen vry, en los nederhangende KKK.

Het word in het Duytsch Net genaamt, om de gelijkenis, die het heeft met een door konst gemaakte Net, dewijl de Bloed-vaten, en 't Vet zig in de

1 Mesenterium. 2 Epigastrium. 3 Diaphragma. 4 Hypochondrium. 5 Peritonaeum.

vlie-

vliezige cellekens onthouden , waar mede de vliezen doorweven zijn , en dus de gedaante van een Net vertoonen.

Het Net bestaat uyt twee zeer dunne vliezen, waar zijn Vliezen. van 't voorste vast is aan den grond der Maag , aan de ¹ Portier, en den twaalf Vingerigen darm, en 't holle gedeelte der Milt; en 't agterste is vast aan den ² Kartel-darm , zo dat het dobbel nederhangt als een zak , en word ook gemeenlijk om zijn gedaante, by een jaagers tas vergeleken. Ziet beyde zijn Vliezen, in de VI. Tafel, de 1. Fig. AB.

Het hangt gemeenlijk tot aan den Navel, of wat laager, en dit is de reden, dat het in de *Navel-brekken* gemeenlijk met de Darmen uytkomt: dog ik hebbe wel gezien , dat het in de Lies, en zomtijds in 't Zakjen was gezonken , zo in de linker , als regter zyde , zomtijds verstorven , en met een ³ Waterbreuk; zomtijds gezond , en met den Darm; zo dat men in de operatien, die men doet voor die gebreken, genoodzaakt was 't zelve af te binden: en zegt *Hippocrates*, dat Vrouwen, die boven maten ver zijn, niet ontfangen , is , om dat de hals van de Lijf-moeder door 't Net toegedrukt word, in zijn ⁴ Kortbondige-spreuk van 't 5. Boek: want het Net, en 't Vet-vlies , zijn onder de deelen , wier aangroeying niet bepaald is, en min, of meer grooter, volgens de gesteltenis, die de Mensch heeft, om min, of meer vet te worden. *Vesalius* zegt een Net gezien te hebben, dat vijf ponden swaar woeg.

Het Net ontfangt Slag-aderen van de ⁴ Buyk-en-Aderen en ⁵ Schey-slag-aderen, en Aderen krijgt het van de ⁶ Slag-aderen. Poort-ader, voornamelijk van de Milt-tak. Nogtans worden die vaten Net-aderen, en Slag-aderen genaamt; en om dat eenige dezer vaten aan de Maag, en 't Net gemeen zijn , worden ze Maag-net-vaten genaamt. Het Net ontfangt zeer kleyne Zenuwen van den tusschen-ribbigen tak.

Onder de gebruyken , die men 't Net toeschrijft, en

¹ Pylorus. ² Colon. ³ Hydrocele. ⁴ Caliacae. ⁵ Mesenterica. ⁶ Vena porta.

zeer twijfelagtig zijn , schijnt het te dienen , om de Darmen te verwarmen.

't Gebeurt zomtjids in doorgaande wonden des Buyks , dat het Net met de Darmen uyt komt , en niet haastlijk zijnde ingebracht , komt het door de koude lugt , en de engte der wonde te bederven , waar door 't koud , swart , en quaad van reuk word ; in zo een geval , moet het , na de Darm ingebracht is , afgebonden worden , als ik heb gezegt in mijn Verhandeling der voornaamste Hand-werken der Heelkonst , in 't agtste Hoofdstuk.

Aanmerkt dat in de V. Tafel een Mensch vertoont word , wiens Borst in opsigt van den Buyk korter is als gewoonlijk , en daarom de Lever verder van den Navel af-legt , en de Navel-ader om die reden langer is , als ze moet wezen.

U Y T L E G G I N G

der

F I G U R E N ,

van de


V I J F D E T A F E L.


Waar in vertoont worden verscheyde deelen des Buyks , op der zelyver natuurlijke plaats.

AA De algemeene den gelegd , of omge-
Dekfelen. slagen.

BB Een gedeelte des CC 't Andere deel op
Pens-zaks aan de zy- zijn eygen plaats.

DD





DD	De uytsteekfels	KKK	Het Net,
	des Pens-zaks.	L	De Maag.
E	De plaats, daar de	M	De Milt.
	Blaas legt.	N	De Lever.
F	Het Navel-pis-vat,	O	De Kartel-darm.
	in een band veran-	PP	De dunne Dar-
	dert.		men.
GG	De Navel-Slag-	1	De Kroon-ader der
	aderen in banden		Maag.
	verandert.	m.	De vaten, die door
H	Den Navel,	't	Net verspreyd zijn.
I	De Navel-ader, die-	n	Het sweert-wyze
	nende voor een band		Kraak-been.
	der Lever.		

HET VII. HOOFDSTUK.

Van de Maag.

NAar 't Net vertoont men gemeenlijk de Darmen, VI. Tafel. op datse om den stank niet alleen haast zouden 2. Figuur. weg genomen worden; maar om dat vele dingen, die'er van te zeggen zijn, niet wel kunnen verstaan worden, zonder voorgaande kennis der Maag, en men hier geen stank te vreezen heeft, ook dat de Maag in de plaat gantsch bloot legt, zonder dat de Darmen, gelijkse in 't doode lighaam doen, de ver- rooning beletten: daarom zullen we van de zelve eerst beginnen.

De Maag is een deel, dat vliezig, hol, en gelijk Maag was een zak is, leggende met zijn breedste deel in de lin- se is. ker ' Zyde-boven-buik. Ziet de VI. Tafel, 2. Fig. ABC. en de V. Tafel, L.

Heeft
twee ope-
ningen.

Deze heeft twee monden of openingen, waar van de een de linker, en de andere de regter is, en ze zijn beyde geplaatst aan 't opperste deel, by na regt tegen over malkander.

Mond of
linker
opening.

De linker opening of de bovenste is vereenigt met den ¹ Slok-darm A. en ontfangt uyt den zelve spijs, en drank, die in de holligheyt der Maag nederdaalt.

Die opening ziet men ontrent 't elfde wervelbeen des Rugs, wat nader aan de Rug-graat, als aan 't ² sweertwyze Kraak-been, en staat by na regt op de Maag, op dat de spijs te ligter daar in zou komen; wanneer spijs, en drank daar in gaat, word die mond geopend, anders is die door de t' samen-trekking van zekere vleezige Vezelen gesloten.

VI. Tafel.

2. Figuur.

Regter

Mond of
opening.

De regter opening C. die de onderste is, ³ en Portier genaamt word, is zo wijd niet als de linker, om datse natuurlijk niet als vloeybare stoffe, gelijk de chijl, moet doorlaten; maar als de Maag met spijs, en drank vervult is, is ze zo hoog als de linker, ja zomtijds hooger, en weder leeg wordende, zaktse neder: de linker mond is die verandering niet onderworpen, om datse van den Slok-darm opgehouden word.

Die opening staat niet regt op de Maag, gelijk de linker, maar word gevonden, daar de schuyns opklimming der Maag eyndigt, en zig vereenigt met den twaalf-vingerigen-Darm: als'er niets uyt de Maag gedreven word, is ze door de t' samentrekking van zekere vleezige Vezelen, die ze ring-wyze omvangen, als door een Sluyt-spier gesloten. Ziet de 4. Fig. B. en word door toetrekking der Maag, en voortdrijving der chijl geopent.

Ruymte
der Maag.

De grootste ruymte der Maag word gevonden aan de linker zyde; en verders na de regter opening, word ze allengskens enger, zo dat de gedaante der Maag niet qualijk by een *Moezel-zak* word vergeleken, voor- namelijk zo men die aanmerkt, met den 4 Slob-darm van boven, en den twaalf-vingerigen-Darm, die'er onder aan valt is.

¹ Oesophagus. ² Cartilago ensiformis. ³ Pylorus. ⁴ Oesophagus.

De groote van de Maag kan niet wel bepaalt worden; want vliezig zijnde, kan ze verwyden, en inkrampen; men zegt datse in Vrouwen kleender, als in Mannen is. Den Heer *Plempius* zegt een dood Mensch t' Amsterdam ontleed te hebben, wiens Maag negen wijn pinten nats hield.

De Maag bestaat uyt vier rokken, waar van de ^{Vier} eerste en buytenste vliezig is, en die bekleed de ghe- ^{rokken.} le Maag: deffelfs Vezelen loopen van de een opening ^{Eerste en} der Maag na de andere; en volgens de ruymte, die ^{buytenste.} ze doorloopen, zijn ze langer, of korter, schuyns of regter B. ontrent de openingen, en den bodem der Maag, zijn ze veel dikker, dan op een andere plaats, zo datse daar eenigfints spierig zijn, en tot de beweging schijnen te dienen.

De tweede rok bestaat uyt tweederley vleezige ^{Tweede.} Vezelen, waar van de eene uytwendig, en de andere inwendig leggen.

De uytwendige omvangen den bodem, en de zyden der Maag in 't rond, en doorkruyssen de Vezelen des buytensten roks. Ziet de 4. Fig.

De inwendige Vezelen schuyns over de Maag loopende, worden gezien in de 5. Fig. A.

Aan 't binnenste deel dezes roks, vindt men een streng van vleezige Vezelen. Ziet de 5. B. die loopende nevens 't opperste deel der Maag, volgens deffelfs lengte, de linker opening omringen, en na de regter zyde gaande, eyndigen ze in de regter opening.

Die vleezige rok dient tot de wormwyze beweging der Maag, in 't Latijn *Motus Peristalticus* genaamt, om 't gene vloeybaar in de zelve is, na de *Portier*, of regter opening, te dryven

Die wormwyze beweging begint van de linker opening der Maag, en zo na de regter gaande, is die door al de Darmen; en geschied in de Maag door vleezige Vezelen, voor zo veel ze inkrampen, en verkorten, gelijk in andere Spieren gebeurt, waar door de holligheyt der Maag vernauwt word. Maar

1 Pylorus.

't schijnt,

VI. Tafel. 't ſchijnt, dat die ſtreng van vleezige Vezelen B. van Vezelen, de 5. Fig. tot die wormwyze beweging niet helpt; die de lin- want door haar t' ſamentrekking, worden de openin- ker ope- gen der Maag na malkander getrokken, dat ſtrydig ning der Maag toe- is om de chijs uyt te dryven, zo datſe dient om de trekken. toetrekken de Vezelen van de openingen der Maag te helpen, en te beletten, dat 't ingenome voedsel door den Slok-darm niet uytcome, en de chijs niet te veel te gelijk, of niet genoeg gekookt zijnde, door de *Portier* zou uytgedreven worden.

Derde Rok.

De derde rok is de Zenuwagtige, beſtaande uyt verſcheyde door een geweve Vezelen, waar door on- telbare kleyne Bloed-vaatjes gaan, die na de Kliert- jes loopen, welke aan 't binnenſte van dien rok ge- plaatſt zijn. Deze rok ſchijnt voornamelijk te dienen tot het gevoel, en door een zeker vogt, ſtrekkende tot verteering van de ſpijs, geprikkelt zijnde, den hon- ger te verwekken. Ziet een deel van dien rok in de 6. Fig.

Vierde en binnenſte.

De vierde of binnenſte rok beſtaat uyt zekere wollige draden, die regt over eynde ſtaan, gelijk men in trijp of fluweel ziet, en beletten, dat de Zenuwagtige rok door de ruuwheyt van zommige ſpijs niet te zeer geprikkelt worde. Die wolligheyt is aan de uytwendige oppervlakte, daar ze mede aan den Zenuwagtigen rok vaſt is, doorzaayt met ontelbare kleyne Kliertjes, waar van de grootſte in dien rok geplaatſt zijn, en dienen zonder twyfel, om een zeker vogt uyt het bloed door de Slag-aderen gebragt af te ſcheyden, tot verteering van de ſpijs; en om hunger te maken. Deze word van *Willis* de Klierige-rok genaamt, en ziet men een deel daar van in de 7. Fig.

Vouwen binnen in de Maag.

De inwendige oppervlakte der Maag heeft in wel- geſtelde lighamen, veel uyt-puylende vouwen, die ontſtaan, om dat de Zenuwagtige, en Klierige-rok veel ruymmer is, als de Vleezige, zo dat die van deze zullende omvangen worden, noodzakelijk moeten ge-

vouwen, en gefronst zijn: maar in de vraten, en drinkebroers, die hun Maag dikwils vullen, ziet men dat die rokken effen zijn, om dat de Vleezige rok zo ruym is als de andere.

De vouwen dienen om te beletten, dat 't gene in de Maag is, niet te haast, eer de chijl gemaakt is, uyt de zelve zou komen, ook bewaarenze 't overblijfsel van de chijl, om den honger te verwekken, en de spijs te verteeren. Ziet die vouwen in een omgekeerde Maag, in de 8. Fig.

De Maag is verzien met zeer veel Bloed-vaten. De Slag-aderen komen van de takken der ¹ Buyk-Slag-^{Bloed-vaten van de Maag.} ader, zo van de regter, als linker Maag-slag-aderen. De Aderen komen van de ² Poort-ader, waar van eenige van den tronk zelf, en andere van de Milt-tak spuyten: gene worden regter Maag-aderen, en deze linker genaamt, en eenige, die aan de Maag, en 't Net gemeen zijn, heet men Maag-net-aderen. Uyt deze komt een groote Ader voort, die de Maag volgens zijn lengte by na geheel omvangt, en daarom Kroon-ader genaamt word DD. die zig verspreyd met vele takken in de vliezen der Maag. dd.

Ter plaats, daar de Milt-ader in de Milt gaat, ^{Kroon-ader.} zendse ook eenige takjes na de Maag, welke, om dat de Maag na by de Milt gelegen is, zeer kort zijn, en daarom van de Ouden het *korte vat* genaamt, ^{Het korte vats} korte vaten moest men zeggen: dewijl men in 't ont-leeden ondervind, dat'er verscheyde zijn. Deze dienen niet om een zuur zap na de Maag te brengen, gelijk de Ouden leerden, tot verwekking van den honger, dewijl dit strijdt met den omloop des bloeds: maar in tegendeel om 't bloed uyt de Slag-aderen van de Maag te rug te brengen in de Milt-ader, en verder in de Poort-ader.

De Maag ontfangt twee Zenuwen van 't agtste paar ^{Zenuwen van de Maag.} der hersenen, de *dwalende* genaamt, deze na de Hert- en Long-zenuwen benevens eenige andere voortgebragt hebbende, gaan neder langs de zyden des ³ Slok-

1 Arteria celiaca. 2 Vena porta. 3 Oesophagus.

darms, en worden ieder in twee takken verdeelt, te weten: de binnenste, en buytenste; beyde de binnenste by malkander komende, vereenigen zig t' samen, en maken de Zenuw E die regt na den Slok-darm gaat, en nevens 't uytwendig deel der linker opening nederdalende, omvangt die den bodem van de Maag. Van gelijken de buytenste takken een weynig nederdalende, vereenigen zig, en maken de Zenuw F. welke tot de Maag langs 't inwendig deel der zelve opening gekomen zijnde, zig verdeelt in 't opperste deel. Beyde de Zenuwen verspreyden zig met vele kleyne takjes, door de zyden der linker opening, die daar een Zenuw-vlegting, als een net voortbrengen, waar door die deelen zeer gevoelig zijn. De Maag ontvangt ook eenige Zenuw-takjes van de Zenuw-vlegting des Buyks, waar van in de VII. Verhandeling zal gesproken worden.

Om het groot getal dezer Zenuwen, zo verneemt men dikwils scherpe pijn, aan de linker opening der Maag, die men *Hert-pijn*, in 't Latijn Cardialgia, noemt, waar by meermaals flauwten komen, welke ontstaan door de gemeenzaamheyt, die deze met de hert-Zenuwen hebben.

Water-vaten.

De Water-vaten, die hier en daar over de Maag loopen, ontlasten zig in 't Chijs-zakjen.

Gebruik der Maag.

De Maag dient eerst, om spijs, en drank uyt den Slok-darm door de linker opening t' ontvangen, die te behouden, tot datse in chijs verandert is, en dan door de ¹ Portier, of onderste opening, na de darmen te dryven. Ten tweeden, om door de Kliertjes een zeker vogt van 't bloed af te scheiden, 't welk bequaam is om de spijs te verteeren. Ten derden, door haar gevoel den Mensch in tijds indagtig te maken, spijs en drank te nemen, om de verlore kragten te herstellen.

Over eenige jaren heb ik het doode lighaam van een persoon geopent, gestorven van een sweer in de Maag: de vliezen waren doorgegeten, en men be-

vond het voedsel, dat hy ingenomen had, uytgestort in de holligheyt des Buyks.

Zo de Maag gequetst is, komt de spijs en drank door de wonde; de ¹ Zyde-boven-buyken swellen, en worden hard; de lyder heeft den hik, en braakt dikwils zuyver galle; daar is groote pijn, en trekking in den Buyk, men ziet een kleyn sweet, en koude aan handen, en voeten, en dan is de dood niet verre.

HET VIII. HOOFDSTUK.

Van de Darmen.

NAar de Maag volgen de Darmen, dat lange, vi. Tafel.
ronde, holle, en vliezige buyzen zijn, die be- 2. Fig.
halven 't begin, en 't eynde in de holligheyt des Buyks De Darmen.
wonderlijk door malkander gedraayt leggen.

Deze beginnen aan de ² Portier, of regter opening Hun be-
der Maag, voortgaande langs den boord van 't ³ gin.
Darm-scheyl, waar aan ze vast zijn, behalven een
kleyn gedeelte M. dat ter zyden af-hangt, eyndigen
ze aan den Aars.

De Darmen zijn gemeenlijk zesmaal langer als 't Lengte
lighaam, waar uyt se zijn genomen, en zijn uytwen- der Dar-
dig, voornamelijk de dikke, met veel Vet bekleed; men.
en schoon de Darmen van de Maag, tot den Aars
maar een eenige buys maken, zo zegt men nogtans
(om dat hun loop verandert van gedaante, en groote)
dat'er verscheide Darmen zijn.

En daarom worden ze verdeelt in *dunne* en *dikke* Dunne en
Darmen. De eerste zijn enger, en verzien met dun- Dikke
der rokken, en dienen om de chijs t' ontfangen. De Darmen.
tweede zijn wyder, en strekken om de dikke vuylig-
heden te plaatsen.

Men stelt gemeenlijk drie dunne Darmen, te we- Dunne
ten: de *Twaalf-vingerige*, de *Nugtere*, en de *Omgewon-* Darmen.

¹ Hypochondria. ² Pylorus. ³ Mesenterium.

de Darm. Deze drie maken maar een enkele buys, die in drie verdeelt word, en malkander zeer gelijk zijn; yder van die ontfangt een byzonderen naam, zo dat het eng genomen, maar een dunne, en dikke Darm is.

Twaalf-
vingerige
Darm.

De Twaalf-vingerige Darm, zo genaamt, om dat hy twaalf dwersche vingeren zou lang zijn, hoewel men dat zo juyft niet bevind, neemt zijn begin aan de ¹ Portier, of regter mond der Maag G. en zig agter na de Rug-graat buygende, eyndigt in de linker zyde onder den ² Kartel-darm, daar de andere dunne Darmen zig beginnen om te draayen, dat maar agt duym breed is, van den regter mond der Maag: vier of vijf vingeren breed van de Maag, is die Darm vast aan 't breedste eynde van 't ³ Al-vlees, daar hy desselfs buys, en Gal-buys ontfangt, welke met de beyde vogten, die'er door vloeyen, eerst met de uyt de Maag komende chijs vermengt worden. Van welke in 't XII. en XIV. Hoofdstuk zal gesproken worden.

VI. Tafel.
2. Figuur.
Nugtere.

De tweede of ⁴ Nugtere-darm HH. zo genaamt om dat hy by na altijd leeg word bevonden, meer als de andere, waar van de reden is, eerst: de vloeybaarheid der chijs, waar door hy ras voor by loopt. Ten tweeden: de scherpheyte der gal, welke door de prikkeling, die ze veroorzaakt aan den Darm, haast voortgedreven word. Ten derden: de menigte der Melkaderen, die'er in gevonden worden, waar door de chijs zeer haast word weg gevoert.

Die Darm is gelegen ontrent 't ⁵ Navel deel, en in de Navel-breuk, gemeenlijk met het Net uyt komende, hy is by na twaalf, of dertien palmen lang.

Omge-
wende.

De laatste der dunne is, de ⁷ Omgewonde Darm III. zo genaamt, om dat hy veel omwindingen heeft. Deze legt onder den Navel, by den Onder-buyk, en Lieffen; die begint, daar de Nugtere-darm eyndigt, en is alleen, of met 't Net verzeld, en zinkt in de Lies, en wel tot in 't zakjen, makende de scheur-

¹ Pylorus. ² Colón. ³ Pancreas. ⁴ Jejunum. ⁵ Regio Umbilicalis. ⁶ Exomphalos. ⁷ Ileum.

fels, waar van in 't V. Hoofdstuk van deze Verhandeling is gesproken, en gekomen zijnde tot de regter zyde, klimt hy opwaarts, en eyndigt inden ¹ Blinden-darm, daar 't wormwyze af-hangfel L. van dien Darm is: dit is de langste van alle de Darmen, dewijl men zegt dat hy wel een-en-twintig palmen ^{Zijn lengte.} lang is.

Zomtijds is maar een der zyden van dezen Darm, die verlangt en allengskens uytgerekt is, in de Breuk gezonken, zo dat de buys nog vry is, tot doorgang der stoffe, die'er door moet vloeyen; waar van ik verscheyde voorbeelden by gebragt heb, in mijn Verhandeling der voornaamste Hand-werken der Heelkonst, in 't elfde Hoofdstuk pag. 116. 't Is ook in dien Darm, dat zomtijds 't opperste deel in 't onderste schiet, zo dat de lyders de vuyligheden ten monde uyt braken, en sterven. Ik heb in 't openen van doode Lighamen dit zomtijds gezien.

De wonden der dunne Darmen, zijn meest altijd doodelijk: als ze in een doorgaande wonde van de Buyk uytkomen, en gequetst zijn, zo moet men die behandelen, gelijk ik heb gezegt in de voorgemelde Verhandeling der voornaamste Hand-werken der Heelkonst, in 't agtste Hoofdstuk.

Nu volgen de dikke Darmen, die ook drie zijn: de ^{De dikke} Blinde, de ² Kartel, en regte of ³ Endel-darm. ^{Darmen.} Deze drie maken ook een eenige buys, die met de voorgaande enger verknogt is, en by gevolg begint de blinde Darm, daar de omgewonde eyndigt.

De blinde Darm, zo genaamt, om dat hy aan de eene zyde gesloten is, en geen doortogt heeft, is tweederley: want eenige nemen daar voor zeker worm- ^{Worm-} wijs af-hangfel, ontrent vijf dwersche vingeren lang, ^{wijs af-} en dunder als de kleyne vinger, en die aan 't ⁴ Darm- ^{hangfel.} scheyl, gelijk de andere Darmen, niet vast is; maar dit wormwijs af-hangfel, dat zo kleyn is, kan voor den Blinden-darm niet genomen worden, dewijl yder een den Blinden-darm onder de dikke rekent. Daarom ^{Blinde-} is 't beter met de Ouden daar voor te nemen, zeker ^{darm.}

1 Caecum. 2 Colon. 3 Rectum. 4 Mesenterium.

E

rond

rondagtig deel des ¹ Kartel-darms, dat neder hangt, M. aan de inplanting des omgewonden Darms, en geplaatst, en vast is aan de regter Nier: want dit deel is waarlijk dik, en zeer ruym, en nauwlijks vier dwersche vingeren lang, zijnde ook blind, om dat in 't onderste deel geen doorrogt, en die vol drek is, en is der zelve gebruyk om 't gene de Kartel-darm niet kan verswelgen, voor een tijd te verbergen.

Kartel-
darm.

De tweede der dikke Darmen, is de Kartel-darm NN. die begint van den Blinden-darm, aan welken hy vast is by de regter Nier, en van daar voortgaande loopt hy opwaarts met een bogt, na 't holle gedeelte der Lever, daar hy zomtjids aan de Gal-blaas vast, van de Galle geel geverwt is. Van daar loopt hy na de linker zyde, dwers onder den bodem der Maag, daar hy aan 't Net vast is, en hegt zig door zekere kleyne vlieskens aan de Milt, en wat lager aan de linker Nier, van waar hy nederdalende, tot aan 't onderste van 't ² Darm-been, weder opklimt, en een kronkel makende, als een verkeerde S tot aan 't opperste van 't Heylig-been, eyndigt in den ³ Endel-darm.

Cellen.

De Kartel-darm heeft zeer vele cellen, welke dienen om den voortgang van de drek een weynig te vertragen, op dat men niet gedurig zou moeten afgaan, en tot dien eynde is die zeer ruym, om de drek op te houden, en wel agt, of negen palmen lang, en behalven den Blinden-darm, die ook de vuyligheyt in zig behoud, is hy de breedste, en ruymste van al de Darmen.

Hoe de
Cellen
gemaakt
worden.

Onder de Maag, en in de linker zyde, zijn die cellen zeer veel, en worden gemaakt door twee banden, die van 't een eynde des Kartel-darms, tot 't ander regt tegen over malkander uytgestrekt zijn, en de rokken toe trekken, en rimpelen, waar uyt de cellen ontstaan, zo dat die banden los gemaakt zijnde, de Darm eens zo lang is, en de cellen verdwijnen. En zijn die banden niet anders als zekere stren-

¹ Colon. ² Os Ilium. ³ Rectum.

gen

gen van vliezige Vezelen, die met den Kartel-darm even lang, en een halve vinger breed zijn. Ziet de VI. Tafel, de 2. Fig. NN.

Tot het rimpelen van den Darm, en 't maken der cellen, helpt ook veel 't kleyn Darm-scheyl, waar door hy van gelyken toe getrokken, aan de Lenden vast gebonden, en gelijk door drie banden word gerimpelt.

In de holligheyt des Blinden darms, aan 't begin des Kartel-darms, en 't eynde des omgewonden Darms, is een Klap-vies K. om 't wederkeeren van de drek te beletten, dat om de ordere der Figuren, in 't ver-
 Klap- vliet.

De derde en laatste dikke Darm, is de regte, of Endel-darm. Deze begint aan 't opperste van 't Heylig-been, daar de Kartel-darm eyndigt, en heeft geen rimpelen, nog cellen, op dat de ontlasting van de drek te ligter zou geschieden: die Darm loopt regt nederwaarts tot aan den Aars, en word aan 't Steert-, en 't Heylig-been, door den Pens-zak vast gehegt. In de Mannen is hy aan de Blaas, en in de Vrouwen aan de scheede der Lijf-moeder vast; zo dat de zelfstandigheyt der scheede, van die des Darms nauwlijks te onderscheyden is.

De Endel darm is ontrent anderhalve palm lang, en drie dwersche vingeren breed; en van zelfstandigheyt zeer dik; uytwendig is hy met veel vet beladen, en daarom word hy gemeenlijk in de Beesten, de vette Darm genaamt wort. 't Eynde van dien Darm R. word den Aars genaamt, en is verzien met drie Spieren.

De eerste Spier is, die den Aars sluyt P. en bestaat uyt ringwyze Vezelen, die niet alleen 't uyteynde van den Endel-darm, maar nog een groote dwersche vinger breed buyten den Aars omringen, en aan de huyd vast is; zo dat als men de operatie doet voor de fistel van den Aars, men eerst in de Spier snyd, eer men aan den Darm komt, en niet eerst in den Darm begint te snyden, gelijk men gemeent heeft. Die Spier

1 Mesenterium. 2 Valvula. 3 Peritonaeum,

E 2

om-

omvangt den Endel-darm wel de hoogte van twee, of drie dwersche vingeren, zijnde boven dikker als onder, en men heeft tot heden geloofd, dat al de fistels van den Aars, die hooger gingen als de Spier, ongenezelijk waren. Maar 't is zeker door vele ontdekkingen, dat men zodanige fistels, die hooger gaan, mag door snyden, en se alle genezen, gelijk de andere. Dog zo ze boven 't bereyk des vingers gaan, zijn ze ongenezelijk.

Maar men vraagt, als alle de vleezige Vezelen van die Spier dwerssch doorsneden zijn, hoe hy dan den Aars kan toe sluyten, gelijk te voren, en beletten, dat de drek tegen wil niet uytkomt? De reden is, dat de Spierige Vezelen afgesneden zijnde, nog eenigzints kunnen aan een groeyen en zig t' samen trekken, zo dat het lidteeken is, als de plaats, daar alle de vleezige Vezelen eyndigen, en gelijk 't hoofd van de Spier, van waar ze te samen trekkende den Darm toe sluyten. Daarom moeten de Heel-meesters in 't maken van 't lidteeken, wel in agt nemen, dat die zo dun, en teer zy, als mogelijk is, en zy van de lengte der Vezelen niet af snyden: voegt'er by, dat de Aars-intrekkers als een Sluyt-spier maken, en den Darm toe trekken, waar door de werking der Sluyt-spier zeer versterkt word.

De Sluyt-spier is in de Mannen vast aan 't onderste deel der blaas, en in de Vrouwen aan de scheede der Lijf-moeder, van agteren aan 't Steert-been; en ter zyden door zekere vleezige banden aan 't Heylig-, en 't Heupe-been.

Die Spier dient om den Aars te sluyten, op dat de drek tegen wil niet uyt lope.

VI. Tafel.
2. Figuur.
Aars-intrekkers.

De twee andere Spieren zijn de Aars-intrekkers QQ. deze nemen haar begin van 't onderste, binnenste, en zydelik deel van 't Heupe-been, en nederdalende, omvangenze 't uytreynde des Endel-darms, en behalven datse den Aars in-, of optrekken, dienenze nog door de peezen, die ze maken, als se te samen werken, tot een soort van Sluyt-spier. Ziet die Spie-

1 Os Ischion,

ren

ren in haar natuurlijke plaats in de VI. Tafel, 2. Figuur. QQ.

De verzwakking van de Aars optrekkende Spieren is oorzaak, dat de ¹ Endel-darm uytzinkt.

Zomtijds is 't Aars-gat in nieuw-gebore Kinderen door een vlies gesloten, dat men meermaals den tweeden of derden dag verneemt, als men ziet datse zig niet vuyl maken: indien 't vlies dun is, zo is 't ligtlijk door te snyden; maar zo 't dik, eh sterk is, is 't moeyeliker. Men moet dan met een vlijm of sny-mesken een opening maken, tot dat men een swarte stoffe *meconium* genaamt ziet uytkomen. Deze opening moet kruyswijs gemaakt worden, en dan met een steek-wiek verbonden worden.

Gulzige Menschen flokken zomtijds onwetende vlees met beenderen in, en 't vlees verteert zijnde, blyven de beenderen aan 't eynde van den Endel-darm vast steken, met pijn, en komt bloed voort, en zo heb ik eens 't been der vleugel van een Kieken, uyt den Aars van een Man getrokken.

Ziet diergelyk voorbeeld, ontstaan door 't inswelgen der onderste Kaak-been van een Schol, by *Job van Mekerem*, in 't 33. Hoofdstuk zijn'er Heel-en Genees-konstige Aanmerkingen; daar hy ook by brengt dat 't voorgemelde been zomtijds uytgetrokken is geweest, door een sweering ter zyden des Aars, en aan 't onderste der Lenden.

¹ Rectum.

U Y T L E G G I N G

der

F I G U R E N ,

van de

S E S D E T A F E L.

Waar in vertoont worden de Maag, en
Darmen, gelijke in 't Lighaam leggen:
als mede verscheyde rokken van de
Maag, en loop der zelve Vezelen.

De 1. Fig. vertoont het B De Bodem.

*Net van een jong Hon-
deken, waar in de va-
ten zeer zichtbaar zijn,
die in den Mensch door
de menigte van 't Vet,
niet wel kunnen gezien
worden.*

C Plaats der regter
opening, of de Por-
tier.

D De Kroon-vaten
der Maag.

dd Verscheyde takjes
der zelve.

A Het agterste vlies
van 't Net.

EF De Zenuwen der
Maag.

B Het voorste Vlies.
aaa De Ader en Slag-
ader.

G Een deel van den
Twaalf - vingerigen
Darm.


*De 2. Fig. vertoont de
Maag met de daar aan
hangende Darmen.*

H De nugtere Darm.

I De Omgewonde
Darm.

A Plaats der linker
opening.

K Een Klap-vlies aan
den ingang des om-
ge-



- gewonden Darms, en die in den geopenden Darm gezien word.
- L** Het wormwyze afhangfel.
- M** De Blinde Darm.
- N** De Kartel-darm.
- nn** Zijn Band.
- O** De Regte Darm.
- P** De Sluyt-spier.
- Q** De opligters van den Aars.
- R** De Aars open staande.
- De 3. Fig. vertoont een dobbel wormwys afhangfel.*
- A** Den Kartel-darm.
- B** Den omgewonden Darm.
- C** Het gewoonlijk wormwys afhangfel.
- D** Het ongewoonlijk wormwys afhangfel, dat waarschijnlijk anders niet was als een verlanging der zyde van den omgewonden Darm, gelijk te voren in zijn beschrijving gezegt is.
- De 4. Fig. vertoont de buytenste ordere der Vezelen van den tweeden rok der Maag. ook,*
- A** Een gedeelte van den doorgesneden Darm.
- B** De Ring-spier van de Maag of de Portier.
- De 5. Fig. vertoont de binnenste ordere der Vezelen van den tweeden rok der Maag.*
- A** De schuyns loopende Vezelen.
- B** Een streng Vezelen loopende in't bovenste deel der Maag, volgens haar lengte.
- De 6. Fig. vertoont een deel des Vaatigen Roks.*
- De 7. Fig. vertoont een deel des Klierigen Roks.*
- De 8. Fig. vertoont een omgekeerde Maag, op dat de rimpelen en vouwen van binnen zouden kunnen gezien worden.*

VII. Tafel.

1. Figuur.

Rokken
der Dar-
men.Eerste en
binnenste
Rok.

De rokken der Darmen zijn zo veel als der Maag; en verschillen niet veel in maakfel, als datse een weynig dunder, en de Vezelen van den tweeden rok wat anders, dan in den tweeden der Maag geschikt zijn.

De eerste en buytenste rok der Darmen, is de dunste, en komt van den Pens-zak A. bedekkende alle de ondergelege rokken, en dient tot steunfel van de daar aan volgende, in de lengte der Darmen loopende vleezige Vezelen.

Tweede.

De tweede rok is dikker, en gantsch vleezig, en bestaat uyt twee op malkander leggende orders van vleezige Vezelen: de eerste en buytenste loopten volgens de lengte der Darmen, B. en de binnenste loopten zo, datse de Darmen omringen, en met de eerste een kruys maken C. en worden in den boord van 't Darmfcheyl gelijk in een peese ingeplant; maar de buytenste rok, die zenuwagtig is, schijnt aan de eerste ordere der Spierige Vezelen, die volgens de lengte der Darmen loopten, voor een pees te dienen; zo dat de gantsche buys der Darmen, niet anders dan een ronde holle Spier is.

Dienst der
Vezelen.

De buytenste spierige Vezelen, die volgens de lengte der Darmen loopten, dienen om ze te verkorten, en die de Darmen in 't ronde omringen, om ze te verengen, zo datse overhands werkende, de wormwyze beweging der Maag, tot aan den Aars verrigten, waar door 't gene in de Darmen is, allenskens voorgeperst word, en 't vloeybaarste van de chijl van de dunne Darmen in de Melk-aderen gedreven word.

Derde
Rok.

De derde of zenuwagtige rok bestaat uyt alderley soort van zenuwagtige Vezelen, waar in veel Zenuwen, en Bloed-vaten D. zijn.

Zijn ge-
bryk.

Deze dient voornamelijk tot het gevoel, en volgens de verscheyde indruk, die hy van de voor by gaande, of stil staande stoffe ontfangt, is hy als een pees, de vleezige rok opwekkende, om de beweging der Darmen daar door te verhaasten, of te vertragen.

De Zenuwagtige rok is van binnen overtrokken met zekere wolligheyt E. gelijk de Maag, en is de

1 Peritonaeum. 2 Mesenterium.

vier-

vierde, en binnenste rok der Darmen. Deze dient om de mondekens der vaten te bedekken, en te beschermen, en den eersten indruk van de chijl, en andere stoffe in de Darmen gelegen te ontfangen, en aan den Zenuwagtigen rok allengskens over te zetten.

Binnen in de holligheyt aan de inwendige oppervlakte der Darmen, zijn zeer veel kleyne Kliertjes, Kliertjes die in de dunne Darmen, zomtijds met menigte by malkander leggen dd. maar in de dikke leggen ze hier, 3. Fig. en daar verspreyd.

Die Kliertjes verschillen in groote zeer veel, en Kliertjes zijn kleynder in de dunne, als in de dikke Darmen; in de holligheyt der Darmen ontrent het eynde des omgewonden Darms zijn die zomtijds digt by malkander, en wel veertig in getal, in groote, en gedaante van het Kirffe-zaad; in den Haar Twaalf-vingerigen en nugteren Darm, zijn ze kleynder, groote en minder in 't getal: in de dikke zijn ze by na zo groot als een boon.

Die Kliertjes dienen in de dunne Darmen, om een Gebruik der Kliertjes zeker vogt van 't bloed af te scheyden, en na dat 't vloeybaarste van de chijl in de Melk-aderen gedreven is, het dikke te verdunnen, op dat'er nog iet goets uyt zou kunnen gehaalt worden, en daarom zijn'er zo veel ontrent het eynde des omgewonden Darms; en in de dikke zijn ze om de grove uytdijgfels te bevogtigen, op datse te beter zouden kunnen voort gedreven worden.

In de holligheyt der Darmen, voornamelijk in de VII. Taf. dunne, zijn veel dwersche uytpuylende vouwen, 2. Figuur cc. gelijk halve ringen, makende als een soort van Klap-Vouwen vliezen, die niet alleen in den omgekeerden, of geo-in de Darmen pendenden Darm; maar ook van buyten gezien worden dd. als de opgeblaze Darm tusschen 't licht, en 't oog gestelt word. Deze vouwen, of Klap-vliezen, ontstaan, om dat de Zenuwagtige rok veel langer, dan de buytenste is: want zullende die van de buytenste rokken in de zelve uytgestrektheyt behouden worden, moet hy noodzakelijk vouwen maken, en zijn die vouwen, zegt *Fallopins*, op zommige plaatsen zo veel, dat zo de Zenuwagtige rok, van de buytenste afge-

3 Ilken.

E 5

daan

daan wierde, zou hy wel driemaal langer, als de buytenste wezen.

Die vouwen, of Klap-vliezen zijn om de chijs eeningfints in zijn loop te vertragen, op dat hy niet te ras, de mondekens der Melk-aderen zou voor by loopen; maar op dat hy ook niet te lang zou opgehouden worden, daarom worden die vouwen bewogen, waar door de voor by gaande stoffe ligtelijk daar over loopt. Den Heer *Ruyfch* toont'er in eenige Kliertjes, van welke te vooren is gesproken.

VII. Taf.
3. Figuur.
Groot
Klap-vlies
tuffchen
de dunne
en dikke
Darmen.
Zijn ge-
bruik.

Daar is een zeker Klap-vlies aan den mond des ¹ omgewonden Darms E. daar hy zig in den ² blinden Darm opent, dat zeer groot, vliezig, en dik is, en in den blinden Darm uytpuylende, omringt het den voorgemelden mond ff. Dit Klap-vlies strekt om te beletten, dat het gene in de dikke Darmen gekomen is, niet weder na den omgewonden Darm te rug zou keeren, zo dat hier door belet word, dat de Kliften in de dunne Darmen niet kunnen komen.

En daarom is dit Klap-vlies, dat aan de zyde des Kartel-darms in den omgewonden Darm is ingeplant; want zo beyde de eynden in een regte linie, aan mal-kander vast geweest waren, zo zoude al 't geweld van de te rug willen keerende stoffe, op 't voorgemelde Klap-vlies geschied zijn, daar ze nu het zelve voor by gaande, in den blinden Darm opgehoopt word.

Maar om dat de winden met meerder moeyelijck-heydt uytgesloten worden, als de dikke stoffe, en niet ligt na de dunne Darmen te rug zouden keeren, zo is het wormwyze af-hangfel te vooren beschreven aldaar gestelt, waar in de winden naar den grond des blinden Darms gedreven zijnde, zig begeven; dat de zaak zo is, leert de ondervinding: want zo men van de Maag de vuyligheden des Kartel-darms (waar by in doode lighamen gemeenlijk winden zijn) naar zijn begin voort drijft, zullen ze de opening des omgewonden Darms voor by gaande, den blinden Darm zeer doen uytzetten, terwijl 't wormwyze af-hangfel alleen met wind zal gevuld worden.

¹ Ileum. ² Cecum.

De

De Darmen zijn vast gehegt aan een zeker vliezig deel, Darm-scheyl genaamt, BB. waar door ze vast aan de Lenden, en aan den boord van 't Scheyl vast zijn gemaakt; by na op die manier, gelijk de *fransen*, of dat men hedendaags *Sabbola* noemt, die aan den boord der kleederen genaayt worden, welke, om datse veel langer als de voorgeeelde boord zijn, zeer gefronst, en ingetrokken worden, zo dat zes ellen Darms vast zijn aan een omtrek, die maar een span van zijn middenpunt af is, en dat des Scheyls omtrek, om de lengte der Darmen op te koppelen, ieder palm, ontrent twaalf palmen Darms bevat: en dit geschiet, op dat de Darmen in een eng, en kleyn begryp, onderscheydentlijk, en zonder te verwarren, zouden kunnen bevat worden.

VII. Tafel
4. Figuur.
De Darmen worden aan 't Scheyl vast gehegt.

En gelijk 't Midden-punt van 't Scheyl na de Lenden, en den boord na vooren is gelegen, zo legt het onder de Darmen zo gedoken, dat men 't zonder na vooren te trekken, nauwlijks kan zien. In 't volgende Hoofdstuk zal van 't Darm-scheyl gesproken worden.

De Darmen ontfangen zeer veel vaten, bb. cc. van de bovenste, en onderste Scheyl-slag-ader, die genaamt is, om datse door 't Scheyl loopen. De bovenste komt van de groote Slag-ader, een weynig boven de uytmelkende Slag-ader, en verspreyd zig met vele takken door de dunne Darmen. De onderste komt ook van de groote Slag-ader, maar wat lager, onmiddelijk onder de Zaad-slag-aderen, en verspreyd zig voor het grootste gedeelte in de dikke Darmen. De Aderen der Darmen worden om de zelve reden Scheyl-aderen geheten, ze komen van den regter tak der 3 Poort-ader, en worden met haar takken, gelijk de Slag-aderen, door alle de Darmen verspreyd.

VII. Tafel
4. Figuur.

Boven dien heeft de Twaalf-vingerige Darm een Slag-ader, die haar eygen is, komende van de 4 Buyk-slag-ader, de *Twaalf-vingerige Slag-ader* genaamt, en een Ader, van den tronk der Poort-ader oorspronkelijk, die den zelve naam draagt.

De Twaalf-vingerige Ader en Slag-ader.

De Endel-darm heeft ook eenige vaten, die haar

1 Mesenterium. 2 Centrum. 3 Vena porta. 4 Caelica.

eygen

Speen-
vaten.

eygen zijn, komende van de Onder-buyks-vaten, als de uytwendige Speen- en Slagaderen. De inwendige Speen-slag-aderen komen van de onderste Scheyl-slag-ader; maar de Aderen komen van een byzonderen tak, die zomtjids uyt den regter tak der Poort-ader, maar ook uyt den linker tak, of ontrent defselfs verdeeling voort komt.

't Gene verders van die vaten valt te zeggen, zal beter gezien worden, als men in de zevende Verhandeling, van der zelve verdeeling zal spreken, en zullen ook eenige van die klaarder aangewezen worden, in 't volgende Hoofdstuk, als men van 't ¹ Darm-scheyl zal handelen.

De reden, waarom de Darmen zo veel Slag-aderen hebben, is waarschijnlijk eerst, tot hun voeding. Ten tweeden om in der selver Kliertjes zeker vogt van 't bloed af te scheyden. En ten derden tot hun beweging, om dat de Darmen ronde holle Spieren zijn. Tot de Slag-aderen behooren ook veele Aderen, welker dienst genoeg bekend is.

Hier uyt is ook te zien de reden, van waar al 't vogt komt, dat in den Buyk-loop, of in 't Buyk-zuyveren uytgeloofd word: want schoon'er veel Gal, en ² Al-vlees-zap, in de Darmen vloeit, zo word evenwel 't grootste deel van 't vogt door de Scheyl-Slag-aderen, in de Klieren der Darmen afgescheyden.

En als de Slag-aderen in een sweer der Darmen, doorgegeten worden, vloeit'er bloed in der zelve holigheyt, gelijk in den Rooden loop gebeurt.

Zenuwen
der Dar-
men.

De Darmen ontfangen ook veel Zenuwen, die dienen tot vervoering der geesten, die ze noodig hebben tot beweging en 't gevoel, deze komen ten deele van de Zenuwen der Maag, die langs de eene, en de andere zyde nederdalen; maar voornamelijk van de groote vlegting, die in 't midden van 't Scheyl is, welker takjes van alle zyden, na de Darmen loopen cc. die Zenuwen zijn alleen tot de natuurlijke beweging; maar de Endel-darm, en waarschijnlijk het

¹ Mesenterium. ² Pancreas.

naast

naast gelege deel des ¹ Kartel-darms ontfangt Zenuwen, die uyt het merg van 't Heylig-been komen, en waar door een vrywillige beweging in 't uyt dryven geschied.

Boven dien hebben de dunne Darmen een zeker soort van vaten, die hun waarschiynelyk eygen zijn, en van kouleur der stoffe, die'er door gaat, en *Melk-aderen* genaamt worden d. d. d. Die vaten beginnen met ontelbare sijne takjes van den binnensten Zenuwagtigen rok der Darmen, en ontfangen 't fijnste en beste deel der chijs, en 't groffte als onnut word allengskens na de dikke Darmen gedreven. Deze vaten zullen beschreven worden in 't X. Hoofdstuk, na dat van 't ² Darm-scheyl zal gehandelt zijn.

De dunne Darmen dienen, om de chijs uyt de Maag door de ³ Portier t' ontfangen, waar by terstont de Gal, en 't Al-vlees-zap zig mengen, en ze word zo door de wormwyze beweging der Darmen, als door 't ⁴ Midden-rift, en Spieren des Buyks, terwijl we ademen, voort gedreven; maar om dat verscheide omdraayingen der Darmen, en Klap-vliezen, der zelve voortgang zeer vertragen, zo dringen ondertusschen de fijnste deelen van de chijs in de Melk-aderen, en die te grof zijn, en'er niet in kunnen, worden na de dikke Darmen gevoert, daar ze in de cellen des Kartel-darm vergaderen, en blyven, tot datse door de boven gemelde beweging, tot den Aars gestooten worden, en door der zelve veelheyt, swaarte, en prikkeling den Mensch moeyelyk vallen, en dus uytgedreven worden.

Gebruik
der dunne
Darmen.

Gebruik
der dikke.

HET IX. HOOFDSTUK.

Van 't Darm-scheyl.

VII. Taf.
5. Figuur.
Darm-
scheyl wat
is.

HET Darm-scheyl is een zeker vliezig deel, aan welkers boord de Darmen vast zijn, dat met

¹ Colon. ² Mesenterium. ³ Pylorus. ⁴ Diaphragma,

veele

veele Zenuwen, bloed-, en Melk-vaten is doorweven, en bezet met met veel Vet, en Klieren BB.

In welgestelde Menschen, is 't gemeenlijk niet doorzigtig, gelijk in honden om het vet, dat over al door het geheele Darm-scheyl gevonden wond.

Plaats.

Dunne
Darm-
scheyl.
Dikke
Darm-
scheyl.

Het legt in 't midden des Onder buyks, en word gemeenlijk verdeelt in twee deelen: 't eerste, waar aan de dunne Darmen vast zijn, word het *dunne Darm-scheyl*, en 't andere, daar de dikke aan vast zijn, het ' *dikke Darm-scheyl* geheten. Het eerste is dikker als 't andere, maar het tegendeel ziet men in de Darmen, die'er aan vast zijn.

Oor-
spronk
van 't
Darm-
scheyl.

Het 2 Darm-scheyl neemt zijn oorspronk, aan 't eerste, en 't derde wervel-been der Lenden, alwaar veele Vezelen van den 3 Pens-zak voorkomen, waar uyt twee sterke vliezen gemaakt worden, welke t' samen gevoegt zijnde, het grootste gedeelte van 't Scheyl uyt maken, tusschen welke beyde den Heer *Warthon* een derde stelt, dikker als een der twee voorgaande, dat hy 't eygen vlies van 't Darm-scheyl zegt te wezen.





Gedaante.

Zijn gedaante is by na rond, zo nogtans dat de gewoonlijke evenbedeeling der 4 Midden-lijn, vergeleken by den omtrek van den ring, 'er veel ontbreekt; om dat in den omtrek van 't Darm-scheyl veel fronsen zijn, die, hoe ze meer 't 5 Midden-punt naderen, hoe ze meer verdwynen, zo dat, schoon de Midden-lijn van 't Darm-scheyl, nauwelijks twee spannen lang is, zo kan nogtans den omtrek tot veele ellen uitgebreyd worden. In de zyden, daar 't na den Endeldarm nederdaalt, word het lang.

Het groot getal der vaten, beschreven in 't voorgaande Hoofdstuk, loopen tusschen de vliezen van 't Darm-scheyl na de Darmen, aan 't welk ze eenige takjes mede deelen, maar van de Melk-aderen krijgt het niet het alderminste takjen.

1 Mesocolon. 2 Mesenterium. 3 Peritonæum, 4 Diameter.
5 Centrum.

U Y T



U Y T L E G G I N G

der

F I G U R E N ,

van de

S E V E N D E T A F E L.

Waar in vertoont worden de Rokken,
Klieren, en Klap-vliezen der Darmen,
en hoe de Darmen aan 't Scheyl vast
zijn, benevens der selver Klieren,
en Bloed-vaten.

- De 1. Fig. vertoont de* A De holligheyt van
Rokken der Darmen. den nugteren Darm.
A Den Vliezigen rok. B Een deel des zelve
BC Den Spierigen rok. Darms omgeslagen.
B De uytwendige or- cc De fronsen of oog-
dere der Vezelen. luykende Klap-vlie-
C De inwendige or- zen.
dere. dd De zelve Klap-
D Den Vatigen rok. vliezen uytwendig
E Den Klierigen rok. zig vertoonende.
aa De bovenste rok- *De 3. Fig. verbeelt een*
ken omgeslagen, op *deel zo van den dikken,*
dat de onderste zou- *als dunnen Darm.*
den kunnen gezien A Een deel des omge-
worden. wonden Darms.
De 2. Fig. vertoont een B Den blinden Darm.
deel des nugteren Darms C Het wormwyze af-
geopent. hangfel. D

- D** Een deel des Kartel-darms geopent.
- E** De opening van den omgewonden Darm, naar den dikken openstaande.
- d** Klieren in den omgewonden Darm.
- cc** Klieren in den Kartel-darm.
- ff** Het groot Klapvlies aan de opening des omgewonden Darms.
- De 4. Fig. vertoont den Buyk geopent, waar in men ziet*
- A** Een gedeelte van 't Net ter zyden na boven omgeslagen.
- BB** Een gedeelte van 't Darm-scheyl, sterk uytgespannen, waar in 't uytwendig vlies weg genomen zijnde, zeer klaar gezien worden.
- bb** De Aderen en Slagaderen van 't Darm-scheyl, loopende na de Darmen, die met vele knopen zig vereenigen, en vele takjes aan 't Scheyl mede deelen.
- aa** De Klieren van 't Scheyl, die hier en daar verspreyd zijn.
- cc** De Zenuwen met swarte linien afgeteekent, op datse te beter zouden gezien worden.
- D** Een gedeelte van den nugteren Darm, die aan 't Scheyl vast is, en waar in vele Bloed-vaten zijn.
- EE** De andere dunne Darmen.
- F** Een gedeelte van 't Mannelijk zakjen, dat geopent, en op de Dye legt.
- G** Het Midden-schot van 't zakjen, zijnde omgeslagen.
- H** De boord van 't uytwendige gedeelte van 't zakjen, waar aan 't Midden-schot vast is.
- De 5. Fig. vertoont het Darm-scheyl, waar van de Darmen afgescheyden zijn, en het welk breed uytgespreyd is.*
- AB** Het dunne Darm-scheyl.
- CDE**

CDE Het dikke Darm- engt is.
 fcheyl. aa De Klieren van 't
 A De vlakke van 't Darm-fcheyl.
 dunne Darm-fcheyl, bb De Bloed-vaten
 met veel Vet be- die om 't Vet leeg
 zet. zijnde , duysterlijk
 BB Zijn omtrek, die gezien worden.
 door vele fronsen ver-

Aanmerkt dat zo haast de voorgemelde Aderen, en Slag-aderen in 't Darm-fcheyl gekomen zijn, zy zig eerst in weynige, daar na in meerder, en eyndelyk in kleynder takjes verdeelen, die, eerze in de Darmen gaan, op vele plaatsen weder vereenigen, en gelijk verscheyde halve ringen maken, van welke vele takjes komen, die zig in de Darmen verspreyden. Ziet de VII. Tafel, 4. Fig. bb.

Men vind tusschen de vliezen van 't Darm-fcheyl, Klieren veele zagte Klieren, die in jonge Menschen witagtig, van 't Darm-fcheyl. maar in oude bruynagtig van kouleur zijn. Die Klieren leggen in 's Menschen Darm-fcheyl hier en daar verspreyd, en met Vet bedekt; haar getal is onzeker, en verschilt ook in groote, onder welke weynige grooter zijn, als een *Roomsche-boom* A. en de minste VIII. Taf. is zo groot, gelijk se alle drie in de Tafel met de groot- 1. Figuur. ste daar by afgebeeld zijn, en de kleyne leggen zomtijds maar een duym breed van den Darm.

In de Lighamen van hun, die met ' Krop-sweeren aan de uytwendige deelen van 't Lighaam sterven, worden zomtijds in 't Darm-fcheyl verscheyde Klier-gezwellen gevonden, die zo groot als erweten, kleyne en groote noten, ja als een vuyft waren, gelijk *Pareus* zegt ondervonden te hebben.

Ontrent het midden van 't Darm-fcheyl, in de hon- 2. Figuur. den is een groote Klier H. die van *Azellius* Alvlees, of *Pancreas*, en ook de groote Klier van 't Darm-fcheyl genoemd word, in welke de Melk-aderen, uyt

1 Mesenterium. 2 Scrophulæ.

F

de

de Darmen komende, t' samen vergaderen, en van daar de takjes wat verandert zijnde, loopen die naar 't Chijl-zakjen. In den Mensch is geen groote Klier van 't Darm-scheyl, als in de honden; maar veele, die minder zijn, en hier, en daar verspreyd leggen, gelijk in een Mensch-darm-scheyl gezien word, in de VII. Tafel. 4. Fig. aa. en de 5.

In de honden, zijn by die groote Klier, nog weynige kleynder; maar in 't overige van 't Scheyl, worden nauwelijks eenige andere gevonden.

Gebruyk
van 't
Darm-
scheyl.

't Gebruyk van 't Darm-scheyl is, dat het dient, eerst: om de Darmen daar aan vast te hegten, waar door ze in de engte van den Buyk gehouden, en aan de Wervel-beenderen der Lenden vast gebonden worden. Ten tweeden: om de Aderen, Slag aderen, en Zenuwen na de Darmen te geleyden, en de Melk-aderen van de zelve, na de Klieren en 't Chijl-zakjen. En ten derden, om door de Klieren, waarschiynlijk een zeker vogt van 't bloed af te scheyden, tot verdunning van de chijl, en om de grove deeltjes, die in de Melk-aderen bleven hangen, af te spoelen.

HET X. HOOFDSTUK.

Van de Chijl-wegen, als Melk-aderen, Chijl-zakjen, en de Chijl- of Borst-buys; ook word een weynig van de Water-vaten gesproken.

VIII. Taf.
2. Figuur.
Wat Melk-
aderen
zijn.
Wanneer
en van
wie ze ge-
vonden
zijn.

DE Melk-aderen zijn zekere kleyne vaatjes; zeer dun van vliezen, niet ongelijk de Water-vaten; ze zijn om de chijl uyt de Darmen t' ontfangen, en naar 't Chijl-zakjen te voeren ddd.

Die vaatjes zijn eerst ontdekt in 't jaar 1622. van *Caspar Azellius*, die ze heeft beschreven.

Men zegt dat *Erasistratus*, een van d' Ouden die in Geyten heeft gezien, welke onlangs gezogen hadden;

I Cisterna

maar

maar hy heeftse genomen voor Slag-aderen, die vol melk waren.

De Melk-aderen nemen haar oorspronk met vele kleyne takjes, van de inwendige oppervlakte des Zenuwagtigen roks der Darmen, die na buyten t' samen komende, grooter vaatjes maken: duyzzende van deze vaatjes, die op de uytwendige oppervlakte der Darmen zig vertoonen, kan men ligtelijk tellen; maar in de inwendige oppervlakte der Darmen, kan 't alderscherpste oog geen een agterhalen.

De grootste Melk-aderkens in een hond, uyt die voorgemelde takjes voorkomende, en lopende door 't ¹ Darm-scheyl, vereenigen op verscheyde plaatsen met malkander, en komen eyndelijk (zo veel tot nog toe bekend is) in de groote Klier t' samen, en omringen die met vele takjes. Daar na uyt de voorgemelde Klier uytgaande, eyndigen ze in 't ² Chijl-zakjen f. of den gemeenen ontfanger der chijl, en 't water. VIII. Taf. 2. Figuur. De Melk-aderen, die van de Darmen, tot de groote Klier zig uytstrekken, worden van zommige de eerste soort dd. en de andere, die van de groote Klier, na 't Chijl-zakjen loopen, de tweede soort genaamt ee. maar dit is zo niet in den Mensch, in wien die groote Klier niet is, gelijk in de honden; maar alle de Melk-aderen loopen na de Klieren, die in 't Darm-scheyl verspreyd leggen, en van daar naar 't Chijl-zakjen; en tot wat eynde ze na de voorgemelde groote Klier loopen, kan uyt 't gene in 't voorgaande Hoofdstuk, van 't gebruyk der Klieren des Darmscheyls gezegt is, ligtelijk verstaan worden.

't Is een geschil onder de Ontleders, of 'er ook Melk-aderen in de dikke Darmen zijn. *Bartholinus* zegt van ja, maar men meent dat het Water-vaten zijn, die hy gezien heeft, die vol lympha waren, en uyt de vliezen der dikke Darmen, en geensins met haar takjes uyt de inwendige oppervlakte quamen, want 't schijnt dat de dikke Darmen dienen om de drek t' ontfangen, uyt welke niet goeds naar 't bloed kan gebragt worden.

1 Mesenterium. 2 Cisterna.

F 2

Zom

Zommige gelooven dat de Melk-aderen , niet anders zijn , als Water-varen , die door 't Scheyl loopen , met dat onderscheyd , datse met eenige kleyne takjes haar begin nemen van de inwendige oppervlakte der Darmen , en daar open zijn , om de chijl te ontfangen , en met andere takjes uyt de vliezen zelf voortkomen , om de lympha weg te voeren , zo dat als'er geen chijl doorgaat , nogtans het water altijd daar door vloeyt.

De Melk-aderen dienen om 't beste deel der chijl uyt de Darmen te ontfangen , en gaande door 't Scheyl , na 't ² Chijl-zakjen te voeren.

Dit zakjen legt in honden , en ander volmaakte dieren , by de groote nederdalende Slag-ader , onder de linker ³ Uytmelkende ader , en Slag-ader , en van daar word het wat na de holligheyt der borst uytgebreyd f.

Chijl-
zakjen.

Dit Chijl-zakjen , met de Buys , die'er aan volgt , is , zo men zegt , eerst ontdekt door *Peket* , vermaard Genees-heer in 't jaar 1651. Andere meenen met groote reden , dat *Bartholomeus Eustachius* , een oud en zeer vermaard Ontleeder , die eerst gezien heeft , in 't jaar 1564. dewijl hy deze deelen op een verkeerde wyze heeft beschreven , dat is van boven , na beneden gaande.

Dit zakjen bestaat uyt een zeer dun vlies , en op dat het niet ligt zou beledigt worden , is het met 't inwendig vlies des ⁴ Pens-zaks bedekt ; van binnen heeft het twee , of drie Klap-vliezen , die beletten , dat 't vogt niet te rug zou keeren.

Zijn
groote.

Zijn uytgestrektheyt is verscheyden , na de grootte en gulzigheyt der dieren ; in dat der honden , die redelijk groot zijn , zou men wel een kleyne vinger konnen in brengen.

Zo veel tot nog toe bekend is , word in honden al de chijl door de tweede soort van Melk-aderen ee. gebracht in 't Chijl-zakjen f. waar in ook vele Water-vaten mm. die van de onderste Ledematen , als ook van de Lever , Maag , en andere deelen des Onder

² Mesenterium. ² Cisterna. ³ Vena Emulgens. ⁴ Peritonæum.
buyks

buys voortkomen , van 't water zig ontlasten , en beyde de vogten t' Tamen vermengt zijnde , vloeyen die vorders door de ¹ Borst-buys.

Deze Buys is vast aan het opperste deel van het Chijl- of Chijl-zakjen , en is van de zelve zelf-standingheyt , ze begint , daar 't zakjen enger word , en volgens de lengte der Borst loopende gg. eyndigtse in de Onder-sleutel-been-ader in den Mensch ; maar in honden , en andere dieren , die geen Sleutel-beenderen hebben , eyndigt deze Buys in de voorste ² Been-ader.

De Borst-buys , van 't Chijl-zakjen opklimmende , loopt in de linker zyde der borst , tusschen de verlobbeling van 't ³ Borst-vlies , nevens de groote nederdalende Slag-ader , welkers tusschen-ribbige takjes in honden , over vele der zelve , na de zyde van den Buys , dwersch henen loopen : ontrent het midden , wordse zomtijds verdeelt in twee kleynder buyskens , tusschen welke eenige takjes der voorgemelde Slag-ader gaan , en ontrent de lengte van twee Wervelbeenderen , vereenigen ze weder tot een Buys , welke afwykende van de groote Slag-ader , na de linker zyde , en schuyns opklimmende , plant zig met een enkelen tak , en zomtijds met twee , of drie takken , in 't agterste deel der linker Been-ader.

Den Heer van *Horne* heeft gezien dat een der twee takken , in de ⁴ Krop-ader ingeplant was. De Ontleder heeft opgemerkt dat de Borst-buys , in de regter Been-ader inging , 't gene de Heer *Verheyen* ook heeft daar genomen. *Bartholinus* zegt dat hy een tak aan de linker , en een anderen , in de regter Been ader , heeft gevonden ingaande.

Alwaar de inplanting dezer Buys in de voorgemelde Ader geschied , daar is een Klap-vlies , boven de opening , 't welk belet dat 't bloed van 't been komende , daar niet zou in loopen. Om dat te zien , pent de Ader in haar lengte ; en de band , zo'er van de vooren een geleyt was om de Chijl-wegen t' onderzoeken , op dat de Borst-buys , het Chijl-zakjen ,

¹ Ductus Thoracicus. ² Cruralis Anterior. ³ Pleura. ⁴ Vena angularis.

en de Melk-aderen zig klaar zouden vertoonen, los gemaakt hebbende, drukt dan de Buys, zo zultge de chijl, met 't water, door de opening in de Ader zien uytvloeyen; zo dat niet gelukt, neemt een spuyt met een bequaam pijpjen, en spuyt eenig vogt in de Borst-buys, en gy zult van de waarheyt hier van overtuigt wezen, en 't vogt in de Chijl-buys gespuyt zijnde, kan niet te rug keeren om de Klap-vliezen, die zulks beletten, welke in de Buys met tusschen-ruymten staan, en in de opgespanne Buys als met knoopjes zig vertoonen, en dienen, op dat de chijl, en 't water, niet weder zouden keeren.

Uyt het gene van de Chijl-wegen is gezegt, kan men klaar zien, dat de Chijl-buys met het Chijl-zakjen niet anders is, als een volherding der Melk-aderen, en Water-vaten, die van de onderste Lede-maten, en deelen des Buyks, met die van de Borst voortkomen, waar uyt blijkt, dat die wegen dienen om de chijl, en 't water, uyt deze deelen, naar 't bloed te brengen.

Manier
om de
Chijl-we-
gen te vin-
den.

En om dat de chijl niet gedurig door de Melk-aderen, ¹ Chijl-zakjen, en ² Borst-buys vloeye, en de loop der chijl na de dood haast ophoud, is dat onder andere redenen de voornaamste, dat die wegen zo lang onbekent zijn geweest. En zo iemand begeerig was om ze te zien, die neme een levenden mageren hond, die een uur daar na melk ete, of zo hy vaster voedsel heeft gebruykt, doe zulks na drie uren; bind hem op een tafel, en opent den buyk, zo zulge 't in ³ Darm-scheyl vele Melk-aderen, voornamelijk over ²t ⁴ Al-vlees na de groote Klier zien loopen, en wiltge eenige ontrent de groote Klier toe binden, zo zullen de Klap vliesjes, als knoopjes zig vertoonen, die zo vele niet zijn in de Melk-aderen, als in de Water-vaten. Dit gezien hebbende opent de Borst, en breekt de ribben dwersch, of aan de linker zyde, tot op vier dwersche vingeren breed van de Wervel-beenderen; en 't ⁵ Midden-rift aan de zelve zyde van

¹ Cisterna. ² Ductus Thoracicus. ³ Mesenterium. ⁴ Pancreas.
⁵ Diaphragma.

de valsche ribben afgescheyden hebbende , ontbloomt dan 't Chijl-zakjen van den ¹ Pens-zak , en de Borst- , of Chijl-buys van 't ² Borst-vlies , dan zultge die deelen vinden , gelijkse te vooren zijn beschreven : maar wiltge nog beter , opent eerst de Borst , en met een kromme naald , en draad , bind de ³ Borst-buys toe ontrent haar opperste deel , en gy zult de chijl en 't water beletten door te gaan , opent dan den Buyk , en die wegen zullen klaarlijk gezien worden.

Hier uyt blijkt , dat al de chijl door de Borst-buys gaat , om in 't bloed te komen , waar uyt volgt , zo die Buys gewond , of toegedrukt is , dat de dood noodzakelijk moet volgen.

Dat de Chijl-wegen , zo getoont , in honden worden gevonden , lijd geen tegenspraak ; maar de vraag is , of die wegen ook in den Mensch zijn ? zulks schijnt waar te wezen : want dewijl het noodzakelijk is in den Mensch , zo wel als in de beesten , dat de chijl na 't bloed gaat , zo moeten'er ook wegen daar toe wezen.

En de Melk-aderen hebben gezien *Bartholinus* , *Tulpius* , *Veslingius* , *Folius* , *Higmorus* , en *Verheyen* . *Dionis* verhaalt in zijn Anatomie pag. 184. dat hy die gevonden heeft te Parijs in een valschen Munter , niet lang na dat hy was gehangen.

Melk-ade-
ren gezien
in den
Mensch.

Indien de Melk-aderen in den Mensch gevonden worden volgens getuygenis van die vermaarde Mannen , zo moetenze ook in een , of meer Buyzen eyn- digen.

Of nu 't ⁴ Chijl-zakje , met de Borst- , of Chijl-buys , in den Mensch gevonden word , daar toe heeft men zo veel getuygen niet. *Bartholinus* spreekt van drie Lende-klieren , die hy voor 't Chijl-zakje houd ; maar hy is waarschiynlijk bedrogen , met Water-vaten voor takjes der Melk-aderen te nemen , die men in honden , dikwils uyt de Klieren des Buyks , ziet uyt komen , gelijk te zien is in de IX. Tafel , 1. Fig. EGH. want wat reden is'er , dat de gemeene ontfan-

¹ Peritonæum. ² Membrana pleura. ³ Ductus Thoracicus.

⁴ Cisterna.

ger in een hond, kat, en andere dieren een zekere ruymte zou hebben, gelijk een zakje, en'er in den Mensch geen merkelyke holligheyt zou wezen?

Chijl-
zakjen ge-
zien in
den
Mensch.

Men geloofst dat *Carolus le Noble*, en *Olaus Rudbek* het Chijl-zakje in den Mensch gezien hebben.

't Is evenwel waarschiynelyk, dat *Bartholinus* de Borst-buys in een Mensch gezien heeft, om dat hy zodanig een heeft afgebeeld, in welke de voorgemelde takjes geplant worden: want gelijk de lympha in beesten, van de onderste deelen, door de Borst-buys na de bovenste loopt, zo is het wel te denken, dat het ook zo in den Mensch is, en dus die Buys toont, waar door de lympha regt na 't bloed gaat; en hy toont ook dat de ¹ Borst-buys daar gevonden word, gelijkse in deze Tafel door de Figuur van *Bartholinus* wort aangewezen, waar by gevoegt is de inplanting der Borst-buys met drie verscheide takjes ccc. in de Onder-sleutel-been-ader b. volgens 't verhaal van den zelve Schrijver.

Borst-buys
gezien
in den
Mensch.

Dionis in zijn Anatomie pag. 145. zegt dat hy dikmaal in een dood Mensch met melk in de Borst-buys gespuyt heeft, en datse door de regter holligheyt van 't hert te vooren geopent, en van 't bloed gezuyvert, uyt quam; volgens welke getuygenissen blijkt, dat'er Chijl-wegen in den Mensch, zo wel als in de beesten, gevonden worden.

1 Ductus Thoracicus.

U Y T



U Y T L E G G I N G

der

F I G U R E N ,

van de

A G T S T E T A F E L.

Benevens eenige Klieren van 't Darm-
scheyl , worden hier vertoont de
Chijl-wegen , en de Water-vaten.

- De 1. Fig. vertoont eenige Klieren uyt een Menschen-darm-scheyl in haar natuurlyke groote.*
- A De grootste Klier van 't Darm-scheyl.
 - B Drie van de kleynste Kliertjes van malkanderen afgelegen, gelijke uytgebeeld staan.
 - De 2. Fig. vertoont de Chijl-wegen in een Hond.*
 - A 't Hart.
 - B De Holle ader.
 - C De nederdalende groote Slag-ader.
 - D De uytmelkende Slag-ader.
 - F De bovenste Darm-scheyl-slagader.
 - G De Darm-scheyl-ader.
 - H De groote Klier van 't Scheyl.
 - II Een gedeelte van 't Scheyl wijd uytgespannen.
 - KK De Darmen , die aan 't Scheyl vast zijn.
 - LL De Aderen en Slag - aderen van 't Scheyl , welke ontrent de Darmen als bogen maken.

- aa Dezelve Aderen en
Slag-aderen op een
hooger plaats.
- bb Zeer kleyne vaat-
jes in de rokken der
Darmen verspreyd.
- cc De Zenuwen, die
door 't Scheyl na de
Darmen loopen.
- dd De Melk-aderen
van de eerste foort,
die door 't Scheyl
loopen.
- ee De Melk-aderen
van het tweede foort,
die na 't Chijl-zakje
loopen.
- f Het Chijl-zakje.
- gg De Borst- of Chijl-
buys.
- h De verdeeling van
dezelve in twee
kleynder.
- i De band, waar me-
de de Chijl-buys ge-
bonden is.
- k De voorste Been-
ader geopent.
- l Het Klap-vlies, dat
voor de opening der
Chijl-buys geplaatst
is.
- mm De Water-vaten,
die van de Lever en
andere delen na 't
Chijl-zakje loopen.
- nn De Water-vaten,
die in de Chijl-buys
ingeplant zijn.
- oo De tusschen-ribbi-
ge Slag-aderkens.
- p De Water-vaten,
die van de onderste
Ledematen na 't Chijl-
zakje loopen.
- De 3. en 4. Fig. verbeelt
de verdeeling der Chijl-
buys, met eenige takjes
daar tusschen.*
- De 5. Fig. wijst deze
aan, zo als se in den
Mensch door Bartho-
linus afgebeeld is.*
- abb Drie Lende-klier-
ren.
- c De regter uytmel-
kende Slag-ader, naar
welke eenige takjes
van de Melk-aderen
geleyd worden.
- dd De Borst-buys.
- e De inplanting van
die in de linker on-
der Sleutel-been-ader.
- f De zelve Ader geo-
pent.
- g De Borst-klier, ge-
heten *Glandula Thy-*
mus. h

- | | | |
|----|--|--|
| h | De Krop-ader. | doorgefmeden, en aan |
| ii | De Klap-vliezen in
dezelve Ader. | beyde zyden omge-
flagen. |
| k | De Slok-darm. | rr De Nieren. |
| l | De groote nederda-
lende Slag-ader. | <i>De 6. Fig. vertoont drie
inplantingen der Borst-
of Chijl-buys in de On-
der-sleutel-been-ader.</i> |
| m | Het onderfte deel
der Holle ader, daar
ze zig verdeelt in twee
Heup-aderen. | A Het uytwendig
deksel omgeflagen. |
| n | De tronk der on-
derfte Holle ader. | b De linker Sleutel-
been-ader. |
| oo | De Ribben door-
gefmeden. | ccc Drie takken der
Chijl-buys, die zig
in de Onder-sleutel-
been-ader inplanten. |
| p | De Wervel-beende-
ren. | |
| qq | Het Midden - rift | |

Het Chijl-zakje dient om de chijl door de Melk-Gebruyl
aderen, en 't water door de Water-vaten, van de on- van 't
derfte deelen aangebragt t' ontfangen, en die twee Chijl-
vogten tot de 1 Borst, of Chijl-buys te voeren, zo zakjen
dat

De Chijl-buys is om de chijl, en 't water uyt het Gebruyl
2 Chijl-zakje, benevens 't water, dat van de deelen der Chijl-
der Borst, door de Water vaten, die zig ter zyden buys,
van die Buys inplanten, t'ontfangen, en die vogten in
de Ader te brengen, om met 't bloed vermengt te
worden.

En om dat de Water-vaten, die van de onderfte Lede-
maten, en van de deelen des Buyks voortkomen, het
grootste getal van het Lighaam uytmaken, en deze,
voor zo veel tot nog toe bekend is, in 't Chijl-
zakje eyndigen, zo is hier by gevoegt een byzondere
Tafel, waar in verscheyde Water-vaten, en der zel-
ver ingang in 't Chijl zakje vertoont worden.

IX. Tafel.


1. Figuur.


Men ziet dan vele Water-vaten, die van de onderste deelen naar 't Chijl-zakje D. gaan, in hun loop de Klieren FGHK. aan doen; waarschijnlijk om van daar, door andere takjes nieuw water, dat in die Klieren uyt het bloed afgescheyden word, te ontfangen, gelijk te vooren van den dienst der Klieren in 't Darm-scheyl ook gezegt is: hoewel 't kan gebeuren, dat die Klieren eygentlijk niet gemaakt zijn, om 't water af te scheyden; maar dat die af-kleynzing van 't water is gevoegt by de af-scheyding van 't vogt, het geen eygen aan dat deel is, gelijk in de Lever, daar de af-scheyding van 't water gevonden word by de af-scheyding der Galle.

2. Figuur.

In 't V. Hoofdstuk van de eerste Verhandeling is gezegt, dat de Water-vaten zijnde gebonden, zig met veel knoopjes vertoonen, welke Klap-vliezen in haar holligheyt zijn, die beletten, dat 't water niet te rug kan keeren: en om dit klaar te zien, zo neemt een Water-vat uyt de Lijf moeder van een Koey, waar in 't Kalf nog is; welk te vooren gebonden zijnde, men uytspreyd op een tafel, en ieder tak ab. ab. met een Sny-mesken dwerssch afgesneden hebben: de, zultge aanstonts de takjes bbb. leeg zien worden, en toevallen, terwijl de andere na den tronk aaa. opgevult blijven; en door 't geweld van 't drukken het water niet kan uytgeperst worden. De Klap-vliezen, die het te rug loopen van 't water beletten, worden in 't geopent vat bloot vertoont in de 4. Fig. a, a. van de volgende Tafel.

UYT.





U Y T L E G G I N G

der

F I G U R E N ,

van de

N E G E N D E T A F E L.

Waar in vertoont worden vele Water-
vaten , zo van een Hond, als van
een Koey.

De 1. Fig. vertoont de den Schrijver Holle
Water-vaten der Nie- klieren genaamt wor-
ren, die by na alle van den.
den Heere Nuk geno- HH De Heup-klie-
men zijn. ren.

A De Holle ader. II De Klieren van 't

BB De Nieren. dikke Darm-scheyl.

CC De uytmelkende K De heylige Klieren.

Aderen.

D Het Chijl-zakje. LL De Water-vaten,

E Het begin der Chijl- die van de voorge-
buys , die gebonden melde deelen, of Klie-
is, om den doorgang ren naar 't Chijl-zakje
van 't water te belet- gaan.

ten.

De 2. Fig. vertoont de
Water-vaten uyt de
Lijf-moeder van een
Koey , op verscheyde
plaatsen doorgesneden.

F Een Klier gelegen
tusschen de Nieren
en 't Chijl-zakje.

GG Klieren , die van aa De Water - vaten
op-

opgespannen tusschen de doorsnyding en den band, om dat het water door de Klap-vliezen niet zou uyt vloeyen.

bbb De takjes, welke leeg zijn, om datse doorgesneden zijn.

De 3. Fig. vertoont een groot Water-vat uyt de Lijf-moeder van een Koey, in zijn natuurlijke groote.

De 4. Fig. vertoont een

Water-vat, dat geopent is, op dat men zoude zien

Twee Klap-vliezen, die beletten, dat 't water na de uyteynden niet te rug kan keeren.

bb Twee deelen van een Water-vat.

cc Twee takken van een Water-vat, welke, om datse geopent zijn, leeg gezien worden.

HET XI. HOOFDSTUK.

Van de plaats, waar in de overige deelen des Buyks leggen.

Tafel.
Figuur.

DE Darmen, en 't 1^e Scheyl weg genomen zijnde, kan men de overige deelen des Buyks in haar plaats beter zien: want dan beschouwt men de Lever DD. de Maag E. de Milt H. de Blaas O. en de Nieren GG. welker regter met de Lever bedekt is, en de Pis-leyders hh. die van de Nieren, tot in de Blaas uytgestrekt zijn. Zomtijds ziet men ook de Gal-blaas a. buyten den ondersten boord der Lever uythangen, en onder den bodem der Maag ziet men een deel van 't 2^e Al-vlees b.

Het Vet ten deele weg genomen zijnde, bespeurt men de groote nederdalende Slag-ader c. en de onderste Holle ader d. van welke eerste de Zaad-slag-aderen voortkomen gg. en van de tweede, de Zaad-aderen

1 Mesenterium, 2 Pancreas,

ff

ff. welker linker van de linker ¹ Uytmelkende-ader spruyt. Men ziet ook, hoe ontrent 't Heylig-been de voorgemelde Slag-ader c. voor de Holle ader d. zig begeeft, zijnde tot hier toe geplaatst geweest aan de linker zyde. Men ziet mede, hoe die Ader en Slag-ader ontrent het Heylig-been in de Heup-takken l. l. verdeeld worden, die zig voorders naar de Dyen, Beenen, en Voeten verspreyden.

Maar dat zeer byzonder is, bestaat daar in, dat de Heup-aderen, en Slag-aderen, in de Dyen gaan, en de ² Pens-zak enkel is, gelijk in de Liefch, daar de Zaad-ader en Slag-ader na de ballekens gaan, en dat om die reden daar zomtijds doodelijke breuken ontstaan, waar van in 't IV. Hoofdstuk is gesproken. Zomtijds ziet men van buyten een merkelyk gefwel, en menigmaal ook niet, na dat 't inwendig vlees des Pens-zaks meer, of min uytgerekt, en de Darm na buyten is gekomen: en dewyl hier alle doorgang in de Darm belet word, zo is 't, dat de lyders met drek te braken sterven. De plaats, daar die breuken komen, is door een ingesteké priem m. aangewezen, en geschied zo wel in Mannen, als Vrouwen.

In een Vrouw vertoont zig de Lijf-moeder h. gelegen tusschen den Endel-darm g. en de Blaas p. aan de zyden van de Lijf-moeder ziet men de ballekens of Eyer-nesten ii. en de Trompetten van *Fallopins* mm. en meer andere deelen der Vrouwen.

a Vena Emulgens. 2 Peritonæum.

U Y T L E G G I N G

der


F I G U R E N ,


van de

T I E N D E T A F E L.

Het Net, de Darmen, en 't Scheyl weg
genomen zijnde, worden de onder
gelege deelen vertoont in haar
natuurelijke plaats.

- | | | |
|--------------------------------|----|-----------------------|
| <i>De 1. Fig. vertoont den</i> | K | Het bekken des |
| <i>Buyk van een Man,</i> | | Buyks. |
| <i>die geopent is.</i> | a | De Gal-blaas. |
| AB De uytwendige | b | Het Al-vlees. |
| deelen, welke omge- | c | De groote nederda- |
| slagen zijn. | | lende Slag-ader. |
| C Een deel van 't Mid- | d | De onderste Holle |
| den-rift. | | ader. |
| DD De Lever. | e | De linker uytmel- |
| E De Maag. | | kende Ader, leggen- |
| F Den Twaalf-vin- | | de de regter onder de |
| gerigen Darm. | | Lever. |
| GG De Nieren, wel- | ff | De Zaad-aderen. |
| ker regter met de Le- | gg | De Zaad-slag-ade- |
| ver bedekt is. | | ren. |
| H De Milt. | hh | De Pis-leyders. |
| II De Heupen. | i | De Lende-klieren |





in 't agterſte deel tuſſchen de Ader en Slag-ader.

gende Vaten.

De 2. Fig. vertoont een Vrouw-buik geopent.

k De onderſte Scheylſlag-ader, die afgeſneden is.

AB De uytwendige deelen omgeſlagen.

ll De Heup- en Slag-aderen.

C De onderſte Holle ader boven de Nieren.

m Een Priem geſteken, daar de Breuken komen.

D De groote nederdalende Slag-ader.

n Den Endel-darm afgeſneden.

EF De Vaten onder de Nieren, daar de Slag-ader zig voor de Ader begeeft.

o De Blaas opgeſpannen.

GG De Nieren.

p De Roede na boven omgeſlagen.

HH De Heupen.

q Den buytenſten boord van 't Zakje.

I Het bekken des Buiks.

r Het Midden-ſchot van 't Zakje.

aa De uytmelkende Vaten.

ft De opſchortende Spier.

bb De Piſ-leyders afgeſneden.

f Den ronden Rok van 't balleken, die door de uytbreyding der voorgemelde Spier gemaakt word.

cc De Zaad-aderen.

t Het begin van die Spier.

dd De Zaad-ſlag-aderen.

vv De Zaad-aderen, en Slag-aderen met Vliezen omwonden.

e De onderſte Scheylſlag-ader afgeſneden.

uu De Zaad-aanbren-

ff De Heup- en Slag-aderen.

g Den Endel-darm afgeſneden.

h De Lijf-moeder.

ii De Ballekens, of

G Eyer.

Eyer-nesten.
kk De Zaad-aderen
en Slag-aderen.

ll Haar takken, die
regt na de Lijf-moe-
der loopen.

mm De Trompetten
van *Fallopins*.

nn De ronde banden
der Lijf-moeder.

oo De breede banden
der Lijf-moeder.

p De Blaas na bene-
den gedrukt.

q De Schaam-beende-
ren niet geheel ont-
dekt.

In die twee Figuren
schijnen de Schaam-
beenderen te verre af-
gelegen te wezen van
de Nieren; om datse
meer na vooren toe zou-
den moeten geplaatst
worden, dat op een
vlak niet wel kan ge-
schieden.

De twee volgende
Figuren zijn hier ge-
stelt, om dat op de eyge
plaats geen ruymte ge-
noeg was.

*De 3. Fig. vertoont het
Midden-schot van 't*

*Zakje, dat uytgebreyd
is, waar in de Bloed-
vaten klaar gezien
worden.*

a De Bloed-schamel-
vaten, die door 't
Midden-schot van 't
Zakje loopen.

b Andere Onder-buyks
Vaten.

*De 4. Fig. vertoont de
Blaas met de Manne-
lijke Pis-schagt, van
vooren te zien.*

A Den grond der
Blaas.

B Het agterste inwen-
dige deel der Blaas.

CC De Vezelen der
Blaas, die schuynsin
de Pis-schagt neder-
dalen.

DD De voorstaande
Klieren.

EE De Spieren, die
de roede opregten.

FF De Zenuw-spon-
gieuze Lighamen ter
zyden gelegd, op
dat men aan de Pis-
schagt zou kunnen
komen.

G De Pis-schagt geo-
pent.

- aa Priemkens in de d De Sluyt-spier der
Pis-leyders gestcken. Blaas.
bb De Pis-leyders af- e Het Hanen-hoofd.
gesneden. f De opening in de
cc De openingen der Pis-schagt by 't hoofd
Pis-leyders in de der Roede.
Blaas , alwaar de g Een Priemken in de
Priemkens uytko- zelve opening.
men.

HET XII. HOOFDSTUK.

Van 't Al-vlees of Pancreas.

Het ¹ Al-vlees in 't Grieks Pancreas, is een ze- ^{XI. Tafel.}
ker deel, bestaande uyt vele vaste, en op een ^{1. Figuur.}
getalte Kliertjes, waar van ieder zijn vlies heeft, en ^{Alvlees}
die te samen in een gemeen vlies besloten zijn ^{wat is.} cc. dat
van den ² Pens-zak komt, en waar door 't in zijn
plaats vast gehouden word.

't Zelve is bleek-rood van kouleur, en gelegen on- ^{Kouleur}
trent 't eerste Lende-wervel-been, onder den bodem
der Maag.

't Is met zijn breedste, en dikste deel byzonder vast
aan den Twaalf-vingerigen Darm, van waar 't uyt
gestrekt is na de Milt; maar het raakt tot aan de zel-
ve nier.

Van gedaante is 't by na gelijk een Hondstong, ^{Gedaante}
maar wat langer: want zomtijds is 't wel agt, ne-
gen, of tien dwersche vingeren lang, twee en een ^{Groote}
half breed, en ontrent een vinger dik, en weegt vier,
of vijf oncen.

Het Alvlees heeft Slag-aderen, van den regter, ^{Slag aderen.}
en linker tak der ³ Buyk-slag-ader.

Aderen ontfangt het van de ⁴ Poort-ader, en voor- ^{Aderen}
namelijk van den linker tak, die in een groef van 't

1 Pancreas. 2 Peritonaeum. 3 Caliac. 4 Vena porta.

Alvlees, na de Milt uytgestrekt leggende, geeft zehier, en daar aan 't zelve eenige takjes, en ontfangt ontrent den Darm eenige takjes van den tronk der Poort-ader.

Zenuwen. Het krijgt Zenuwen van de Zenuw-vlegting des Levers, gelegen onder de zelve, en die gemaakt is van de takjes der tusschen-ribbige Zenuw.

Water-vaten. 't Is ook wel te denken dat 't Alvlees Water-vaten heeft, waar van eenige der zelve takjes zijn van de Melk-aderen, die over 't Alvlees loopen, en hun water onder de chijl vermengen, op de manier, gelijk te vooren in 't X. Hoofdstuk van de Water-vaten der dunne Darmen gezegt is.

Alvlees-buys. Daar is in 't Alvlees een byzondere buys, die door zijn gehele lengte uytgestrekt, en eerst ontdekt is door *Wirfungus* in 't jaar 1642.

Dikte van de zelve. Ontrent den Darm B. isse dikker als een Henschagt; maar van daar naar 't ander eynde van 't Alvlees gaande, wordse allengkens dunder. Deze buys heeft zeer veel zyde-takjes, die zig door 't Alvlees verspreyden, welke in 't begin grooter zijn, en hoe ze meer aan 't eynde naderen, allengskens minder en minder worden.

Implanting der Buyze. Deze buys is in den Twaalf-vingerigen Darm ingeplant, vier, of vijf dwersche vingeren breed, onder de Portier, of Pylorus, meermaals met haar opening F. in die van de Gal-buys E. van welke in 't XIV. Hoofdstuk zal gesproken worden; maar in honden en andere dieren is die opening ten minsten twee dwersche vingeren breed, laager als die van de Gal-buys.

Tomtijds dubbel. *Regnerus de Graaf* zegt deze buys in den Mensch dubbel gevonden te hebben.

Gebruyk. Het Alvlees dient om een zeker vogt, in zijn Kliertjes van 't bloed af te scheiden, dat door middel van zijn buys en zyde-takjes in den Darm gebragt word.

z. Pancreas.

H E T

HET XIII. HOOFDSTUK.

Van de Milt.

DE Milt is een zagt, spongieus deel, rood, ^{XI. Tafel.}
 en zomtijds loodverwig van kouleur, gelegen ^{1. Figuur.}
 in de linker ¹ Zyde van den Boven-buyk, eenigfints ^{Milt wat}
 na agteren tusschen de Maag, en valsche Ribben ^{G. Plaats.}
 Zie de X. Tafel, 1. Fig. H.

Natuurlijk is'er maar een Milt; maar verscheyde
 Schrijvers zeggen, dat'er zomtijds twee, ja drie Mil- ^{Twee of}
 ten in een Lighaam zijn gevonden. ^{drie Mil-}
 ten.

De Milt gelijkt niet qualijk na een Mensche-tong: ^{Gedaante,}
 aan de zyde na de valsche ribben is ze bultig; maar
 de andere zyde na de Maag is uytgeholt, alwaar de
 vaten ingaan.

De groote in Menschen van gelijke gestalte ver- ^{Groote}
 scheelt, gemeenlijk is ze ontrent zes dwersche vingeren
 lang, drie breed, en een dik.

Met haar bultige zyde is ze vast aan 't ² Midden-rift, ^{Vast-heg-}
 met de uytgeholde aan 't Net, en van onderen aan ^{ting.}
 het vlies der linker Nier.

De Milt heeft twee Vliezen, waar van 't buytenste
 komt van den ³ Pens-zak, zijnde los aan 't binnenste ^{Buytenste}
 van den zelfden; door de takjes der vaatjes, die'er ^{Vlies.}
 door loopen, is ze vast; en afgescheyden zijnde, ziet
 men in 't inwendig Vlies veel zwarte stippen, die
 tekenen zijn van de gebroke vaatjes, zo dat als men
 blaast in de Ader, of Slag-ader der Milt, 'er de in-
 geblaze lugt om die reden uyt vliegt, dat niet ge-
 schied, alse met het buytenste Vlies bekleed is.

Het binnenste Vlies bestaat uyt door een gevlogte ^{Binnenste.}
 Vezelen, welke wonderlijk om te zien zijn, van wel-
 kers eene zyde, zeer veel Vezelen komen, en die
 dwersch na de tegen overige zyde lopen. Deze Ve-
 zelen zijn uyt andere kleynder te samen gestelt, en
 schijnen Spieragtig te wezen, dewijl 't binnenste Vlies,

1 Hypochondrium. 2 Diaphragma. 3 Peritonæum.

waar in ze eyndigen, zo pezig is, dat het meermaals kraak-beenig, of beenig word.

Cellekens
van de
Milt.

Ook bestaat 't inwendig gestel der Milt uyt ontelbare vliezige blaaskens, of cellekens, die leggen tusschen den tronk, en takken der Aderen, en hebben alle gemeenschap met malkanderen; zo dat, als men in de Ader blaast, de Milt uytgezet word, even gelijk de Long. Deze cellekens ontlasten zig van 't bloed, datse door de Slag-aderen ontfangen, niet alleen in de takken, maar ook in den tronk van de Ader; en zijn vast aan de Vezelen, die dwerssch van d' een zyde der Milt, na de tegenoverige loopen; en 't is zeer waarschijnlijk, dat die kleyne witte stippen, die men in de kleyne cellekens ziet, pezen van de Vezelen, en geen kliertjes zijn, gelijk *Malpigi* gedagt heeft. Alle die kleyne cellekens worden gemaakt van 't inwendig vlies der Milt. Als een opgeblaze Milt gedroogt is, vertoontse zig van binnen als een honigraat D. Zie de XI. Tafel, 2. Fig.

Aderen en
slag aderen
der
Milt.

De Milt heeft Slag-aderen van den linker tak der ¹ Buyk-slag-ader, welkers voornaamste takjes door de zelfstandigheyt der zelve zig verspreyden. De Aderen komen van den linker tak der ² Poort-ader H, 1. Fig. die zig voor 't grootste deel in de Milt verdelzen. De voorgemelde vaten worden gemeenlijk de Milt-ader, en Slag-ader genaamt.

Zenuwen.

De Zenuwen der Milt komen van een vlegting, gelegen aan de linker zyde, onder den bodem der Maag, die *Willis* de Milt-vlegting noemt; welke van deze vlegting naar de Milt gaan, verzellen eerst den grootsten tak der Slag-ader, en dan verscheyde van zijn takjes, en wikkelen die als in een Net.

Water-vaten.

De Milt heeft volgens haar groote zo veel Water-vaten, als eenig ander deel van 't Lighaam B. 2. Fig. die op 't buytenste vlies gezien worden.

Gebruik.

Wat de dienst der Milt aangaat, is zeer twijfelagtig. Eenige meenen dat het bloed door de Slag-aderen in de vliezige cellekens van de Milt gedreven zijnde, de zelve uytzet, t' samen met de vliezige Ve-

¹ Celiaca. ² Vena porta.

zelen, dieze omringen, welke zig dan t' faamtrek-
kende, het bloed zouden verdunnen, waar door 't
bequamer zou wezen, om de Galle in de Lever te
doen af-scheyden. Dog dit 's een giffing gelijk alle
de andere, die men tot nu van 't gebruyk der Milt ge-
zeft heeft.

Dat de Milt in honden kan uytgefne-
den worden, en zy lang in 't leven blyven, is een bekende zaak;
maar dat zou in den Menfch zo wel niet gelukken.

Als de Milt gequetft is, vloeyt'er een grof, en
zwart bloed uyt de wonde; de lyder is dorftig, heeft
pijn in de linker zyde; het bloed in den Buyk uytftor-
tende, bederft dikwils; waar uyt veele quade toeval-
len, en de dood volgt.

De Milt word zomtijds zodanig uytgezet, datfe zig
uytftrekt tot de Liefch; gelijk *Hildanus* in een van
zijn aanmerkingen getuygt gezien te hebben.

Mijn Heer *Littre*, Lid van de Koninglijke Acade-
mie der Wetenfchappen te Parijs, heeft in de verga-
dering getoont de Milt van een Man festig jaren oud,
die verfteent was; als ook een deel van 't vlies van
een ander Milt, dat beenagtig was.

HET XIV. HOOFDSTUK.

Van de Lever, Gal-blaas, en Gal-buizen.

DE Lever is een zeer groot klierig ingewand, XI. Tafel.
gelegen onmiddelyk onder 't ¹ Midden-rift, in ³. en ⁴.
de regter ² Zyde van den Boven-buyk, zig uytftrek-
kende over 't regter deel der Maag, tot voor by 't ^{Fig.} Wat de
Lever is.
³ spitswyze Kraak-been, allengskens dunder wor-
dende, op datfe de uytzetting der Maag niet zou be-
letten. Zie ³. en ⁴. Fig. ^{Plaats.}

De gedaante der Lever is by na rond; van vooren, ^{Gedaante.}
en boven na 't Midden-rift, is ze bultig, zie ³. Fig.
maar agter na de zyde van de Maag, is ze holagtig,

¹ Diaphragma. ² Hypochondrium. ³ Cartilago eniformis.

XI. Taf.
3. en 4.
Figuur.

zie 4. Fig. en eyndigt onder met een dunnen en onef-
fen boord.

Hollighe-
den.

De bultige oppervlakte is effen, en glad; maar 't
kolagtig gedeelte der Lever is ongelijk, en behalven
de groote spleet, daar de Navel-band L. inloopt,
zijn'er holligheden, waar van de grootste 't regter
deel der Maag, met de ¹ Portier, en 't begin des
Twaalf-vingerigen-darms ontfangt: de tweede is on-
trent den ondersten boord, waar in de Gal-blaas legt
D. en de derde is in 't bovenste deel, tot doorgang van
de holle Ader H.

Groote
van de
Lever.

De Lever is in alle Menschen niet even groot. In
ongebore en nieuwgebore Kinderen, beslaatse niet al-
leen beyde de ² Zyden van de Boven-buyken; maar
het grootste deel des Buyks, ende waft niet aan na
mate van de andere deelen.

XI. Tafel.
4. Figuur.

De Lever heeft een dun vlies, komende van den 3
Pens-zak, en is verdeelt in verscheide loben; de
grootste A. is op de regter, en een kleynder B. op de
linker zyde: deze loben zijn gescheiden door een
spleet, waar door de Navel-ader L. ingaat; een
kleynder lobeken C. kan gestelt worden aan den bo-
vensten omtrek der Lever, in een holligheyt nevens
den tronk van de holle Ader, waar onder de Poort-
ader legt; van onderen ontrent de Gal-blaas is nog een
kleynder,

Vastheg-
ting, en
banden
der Lever.

4. Figuur.

De Lever is aan 't 4 Midden-rift vast door ver-
scheide banden, en voor eerst van boven door een
breeden, sterken, en vliezigen band, die de Lever
ophoud: deze diep in de Lever gaande regt tegen
over de groote spleet, C. is vast aan een vliezige
scheede, die de Poort-ader, en de Gal-buys der Lever
omvangt: de tweede band is breed en sterk, komende
van den Pens-zak, en hegt de Lever vast aan 't 5
zweertwyze Kraak-been: de zelve word ook vast
gehegt aan den Navel door een ronden band, L. die
in de ongeboore, en nieuwgebore Kinderen de Navel-

4. Figuur.

¹ Pylorus. ² Hypochondria. ³ Peritonæum. ⁴ Diaphragma.
⁵ Costilago ensiformis.

ader

ader is; en de Navel-ftreng afgebonden zijnde, is die van geen gebruyk meer, en groeyt allengskens toe. Deze band gaat in de Lever door de groote spleet, waar van te vooren is gefproken.

Dewijl de Lever vast aan 't Midden-rift is gehegt, ^{De Lever} zo moetse noodzakelijk deffelfs beweging volgen, zo volgt het dat als 't Midden-rift in de inademing nederdaalt, ^{Midden-} dan de Lever ook na onder wijkt: wanneer het in de ^{ademing,} uytademing opgaat, volgt de Lever mede.

Natuurlijk is de Lever rood van kouleur; maar dat ^{Kouleur,} komt van het bloed, dat'er gedurig door loopt: want als men in de Poort-ader met warm water fpuyt, zal al het bloed uyt de Lever gaan, en ze gantsch wit worden.

De Ouden meenen dat de zelfftandigheyt der Lever een gestolt bloed was ontrent de vaten: maar *Malpi-* ^{Zelfftan-} *gius* toont dat de Lever, behalven de vaten, niet als ^{digheyt} een oneyndig getal van kleyne Kliertjes is, die druyf- ^{der Lever} wijs aan de uyteynden der alderfijnste takjes hangende, ^{is klierig,} verfcheyde lobekens maken, die met hun eygen Vlies bekleed, in 't buytenfte of gemeene Vlies der Lever eyndigen, en daar mede omwonden worden; zo dat de Lever van de hedendaagsche Ontleeders, onder de op een getaste Klieren word gestelt.

De Lever heeft zeer veele vaten, als Aderen, ^{Vaten des} Slag-aderen, Zenuwen, Water-vaten, en eygen uyt- ^{Lever.} loozende Vaten, waar by zommige de Gal-blaas ftellen.

Aderen heeftse van de holle Ader, en de Poort- ^{Aderen} ader; de eerfte door 't Midden-rift gekomen zijnde, ^{van de} brengt een zeer grooten tak voort, die in 't opperfte ^{holle en} deel der Lever H. 4. Fig. en 3. Fig. D. door een hol- ^{Poort-} ader. ligheyt, maar niet diep in gaande, zig in drie, en zomtjids in vier ander takken verdeelt, welke vorders in oneyndige kleyne takjes door de Lever zig verspreyden.

De Poort-ader, gelijk in 't vierde Hoofdstuk van ^{De Poort-} de eerfte Verhandeling is gezegt, begint met oneyn- ^{ader.} dige kleyne takjes, uyt verfcheyde deelen des Buyks; en ontrent de Lever tot een tronk geworden zijnde,

II. Tafel. I. gaatse zig door de zelve verspreyden, welker tak-
 4. Figuur. jes allengskens zo fijn worden, datse eyndelijk in
 Kliertjes veranderen. De Gal-buyzen zijn zo met de
 Poort-ader verzeld, datse om malkander te helpen,
 in een gemeen Vlies besloten zijn.

Daar nu in de Lever ieder takjen van de Poort-ader
 in een Kliertjen verandert, daar vereenigt zig een
 Galbuys-takjen, om de Gal, die uyt het bloed in een
 Kliertjen gebragt word, te ontfangen, en buyten de
 Lever te voeren: het overige bloed, dat door dit
 Kliertjen niet kan loopen, word van de takjes der
 holle Ader over genomen, en weder uyt de Lever, na
 't herte gebragt.

En dewijl de takjes der Poort-ader, van onderen
 opwaarts, en na alle zyden, en die van de holle Ader
 meest schuyns nederwaarts loopen, zo is 't, datse mal-
 kander dikwils doorkruyssen, en verzellen; zodanig
 datse op veele plaatsfen met malkander vereenigen,
 waar door 't bloed gemakkelijk uyt de takken der
 Poort-ader, in die der holle Ader kan overgaan.

Vereening
 der takjes
 van beyde
 de Ade-
 ren.

Wat de
 Gal-blaas
 is.

Laat ons nu de Gal-blaas beschouwen, die op de
 regter zyde in 't holle gedeelte der Lever, in een
 holligheyt onder de groote lobé aan 't onderste der
 zelve legt, daar ze gemeenlijk een weynig uythangt
 4. Fig. D. en 3. Fig. E.

Gedaante.

Ze is als een kleyne Peer, van onderen rondagtig
 en breed; na boven gaande, wordse enger, en eyn-
 digt in een lange pijp. E. 4. Fig.

Vastheg-
 ging aan
 de Lever.

5. Figuur.

Aan de Lever wordse vast gehegt door de vaten,
 en voornamelijk door twee Vliezen; een uytwendige
 met 't gemeene Vlies komende van den Pens-zak A.
 en een inwendige gaande na de Lever, dat van de
 scheede komt, die de takken der Poort-ader, en
 Galbuyzen in zig besluyt.

Eygen
 sokken
 der Gal-
 blaas.
 Eerste.

Behalven die Vliezen, bestaat de Gal-blaas uyt drie
 eygene rokken, die in zelfstandigheyt, plaats en
 maakfel zeer verschillen. De eerste en buytenste eyge
 rok, die onmiddelijk onder de gemeene A. geplaatst
 is, bestaat uyt witte door een gevlogte Vezelkens,
 die met vele Zenuwen, en Bloed-vaten B. doorweven
 zijn,

zijn, en van den hals na den grond loopen; in vette Menschen, is hy met vet bezet.

De tweede eyge rok is Spieragtig, en bestaat uyt Tweederley loop van vleezige draden, waar van eenige inwendig, en andere uytwendig leggen: de inwendige C. loopen een weynig ongeschikt volgens de lengte der Gal-blaas, en de uytwendige D. loopen ringwys, en ongeschikt, gelijk de voorgaande. Deze rok trekt de Gal-blaas toe, en drijft de Gal uyt.

De binnenste of derde rok is Zenuwagtig, van Derde binnen gerimpelt, en met veel cellekens verzien, gelijk in de honigraat blijkt E. deze rok geprikkelt zijnde, zo vloeyen de geesten in den Vleezigen rok, tot verrigting van de toetrekking.

Tegen de scherpheyt der Gal, word die rok van binnen bekleed met een slymige korst, waar in *Mal-pigius* veel Kliertjes bemerkt, dienende mogelijk tot af-kleynzing van 't water. Slymige korst.

De Gal-blaas heeft Aderen, Slag-aderen, Zenuwen, Water-vaten, en Gal-buyzen; de drie eerste komen van de vaten der Lever, en voornamelijk de Aderen van de Poort-ader, welke twee zijnde, de tweelingen der Gal-blaas genaamt worden: de Water-vaten ontlasten zig in 't Chijszakje. Vaten der Gal-blaas.

Hildanus heeft een steen gevonden in de Gal-blaas zo groot als een Okker-noot.

In een gestorve Waterzugtige Dogter heeft *Wierus* twee wormen in de Gal-blaas gevonden.

Job van Meekeren, een der vermaartste Heelmeesters te Amsterdam, verhaalt een aanmerking van een gestorste Gal-blaas, en een ingeschokte Gal-blaas-pijp in een kind van zes jaren, 't welk zonder twyfel door een verstopping dezer Gal-pijp geschied is: want de persing der Gal heeft de blaas allengskens doen rekken, en de pijp door de verstopping doen verwyden, waar door ligtelijk het ruymste deel over het engste is geschoten.

De Gal-buyzen, die eygen zijn aan de Gal-blaas, zijn tweederley: want eenige brengen de Gal in de Gal-buyzen der Gal-blaas.

† Cisterna.

zel-

zelve, en andere dienen om ze weg te voeren. De eerste komen waarschijnlijk ten deele onmiddelijk van de Lever voort, en ten deele door middel van de 1 Galbuys der Lever. Eene, die de zichtbaarste is, komt agter in de Gal-blaas ontrent den hals, en verspreyd zig met vele takjes m. in des Levers zelfstandigheyt, de andere zijn vele minder, en gelijk Vezelen; maar in Ossen zijn ze met hun opening in de Gal-blaas zeer zichtbaar. Zie de 6. Fig. XI. Tafel.

Hoe veel
Gal-buys-
zen 'er
zijn.
XI. Tafel.
4. Figuur.

Behalven de nu beschrevene Gal-buysen, zijn'er nog drie andere, de Gal-buys der Lever F. der 2 Gal-blaas E. en de gemeene 3 Gal-buys G. De eerste komt voort met ontelbare kleyne takjes uyt de zelfstandigheyt en lobekens der Lever, en zig met de tweede vereenigende, brengen de gemeene, of derde voort, die dan nederwaarts loopende, boort ze door het buytenste Darm-vlies, ontrent vier, of vijf vingeren, onder de 4 Portier, en verder schuyns ontrent een duym breed tusschen de Vliezen loopende, opent ze zig in den twaalfvingerigen Darm, met de zelve opening der 5 Al-vlees-buys; deze opening is altijd toegestopt en veel enger als de Buys zelf.

Gemeene
Scheede.
XI. Tafel.
7. Figuur.

De Gal-buys der Lever, en de 6 Poort-ader, hebben door de Lever een gemeen Vlies, als in een scheede besloten d. d. zo dat de tronk van de een, met die van de andere, en de groote tak met de groote, en de kleyne met de kleyne, in de zelve scheede besloten zijnde, in 't eerste aanzien maar een eenzaam vat schijnen te wezen; maar dit nauwkeuriger onderzoekende, zal men bevinden, dat de Gal-buys C. van de Lever, dunder zijnde als de Ader, uytsteekt, en van de zelve door een geel kouleur onderscheyden word.

Slag-ade-
ren der
Lever.

De Slag-aderen der Lever komen van de regter Maag-Slag-ader K. maar zijn zeer weynig in opsigt van de groote der Lever: en zegt *Glissonius* datse zig in de zelfstandigheyt der Lever niet verspreyden, maar

1 Ductus hepaticus. 2 Cisticus. 3 Communis. 4 Pylorus
5 Ductus Pancreaticus. 6 Vena porta.

al-

alleen in de vaten, en gemeene scheede, en hy meent dat de ¹ Poort-ader in de Lever, den dienst doet van een Slag-ader, om datse dikker is als een gemeene Ader, en zeer na by aan de volmaaktheyt komt van een Slag-ader.

Zenuwen heeft de Lever van de bovenste Zenuw-^{De Zenuw-}vlegting des Buyks, die uyt de takjes der tusschen-^{wen.}ribbige Zenuw gemaakt zijnde, *Willis* de Lever-zenuw-vlegting noemt, uyt welke vele takjes O. door de Lever verspreyd worden, doende aldaar den dienst, ^{XI. Tafel} waar van in 't zevende Hoofdstuk, van d' eerste Ver-^{4. Figuur}handeling, rakende de Klieren is gezegt.

De Water-vaten worden in de Lever van een Mensch als ook in de andere deelen beswaarlijk gevonden, om reden, die in 't V. Hoofdstuk in d' eerste Verhandeling is gezegt. Die in de 4. Fig. nn. XI. Taf. afgebeeld zijn, is om den Lezer te toonen, hoe ze in beesten gevonden worden.

De dienst der Lever is, datse door haar Kliertjes, ^{Gebruyk} de Gal van 't bloed, dat door de Poort-ader gebragt ^{der Lever.} word, af-scheyd, waar van een deel door de Gal-buyzen, die van de Lever na de Gal-blaas loopen, in de Gal-blaas gaat, 't welk met 't andere deel, dat door de Gal-buyts der Lever af-komt, t' samen door middel der Gal-blaas-buyts, en de gemeene, in den twaalfvingerigen Darm gestort word; daar ze benevens 't ² Al-vlees-zap, by de chijl zig vermengende, diend, om dien allengskens te volmaken.

't Is aanmerkens waardig, dat in de Kliertjes der Lever, de Gal van 't bloed word afgescheyden, 't welk door de Poort-ader word gebragt, en dat in de andere deelen, door eenig vogt word afgescheyden, 't zelve niet van 't bloed, 't welk door de Aderen; maar door de Slag-aderen tot de deelen komt: want schoon de Klieren der Maag, Darmen, en Al-vlees ook takken der Poort-ader hebben, brengen ze nogtans niets naar de voorgemelde Klieren; maar voeren 't bloed, datse uyt de Slag-aderen ontfangen, op een geheel andere wyze, als in de Lever, naar

1 Vena porta, 2 Sucus pancreaticus.

den

den tronk der Poort-ader , daar alle de takken der Poort-ader 't bloed , datse van den tronk ontfangen , naar de Kliertjes der Lever voeren. En dat is de reden , waarom in de voorgemelde deelen , de Slag-aderen zo veel zijn met de Aderen , en in de Lever veel te kort komen.


Uyt een ontsteking , die tot sweering is gekomen aan 't opperste , en bultige deel der Lever , daar ze aan 't ¹ Midden-rift vast is , breekt de etter zomtijds door , en uytstortende , maakt een ² *Etter-borst*. Ook is 't wel gebeurt , dat op die plaats , 't onderste deel der Long , aan 't Midden-rift vast zijnde , de etter die deelen doorknaagt hebbende , door den lyder daggelijks al hoeftende , wierd uytgespogen.

Wanneer de Lever gequetst is , vloeyt'er veel bloed uyt de wonde , de lyder voelt een stekende pijn , die zig uytstrekt tot 't zweertwyze Kraak-been : zomtijds braakt hy niet als enkel Gal , en voelt zig beter , leggende op den Buyk , als andersints ; 't bloed in den Buyk uytstortende , bederft , en veroorzaakt veele quade toevallen , ja meest altijd de dood.

Hildanus heeft een aanmerking van iemand , aan wien een stukje van de Lever , door een wonde uytgetrokken , en genezen is.

In die van Hoofd-wonden sterven , vind men dikwils een *Etter-geswel* in de Lever , of in 't Darm-scheyl.

¹ Diaphragma. ² Empyema.



U Y T L E G G I N G

der

F I G U R E N ,

van de

ELFSTE TAFEL.

Waar in ver- toont worden, 't Al-vlees,
de Milt, Lever, en Gal-blaas met
haar Rokken, Vaten &c.

- | | |
|--|--|
| <p><i>De 1. Fig. ver- toont het</i>
<i>Al-vlees, of Pancreas</i>
<i>en de Milt.</i></p> <p>A Een deel der Maag
opwaarts geleg-
B Een deel des twaalf-
vingerigen Darms,
onder geopent.
C 't Al-vlees boven
wat weg genomen.
D De Al-vlees-buys.
E De Gal-buys.
F De inplanting van
beyde Buyzen.
G De Milt.
H De Milt-, en Slag-
ader.</p> | <p><i>De 2. Fig. ver- toont een</i>
<i>Kalfs-milt.</i></p> <p>A De Bloed-vaten.
B De Water - vaten
boven den band op-
geswollen.
C De Vliezen der
Milt afgescheyden.
D De spongieuze zelf-
standigheyt der Milt.</p> <p><i>De 3. Fig. ver- toont de</i>
<i>bultige oppervlakte der</i>
<i>Lever.</i></p> <p>A Het regter deel der
Lever.
B Het linker.
C Den opschortenden
band, D</p> |
|--|--|

D De holle Ader.
E Den bodem der Gal-
blaas.

*De 2. Fig. vertoont 't
holle gedeelte der Lever.*

A Het regter deel der
Lever.

B Het linker.

C Een kleyn Lobe-
ken.

D De Gal-blaas.

E De Gal-buys.

F De Lever-Gal-buys.

G De gemeene Gal-
buys.

H De holle Ader.

I De Poort-ader.

K De Lever Slag-ader
na de regter zyde om-
geflagen.

L De Navel-ader.

m De Lever Gal-
blaas-buys.

nn Water - vaten der
Lever.

o Zenuwen der Le-
ver.

*De 5. Fig. vertoont de
rokken der Gal-blaas.*

A Den Vliezigen of
gemeenen Rok.

B Den Vaatigen Rok.

CD Den Spierigen
Rok.

C De uytwendige rye
der Vezelen.

D De inwendige op-
pervlakte des Zenuw-
agtigen Rok.

*De 6. Fig. vertoont de
Lever Gal-blaas-
buyzen.*

A De geopende Gal-
blaas.

B De Lever Gal-buys
geopent.

C Den grooten tak
ook geopent.

DD Des Levers Gal-
blaas-buysen.

cc Hun mondekens in
de Lever-Gal-buys.

1.2.3 Hun inplanting
in de Gal-blaas.

*De 7. Fig. vertoont de
gemeene Scheede van
Glissonius.*

A De Poort-ader.

aa Haar takken.

B De Gal-blaas.

C De Lever-Gal-
buys.

cc Haar takken.

dd De gemeene Schee-
de of 't Vlies, dat de
takken der Poort-
ader, en Lever-Gal-
buys omvangt, afge-
scheyden. HET

HET XV. HOOFDSTUK.

Van de Nieren, en Pis-leyders.

DE Nieren zijn zekere roodverwige deelen, veel vaster van zelfstandigheyt, als de Lever, en Milt, en zijn twee A. B.

XII. Tafel.
1. Figuur.
Wat de
Nieren
zijn.

In deze figuur worden ze afgebeeld, benevens de Blaas, Pis-leyders, en Mannelijke teel-deelen, uyt 't lighaam genomen; maar ze worden vertoont in hun natuurlijke plaats in de X. Tafel, de 1. Fig. G. G.

In twee aan een gebore kinderen, die ik over eenige jaren ontleed heb, had 't een maar een Nier aan de linker zyde, die ontrent eens zo groot was, als beyde de andere; de Pis-leyder was ook grooter, als een van de andere, en quam uyt ontrent 't opperste deel der Nier, loopende over de zelve tegen de natuurlijke order na de Blaas, die een was voor beyde kinderen.

De Nieren leggen aan de Lenden, op de Spieren van dien naam, tusschen beyde Vliezen des Pens-zaks; de een aan de regter zyde, onder de Lever, en de andere aan de linker, onder de Milt, aan de zyde der holle Ader C: en groote nederdalende Slag-ader D. leggende de regter gemeenlijk wat laager, als de linker, en ieder drie dwersche vingeren, of wat meer, van de voorgemelde Vaten.

De Nieren in een Mensch van middelbare groote, zijn ontrent de lengte van vijf dwersche vingeren, by na drie breed, en anderhalven vinger dik.

Ze gelijken niet qualijk een turkse boon, agter bultig, inwaarts, daar de Vaten ingaan, hol, en ingebogen.

Hun oppervlakte is gemeenlijk effen en glad; maar in nieuwgebore Kinderen schijnen ze uyt verscheyde stukjes t'samengesteld te wèzen; gelijk in de tweede Figuur vertoont word.

In Nieuw-
gebore
Kinderen.

H

De

Vliezen.

De Nieren hebben twee Vliezen: 't buytenste komt van den Pens-zak, en heeft veel Vet, zo dat in vette Menschen, de Nieren daar onder verborgen leggen, waarom 't ook Vet-vlies genaamt word. 't Binnenste of eygen Vlies, omvangt zeer dicht de Nieren, en kan zonder de zelfstandigheyt te verbreken, ligtelijk afgetrokken worden.

Hezting.

Door 't buytenste Vlies wordenze vast gehegt aan de Lenden; door hun Vaten aan den tronk der holle Ader, en groote nederdalende Slag ader; door middel van de Pis-leyders aan de Blaas, de regter aanden blinden, en 't Kartel-darm, en de linker aan den Kartel-darm, en de Milt.

XII. Taf.

3. Figuur.
Zelfstandigheyt
der Nieren.

De Nieren bestaan uyt een klierige zelfstandigheyt, die uytwendig legt, en ontrent zo dik als een halve dwersche vinger is AA. en uyt Pis-buysjes B. want de Slag-aderen in de Nieren worden zeer fijne takjes, die eyndelijk in Kliertjes veranderen, en van deze Kliertjes ontstaan zekere kleyne Pisbuysjes, gelijk als fijne vleezige bleeke Vezelkens, die de pis uyt de kliertjes ontfangen, en na 't Bekken voeren.

Tepelwyzige
Lighaamtjes.

3. Figuur.
Vliezige
pijpijes.

Deze Pis-buysjes leggen van den omtrek der Nieren, naar 't Bekken uytgestrekt, en vervolgens tot verscheyde bondelkens t' samen komende, zo maken die uyteyndekens dicht by een gedrongen zekere tepeltjes, die *tepelwyzige lighaamtjes* genaamt worden; zodanige vind men dikwils twaalf in een Nier.

Ieder een dezer tepeltjes, word ontfangen in een pijpien cc. die van 't Bekken c. voort gebragt worden, zijnde zeer kort, en tamelijk ruym, in welke een priem van middelbare dikte kan ingaan, en waar in ze de pis, uyt de voorgemelde Pis-buysjes komende, ontfangen, en laten nederdalen.

Uytmelkende
Vaten.

1. Figuur.

De Bloed-vaten der Nieren, die de 2 uytmelkende genaamt worden FF. komen ieder met een tak voor, van de groote nederdalende Slag-ader, en de holle Ader, die vorders in twee, drie, of vier ander verdeelt worden, en in 't holle gedeelte der Nieren ingaande,

1 Colon. 2 Emulgentia.

cyn-

eyndigen voor 't grootste deel , in de klierige zelfstandigheyt.

In 't jaar 1705. een Krijgsman ontleedende , vond ik aan de linker Nier twee uytmelkende Slag-aderen , 't gene aan de Aderen , nu aan d' een , dan aan d' andere Nier , ook zomtijds gezien werd.

Het buytenste of 't Vet-vlies der Nieren , heeft een ^{smeers-} Ader , en Slag-ader , de Smeer-vaten genaamt a. die ^{vaten.} zomtijds onmiddelijk van de tronken , en ook wel ^{XII. Taf.} van ^{1. Figuur.} de uytmelkende Vaten , of de Zaad-slag-aderen p. voort komen.

De Zenuwen der Nieren komen aan ieder zyde , van de Nier-zenuwvlegting , die gemaakt word van de takjes der tusschen-ribbige , en Lende zenuwen ; de Water-vaten ontlasten zig in 't 2 Chijl-zakje.

Daar zijn voorbeelden van gestorve Menschen , in wier Nieren steenen zijn gevonden ; maar een der aanmerkelykste is , dat van den Paus *Innocentius* den XI. die gestorven is den 13. Augusti 1689. men vond in 't doode lighaam een steen in de regter Nier , wegende zes oncen , en in de linker een van negen oncen.

Eerwe van 't gebruyk der Nieren spreken , moeten we eerst de Pis-leyders , en 't Bekken beschrijven. ^{Getal} Twee Pis-leyders zijn'er , een aan elke zyde 1. Fig. GG. zomtijds heeft men wel aan een zyde twee , of drie gevonden.

Het zijn lange , ronde , vliezige pijpen , zo dik als ^{Pis-ley-} en schrijf penne , beginnende aan de holle zyde der ^{ders.} Nieren , en langs de 3 Lende-spier tusschen beyde vliezen des Pens-zaks (een weynig gebogen , als een roomsche S) nederdalende , eyndigen ze ontrent den hals der Blaas , gelijk in 't vervolg van de zelve , zal gezegt worden.

Die den steen der Nieren hebben gehad , heeftze *Bartholinus* zo ruym , als een darm gevonden.

Mijn Heer *Kolbert* , eerste Minister des Konings van Frankrijk gestorven zijnde , zo wierden in de Pis-leyders van 't geopend lighaam , verscheyde zeer groo-

te steenen gevonden, door welke de pis een doorgang had gemaakt om na de Blaas te gaan.

In 't doode lighaam van een Edele Juffrouw over eenige jaren door my geopend, vondik 't Bekken, en de Pis-leyders, vol gravelige stoffe.

Vaten der
Pis-ley-
ders.

De Pis-leyders ontfangen Aderen, en Slag-aderen van de Bloed-vaten der naburige deelen.

Zenuwen krygen ze van de tusschen-ribbige Zenuw, en van 't Lende-merg.

Het Bek-
ken.

Het Bekken C. 3. Fig. is anders niet als zekere hol-
ligheyt, wel een dwersche duym breed gemaakt, door
verwyding van 't opperste uyteynde der Pis-leyders,
in 't holle gedeelte der Nier.

Zomtijds vind men 't verdeelt in twee groote tak-
ken, uyt welke onmiddelijk de pijpjes cc. voort ko-
men, die, gelijk te voren is gezegt, de tepelwyze lig-
haamtjes ontfangen.

Vet.

Tusschen de groote takken van 't Bekken legt een
weynig Vet, 't welk dient om de tusschen-ruymte te
vullen, en mogelijk om de pijpjes slibberig te ma-
ken.

Den onvergelykelijken Ontleder *Malpigi* en eer-
ste Genees-Heer van den Paus *Innocentius* den XII.
overleden den 29. November 1694. van een ¹ Be-
roerte, zo vond men in 't doode lighaam de regter
Nier tweemaal minder als de linker, en 't Bekken
driemaal grooter, waarom vele steentjes, die hy ge-
lost had, zo ligt uyt de Nier nederdaalden. Men
vond in de Blaas een kleyn steentjen, dat sedert wey-
nig dagen, uyt de Nieren gekomen was.

Dienst der
Nieren.

De dienst der Nieren is, datse door hun klierige
zelfstandigheyt, de pis van 't bloed af-scheyden, die
dan van de Pis-buysjes ontfangen zijnde, nederdaalt
door de pijpjes van 't Bekken, tot in 't zelve, van
waar ze dan door de Pis-leyders gebragt word in
de Blaas, welke Pis-leyders waarschiynelijk door een
zeker wormwyze beweging, hier toe helpen.

Als de Nieren gequetst zijn, watert de lyder mer

noeyte, hy pift bloed, en heeft pijn in de lieffen, in de roede, en balletjes.

En zo de Pis-leyders gewond zijn, heeft hy pijn aan de zyden des Buyks, het deel boven de roede staat gespannen, en in plaats van water pift hy bloed, of bloedig water.

HET XVI. HOOFDSTUK.

Van de zwarte Gal-dooſjes.

DE zwarte Gal-dooſjes, zo genaamt, om dat XII. Taf.
men in hun holligheyt, altijd een zwart vogt 1. Figuur.
vind, zijn twee Klieren, die leggen aan de regter, Zwarte
en aan de linker zyde EE. van de Nieren. Gal-dooſjes.

Hun plaats is niet altijd de zelfde, zomtijds leg- Plaats.
genze tuffchen de Nieren, en de groote nederdalende
Slag-ader met de holle Ader; in jong-gebore kinde-
ren, heb ikſe gevonden, aan 't opperſte deel der
Nieren, zo datſe daar een deel ſchenen van te ma-
ken.

In de jonge kinderen, zijn ze zo groot als de Nie- Groote.
ren, en groeyen met de jaren niet aan, gelijk andere
deelen; maar verminderen veel eer: zomtijds is de
een grooter als de andere; maar meermaals zijn ze
even groot.

Zomtijds zijn ze langwerpig-rond, drie-of vier- Gedaante.
hoekig, of van een andere gedaante.

Hun kouleur is zomtijds rood, en zomtijds 't Vet
gelijk, waar in ze omwonden zijn, en zijn ook
van een teer geſtel, zo dat als men ze van 't buyten-
ſte Vlies der Nieren, waar aan ze vaſt zijn, wil ſchey-
den, zy ligtelijk breken.

Bloed-vaten ee. krijgen ze zomtijds van de holle Bloed va-
Ader, en groote Slag-ader, ook wel van de uytmel- ten.
kende Vaten.

Zenuwen hebben ze waarschijnlijk van de by gele- Zenuwen
ge Nier-zenuwvlegting.

1 Capsula atrabilaria.

H 3

Een

Een eygen Buys in dit deel weet men niet dat nog ontdekt is, en daarom is 't gebruyk zeer onzeker.

Gebruyk.

Eenige meenen, dat zeker vogt uyt die Klieren, door de tot nu toe onbekende Buyzen, in de ' uyt-melkende Slag-ader zoude gebragt worden, om een neerstooting in 't Bloed te maken, waar door de pis te beter in de Nieren, van 't zelve zou afgescheyden worden.

HET XVII. HOOFDSTUK.

Van de Blaas en Pis-schagt.

XII. Taf.
1. Figuur.
De Blaas.

DE Blaas is een hol vliezig deel, van een peer-wyze gedaante, waar in zomtjids steenen groeyen, wegende zestien, agtentwintig, tweendertig, ja eenenvijftig oncen, welker eersten, ik na de dood heb uyt gesneden; de tweede, derde, heeft de Heer Tolet, vermaard Steen-snyder te Parijs, my gezegt gezien te hebben; en de laatste heb ik dikwils in 't Mans Gast-huys der bermhartigheyt in de voorgemelde Stadt gezien.

Plaats.

Zy legt in 't onderste des Buys, in een holligheyt, gemaakt van 't Heylig-been, Darm-Heup- en Schaam-been-aderen, die 't *Bekken* genaamt word.

In de Mannen legtse op den 3 Endel-darm, en in de Vrouwen, tusschen de scheede der Lijf-moeder, en Schaam-beenderen.

XII. Taf.
1. Figuur.
Bodem en
hals der
Blaas.
Vliezen.

De Blaas word verdeelt in den bodem H. die breed, en in een regt staanden Mensch na boven gekeert is, en in den hals I. die enger, en na beneden legt.

Ze bestaat uyt drie Vliezen. Het buytenste komt van den Pens-zak. Het middenste is Spieragtig, en bestaat uyt dikke vleezige Vezelen, die na de lengte der Blaas, en ook anders ongeschikt loopen. 4. Fig. A. Het derde of binnenste Vlies is Zenuwagtig, en zeer gevoelig, binnen gefronst, en bezet met een slymige korst, tegen de scherphelyt der pis.

1 Arteria emulgens. 2 Ossa pubis. 3 Intestinum rectum.

De

De groote der Blaas is verscheyden: want alsfe vol ^{Groote} is, wordse zeer uyt gezet, en leeg zijnde valtse ne- ^{der Blaas.} der onder 't Schaam-been. In die een opstopping van 't water hadden, heb ik menigmaal meer dan een pot afgehaalt.

De bodem der Blaas is vast aan den ² Pens-zak, ^{Hegting.} en aan den Navel, door 't ³ Pis-navelvat, dat na de geboorte van 't kind, in een band verandert. Zie ^{Band voor} de V. Tafel F. En 't is zeker, dat'er een gemeen- ^{de Blaas.} schap is met den Navel, en de Blaas, ja met de Pis- ^{Gemeen-} schagt; zo dat *Hildanus* getuygt, dat die de koude- ^{schap tuf-} pis hadden, verligting kregen, alsfe den Navel met ^{Navel en} een keers, of Offen-roet besmeerden. ^{de Blaas.}

Boven dien is ze met den hals vast aan den ⁴ Endel- darm, 't welk de reden is, dat als de Steen-snyders wat te laag snyden, zy den Darm quetsen; zo dat de pis door de Aars, en de vuyligheyt door de wonde uyt komt.

Ook is de hals der Blaas, in de Vrouwen zeer vast, aan 't voorste deel der scheede van de Lijf-moeder, en daar van komen zomtjids in 't baren groote onge- makken, gelijk gebeurde over vele jaren toen ik te Parijs was. De Heer *Mauriceau* genoeg bekend door zijn schriften, word den 21. November 1695. geroe- pen, om in 't baren by te staan zekere Mevrouw 25. jaren oud, zwanger van haar vierde kind, die den doorgang om de quade vorming der beenderen, zeer eng had. 't Hoofd van 't kind, dat zeer groot was, vier dagen lang in de geboorte gestaan hebben- de, en niet konnende geboren worden; besloot men 't kind uyt te trekken, dewijl hy 't dood oordeelde: tot dien eynde maakte hy een opening tusschen beyde Opperhoofds beenderen, en met beyde vingers een deel herffenen uytgenomen hebbende, trok hy 't kind uyt, waar op korts daar na een onwillige uytlooping der pis volgde, veroorzaakt door de sterke drukking, die den hals der Blaas, daar hy met de scheede der Lijf-moeder verknogt is, door 't hoofd van 't kind, vier dagen lang in de geboorte staande, tegen 't

1 Os pubis. 2 Peritonæum. 3 Urachus. 4 Intestinum rectum.

Schaam-been had geleden; zo dat uyt een voorgaande ontsteking, op die plaats een versterking ontstaan is, met af-scheyding van een korst, (doorzaayd met vele harde steentjes) zo groot als een frans-stuk van vijftien stuyvers, zo dat'er altijd een onwillige uytlooping van 't water na gebleven is. Die Mevrouw had dikwils 't graveel, en vaak tamelijke groote steenen geloft.

Vorders is de Blaas onder met de Schaamelheyt vereenigt, zo in Mannen als Vrouwen, door middel der Pis-schagt.

In de Blaas zijn drie openingen, twee aan 't agterste deel, twee dwersche vingeren van malkander, niet verre van den hals, en worden gemaakt door de monden der Pis-leyders, waar door de pis gedurig in de Blaas zypelt.

Deze Pis-leyders BB. 4. Fig. booren wel hooger in de Blaas; maar loopen eerst tusschen de Vliezen, eer ze 't binnenste Vlies doorbooren. Zie den ingang der Pis-leyders in de Blaas in de X. Tafel. 4. Fig. bb cc. 'T is daar, datze tusschen de Vliezen der Blaas loopen, en zomtijds een, of meer kleyne steentjes uyt de Nier komende, blyven zitten, aangroeyen, en zomtijds een zweer veroorzaken; waar op de Steen-snyders moeten letten: want men kan, alsse wat merkelyk groot zijn, met den vinger in den Endel-darm der Mannen, en in de scheede der Lijf-moeder in Vrouwen te steken, de zelve voelen, en dat zo veel te beter, als men op den zelve tijd, een Catheter in de Blaas brengt, om die van boven te drukken. De derde opening van den Blaas is in den hals, tot uytloozing van 't water door de schagt.

Op dat de pis in de Blaas niet tegens dank gedurig uytvloeye, word de opening van den hals door eenige schuyms in 't rond loopende vleezige Vezelen, dienende voor een Sluyt-spier, en onder 't buytenste Vlies leggende, gesloten, tot dat door de veelheyt, en scherpte der pis, en t' samentrekking van 't middenste vleezige Vlies der Blaas, benevens de Spieren des

+ Intestinum rectum,

Buyks

Sluyt-
spier.

Buyks, de toetrekking der Sluyt-spier overwonnen, en 't water uytgedreven word. Zie de Sluyt-spier in de X. Tafel. 4. Fig. d.

De Blaas dient om 't water uyt de Pis-leyders te ontfangen, en op zijn tijd, uyt 't lighaam te dryven.

In ordere der wegen, daar de pis door gaat, moet nu van de Pis-schagt gesproken worden, dat een Zenuwagtige buys is, die zig uytstrekt, van den hals der Blaas, tot 't eynde der Mannelijke roede, hebbende by na de zelve wijdte van boven tot beneden. 1. Fig. Z. en 4. Fig. F. Ik heb op den 18. Maart 1707. een kind gezien van elf weken, welkers Pis-schagt eyndigde onder de roede aan 't opperste, en voorste deel van 't zakjen, zijnde 't overige niet open, zo dat dit kind oud wordende, waarschiijnlijk onbequaam zal zijn tot de voorteeeling.

Die Buys of Pis-schagt is van buyten bekleed met een spongieuse zelfstandigheyt, welke, om datse tot de teeldeelen behoort, in 't vervolg zal beschreven worden.

De lengte dezer Buys verschilt niet alleen volgens de jaren, en groote der Menschen, maar ook volgens 't geslacht: want in Mannen isse wel agt, negen, of meer dwersche vingeren lang, en in den Vrouwen geen twee, en is in deze breeder, zo gevoelig niet, en ligter te verwyden; zo dat de steenen in de Vrouwen om die reden met minder moeyte uyt de Blaas door de Pis-schagt uytgedreven worden, als in Mannen, in welke ze dikwils blyven vast zitten, zo dat men die moet uyt halen, gelijk ik aangewezen heb in mijn Verhandeling der voornaamste Handwerken der Heel-konst in 't 18. Hoofdstuk.

Nadien de Pis-schagt in de Mannen langer, en enger is, als in de Vrouwen, is zy ook veel krommer, en dat is de reden, als men in de Mannen een Catheter in de Blaas moet brengen, om te weten of 'er steen is, of om 't opgestopt water uyt te halen, dat 't veel moeyelijker is, als in de Vrouwen, welker Pis-schagt regt, kort, en wyder is, waarom ze min met

steen der Blaas gequelt zijn, als de Mannen.

Boven dien is'er een weg na de Lijf-moeder, en een na de Blaas; want de eerste is zeer wijd, en staat wat laager; en de tweede is veel enger, en een weynig hooger, waar op wel moet gelet worden in 't sondeeren der Vrouwen. Zie den ingang dezer wegen onder de Vrouwelijke deelen in de XVI. Tafel, 1. Fig.

Vaten der Blaas, en aderen van de Onder-buyks, en inwendige Speen-Pis-schagt. vaten, en in de Vrouwen ook van de Zaad-vaten.

Haar Zenuwen nemen oorsprong van 't dwalende paar, en van die uyt 't merg van 't Heylig-been voortkomen.

Gebruik
der Pis-
schagt.

De Pis-schagt dient om doorgang te geven aan 't water, en in de Mannen ook aan 't zaad.

De Blaas heeft twee gebreken, de steen, en 't opgestopte water.

Daar zijn verscheide manieren uyt gevonden, om den steen uyt de Blaas te halen, zo in Mannen, als in Vrouwen.

Lees hier over *Tolet*, in zijn Verhandeling van 't uythalen van den steen uyt de Blaas. Als mede de aanmerkingen, gedaan door den Heer *Mery*, eersten Heel-meester van Gods - gasthuys, en Ontleeder van de Koninglijke Academie der Wetenschappen te Parijs wegens de manier van 't uythalen des steens uyt de Blaas, ge oefent door *Frere Jacques d' Eremijt*.

Hoewel'er gemeenlijk maar een steen in de Blaas is, gebeurt 't wel dat'er veel meer in gevonden worden, gelijk den Heer Professor *Ruyfch* verhaalt, dat hy in de Blaas van een Vrouw van 81. jaar, twee-en-veertig dikke en hoekagtige steenen heeft gevonden.

HET XVIII. HOOFDSTUK.

Van de Mannelijke Teel-deelen.

DE deelen in de Mannen, tot de voorteeeling dienende, zijn de ¹ Ballen, de ² Opper-klootjes, of Bystaanders, de ³ aanbrengende Vaten, Zaad-blaasjes, ⁴ Voorstaanders, Roede met de Bloed-vaten, Water-vaten, en Zenuwen, die zig in de voorgemelde deelen verspreyden: waar by komen de twee nieuwe Voorstaanders, ontdekt door den Heer *Kowper*, XII. Tafel
1. Figuur.
Teel-deelen welke zijn.

De ballen zijn zekere deelen, die in de Mannen buyten den Buyk in 't zakje neder-hangen *KL*, 1. Fig. en zijn als getuygen der Mannelijkheid, zo dat niemand eertijds by de Romeynen kon getuygenis geven, ten zy hy deze hadde. Men moet geen van die deelen oyt weg nemen, als in de uyterste noodzakelykheyt, wanneer ze gansch geplettert, verstorven, of verhard zijn, en in alle soorten van Vlees-breuken, die men met uyt-, en innerlijke middelen niet kan genezen: en daarom moeten d' Overheden die Werk-meesters en Land-loopers straffen, welke om een enkel scheursel zeer veel kinderen beroven van een deel, dat zo noodzakelyk tot voortzetting van 't Menschelyk geslacht is. Gemeenlyk zijn ze twee: zeer zelden drie, of een. welke de Ballen zijn.

Ze zijn in groote zeer verscheyden, in 't gemeen als een kleyn henne- of groot duyven ey; de regter is meermaals grooter als de linker; en ze zijn van een cyronde gedaante. Grooter.

De rokken, die de ballen omvangen, verschillen veel van malkander, zo in maaksel, wijdte, en dunte; en zijn gemeene, of eygene. Rokken.

De gemeene zijn, welke beyde ballen te gelijk omvangen, en zijn twee, waar van de buytenste het zakjen maakt, in 't Latijn *Scrotum* genaamt; dat anders Gemeene.

1 Testiculi. 2 Epididymides. 3 Vasa deferentia. 4 Prostata. niet

niet is als de huyd, die hier dun, en met den 1 Opperhuyd bedekt is, die gerimpelt, en in de jongelingen van tien, of vijftien jaren, met hayr bewassen word.

Dit zakjen word verdeelt in een regter en linker deel, door middel van een streep, die men de naad noemt, beginnende aan den Aars, en eyndigende aan 't hooft der roede; die men in 't snyden moet myden.

De andere en binnenste gemeene rok, die eenige met de vorige onder 't zakjen begripen, en de Grieken *Dartos* noemen, is volgens 't gevoelen van meest alle de Ontleeders anders niet als een Spier aan elke zyde, die ieder bal omvangt, en in 't midden malkander rakende een foort van scheydsel maken, waar door de ballen van malkander zijn gescheyden; zo dat die Spieren tot de eygen rokken der ballen zouden kunnen gebragt worden. Deze Spieren in werking zijnde, doen 't zakjen rimpelen, en trekken, geholpen door de opschortende Spieren, de ballen om hoog; waar uyt men oordeelt van de sterkte en gezondheid van een Man, welkers zakjen kort, en de ballen tegen de billen aan gedrukt worden: want dit geeft te kennen de kragt der geesten, waar door de vezelen van die Spieren opzwellen, en altijd ingetrokken moeten blyven, om datse geen andere 2 Tegenwerkers hebben, als 't gewigt der ballen, om een tegengewigt met de werking van die Spieren te maken.

't Is waarschijnlijk dat in 't zakjen, tusschen de huyd, en de voorgemelde spieren, 't Vet-vlies gevonden word, dewijl men niet alleen onder de roede, zomtijds Vet in 't zakjen vind, maar ook een Lugt-gefwel of *Emphysema* krijgen kan, gelijk ik zomtijds gezien heb.

Als ik in de maand Augustus van 't jaar 1716. t' Amsterdam was by den Heer Professor *Ruyfch*, en sprekende van 't Vet-vlies, zeyde hy my dat het gene men tot nog van de *Dartos* had gezegt, twee Spieren te zijn, anders niet is als 't Vet-vlies,

1 Epidermis. 2 Antagonista.

of

Midden-
schot van
't zakje.

of de *tunica cellulosa*, gelijk die door 't gantsche lighaam onder den huyd word gevonden; en daarom ook een *Emphysema*, of Lugt-geswel onderworpen is: want als men in de Lies een opening maakt door den huyd tot in 't Vet-vlies, en met een bequaam pijpen'er in blaast, zal 't zakjen zeer opzwellen, omdat de cellekens met de lugt gevult worden, 't gene op 't hoofd ook kan gedaan worden.

Boven dien is 't zakjen onderworpen een soort van ¹ *Water-breuk*, daar 't water door 't zelve in 't Vet-vlies, even gelijk in een wolle lap, die in 't water is gestoken verspreyd legt, en in 't Latijn een *Anasarca* van 't zakjen kan genaamt worden; welkers genezing, zo die uyt 't ² *Buyk-water* ontstaat, niet wel mogelijk is, ten zy 't Buyk-water eerst genezen is, anders zo die in 't zakjen is voortgebragt, kan ze, zo de algemeene middelen vrugteloos gebruykt zijn, en de plaats-middelen om 't water te verteeren niet helpen, door *Scarificatien*, of 't gebruyk van een *Seton*, of doortogt in 't zakjen te maken, en het op te schorten geholpen worden.

Het zakjen dient om de ballen, de 3 bystaanders, ^{Dienst van} en de vaten te omvangen, de zelve te verwarmen, 't zakjen. en tegen alle ongemak te beschermen.

Nu volgen de eyge rokken, die ieder bal in 't by- ^{XII. Tafel.} zonder omvangen, welke van zommige maar twee, ^{1. Figuur.} van andere drie gestelt worden. De eerste komt van ^{Eyge} de 4 opschortende Spier N. die haar begin neemt van ^{rokken.} de pees der schuyns opklimmende Spier des Buyks, ^{Opschortende} en zig op den bal uytspreydende, omvangt die den zelve: ^{Spier.} die word ook de roode rok genaamt, in 't Grieks *Erythroides*. Zie deze Spier in haar natuurlijke plaats ^{Den roo-} in de X. Tafel 1. Fig. Letter t. ^{den rok.}

De tweede is de ⁵ Schee-wyze rok M. om dat hy ^{Schee-wy-} de ballen als in een scheede omvangt, en komt ^{zen rok.} van 't uytwendig vlies des ⁶ Pens-zaks, dat zig uytbreyd, en nederdaalt ontrent de Lies, en de zaadvaten, met de bystaanders, en ballen omringt, met

¹ Hydrocele. ² Ascites. ³ Epididymides. ⁴ Cremaster.
⁵ Tunica Vaginalis. ⁶ Peritonæum.

dit onderscheyd dat hy zeer vast is aan beyde de eyn-
den der bystaanders, wat minder aan de zaad-vaten,
en niet het minste aan de oppervlakte der ballen.

Door die twee rokken, worden de ballen vast ge-
hegt aan de *Dartos*, of 't Vet-vlies, waar van te voo-
ren is gezegt: en 't is in deze losse tusschenheyt dat 't
water zomtjids gelijk in verscheyde blazen, of cellen
vergadert wort, aan beyde de zyden van 't zakjen,
en een tweede soort van Water-breuk maakt, welker
genezing bestaat, in aan elke zyde van 't zakjen, ee-
nige brandmiddelen volgens zijn lengte te leggen, de
zelve door te snyden, om 't water uyt te laten, en de
Vliezige cellen door de ettermaking te verteeren.

De derde eyge rok word om zijn kouleur, de wit-
te genaamt L. deze is zenuwagtig, sterk, en dik,
en bekleed onmiddelijk de zelfstandigheyt der bal.

Zijn buytenste oppervlakte is effen, glad, en vog-
tig; maar de binnenste, die aan de zelfstandigheyt der
ballen vast is, ruw en oneffen.

In 't bovenste dezes roks worden de Bloed-vaten,
Zenuwen en Water-vaten ingeplant, die zig dan ver-
der met verscheyde takjes in de zelfstandigheyt der
ballen verspreyden.

Tusschen den Witten, en Schee-wyzen rok, die te
vooren is beschreven, is rondom de bal een ruymte,
en in die tusschenheyt wort zomtjids water vergadert,
waar in de bal zwemt, en een derde soort van Wa-
ter-breuk maakt, in welke 't geswel, en de bal, eene
swelling maakt, en de bal niet gevoelt word; en als
't geswel meer aangroeyd, vind men 't water ook tus-
schen den ² Schee-wyzen rok, en de Zaad-vaten,
na boven tot aan de Lies, waar door 't langwerpig
word: welker genezing bestaat in 't water met de
troiscar aan 't onderste deel van 't zakjen uyt te la-
ten; maar de volkome genezing moet geschieden,
gelijk van de tweede soort gezegt is. Zie alle die
soorten van Water-breuken en haar genezing, in 't
veertiende Hoofdstuk van onze Verhandeling der voor-
naamste Handwerken der Heel-konst.

1 Hydrocele. 2 Tunica Vaginalis.

Als

Als men de laatste eyge, of witte rok doorsnijdt, vertoont zig de zelfstandigheyt der ballen, die wit-agtig en zagt is, bestaande uyt een vergadering van zeer fijne vaatjes, waar in 't zaad word afgescheyden, welke zonder breken los zijnde gemaakt, wel over de twintig ellen lang zouden wezen.

Deze vaatjes loopen in een nette ordere van den omtrek der ballen naar 't midden, en worden daar in gehouden, en van malkander gescheyden, door zeer fijne Vliesjes, by na op de manier, gelijk men ziet in 't binnenste gestel der Orangie appelen. Ziet in de XIV. Tafel, de 1. en 2. Fig.

Deze vaatjes komen in een Zand-kloot of *Testiculus Veneris*, door een te dik zaad te verstoppen, waar door de bal opzwellt, en zomtijds tot een ongelooflijke groote groeyt, en verhard wort, aan welken, zo men met in-, en uysterlijke geneesmiddelen als verdrijvende, en etter makende, niet kan te regt komen, men zomtijds genoodzaakt is dien uyt te snyden. Zie de manier van uyt snyding in 't vijftiende Hoofdstuk van onze Verhandeling der voornaamste Handwerken der Heel-konst.

De Bloed-vaten der ballen worden gemeenlijk * Zaad- of bereydende vaten genaamt, welke zo ze 't Zaad bereyden, alleen aan de Slag-aderen toekomt.

De Slag-aderen nemen haar begin, ontrent twee XII. Taf. vingeren breed, onder de Nier-slag-aderen, aan 't I. Figuur. voorste deel der groote Slag-ader PP. De regter Zaad-ader O. neemt ook dikwils haar begin van 't voorste deel der holle Ader, een weynig lager, als daar de Slag-ader begint; maar de linker n. komt voort uyt de linker Nier-ader.

Ik heb in 't jaar 1704. een Krijgsman ontleed, die op de regter zyde twee Zaad-slag-aderen hadde, welker eene voortquam uyt den tronk der groote Slag-ader, daar de Nier-slag-aderen uyt gaan. En in 't jaar 1705. een ander, wiens regter zaad Slag-ader voortquam, daar de Nier-slag-aderen uyt den tronk der groote Slag-ader voort komen, loopende verders

* Vasa spermatica & præparantia.

onder de holle Ader naar de regter bal, en de linker quam voort onmiddelijk onder de bovenste ¹ Buyk-slag-ader, en ging over de linker Nier-ader naar den linker bal. Dezen had ook een dobbel Nier-slag-ader, gaande naar de linker Nier. Zomtijds komen de Zaad-aderen voort aan beyde de zyden, uyt de Nier-aderen.

Deze Aderen, en Slag-aderen dalen zydelings neder naar de ballen, tusschen de verdobbeling des ² Pens-zaks, waar tusschen de groote vaten, daar ze van af komen, ook geplaatst zijn.

De Slag-ader met de Ader aan elke zyde voegen zig te samen, en over de ³ Lende-spiere nederdalende, geven hier en daar eenige takjes. Maar aan 't ⁴ Darm-been gekomen zijnde, loopen ze allengskens voorwaarts, daar ze 't inwendig Vlies verlatende, in de uytsteekfels (die van 't uytwendig Vlies gemaakt worden,) gelijk in een scheede, naar de ballen gaan, terwijl 't inwendig vlies des Pens-zaks, boven over de opening gaat, en die stopt, op dat de Darmen daar niet zouden inzinken. Deze uytsteekfels van den Pens-zak omvangen niet alleen de Zaad-vaten, als in een scheede, maar scheidende zelve van malkander, door kleyne Vliesjes, die ze van zig geven. Zie hier over in 't IV. Hoofdstuk van den Pens-zak.

De Zaad-slag-aderen nederdalende in den Mensch, gaan niet kronkelende, gelijk in eenige andere Dieren; maar loopen by na regelrecht naar de ballen. Dog eer zy'er inkomen, verdeelen ze zig ontrent drie, of vier vingeren breed, voor de inplanting, in twee takken, welker kleynste in de bystaanders, en de grootste in den bal zelf gaat.

Eer de Zaad aderen uyt den Onder-buik gaan, geven ze verscheyde takjes, waar van zommige, voornamelijk die van haar begin voort komen, naar 't Net, en Pens-zak loopen; andere hier, en daar met malkander vereenigende, en niet minder verscheyde takken uytfschietende, gaan naar de ballen.

¹ Arteria Cœliaca. ² Peritonæum. ³ Psoas. ⁴ Os Illium.

De

Deze Aderen gaan niet gelijk de Slag-aderen, regelrecht na om laag; maar gelijk de Wijngaarden met verscheide krullen, en vliesjes doorweven zijnde, zo maken ze een dik Lighaam, dat om de menigte van kronkelingen, 't *Wijngaart-rankwyze Lighaam* genaamt word, en om dat 't door den gedurigen aanwas van 't getal der takken, als van hun kronkelingen allengskens nederdalende, ontrent de ballen zig verbreed, word het ook 't *Piramidwyze Lighaam* geheten oo. en de 5. Fig. C.

Wijngaart-rankwyze Lighaam, of corpus pampini-forme.

Het Piramidwyze Lighaam. Vaten van des Onder-buyks en Schamel-vaten.

Ook hebben de ballen Aderen, en Slag-aderen van des Onder-buyks, en Schamel-vaten; van de Slag-aderen ontfangen zy 't voornaamste voedsel, zo dat de Zaad-vaten toegebonden zijnde, de bal daarom niet versterft, nog vermagert, hoewel hy tot de voortteeling onbequaam is, om dat de vaten, die van onderen aankomen, geen zaadelijke stoffe aanbrengen, om die aan de ballen over te zetten.

Zenuwen.

Zenuwen krijgen de ballen van de vlegtingen van 't bekken, en van 't tweede paar der Lenden.

Gebruik der ballen.

De ballen zijn om 't zaad van 't Slag-aderlijk bloed af te scheiden; en schoon'er twee ballen zijn, zo zijn ze beyde niet volkomen noodig tot de voortteeling, dewijl'er voorbeelden zijn, zo van Menschen, als Dieren, die met een bal voortgeteelt hebben.

HET XIX. HOOFDSTUK.

Van de Opperklootjes of Bystaanders, en Zaad-dragende Vaten.

DE Opperklootjes, of Bystaanders, in 't Grieks *Epididymides*, en *Paraflata* genaamt, zijn lange, witte, hardagtige lighamen, leggende boven op yder bal, aan welke te met haar beyde eynden vast zijn, en den omtrek by na half omvatten Q.

XII. Tafel. 1. Figuur. Opperklootjes.

Deze worden gemaakt uyt een Zaad-buys, die verscheide kronkelingen maakt, en door een sterk

I

Vlies,

Vlies, van den witten rok der ballen voortkomende, omvangen. 5. Fig. B.

Yder Buys neemt zijn begin volgens 't zeggen van de *Graaf*, uyt zes, of zeven zaad-vaatjes der ballen, die t' samen komende in een middelbaar dier, wel vijf ellen lang zijn. Zie de XIV. Tafel, 3. Fig. CC.

Een weynig van de ballen af, daar de kronkelingen ophouden, word die buys harder, en dikker, gelijk een groote zenuw; en den naam van ¹ zaad-dragende, of uytfschietende Vat gekregen hebbende, klimt die opwaarts, omvangen zijnde in 't uytsteekfel van den ² Penszak, benevens de Aderen, en Slag-aderen, gelijk in een Scheede; en de zelve aan den ingang des Buyks verlatende, buygt zig, aan elke zijde R. R. naar 't agterste der blaas, daarze zig uytbreyden op de manier van een blaasjen, en weder enger worden, ontrent de zaad-blaasjes eyndigen. 1. Fig. X. Zie de 4. Fig. van deze en van de XIV. Tafel.

Deze buyzen hebben in 't begin een zeer enge holigheyt, en dikke zijden; maar ontrent de zaad-blaasjes wordenze ruymmer, zo dat men daar een redelijke groote priem kan inbrengen.

Bloed-
vaten.

Bloed-vaten krijgenze van de zaad-bloedvaten, en zenuwen van de nabuurige, als mede watervaten, die van de 3 Opperklootjes komen, welke te samen, met die van de ballen komen, naar 't ⁴ Chijl-zakje loopen.

Dienst der
zaad dra-
gende Va-
ten, en
Opper-
klootjes.

Deze buyzen dienen om 't zaad uyt de ballen naar de zaad-blaasjes te brengen, en by d' uytfschieting zig waarschijnlijk onmiddelijk in Pis-schagt t' ontlasten; en zijn de Opper klootjes, op dat het zaad in zijn langer weg door de gekronkelde buysjes, vorders zou bewerkt worden, en de weyagtige stoffe, die'er onder gemengt is, van de water-vaatjes, die hier zeer veel zijn, allengskens opgenomen, en weggevoert worden.

¹ Vas semen deferens. ² Peritonæum. ³ Epididymides. ⁴ Cisterna.

HET XX. HOOFDSTUK.

Van de Zaad-blaasjes en Voorstaanders.

DE Zaad blaasjes leggen aan elke zijde, tusschen XII. Tafel.
 't agterste, en onderste deel der Blaas, en den De Zaad-
 Endel-darm, daarze met verscheide vliësjes aan den blaasjes.
 hals der Blaas en naburige deelen vast zijn; waar van
 het komt, dat zommigen geklysteert werdende, zaad
 uyt schieten, om dat de warmte van den Endel-darm;
 doordringende tot in de Zaad-blaasjes, 't zaad gaande
 maakt dat 'er in besloten is. Zie de Zaad-blaasjes
 1. Fig. XX. 4. Fig. DD. En in de XIV. Tafel 4. Fig.
 EE.

Ze bestaan uyt een zeer dun Vlies, waar door ver-
 scheide Aderen, Slag-aderen, Zenuwen, en waar-
 schijnlijk ook Water-vaten loopen.

Hun gedaante gelijkt niet qualijk 't gedarmte van Gedaante.
 kleyne Vogeltjes, verscheidelijk door een gedraayt,
 die als knobbelagtigegezwollen Aderen, inwaarts ge-
 trokken zijn.

Gemeenlijk hebbenze de lengte van drie of vier Groote,
 dwersche vingers, by na een duym breed, en 't derde
 deel van een vinger dik: dog in den een grooter, als
 in den ander.

De innerlijke holligheyt is in d'eene plaats wijder, Celle-
 in d'andere enger, makende verscheide celletjes, die kens-wij-
 gemeenschap met malkander hebben, dewijl men daar ze hollig-
 in blazende, zy alle opzwellen. heyt.

De Zaad-blaasjes eyndigen aan elke zyde met een
 kleyn pypjen, dat ontrent de breedte van een dwer-
 schen vinger, onder den hals der Blaas, in 't agterste
 deel der Pis-schagt ingeplant word.

Tusschen de beyde openingen dezer pypjes is een
 scheydsel, 't welk belet, dat 't zaad uyt een der zel-
 ve schietende, tegen 't ander niet aanstote. Dit scheyd- Het Ha-
 sel word van zommigen 't *Hanen-hoofst* genaamt, door nen-
hoofst.

1 Rectum.

I 2

wel-

welkers twee oogen , of voorgemelde openingen , 't zaad in de Pis-schagt geschoten word. Zie de XIV. Tafel 4. Fig. H.

Aan beyde de openingen dezer pypjes , is een klier-tjen , gelijk een klap-vlies , 't welk belet , dat 't zaad niet gedurig uytloopt ; maar uytfschietende , word het opwaarts gedreven , en uytgespuyt zijnde , komt het tot zijn vorigen stant.

Voor-
staanders. De Voorstaanders , in 't Grieks *Parastatae* , zijn twee klieragtige lighamen , digt by malkander gelegen , onmiddelijk onder den hals der Blaas , hebbende een ey-ronde gedaante , behalven , datse boven , daar de pypjes der Zaad-blaasjes door gaan , wat breeder zijn , als onder 1. Fig. S , en 4. Fig. E. Vele treffelijke Ontleeders nemen ze voor een klier.

Groote. De groote van beyde is ontrent als die van een okker-noot ; zeer kleyn zijn ze in oude luyden , en die 't Venus-tuyg niet gebruyken ; maar in die 'er dagelijks werk van maken , zijnze groot en opgezwollen.

Zelfstan-
digheyt. Ze bestaan uyt een klierige , en spongieuze zelfstandigheyt , welker laatste niet anders schijnt te wezen , als een vergadering van kleyne vaatjes , en vliesjes ; en die klieren zijn met een sterk Vlies bekleed.

Uytloo-
zende
Buysjes. Ze hebben van binnen een byzondere soort van Buysjes , die in de Pis-schagt boven , en onder 't Hennen-hoofst , maar voornamelijk aan desselfs zijden zig openen , welker mondekens met eenige uytpuylende klap-vliesjes bezet zijn , op dat 'er niets dan op behoorlijken tijd zou uytloopen , en geen Pis ingaan. Zie de XIV. Tafel , 4 Fig. II. Volgens 't zeggen van den Heere de Graaf , zijn 'er weynig minder als tien ; maar in honden wel tnegentig en meer.

Als men de Voorstaanders drukt , vloeyt 'er uyt die buysjes een wit vogt , gelijkende naar 't zaad , hoewel 't eygentlijk geen zaad is , dewijl die gesneden zijn , dit vogt ook hebben , en tot de voortteling onbequaam zijn.

't Is op die plaats , dat de Voorstaanders door een vuylen byslaap onsteken , en een *Druypert* komt , welke verzuymt zijnde , wel in een gedurige *Druypert* veran-

verandert , om dat de gaatjes , en klap-vliesjes door de fcherpte der ftoffe , weg gegeten zijnde , 't zaad , en de andere vogten , niet meer wederhouden worden.

't Is ook ontrent die plaats , dat in een *Druypert* 't uytvloeyende vogt door zijn fcherpte , zomtijds de Pis-fchagt in-eet , en door een hard lidteeken genezende , de Pis-weg vernauwt word ; 't welk dan , qualijk voor een stukje Vlees , of *Caruncula* genomen word , waar door de Pis niet meer zo vry kan doorgaan , en 't zijn die lidteeken , die beletten dat men met een proefzyzer niet kan pafferen.

Boven dien is d'uytvloeyende ftoffe in een *Druypert* zo fcherp , datze de deelen gelegen ter plaats van 't *Perineum* , dat is tuffchen den Aars en 't Zakjen doorknaagt tot de Huyd , en daar een gezwel maakt , 't welk geopent zijnde , doorgang geeft aan de uytloozing der Pis , dat ik zomtijds heb gezien. Ook word de krop der Blaas doorgegeten , zo dat de Pis geloofst word ; 't welk gemeenlijk ongenezelijke qualen zijn.

Zomtijds word door een plettering van de zelve deelen , die verfterven , of verzweren , de Pis door de zweer uytgeloofst ; en het gebeurt zomtijds dat de Pis-fchagt op die plaats verftopt wert , zo dat de Lijder geen water kan loffen ; waarom men de Pis-fchagt op die plaats moet open fnijden , en een loode pypjen in brengen , dat met een band moet vafst gemaakt worden ; waar door de Lijder zijn water maakt.

Ik was over eenige jaren geroepen by een Jongman , die een *Druypert* had , benevens een opftopping van 't water : waarfchijnlijk ontftaan door ontfteking ontrent den hals der Blaas , en verftopping van d'opening der Pis-fchagt , die toe was geraakt door de uytvloeyende ftoffe : ook was'er een *Phymofis* by ; zo dat 't hoofd der roede niet kon ontdekt worden: De Lijder had in twee dagen geen water geloofst , zo dat hy ongelooovelijke pyn had ; ik heb aanftonts de voorhuyd doorgesneden , om 't hoofd der roedet' ontdekken , en d'opening der geflote Pis-fchagt t'openen , en 't wa-

ter afgetrokken, waar door de Lijder zeer verligt was; en wierd verbonden en bezorgt van noodige middelen, door een ander Heelmeester, die hem eerst had behandelt: eenige dagen daar na, kreeg hy een versterking in de regter zijde van 't zakjen; zo dat ik genoodzaakt was 't zelve by na van boven, tot beneden door te snijden, en wierd genezen door *Myrrha*, *Aloës*, met *Sal Armoniac*, en een pap tegen de versterking: ook was de Pis-schagt onder de roede, door de scherpte van 't uytvloeyende vogt doorgegeten, waar door de Lijder pissende, het water uyt liep. Niet tegenstaande al die zware toevallen is hy genezen, behalven een zeer kleyn gaatjen, dat na gebleven is, onder aan de roede, waar door, als de Lijder zijn water maakt, een weynig Pis door vloeyd; maar de vinger daar op leggende, loopt'er niets uyt: gedurende de genezing, heeft hy eenigen tyd een was-ligt in de Pis-schagt gedragen, en t' sedert getrouwt zijnde, kinderen voortgeteeld.

Bloed-
vaten.

Zenuwen.

Dienst der
zaad-
blaasjes.

Der Voor-
staanders.

De Voorstaanders, en Zaad-blaasjes, hebben hun bloed-vaten, van de Onder-buiks, en onderste Darm-scheyls Vaten, en zenuwen van de vlegtingen, die in 't bekken zijn.

De Zaad-blaasjes dienen, om 't Zaad, uyt de Zaad-dragende Vaten t' ontfangen, te bewaren, en zomtyds na de Pis-schagt toe te zenden.

En zijn de Voorstaanders om een vogt, 't zaad by na gelijk, voort te brengen, en als 't zaad uyt de zaad-blaasjes geschoten word, het te omhelzen, op dat de sijne deeltjes des zaads niet zouden vervliegen.

Gelyk de honden geen zaad-blaasjes hebben, zo zynze lange bezig, tot de volkomen verzamening, om dat het zaad als met geweld uyt de ballen moet opgetrokken worden, en tot dien eynde, is hun roede rondom met veel klieren bezet, die ten tyde der verzamening zo opzwellen, datze, ten zyze ontzwellen zyn, de roede niet kunnen uyttrekken.

Nieuwe
Voor-
staanders.

De nieuwe Voorstaanders, die ontdekt zyn door den Heer *Kemper*, een vermaard Engels Ontleeder, zyn

zyn twee klieren, aan yder zyde der Pis-schagt, tusschen 't begin der opregtende, en de Pis-schagt verwydende spieren.

Deze hebben een uytloozende vat, dat zig ontrent 't begin der roede, in de Pis-schagt opent; en worden ook gevonden in de meeste dieren, en zyn geplaatst op de zelve manier.

Over haar gebruyk, is geschil tusschen de Heeren *du Verney*, en *Littre*, beyde Ontleeders van de Koniglijke Academie der Wetenschappen te Parijs, of 't vogt, dat de nieuwe Voorstaanders afkleynzen, met het zaad vermengt word, en by gevolg noodzakelyk is, tot de voortteeling. De Heer *du Verney* gelooft van ja, om volgende redenen.

Eerst, om dat men in de dieren, die gelubt zyn, die klieren, zo wel als alle de andere, die eenig vogt, nodig tot de voortteeling, afkleynzen, verdroogt, en verslenst vind.

Ten tweeden, om dat zommige Lyders, door de plaats, diese aanwyzen, daar hun gebrek is, te kennen geven, dat het in deze klieren is.

Ten derden, nadien 't gene eenigen overkomt, die te onmatig zyn in 't byslapen, wanneer ze de laatste druppelen pis uytloozen, dat niet als van die klieren kan komen, welke onder 't begin der Pis-schagt verwydende spieren leggende, dan in werking zyn.

De Heer *Littre* zegt, dat de gewoonlyke Voorstaanders vele kleyne celletjes hebben, waar in 't afgekleynsde vogt zig onthoud, en daar eenigentyd verblijft, tot dat het nodig is om uyt te vloeyen; maar dat in tegendeel de nieuwe Voorstaanders van den Heere *Kowper* deze celletjes niet hebben; en by gevolg, dat 't vogt in de Pis-schagt moet loopen, na dat het afgekleynst word, en tot een gedurig gebruyk is, en niet voor nu, en dan.

Boven dien, dat de uytloozende Vaten der nieuwe Voorstaanders, door 't spongieuze deel der Pis-schagt loopen, de lengte van twee dwersche duymen, eerze in de Pis-schagt in-booren, en op den tijd, als dit

Vogt moet uytvloeyen , het spongieus lighaam dan opgezwollen is , en de zijden zeer dun , en toegedrukt zijn zo dat dit vogt geen vryen doorgang heeft.

HET XXI. HOOFDSTUK.

Van de Mannelijke Roede.

XII. Tafel,
I. Figuur.

DE Roede , of 't Mannelijk lid , is dat langwerpige deel , 't welk aan 't onderste , en buytenste des Onderbuyks , van voren op 't zakjen nederhangt ; zijnde des zelfs gedaante genoeg bekend.

Hoe groot de Roede is , kan niet wel gezegt worden ; dewijlze ze in den eenen mensch grooter is als in den anderen , ook grooter en minder , op verscheyde tijden.

Deelen
der Roede.

De Roede bestaat uyt verscheyde deelen , waar van eenige uysterlijk , en andere innerlijk zijn.

De buytenste zijn de Opperhuyd , de Huyd , en 't Vet-vlies , die de Roede gemeen heeft met d'andere deelen.

XII. Tafel,
I. Figuur.

De binnenste of eygene deelen der Roede ; zijn twee zenuw-spongieuze lichamen , 't middenschor , de pisschagt , 't hoofd der Roede , het toomken met de vaten , banden en spieren.

De zenuw-spongieuze lichamen.

De zenuw-spongieuze lichamen , zijn twee lange , smalle deelen , die tot 't eynde der Roede uytgestrekt en met een dik , wit , zenuwagtig , en zeer vast vlies , bekleed zijn.

Ze nemen hun begin onder aan 't agterste van 't Schaambeens , zijnde in den oorspronk merkelyk van een gescheyden T T ; maar in 't vervolg worden ze vereenigt , en maken een gedaante , gelijk de letter Y.

Middenschor der Roede.

Ze worden t'zamen gevoegt door een vliezig middenschor , 't welk , hoe 't verder loopt naar 't hoofd der Roede , hoe 't dunder word , zo dat ontrent 't hoofd dit schot zo dun is , dat men 't niet meer ziet ,

i Tunica cellulosa.

waar

waar door die twee lighamen vereenigen, waarom de Roede altijd gelijkmatig kan opgeblazen worden. Zie dit Middenshot in de XIV. Tafel, Fig. F.

d'Inwendige zelfftandigheyt dezer lighamen is zeer spongieus, en bestaat uyt ontelbare kleyne cellekens, die uyt vele vliesjes en vezeltjes wonderlijk door mal- kander gevlogten zijn, zo dat beyde die lighamen C C, schoon men maar in een der zelver blaast, of spuyt, aanstonts opzwellen, en de Roede van alle kanten uytgezet, en gespannen word.

XIII. Tafel, 2. Figuur.

Die spongieuze zelfftandigheyt is gemeenlijk met zwart bloed vervult, zo de Roede te voren niet op- geblazen is geweest; maar zo men daar de lugt heeft ingedreven, zal 't bloed schoon rood wezen; even gelijk geschied in levende menschen in de longen, door de lugtdeeltjes, die'er bykomen.

Onder, en ten deele tusschen de zenuwspongieuze lighamen, legt de Pis-schagt, die men onderscheyden kan in een deel, dat vliezig, en dat spongieus is; 't eerste, D dat inwaarts legt, maakt de Pis-schagt, die gemeen is tot doorgang der pis, en 't zaad; en 't spongieuze E, legt buytenwaarts tegen 't ander aan, zijnde by na van de zelve zelfftandigheyt, gelijk de zenuw-spongieuze lighamen: want opgeblazen zijnde in een gemeene Roede, word ze ontrent zo dik, als een kleynen vinger. Die zelfftandigheyt zwelt op, als een van beyde de zenuw-spongieuze lighamen op- geblazen word; maar niet zo ligt: de zelve is teer- der, de cellekens minder, en zo niet met bloed ge- vult.

XIII. Tafel, 2. Figuur.

De zenuw-spongieuze lighamen nemen hun begin, van 't onderste, en agterste deel van 't Schaambe- en, gelijk te voren is gezegt, op dat de Pis-schagt zig te beter met de zelve zou kunnen voegen, en worden beyde met een sterken band daar aan gebonden, 3. Fig. a.

XIII. Tafel.

Men vind in 't opperste, en zydelijke deel der Pis- schagt, verscheyde zo groote, als kleyne openingen; een, die den Heer Professor *Verheyen* heeft gevonden,

1 Os pubis.

gelijk in de X. Tafel , 4. Fig. f , met een ingesteke priemken g word vertoont ; maar de Lezer zy ge-
waarschouwt , dat 't vlies , 't welk den omtrek der
opening maakt , enger was , en hier met eenig geweld
verwijd is.

De andere openingen zijn ontdekt , „ door den Heer
„ *Morgagnus* en staan , zo als hy zegt , in een regte li-
„ nie , volgens de lengte der pis-schagt. In zommige
„ beginnen ze een duym breed van 't uyteynde der pis-
„ schagt ; en gelijk 'er zelden meer als tien , of elf
„ zijn , zo zijn 'er ook zelden drie of vier minder :
„ haar groote en afgelegentheyd is onzeker , hoewel
„ d' eerste dikwils de grootste zijn.

Den Heer Professor *Verbeyen Morgagnus* hier over
gelezen hebbende , gelijk hy zegt in zijn *Ontleeding*
XIII. Taf. pag. 190. spreekt aldus : „ Maar op dien tijd , dat 't
1. Figuur. „ werk onder de pers was , en de drukker zig haaste ,
„ is het voorgevallen in een soldaat , die gehangen
„ was ; dat ik de voorgemelde openingen heb gevon-
„ den , niet alleen zo als ze volgens de lengte der pis-
„ schagt geschikt zijn ; maar in zommige plaatzen
„ twee , en twee b b ; in andere was een buysjen in
„ beyde de uyteynden , zo dat 'teen na boven , en 't
„ ander na beneden gong : 't gene den Heer *Morgagnus*
„ zegt ook aangemerkt te hebben : boven dien heb ik
„ ter zijden in een dezer openingen een derde buysjen
„ gevonden , en meen dat in yder dezer openingen
„ meer mondekens van buysjes zijn ; dewijl ik niet
„ zien kan , waar om ze anders zo groot zouden we-
„ zen.

„ De kleyne gaatjes , waar van *Morgagnus* spreekt ,
„ waren ontelbaar , waar van eenige zichtbaar open
„ waren , en andere door de uytkomst van een zeker
„ vogt bekend wierden , en zijn eenige van die afge-
„ beeld by de letter d.

Van 't gebruyk dezer openingen , en van 't uytzijpe-
rende vogt zegt de voorgemelde Schrijver 't volgende:
„ Vorders gelijk de Pis-schagt van boven door de
„ Voorstaanders , en Klieren van *Comper* bevogtigt
„ word , zo word die ook van onderen door 't vogt , uyt
„ die

„die openingen komende, bestreken, op dat niet te
 „veel van 't zaad voorby vloeyende, aan de Pis-
 „schagt zou haperen, en verloren gaan, hoewel dit
 „vogt ook mogelijk in de pis-schagt dient, om de
 „scherpheyte der pis te matigen.

Hy meent dat dit vogt in de pis-schagt word uytgedrukt, als zijn spongieuze zelfstandigheyt, en dat die der zenuw-spongieuze lighamen opzwellt, dewijl 't dikwils op dien tijd noodig is, dat de pis-schagt word bevogtigt, eer 't zaad word uytgeschoten.

De *Tunica cellulosa* of cellekens-wijze rok, ontdekt door den Heer *Ruyfch*, leggende onmiddelijk onder de huyd der Roede, is niet anders als een continuatie van 't Vet-vlies, dat gevonden word onmiddelijk door 't gantsche lighaam onder de huyd: dit vlies of cellekens-wijze rok is dun, ten zy de cellekens opgeblazen worden; waar door hy meermaals dikker als een schrijfspen word, zijnde die cellekens zo op malkander geplaatst, dat zig 't voorgemelde vlies noyt cellulëus vertoont; in tegendeel opgeblazen zijnde, vertoonnen zig millioene cellekens even als schuym, niet alleen in de Roede, maar ook in des zelfs hoofd, dat van 't Vet-vlies omvangen word.

Zo dat de Roede niet alleen opzwellt, en verhard, na dien men de zelfstandigheyt der zenuw-spongieuze lighamen, en de spongieuze zelfstandigheyt der pis-schagt opblaast; maar ook om dat de voorgemelde cellekens van 't Vet-vlies opgeblazen worden.

Die cellekens vertoonnen zig in een sterk opgeblazen, en gedroogde Roede, die dwerssch doorsneden zijnde, open blijven, gelijk ik dikwils by den Heer *Ruyfch* gezien heb; daarze in tegendeel in een ongedroogde toe vallen. Zie dien cellekens-wijzenrok van den Heer *Ruyfch* in de XIII. Tafel, 2. Fig.

En om dat dit vlies of cellekens-wijze rok, en de huyd der Roede gemeenschap hebben met de huyd en 't Vet-vlies of *Dartos* van 't balzakjen: daarom hoe de *Anasarca* van 't zakjen, of die soort van water-breuk, daar 't water in 't Vet-vlies, of de *Dartos* en de huyd

van 't zakjen verspreyd legt , 'grooter word , hoe de Roede ook meer gezwollen , gespannen , en doorzigtiger is , en een *Phymosis* , of *Paraphymosis* maakt , na dat 't hoofd der Roede met de voorhuyd bedekt of niet bedekt is.

't Hoofd der Roede maakt 't uyteynde der zelve , is zeer gevoelig , dikker in 't begin , en naar 't eynde wat spits afloopende V.

Het binnenste , en minste deel van 't hoofd der Roede , word gemaakt uyt beyde de zenuw-spongieuze lighamen , die hier t' famen komen , zonder 't middenshot , en komt niet tot aan 't uyterste van 't hoofd ; maar 't buytenste , en grootste deel , 't welk 't binnenste omvangt , word gemaakt van 't spongieuze deel der pis-schagt ; zo dat 't hoofd der Roede niet anders is , als een continuatie der zelfstandigheyt van al de spongieuze lighamen , die met 't Vet-vlies of cellekens-wijzen rok der Roede , veel dunder , en teerder te voren beschreven , bekleed is , en waar in de Pis-schagt (die zomtjids in nieuw-gebore kinderen gesloten is , en op 't spoedigste , om dat de kinderen zonder pissen niet lang leven kunnen , moet geopent worden) komt te eyndigen ; zo dat , als de Roede opzwelt , 't hoofd ook opzwelt ; hoewel 't zo schielijk , als de zenuw-spongieuze lighamen , daarze met 't middenshot gescheyden zijn , niet opzwelt , om dat 't inwendig gestel van 't hoofd vaster van maakzel is.

De Pis-schagt word ligt geopent , als 't vlies , waar door ze gesloten is , geheel dun is ; maar zo de zijden aan een gegroeyt zijn , moet men met een lancet d' opening maken , liever wat groot als kleyn , tot dat de pis uytkomt , waar in de Heelmeester moet voorzigtig te werk gaan : 't is niet noodig iet in d' opening te steken ; de pis , die'er dikwils doorloopt , belet de t' famengroeying.

Zomtjids is in de nieuw gebore kinderen de opening te kleyn , en dan moet ze na onder , en na boven met een lancet vergroot worden.

I Septum.

't Gei

't Gebeurt ook zomtijds dat d'opening onder by 't bandeken is, en dan moet men een opening maken op de natuurlijke plaats tot aan d'opening, die onder is, waar in men een lang loode pijpjes brengt, tot over de onderste opening, en dan moet men de onderste opening, met de zijden wat af te snijden, tragten te heelen, latende het loode pijpjes in de gemaakte opening tot de volkomen genezing.

Daar komen zomtijds op 't hoofd der Roede, voornamelijk in die de pokken hebben, kleyne vleezige uytwassen, welkers oppervlakte als kleyne graantjes zijn. Deze worden weg-genomen met gepoedert *zavelboom*, of *unguentum egyptiacum*: men kan ze, als ze een engen grond hebben, afbinden; maar 't is eer gedaan die af te snijden met een schaar, en wel gebloed hebbende, afwasschen, en met blauw *koperrood* aanraken: zo ze uyt de pokken komen, moeten de inwendige middelen gebruykt worden.

't Hoofd is rooder, als 't lighaam der Roede, om dat'er meer bloed-vaten in zijn, die om hun reerheyt doorzigtiger zijn.

't Hoofd der Roede is gemeenlijk bedekt met 't vel, ^{De Voorhuyd.} 't welk de Roede bekleed, dat de voorhuyd, en in 't Latijn *Preputium* genaamt word UU; 't is hier dubbel, waar van 't binnenste deel vast is aan 't eynde der zenuw-spongieuze lighamen, zijnde 't eynde los, dat ligtelijk overgestroopt kan werden: aan de Joden wierd het volgens hun wet afgesneden. Zommige hebben dit deel zo kort, dat'er nauwlijks yet is, 't welk de voorhuyd kan genaamt worden, zo dat 't hoofd altijd bloot is.

Zomtijds komen de kinderen ter wereld met de voorhuyd vast rondom 't hoofd der Roede, die zeer moeyelijk is om af te scheyden; maar als dit komt van een zweer of sjankers, dan is 't veel ligter te doen, om dat ze alleen vast is aan de zweer; men moet de voorhuyd met een bequaam werktuyg van 't hoofd der Roede afscheyden, en beletten dat 's er niet meer aan groeyt.

Als de opening der voorhuyd zo eng is, dat 't hoofd
niet

niet kan ontdekt worden , word dit gebrek in 't Latijn *Phymosis* genaamt, en is natuurlijk, of toevallig; Natuurlijk, als yemand daar mede geboren is: Toevallig, wanneer 't veroorzaakt is door sjankers of eenige andere Venus qualen, die ontsteking, of spanning aan dit deel veroorzaken, of van eenig bytend middel, dat men gebruykt heeft, om die gebreken te genezen. Dit gebrek word geholpen met de Voorhuyd boven, of aan de zijde met een bequaam mesken door te snijden, als men met d'algemeene en byzondere middelen niet kan te regt raken.

Zomtijds is de opening der voorhuyd zo eng, dat de Lijder niet als met groote pijn wateren kan, en men met geen snijgend werktuyg daar in kan komen, omze door te snijden: dan moet men de besnijdenis doen, gelijk men voortijds aan de *Joden* dede. Ziet van deze Operatie en de naastvolgende het XVI. Hoofdstuk van onze verhandeling der Voornaamste Handwerken der Heelkonst.

't Gebeurt ook wel dat de voorhuyd, door wat oorzaak 't mag wezen, agter 't hoofd toegestroopt is, zo dat het niet meer kan bedekt worden; welk gebrek *Paraphymosis* genaamt word. Zo men met de Roede in 't koud water te steken, om 't hoofd te doen verminderen, en de voorhuyd na voren te trekken, niet kan te regt komen, moet men ter plaats van de toestrooping, die door 't inwendig deel der voorhuyd geschied, en op der zelve gezwollenheyt, zelf eer men gereedschap gemaakt heeft om te verbinden, eenige kleyne scarificatien doen, en als de voorhuyd overgetrokken is, moet men letten, datze aan 't hoofd der Roede niet vast groeyt.

De Voorhuyd is aan 't voorste, en onderste deel van 't hoofd der Roede vast door een dun bandeken, in 't Latijn *frænum* genaamt: wanneer 't al te kort is, trekt het 't hoofd na beneden, als dan moet men 't afsnijden, gelijk men gemeenlijk doet aan nieuw-gebore kinderen, die de tong-riem hebben.

Dit bandeken word gezien in de XIV. Tafel, 7. Fig. B.

Alwaar 't hoofd aan 't lighaam der Roede vast is, is rondom een engte, die men de hals zou kunnen noemen, dat is onmiddelijk agter 't hoofd, op welke plaats, en boven op 't hoofd, vele kliertjes A B gezien worden; die dienen om een vogt van 't bloed te scheiden, om 't hoofd der Roede te besmeeren, op dat de voorhuyd te beter zou schuyven, als men 't hoofd wil ontblooten, of bedekken.

XIII. Tafel,
2. Figuur.

De Mannelijke Roede heeft aderen r r, en slag-aderen s s, van de Onder-buyks vaten, van welke aan yder zijde, een tak boven op de Roede loopt; maar aderen ontfangt ze, daar de zenuw-spongieuze lighamen zig vereenigen, en t'samenkomende, maken een tronk, die loopt naar 't hoofd der Roede; op een gehele andere wijze, als in 't meeste deel der andere deelen van 't lighaam geschied, daar de takken der holle ader, hoeze verder van den tronk afwijken, hoeze meer verdeelt worden. In den tronk ontrent de plaats der verdeeling, zijn twee klap-vliezen q, die beletten dat 't bloed uyt de takken, naar den tronk niet weder keere: de andere aderen, en slag-aderen, oorspronkelijk van de zelve Onder-buyks vaten, ziet men klaar in 't agterste deel der Roede, die zig met ontelbare takjes, in de spongieuze zelfstandigheyt der Pis-schagt, en zenuw-spongieuze lighamen verspreyden.

Ook heeft de Roede nog takken van de Schaam-vaten, die zig voornamelijk in de dekzelen der Roede verdeelen; en hebben de onderbuyks-aderen gemeenschap met de schaam-aderen, gelijk door 't blazen kan getoont worden, op dat 't bloed in de Roede, altijd zonder beletzel zou kunnen te rug keeren.

Het bloed door de slag-aderen, in de Roede gebragt, loopt niet te rug door zeer kleyne mondekens; maar door zeer zichtbare openingen der aderen: want de aderen, die door de zelve loopen, zijn als een zeef, doorboort met groote, en zichtbare gaten; zo dat 't slag-aderlijk bloed schielik kan te rug loopen, en de Roede in een oogenblik doen verflappen.

U Y T:

U Y T L E G G I N G

der


F I G U R E N ,

van de

T W A A L F D E T A F E L.

Waar in vertoont worden de Mannelijke
Teel-deelen, benevens de Nieren, Pis-
leyders, de Blaas, zo als die uyt
't lighaam genomen zijn.

<i>De 1. Figuur vertoont de voorgemelde deelen aan malkander han- gende.</i>	Nier-ader, en Slag- ader.
A De regter Nier van 't Vet-vlies ontbloot.	G De Pis-leyder.
a De Smeer-vaten.	H De Blaas.
B De linker Nier van 't Vet-vlies ontbloot.	I Haren hals.
C De Holle-ader.	K Het regter balleken in 't scheede-vlies be- floten.
D De nederdalende Slag-ader.	L Het linker balle- ken, alleen met den witten rok bedekt.
E De zwarte Gal- doosjes.	M Het uytsteekzel des Pens-zaks, 't welk het Scheede - vlies maakt.
e De Aderen en Slag- aderen.	N De opschortende Spier.
F De uytmelkende of	





- o n De Zaad-aderen.
 o o Haar takken met Slag-aderlijke takjes verzeld.
 PP De Zaad-slag-aderen.
 p Den tak van de zelve naar de Nier gaande.
 Q Het Opper-klootjen of Byftaander.
 R Het Zaad-dragende Vat.
 S De Voorftaanders.
 T Het Zenuw-spongieus lighaam der Roede.
 V Het hoofd der Roede.
 UU De Voor-huyd doorgesneden.
 X De Zaad-blaasjes.
 Z De Pis-schagt met haar spongieus deel.
 q Een groote Ader, die op 't opperste der Roede loopt, welke geopent is, om de twee Klap-vliezen te zien, die beletten, dat het bloed niet terug keeren kan door de Aderen.
 r Takken van de Onder-buyks-ader.
 s Een tak van de Onder-buyks Slag-ader.
 f De Zenuw.
 tt De uytwendige deelen der Roede.
De 2. Figuur vertoont een Kinder-nier, die uyt vele stukjes t' samen is gestelt.
De 3. Figuur vertoont de Nier boven op 't Bekken in haar vlakke doorgesneden.
 A De klierige zelfstandigheyt der Nier.
 B De Pis-buysjes.
 C Het Bekken.
 cc Zijntakken of vliezige pijpjes.
 D De Pis-leyder ontrent het Bekken, daar hy dikker is, afgesneden.
De 4. Figuur vertoont de Blaas, de Pis-schagt, en Zaad-blaasjes met de Roede van agteren te zien.
 A a De Blaas.
 a Den buytensten Rok.
 A Den Spierigen Rok.
 B De afgesnede Pis-leyder.

C Het Zaad-dragende Vat afgesneden.

c De Zenuw.

D De Zaad-blaasjes.

E De Voorstaanders.

F De Pis-schagt.

GG De Zenuw-spongieuze lighamen der Roede.

H Het hoofd der Roede.

I De Pis-schagts verwydende Spier aan de regter zyde in haar natuurlijke plaats.

K De opregtende Spier der Roede.

*De 5. Figuur uyt den Heer de Graaf, ver-
toont*

A Een Hondsballe-

ken door 't zaad opgeswollen, en alleen met den witten Rok bekleed.

B De Vaten, die 't Opper-klootjen uyt-maken, door 't zaad opgeswollen.

C De Zaad-bereyden-
de Vaten, gelijke na-
de ballen loopen, bo-
ven afgesneden.

D Het Zaad-dragen-
de Vat, in een hond
gebonden, die tot de
verzamening bereyd
was, op dat de Vaat-
jes der Bystaanders te
meer zouden opzwel-
len.

Boven op de Roede loopen eenige groote Zenuwen S. die van de vlegtingen des Bekkens, en voornamel-
lijk van 't laatste paar der Wervelbeenderen voort ko-
men, welke zig door 't grootste deel van de dikke
dekselen der Zenuw-spongieuze lighamen versprey-
den.

De Ader loopt boven in 't midden der Roede, de
Zenuwen aan de zyden, en de Slag-aderen tusschen de
Ader en de Zenuwen.

Spieren
der Roe-
de.

De Roede heeft twee paar Spieren: 't eerste bb.
neemt zijn begin op elke zyde, aan 't inwendig deel
van een groot dik uytsteeksel van 't Heupe-been,
onder 't begin der Zenuw-spongieuze lighamen, en

Os Ischion.

eyn-

eyndigen in 't buytenste vlies der zelve. Deze dienen om de Roede op te regten.

De twee andere cc. nemen haar oorsprok van de ¹ Sluyt-spier des Aars, en zig met haar inwendige zyden t'samen voegende, loopen op de Pis-schagt, van agteren na voren, en eyndigen ontrent 't midden der Roede, aan de zyden der Pis-schagt. Deze dienen om de Pis-schagt, en de ² Voorstaanders te drukken, en om 't Zaad in de zelve komende, uyt te dryven. Zommigen zeggen datse dienen om de Pis-schagt te verwijden, en anderen tot opregting der Roede.

Aan 't bovenste deel der Roede, is een driehoekige band, voortkomende uyt de vereening der ³ Schaambeenderen, en zomtijds ook van 't onderste deel der witte linie, en eyndigt in 't buytenste eygen deksel der Roede. Die band dient om de Roede op te houden; dezelve slap nederhangende, verslapt die ook; maar opgeregt zijnde, is de zelve gespannen. Ziet dien band, in de XIII. Tafel, 4. Figuur B. en I. Figuur E.

1 Sphincter. 2 Prostatæ. 3 Ossa pubis.

UYTLEGGING

der

FIGUREN,

van de

DE RTIENDE TAFEL.

Waar in vertoont worden de Spieren
der Mannelijke Roede, van den Aars,
en eenige andere deelen.

*De 1. Figuur vertoont de
Pis-schagt, na de
lengte open gesneden.*

AA De Zenuw-spon-
gieuze lighamen.

BB De Pis-schagt o-
pen-gesneden.

CC Haar spongieuze
zelfstandigheyt.

D De Voorhuyd.

E Den opschortenden
band der Roede.

abc De groote openin-
gen in de Pis-schagt,
van welke in b twee
mondekens, en in c
drie gezien worden.

d De kleyne openin-
gen.

*De 2. Figuur vertoont een
deel der Roede, met
't hoofd van de gemee-
ne dekselen ontbloot,
opgeblazen, en ge-
droogt.*


AB 't Hoofd en den
hals met Kliertjes be-
zet.

CC De Zenuw-spon-
gieuze lighamen op-
geblazen.

D De holligheyt der
Pis-schagt.

E Haar spongieuze
zelfstandigheyt opge-
blazen.

a Den Cellekens-wy-
zen Rok van den
Heer



- | | |
|--|---|
| <p>Heer <i>Ruysch</i> opgeblazen.</p> <p><i>De 3. Figuur</i> vertoont de <i>Spieren der Roede en van den Aars.</i></p> <p>AA De Billen.</p> <p>B De Roede ontbloot van de gemeene dekfel.</p> <p>CC De Zenuw-spongieuze lighamen.</p> <p>D De Pis-schagt.</p> <p>a Den Band, waar door 't Zenuw-spongieuze lighaam aan het Schaam-been gehegt word.</p> <p>bb De opregtende Spieren der Roede.</p> | <p>cc De Spieren, die de Pis-schagt en de Voorstaanders drukken, en 't Zaad uyt-dryven.</p> <p>d De Aars-fluytende Spier.</p> <p>e Den Aars toegesloten.</p> <p><i>De 4. Figuur</i> vertoont een deel van een <i>Mensch op de zyde leggende.</i></p> <p>A Het agterste deel der Mannelijke Roede, ontbloot van de gemeene dekfel.</p> <p>B Den opschortenden band der Mannelijke Roede.</p> |
|--|---|

U Y T L E G G I N G

der

F I G U R E N ,

van de

VEERTIENDE TAFEL.

Waar in vertoont worden de zelve
Teel-deelen, die in de voorgaan-
de Tafel te zien zijn, op een an-
dere manier bereyd, uyt den
Heere de Graaf.

*De 1. Figuur vertoont een
Mensche-bal.*

A Den witten Rok
van voren geopent
en aan de zyden ge-
legt.

B De gesteltenis der
Zaad-vaatjes.

C De Zaad-vaatjes,
die door 't Vlies loo-
pen, 't welk aan den
rug der Bal vast is.

D De Zaad-vaatjes,
die den witten Rok
doorbooren, om een
deel van 't Opper-
klootjen of Bystaan-

der uyt te maken.

*De 2. Figuur vertoont
een Hond's - balleken
dwerssch door gesne-
den.*

A Het overig deel
van 't Balleken.

B De Zaad-vaatjes.

C Den wortel van 't
Opper-Balleken, of
Bystaander van *Hig-
morus*.





*De 3. Figuur vertoont het
Opper-klootjen los ge-
maakt,*

A Het Balleken.

B 't Begin van 't Op-
per-

Fig: 14.

Plat. 154.





per-klootjen.

CC De Vaatjes los gemaakt, die t' samen gevoegt zijnde, het Opper-klootjen uyt-maakten.

D Het Zaad-dragende Vat afgesneden.

De 4. Figuur vertoont de t' samen-komst der Zaad-dragende Vaten, benevens de Zaad-blaasjes, en hun in-planting in de Pis-schagt.

A De dikke zelfstandigheyt van 't Zaad-dragende Vat, in 't welk de holligheyt kleyn is.

B Het deel, 't welk meer uytgebreyd is.

C Zijn uyteynde, dat zig opent in den hals der Zaad-blaasjes.

D Het Vlies, waar door de Zaad-blaasjes t' samen-gehegt worden.

E De Zaad-blaasjes.

FF De Voorstaanders.

G De Pis-schagt open getneden.

H De mondekens der Zaad-blaasjes, die

open zijn in de Pis-schagt, en t' samen met het Kliertjen het Hanen-hoofd uyt-maken.

I Debuysjes der Voorstaanders, die zig in de Pis-schagt openen.

K De Vaten der Zaad-blaasjes.

De 5. Figuur vertoont de Roede volgens de lengte tot de Pis-schagt toe doorgesneden.

A Het hoofd der Roede.

B 't Begin van 't Zenuw-spongieuze lighaam.

C De Pis-schagt.

D Haar spongieuze zelfstandigheyt.

E Het Zenuw-spongieuus lighaam geopent.

ee De Slag-aderen, die door 't zelve loopen.

F Het Midden-schot der Roede.

De 6. Figuur vertoont de Roede dwerssch doorgesneden.

A De spongieuze zelfstandigheyt van 't Zenuw - spongieus lighaam.

a De Slag-ader.

B De Ader, die boven op de Roede loopt.

C De Pis-schagt.

De 7. Figuur vertoont de Roede volgens de lengte op de zyde geopent.

A Het hoofd der Roede.

B Het Bandeken.

C De spongieuze zelfstandigheyt van 't Zenuw - spongieus lighaam.

cc De Slag-ader, welke de zelfstandigheyt doorloopt.

D Het Midden-schot.

E De Pis-schagt.

HET XXII. HOOFDSTUK.

Van de Lijfmoeder, en haar Banden.

ALs men van de Vrouwelijke ¹ Teel-deelen wil handelen, is 't beter eerst van de Lijf-moeder te beginnen, om dat men die kennende, ligtelijk de plaats, 't maakfel, en 't gebruyk der andere Teel-deelen kan verstaan: want alle deze brengen eenige stofte tot de Lijf-moeder, of ontfangen iet van de zelve,

Wat de Lijf-moeder is. De Lijf-moeder is een deel eygen aan de Vrouwen, van binnen hol, leggende in den Onder-buyk tusschen den ² Endel-darm, en de Blaas 1. Fig. g G. en 2. Fig. A C.

Plaats. De holligheyt, waar in ze geplaatst is, word genaamt het Bekken, en is gemaakt van voren door 't Schaam-been; van agteren door 't Heylig-been, en ter zyden door 't Darm-, en Heupe-been.

Gedaante. In die niet bevrugt zijn, is de Lijf-moeder van een driehoekige gedaante, boven breed, en onder enger.

¹ Partes genitales. ² Rectum.

Het bovenste en breedste deel, word genaamt den ^{2. Figuur} grond A. 't onderste C. den hals, hoewel zommigen voor den hals nemen dat het Mannelijke lid ontfangt, 't welk de scheede is, B. 2. Fig. eenigen noemen 't eerste, den korten, en 't tweede, den langen hals.

De Lijf-moeder verandert dikwils van gedaante, ^{Groote} en groote; in onbevrupte, is ze gemeenlijk drie dwersche vingeren lang, van den bodem, tot den hals: de breedte des bodems is twee dwersche vingeren en een half, en de dikte ontrent twee dwersche vingeren, 't welk egter niet altoos zo is. In bevrugte, strektse zig zomtijds uyt, tot aan, en boven den Navel.

In onbevrupte is de holligheyt zeer kleyn, zo datse nauwlijks een groote boon kan omvangen. ^{Holligheyt.}

De Lijf-moeder C. gelijk te voren gezegt is, is drie- ^{XVII. Tafel, 3. Figuur.} hoekig van gedaante: twee hoeken heeft ze aan de monden der Trompetten B B. en een derden by haren hals D.

In den hals is de holligheyt langwerpig, en zeer ^{Inwendige mond.} eng, voornamelijk aan 't onderste deel, dat de inwendige mond genaamt word; in Maagden is die eng; in de bevrugte, als de baring aanstaande is, wat meer open, en zomtijds met een slymige stoffe gestopt.

Dezen hals der Lijf-moeder is omringt met een Sluyt-spier, eerst ontdekt door den Heer Professor Verheyen. Zie de 3. Fig. van de XVII. Tafel, EF.

Het onderste deel des hals, of omtreks van den mond, die in de holligheyt der scheede uyt steekt, is zeer wel 't hoofd der Mannelijke Roede gelijk, 2. Fig. F. en is van een vaste zelfstandigheyt, zo datse schijnt zig niet te kunnen uyt-rekken, hoewel ze in 't baren (dat een groot wonder is) zig zo uytspant, dat die enge mond doorgang aan de Vrugt geeft. ^{Wonderbare uytrekking.}

De Lijf-moeder bestaat uyt drie Vliezen; het buytenste is zeer dik, en kan in twee gescheyden worden; het komt van den Pens-zak, uytwendig is het Vlies glad en effen, inwendig ruw, de Lijf-moeder over al bekleedende, en hegt de zelve aan de Blaas, Endel-darm, en andere deelen. ^{Buytenste Vlies.}

Middenste
Vlies of
eygene
zelfstan-
digheyt
der Lijf-
moeder.

Het tweede of middenste, dat eenigen geen Vlies; maar de eyge zelfstandigheyt der Lijf-moeder noemen, is zeer dik, en vliezig, bestaande uyt dikke, sterke, en door malkander gevlogte Vezelen, en veel helpt tot 't uytbijven der Vrucht, en is in Maagden vast en digt, als ook in die gebaart hebben; maar in bevruchte kan ze in verscheide Vliezen gescheiden worden.

Binnenste
Vlies.

Het binnenste Vlies der Lijf-moeder is dun, zenuwagtig; en in den bodem effen, en glad; op welke plaats in de zwangere, de Moeder-koek van de Vrucht vast is; maar in den hals zeer gerimpelt, en met veel Kliertjes bezet D. die gedrukt zijnde, een slymig vogt uyt geven; waar door waarschijnlijk de inwendige mond in bevruchte gestopt word, gelijk te voren gezegt is.

XVII. Tafel, 3. Figuur.

Dit Vlies is voornamelijk tot 't gevoel, en steunsel der vleezige Vezelen van 't middenste Vlies, of eygene zelfstandigheyt der Lijf-moeder.

Verknogt-
heyt van
den hals
der Lijf-
moeder.
XV. Tafel,
2. Figuur.

Van onderen word den hals der Lijf-moeder vast verknogt met 't opperste deel der scheede; van agteren met den 1 Endel-darm H. van voren met de Blaas I. en de zyden zijn vast door vier banden aan eenige andere deelen; maar de bodem is vry en los, op dat hy, als 't noodig is, uytgebreyd, en ingetrokken kan worden.

Banden
der Lijf-
moeder.

Van vier banden, die'er zijn, worden twee de breedte, en de andere de ronde genaamt.

De breedte banden MM. zijn vliezig, komende van den 2 Pens-zak, vast aan de zyden der Lijf-moeder, en Scheede, om 't uytzinken der zelve te beletten, als ook om de Eyerneften, de Trompetten, en eenige Vaten t' ondersteunen; gemeenlijk worden ze by de vleugelen van een Vleermuys vergeleken, en daarom *Vleugel-wyze Banden* genaamt.

De ronde Banden KK. zijn roodagtig, en hebben hun begin boven aan de zyden der Lijf-moeder, daar de Trompetten met de zelve vereenigen, en zijn daar ook breed; maar van de Lijf-moeder schuyns af-

1 Rectum. 2 Peritonæum.

wij-

wijkende, worden ze allengskens finalder.

Die Banden dalen neder in de Vrouwen, gelijk de Zaad-vaten in de Mannen, tusschen de verdobbeling van den Pens-zak, en gaan uyt den Onder-buyk door de openingen van de Spieren des Buyks, gelijk de Zaad-vaten in de Mannen: en alzo 't inwendig Vlies des Pens-zaks op die plaats door 't uytwendig niet versterkt word, zo zijn de Vrouwen ook zo niet onderworpen scheursels, gelijk de Mannen; en tot in 't Vet ontrent de ² Kittelaar gekomen zijnde, verdwijnen ze.

Ze bestaan uyt twee Vliezen, en hebben van binnen alle beyde Vaten, als Aderen, Slag-aderen, Zenuwen, en Water-vaten.

Deze Banden dienen, om de Lijf-moeder van alle ^{Hun ge-}zyden gespannen te houden, voornamelijk in bevrug-^{bruyk.}te, in welke de bodem verre van den hals is afgeweken, op datse niet te zeer na d' een, of d' andere zyde zou vallen.

Als de breede Banden al te veel verslappen, zinkt de Lijf-moeder meer, of min nederwaarts, ja zomtijds buyten 't lighaam, (voornamelijk indien haar zelfstandigheyt, door wat oorzaak het mag wezen, verslapt is) gelijk ik over eenige jaren heb gezien in een Dogter oud ontrent 30. jaren, die lang een uyt-zinking van de Lijf-moeder had; den hals hong uyt de scheede, de lengte van twee dwersche vingers: de inwendige mond was zeer zichtbaar; ik brachtse in, en hieldse binnen door een Pessarium; dat naderhand van veel nut geweest is.

Van de Aderen, Slag-aderen, Zenuwen, en Water-vaten des Lijf-moeders, zal in 't XXVI. Hoofdstuk gehandelt worden.

De Lijf-moeder is om de Vrucht te bewaren, en te koesteren, en op zijn tijd uyt te drijven, de kraamzuyvering, en de maand-stonden uyt te laten, en de fijnste deelen van 't Zaad doorgang te geven.

Onder de oorzaken, die de Schrijvers by brengen, waarom een voldragen Vrucht de Lijf-moeder ver-

1 Peritonæum. 2 Clitoris.

laat, is de waarschijnlijkste, die den Heer *Drelincourt*, eertijds vermaard Hoog-leeraar in de Ontleed-kunde te Leyden, in 't tweede deel zijns Boeks, d' ontfanging genoemd, by gebragt heeft.

Dezen Heer is van gevoelen, dat, als de Darmen, met zo veel drek opgevult, en uytgerekt zijn, datse niet meer kunnen inlaten; de Vrugt dan (zo'er nog meer vuyligheyt by komt, en de Darmen meer uytrekken) min, of meer Buyk-pijn krijgt, en zig daarom meer, of min beweegt, en de Vliezen op de zwakste plaats doet breken, dat gemeenlijk regt tegen over den inwendigen mond der Lijf-moeder is, door 't voortgestoote water, dat volgens de groote der opening schiekelijk, of langzaam uyt loopt: de Vrugt dan Armen, en Beenen uytstekende, veroorzaakt pijn, waarom de Lijf-moeder, zig t' samen trekkende met hulpe der Buyk-spiere, en 't Midden rift, de Vrugt met geweld tragt uyt te drijven.

De Vrugt hier door pijn, en ongemak voelende, beweegt zig meer als te voren, en steekt Armen, en Beenen uyt: boven dien valtse met 't hoofd door de zwaarte nog meer na beneden: en dewijl ze tegen geen ander uytgang, als den ondersten, die voor haar staat, kan stooten, moetse daar noodzakelijk met 't hoofd in vallen, en dan zegt men dat 't kind in de geboorte staat, en zo gedurig geweld doende om uyt te komen, raaktse daar nog vorder in. De Lijf-moeder, en de Scheede, hier door nog meer geprikkelt zijnde, trachten door haar t' samentrekking de Vrugt uyt te drijven, en om dat ze van zig zelfs tragt uyt te komen, geschied dat zo veel te beter, als de Moeder op den zelve tijd, zo door 't Midden-rift, met een sterke inademing, als door t' samentrekking der Buyk-spiere, de Vrugt komt voort te persen.

En dewijl tot ontlasting van den Buyk noodig is, dat de Ingewanden door een sterke inademing, als andersints geperst worden, en de Vrugt in de Lijf-moeder niet ademt, zo mag men zeggen, datse voldragen zijnde, tragt uyt te komen om te ademen,

de.

dewijl ze de ademing nodig heeft , om de zwarte drek, die haar pijnlijk valt ; (en zo die langer in de Darmen bleef , schadelijk zou zijn) uyt te dryven.

Onder de onsteltenissen, die de Lijf-moeder, en Vrucht hebben, is, zo ik meen, geen wonderlijker, als die in 't jaar 1695. te Parijs gebeurt is.

Een Dogter 12 jaren oud, bedroeft zijnde om een Jongman, die ze zeer beminde, en haar verlaten had, kreeg de Geel-zugt, en quijnde eenige jaren ; maar kreeg eyndelijk een Vryer, waar van ze wel getroost wierd, en leefde in 't gezigt van haar Vrienden met groote wederhouding, als de buyk begon te zwellen. De Buuren merkten dat ze bevrucht was, waar door ze zo bevreesd wierd, en de hartstogten zo veel op 't lighaam vermogten, dat de Vrucht, volgens 't voornemen der Moeder, door een t'samenhang tot nu toe onbekent, met de Lijf-moeder vereenigt wierd. Die geweldige drift koste 't leven aan de Vrucht, en de gezondheid aan de Moeder : want 't water, dat den weg tot het baren van 't Kind moest maken, door 't verblijf bedervende, bedierf ook de Vrucht, waar door de Moeder waterzugtig wierd. De tijd van baring gekomen zijnde, bleef ze in den zelven staat, en vele maanden verliepen 'er zonder merkelijke verandering. Ze sleet zo zes of zeven jaren met groote droetheyt, in welken tijd de ziekte toenam, en zwol de buyk allengskens meer, en meer ; zo dat men was genoodzaakt, in de maand van July, tot d'operatie te komen ; als de Lijdster ontrent 25. jaren oud was. Monfr. *Prévôt*, aan wien de zorg der waterzugtige bevolen was, doorstak den buyk met den *troiscar*, op twee verscheide plaatsen ; maar de vellen van binnen, de openingen stoppende, waren oorzaak dat 'er niet uytquam, en de Lijdster niet verligt wierd.

Na eenigen tijd dede hy een derde doorstekking, laager als de twee voorgaande ; maar was verwondert, als hy met een etteragtig water, uyt zag komen vlokskens wol, hayr, roet, beentjes, en kleyne blaasjes ; en hy trok vele dagen na den anderen, diergelijke
din-

dingen uyt, in 't bywezen van verfcheyde perfoonen, die meenden dat ze betovert was. Eyndelijk ftierf ze, en 't lighaam wierd geopent door de Heeren *Devaux*, *Emmerez*, en *Duchefne*, welke bevonden, dat de Lijfmoeder, die zeer dik, en uytgezet was, 't grootfte deel des buyks befloeg, en vast gehegt tegen den Pens-zak was, waarom men in d'eerste doorstekingen, geen water kon uyttrekken: 't overige des buyks was vervult met een geel vogt: maar wat ze deden, om de lever, en milt te vinden, konden ze die niet gewaar worden om den vervaarlijken ftank.

De Lijfmoeder uyt 't lighaam genomen zijnde, heb ik in 't huys van *Monf. Prévôt* gezien, en was vier dwersche vingeren dik, meest over al vervult met een hardagtig vet: en men vond hier, en daar beenderen, hayr, als ook een gantsche rye tanden van 't opperfte kaakbeen.

H E T XXIII. H O O F D S T U K.

*Van de Ballekens of Eyerneften der Vrouwen,
en de Eyeren.*

XV. Tafel.
1. Figuur.
Ballekens
of Eyerneften.

An elke zijde der Lijfmoeder, ontrent twee vingeren breed van de zelve, legt in onbevugte, een rondagtig lighaam, 1. dat gemeenlijk de Vrouwelijke Ballekens, en van de hedendaagsche Ontleeders d'Eyerneften genaamt word.

Vast-hegging met de Lijfmoeder.

Aan de Lijfmoeder zijn ze vast door een sterken band, van zommigen qualijk voor 't zaad-dragende Vat genomen, als ook eenigsints door de Trompetten van *Fallopins*, en breede banden der Lijfmoeder: boven zijnze ook vast aan de Zaad-vaten, door middel des Penszaks, zo dat ze gelijk hangende, de zelve hoogte hebben met den bodem der Lijfmoeder; maar in befwangerde, is de bodem veel hooger, terwijl de Ballekens meer aan de zijden der Lijfmoeder naderen.

Plaats.

1 Peritonæum.

De

Getal.

jonge Dieren zijn ze alderkleynst ; in ouder grooter ; en ze worden zomtijds wel twintig in een Balleken gevonden , waar van yder in een kleyne holligheyt legt , en in welke zeer veel kleyne Adertjes en Slag-adertjes eyndigen , die het voedzel van 't Ey aanbrengen , en 't overtollige weg voeren.

De meeste hedendaagsche Ontleeders meenen , dat die Eyeren , in de by-een komst van Vrouw , en Man , door 't fijnste deel van 't Zaad bezwangert worden , en door de Trompetten in de Lijf-moeder gebragt zijnde , door 't aangebragte voedzel groeyen ; en dat van de inwendige zelfstandigheyt de Vrugt , en vande uytwendige de Nageboorte voortkomt ; 't welk zy met ondervindingen , en redenen bevestigen.

Men heeft in 't openen van Vrouwen zomtijds gevonden , dat een van die Ballekens of Eyerneften zo groot was , als een kaatsbal , of vuyst , vol slijmig , groen , of geel water , en zomtijds hayr. Zommige zijn vleezig , en andere zo groot , dat ze negen pond water hadden. Zomtijds vind men in die Eyeren steentjes , roet , en diergelijke dingen.

In de Gedenkschriften der Koninglijke Academie der Wetenschappen te Parijs van 't Jaar 1701. is een Aanmerking van de Heer *Littre* , die een Vrugt gevonden heeft in het regter Eyerest.

HET XXIV. HOOFDSTUK.

Van de Trompetten der Lijfmoeder.

Trompet-
ten der
Lijf-moe-
der.
XV. Tafel,
1. Figuur.
Plaats, en
getal.

DE Trompetten zo genaamt , om de gelijkenis , die ze hebben , met een Oorlogs-Trompet , zijn ontdekt door *Fallopins M.*

Ze zijn twee , aan elke zijde der Lijf-moeder , aan welkers opperste en zydelijk deel , zy met een eng begin voort-komen , en voort-gaande , worden ze allengskens wijder , zo dat ze ontrent aan 't ander eynde , zo wijd als een schrijfpennet , en wat omgekromt worden ; maar aan 't eynde zelf , worden ze weder

en

enger, waar in men nogtans een tamelijke groote priem kan inbrengen.

In onbevruigte leggen ze by na in eene hoogte met den bodem der Lijf-moeder, en veranderen ligt van plaats, om datse zeer beweeglijk zijn: dikwils leggen ze op de Eyernesten, dat haar natuurlijke plaats schijnt te wezen.

Het dikste uyteynde dezer deelen, is in verscheyde stukken gekloven, en gelijkt zeer wel na 't gemaakte Loofwerk N.

De Trompetten der Lijf-moeder zijn by na in haar uytgestrektheyt vast aan den breedten band, die gemeenlijk gefronst is; maar na beneden uytgerekt zijnde, leggen ze ontrent een dwerschen vinger van de Ballekens. xv. Tafel, 1. Figuur. Vast-hegting.

Haar lengte is zes, of zeven dwersche vingers, en zomtijds wel agt, of negen. Lengte der Trompetten.

Ze bestaan uyt twee Vliezen, welker buytenste komt van den ¹ Pens-zak, en 't binnenste, dat in de Trompetten zeer gefronst is, komt van de Lijf-moeder, ontrent welke het dikker is; maar aan 't breedste uyteynde is 't dunder, en in 't geklove deel zijn ze zo vereenigt, datse van malkander niet wel zijn te scheyden. Zelfstandigheyt.

In de inwendige oppervlakte, zijn zeer veel kleine gaatjes, die over een komen met zo veel Kliertjes, leggende aan de uytwendige oppervlakte.

De Trompetten zijn om 't fijnste, of vlugste deel van 't Zaad, naar de Eyernesten te voeren, en 't ey daar door bezwangert zijnde, na de Lijf-moeder te brengen. Gebruik.

't Gebeurt zomtijds, dat 't ey door 't fijnste deel van 't Zaad bezwangert zijnde, niet wel door 't Trompet ontfangen word, om in de Lijf-moeder te komen; maar dat het in de holligheyt des Buyks vast blijft; zo dat de Moeder-koek aan eenige deelen vast rakende, daar voedsel voor 't Kind krijgt, waar door 't tot zijn volkome rijpheyte raakt: waar van een voor-

beeld is by Monfr. *Courtial*, in zijn nieuwe Ontleedkundige aanmerkingen op de Beenderen.

Ook gebeurt het, dat 't ey ontfangen in 't Trompet, daar blijft, en de Vrugt daar aan groeyt, waar van verscheide voorbeelden zijn by geloofwaardige Schrijvers, en voornamelijk in de Gedenk-schriften van de Koninglijke Academie der Wetenschappen te Parijs, van 't jaar 1702. Ook heeft men dikwils Kinderen gezien, leggende in de holligheyt des Buyks, die door 't Trompet uytgebroken zijnde, de dood aan de Moeder in weynig tijd veroorzaakt hebben.

Het Kind van *Toulouse*, dat 25. jaren van de Moeder was gedragen, en in de holligheyt des Buyks lag, was uyt de Lijf-moeder geraakt door een opening, die 't gemaakt had in den bodem, en die was toegegroeyt met een weeragtig lighaam, als een schelp.

H E T X X V. H O O F D S T U K.

Van de Scheede der Lijf-moeder.

Scheede.

DE Scheede, in 't Latijn *Vagina*, is dat vliezig kanaal, 't welk zig uytstrekt van des Lijfmoeders mond, tot de uysterlijke Schamelheyt, waar in de Mannelijke Roede ontfangen word C. 2. Fig.

XV. Tafel.
Gedaante.

Haar gedaante is langwerpig rond, zo datse zig op alle wyze, naar 't Mannelijk lid kan voegen; en kan ten tijde van 't baren zeer uytgerekt, en verwijd worden; maar als'er niets doorgaat, vallen de zyden t'famen, en ze is dan als een flappe Darm.

Plaats.

Ze legt in 't onderste des Buyks, onder de ¹ Schaambeenderen; in haar agterste deel is ze vast aan den ² Endel-darm; en door het voorste deel met de Blaas, zo dat men zou zeggen, dat die deelen, daar ze aan malkander vast zijn, t'famen maar een Vlies maken; waar van het geschied, dat door d'operatie,

1 Ossa pubis. 2 Rectum.

in

in een zware baring, die deelen gefcheurt, doorboord, of in 't vervolg door een zweer doorgegeven worden, de drek, of pis, van het een deel, tot het ander over gaat, zonder dat de Vrouw het kan beletten.

De Scheede in Vrouwen, die geen Kinderen gehad hebben, is ontrent vier dwersche vingeren lang, en een en half breed; maar in die gebaart hebben, kan men de groote niet wel bepalen.

De inwendige zelfstandigheyt der Scheede, schijnt zenuwagtig te wezen, waarom ze zeer gevoelig is; maar d'uytwendige Vliezen zijn voos, of spongieus, en bezet met veel vleezige Vezelen, die volgens haar lengte loopen.

Het gebeurt zomtijds naar een zware baring door een zweer, dat de inwendige zyden der Scheede aan malkanderen groeyen, ook door misflag des Heelmeesters, die de zyden in 't verbinden, om dit te beletten, niet genoeg van malkander houd; gelijk ook gebeurt aan de vingeren, zo dat men genoodzaakt is, de zelve van een te fcheyden, en verders na de konst te genezen.

't Inwendig Vlies der Scheede word zomtijds door zekere vogten zo uytgezet, dat het verre buyten de Schamelheyt uytzinkt, en van de Ouden voor de Lijf-moeder is genomen geweest. Zie de tweede Historische Aanmerking van *Hendrik van Roonbuijze*, en 't eenenvijftigste Hoofdstuk der Heel- en Geneeskonstige Aanmerkingen van *Job van Meekeren*.

Haar opening staat by na in 't midden der Schamelheyt, nogtans een weynig meer na agteren, en is in jonge Maagden veel enger, als de Scheede zelf q. 1. Fig.

Als men den ingang der Scheede verwijdt, vertoont zig d' inwendige zelfstandigheyt zeer gerimpelt, en dat dikwils van voren, daar de Pis-schagt op legt, als van agteren, en altijd meer in 't onderste deel F. als in 't bovenste.

Door het veel by een komen, en 't dikwils baren, verdwijnen die rimpelen, zo dat de Scheede inwendig

dig effen, en glad word. Deze rimpelen dienen, op dat de Scheede zig beter zou kunnen uytbreyden.

In de Scheede zijn vele kleyne gaatjes, die aan 't onderste deel, daar de opening der Pis-schagt L. is, aldergrootst zijn. Waar uyt gedurig, ten minsten in 't bloeyen der jaren, een lymig vogt uyt vloeyt, om die deelen te bevogtigen. In 't Venus-werk, en door onzuyvere gedagten, loopt het buyten de Schamelheyt, en word gemeenlijk, maar qualijk voor 't Vrouwelijk zaad genomen: die gaatjes zijn waarschiynelijk zo veel mondekens der uytloozende Buysjes van de Kliertjes HH., die dieper gelegen zijn.

De Scheede heeft ook een Sluyt-spier, geplaatst onder de Kittelaar, voort komende van die des Endel-darms, zijnde wel drie vingeren breed, en aan haar zyden opklimmende, omvangt de Scheede, en dient om ze te sluyten, voornamelijk na de verzaming, op dat de uytwendige lugt niet zou indringen en 't zaad of de deelen beschadigen.

Behalven die Spieren, helpen niet weynig de lighamen, die in 't onderste deel der Scheede, ontrent de lippen gezien worden: ze klimmen beyde van onderen op tot de Vliezige zelfstandigheyt, door welke de Kittelaar aan de naast gelegene deelen vast is, en verdwijnen zo: haar uyterlijke zelfstandigheyt is zeer dun en vliezig; maar de binnenste bestaat uyt veelderley Vaatjes en Vezelen, die met malkander losjes verknogt zijn; en dewijl dit maaksel zeer gelijk een Net is, word het van de *Graaf Plexus Retiformis*, of Net-wyze vlegting genaamt, en is, om den mond der Scheede te verengen, en de Roede beter te omvangen.

Vleezige
Verhe-
venthe-
den.

Verscheyde oude Ontleeders stellen aan den ingang der Scheede, vier vleezige Verheventheden, hoewel 't getal onzeker is; die ze in 't Latijn *Caruncula Myrtiformes*, of Mirtys-bezie gelijkende Vleezigheden noemen, die volgens de Hedendaagsche, niet anders zijn als zekere rimpelen, of verhevent-

1 Clitoris.

he-

heden van 't binnenste Vlies der Scheede, deze zijn rood, en vast in Maagden, in welk ze met haar zydelijke deelen, door eenige Vliesjes zeer nauw vereenigt zijn: en 't is in die vernauwing des ingangs van de Scheede, dat de Maagdom bestaat; zo dat in de eerste t' famen-komst, die Vliesjes gemeenlijk breken, waar uyt dan pijn, en Bloedstorting volgt; maar in Vrouwen, die gebaart hebben, of in die, daar ze in de eerste t' famen-komst gebroken worden, zijn ze van malkander gescheiden, om dat de Vliesjes, waar door ze vereenigt waren, gebroken zijnde, niet meer t' famen vereenigen.

Nu is de vraag, of de Vrouwen d'eerste maal by den Man slapende, pijn gevoelen en bloed storten? waar op neen geantwoord wert: want 't kan gebeuren, dat de Vliesjes, die de vleezige Verheventheden zeer nauw vereenigen, weg geknaagt, of door een val, slag, uytzinking der Lijf-moeder gebroken worden: of dat het Mannelijk lid zeer kleyn, en den weg om de groote, en ouderdom der Maagt, natuurlijk wijd kan wezen: 't welk ook kan geschieden, om dat de maandstonden weynig te voren gevloeyt hebben; waar door de deelen verflapt zijnde, zonder scheuren kunnen verwijden, of uytrekken.

Zo dat in zo een voorval geschiedt, 't gene *Plempius* zegt: dat een Maagt door 't byslapen kan ontfangen, zonder haar Maagdom te verliezen, en zonder wonderwerk Maagt, en Moeder is, zo 't kind in haar leven uytgesneden word; maar dit moet van de Lighamelijke, en niet van de Geestelijke Maagdom verstaan worden: waar uyt blijkt, dat men niet moet denken, dat de Bruyd geen Maagt is, schoon den ingang zo gemakkelijk, zonder pijn, en Bloedstorting toegaat.

Die vleezige Verheventheden, of *Carunculae Myrtiformes*, zijn zomtijds door een sterke Vlies zo nauw vereenigt, dat ze niet van een kunnen wyken, en dan is'er maar een kleyne opening in 't midden; waar door de maandstonden vloeyen, en de Roede niet kan ingaan: of ze zijn zo vereenigt, dat d'opening

t'eenemaal gefloten is; zo dat'er niet kan ingaan, of uyt komen: die twee beletsels worden niet geholpen als door 't hand-werk: 't eerste met de kleyne opening kruys-wijs, gelijk de Letter X. te vergrooten, en 't andere met een eenige langwerpige opening te maken; gelijk *Aquapendens* dede in een Dogter, om uytgang te geven aan de maandstonden, die door 't voorgemelde Vlies wederhouden wierden.

HET XXVI. HOOFDSTUK.

Van de Bloed-vaten, Zenuwen, en Water-vaten der Lijf-moeder, &c.

Bovenste
Aderen,
en Slag-
aderen.
XV. Tafel.
J. Figuur.

DE Lijf-moeder met haar deelen zo beschreven, heeft Aderen, en Slag-aderen, die de bovenste en onderste genaamt worden: de eerste zijn de Zaad-vaten, voort komende op de zelve plaats, gelijk in de Mannen, uyt de nederdalende groote Slag-ader, en de holle Ader O. en gaan, om dat de Vrouwelijke Teel-deelen zo laag niet leggen, als der Mannen, door een korter weg tot de zelve: boven dien, gaan meerder en grooter takken tot de Lijf-moeder; maar minder, en kleynder tot de ballekens, en de Trompetten van *Fallopins*.

Onderste.

De onderste Aderen, en Slag-aderen der Lijf-moeder, zijn takken van de Onder-buyks-vaten, en die der Speen-vaten. De eerste zijn groot, en loopen met veel kronkelingen aan elken kant, eerst door de zyden der Scheede P. en dan naar onderen, naar boven, en voorwaarts, en agterwaarts, door de Lijf-moeder, en Scheede, gelijk ook doen de Zaad-vaten. De tweede of de Speen-vaten zijn weynig, en verspreyden zig alleen in 't onderste deel der Scheede, als te vooren in 't IV. Hoofdstuk, van de I. Verhandeling is gezegt, dat de Slag-aderen door vele inmondingen met de Slag-aderen, en de Aderen met Aderen vereenigen; het geen men zien kan, als men met bequame werk-tuygen in de zelve blaast, of 'er vogt in spuyl.

Inmon-
dingen of
Anatto-
moses.

De

Deze Vaten dienen om 't voedsel aan te brengen, en de Kittelaar, als 't nodig is, te doen opzwellen.

De Kittelaar maakt de slapende Venus wakker; want haar hoofd is zo gevoelig, dat het niet kwalijk een liefde-appel genaamt word.

De Nymphen zo genaamt, om dat ze alstwee Wa-Nym-
ter-godinnen, 't water uytleyden, zijn twee zagte, phen.
roode, spongieuze lighamen, leggende tusschen de
Lippen, een aan elke zijde t t, en 4. Fig. C.

Deze schijnen aan 't bovenste van 't hoofd der Kittelaar voort te komen, en zo ter zijden van d' opening xv. Tafel, 1. Fig. der Pis-schagt, tot ontrent 't midden van den ingang der Scheede nederdalende, verdwijnen ze allengskens. guur.

Ze zijn van een driehoekige gedaante: haar groote is niet altijd even eens, de eene is zomtijds grooter, als de andere: in Maagden zijn ze zelden breeder als een dwersche vinger, en zwellen ook op gelijk de Kittelaar. Gedaante.

Aderen en Slag-aderen krijgen ze van de Schaamvaten, en Zenuwen van de tusschen-ribbige.

De Nymphen zijn, op dat zig 't water niet te veel Dienst.) ter zijden zou verspreyden, als ook tot grooter lust, en vermaak in de by een komst, en om de inwendige deelen van koude te beschermen.

Die deelen groeyen zomtijds zo groot, dat ze verre buyten de Lippen uyt hangen, zo dat een Heelmeester ze zomtijds moet af snijden; 't welk met een welsnijdende schaar kan gedaan worden. Ziet een voorbeeld hier van, by *Monf. Mauriceau*, in zijn 174^{ste} Aanmerking.

Tusschen de Nymphen, ontrent 't midden der Spleet, xv. Tafel, 1. Fig. is de ingang der Scheede q: in jonge Maagdekens is hy zeer eng; maar niet zo eng in die dikwils haar maandstonden gehad hebben: in die byslapen is hy wijd, en nog wijder in die gebaart hebben. guur.

't Is nu eenige jaren geleden, dat ik een Dogter ontleede op onze Snykamer, oud 24 jaren, in welke voor den ingang der Scheede, regt in 't midden, een vleezig ligament, of band was, wat breeder als

1 Clitoris.

. een

een stroo ; welkers een uyt-eynde onmiddelijk vast was onder de opening der Pis-schagt , en 't andere aan'tonderste deel van den ingang der Scheede , dat na den Aars legt.

Een weynig boven den ingang der Scheede , ver-
toont zig de opening der Pis-schagt u. en in de 3.
Fig. L.

Men vind van buyten rond-om de Pis-schagt , een wit klierig lighaam , ontrent een dwerschen vinger breed , waar uyt eenige Buyskens voort komen , die onderwaarts in 't begin der Pis-schagt , en aan 't voorste deel der Scheede , met zijn mondekens H. **Fig. L.** eyndigen , uyt welke een lymig vogt zypert , gelijk in 't XXV. Hoofdstuk van deze Verhandeling gezegt is , om de naburige deelen te bevogtigen.

In dit Klierig lighaam is de Zit-plaats van de *Druypert* in Vrouwen.

Deze uytwendige deelen ontfangen hun Bloed -va-
ten van de Schaam-ader , en Slag-ader.

UYT.



U Y T L E G G I N G

der

F I G U R E N ,

van de

VIJFTIENDE TAFEL.

Waar in vertoont worden de Vrouwelijke Teel - deelen.

- | | |
|--|---|
| <p><i>De 1. Figuur vertoont de Vrouwelijke Teel-deelen, zo als ze uyt het Lighaam genomen zijn, nog aan een hangende, uyt de Graaf.</i></p> <p>A De holle Ader.</p> <p>B De groote nederdalende Slag-ader.</p> <p>C De Nier-ader en Slag-ader.</p> <p>D De Nier.</p> <p>E De Pis-leyder afgesneden voor een deel.</p> <p>F De Heup-vaten.</p> <p>g Den bodem der Lijf-moeder.</p> <p>G De plaats van den hals der Lijf-moeder.</p> | <p>H Den Endel - darm afgebonden.</p> <p>I De Blaas.</p> <p>K De ronde banden der Lijf-moeder.</p> <p>m De breede Banden der Lijf-moeder.</p> <p>L 't Eyer-nest.</p> <p>M De Trompetten van <i>Fallopious</i>.</p> <p>N Het geklove deel, of Loof - werk der Trompetten.</p> <p>O De Zaad-slag-aderen en Aderen.</p> <p>P Aderen en Slag-aderen der Lijf-moeder, komende van de Onder-buyks Vaten.</p> <p>q Den ingang der Scheede.</p> |
|--|---|

rr De Lippen der
Schamelheyt.

f De Kittelaar.

tt De Nymphen van
voren gezien.

u De opening der Pis-
schagt.

*De 2. Figuur vertoont
de Lijf-moeder ont-
bloot van meest alle de
andere deelen.*

A Den bodem der Lijf-
moeder.

B Den Hals.

C De Scheede.

D Den ingang der
Scheede.

E De Water - vaten
hier by gevoegt, zo
als die in Beesten ge-
gezien worden.

*De 3. Figuur vertoont de
Scheede open gesneden.*

A De Lijf-moeder.

B Trompetten van
Fallopis ten deele af-
gesneden.

C De breede Banden.

D De Vaten der Lijf-
moeder.

E Den mond van den

Hals, uytstekende in
de Scheede.

F De rimpelen in de
Scheede.

G De dikte van 't on-
derste deel der Schee-
de.

H De mondekens der
Buyskens, voortko-
mende uyt het Klier-
agtig lighaam der Pis-
schagt.

I De Kittelaar.

K Aanmerkelijke Ze-
nuwen, die door den
rug der Kittelaar loo-
pen.

L De opening der Pis-
schagt.

*De 4. Figuur vertoont
de Kittelaar, en de
Nymphen.*

A De Beenen der Kit-
telaar.

a Haar Lighaam.

B De Spier der Kit-
telaar aan een zyde.

C De Nymphen.

D De Vaten der Kit-
telaar.



U Y T L E G G I N G

der

F I G U R E N ,

van de

ZESTIENDE TAFEL.

Waar in vertoont worden de Vrouwelijke Teel-deelen, by na gelijk in de voorgaande Tafel, benevens eenige andere dingen tot dezelve behoorende.

<i>De 1. Figuur vertoont de Lijf-moeder van een Vrijster.</i>	voortkomende van de Nier-ader.
AA De onderste holle Ader.	GG De Zaad-flag-aderen.
BB De groote nederdalende Slag-ader.	HH De Heup-aderen en Slag-aderen.
CC De Nier-aderen en Slag-aderen.	I Den bodem der Lijf-moeder.
D De linker Nier, wordende de regter nauwlijks gezien.	K Den Hals der Lijf-moeder.
E De Zaad-ader voortkomende uyt den tronk der holle Ader.	L De Scheede.
F De Zaad - ader	M De Blaas neergedrukt.
	N De Eyer-nesten.
	OO De Trompetten van Fallopius.

99 Het geklove deel,
of Loof-werk der
zelve.

O De verengde hol-
ligheyt.

PP De Bloed-vaten
voortkomende van de
inwendige Heup-va-
ten.

QQ De ronde Banden
der Lijf-moeder.

RR De Lippen der
Schamelheyt buyten-
waarts open gelegd.

S De Kittelaar.

T De opening der
Pis-schagt.

tt De Nymphen.

V Den ingang der
Scheede.

*De 2. Figuur vertoont een
Vrouwe-Balleken, of*

*Eyer-nest, in 't on-
derste deel geopent uyt
de Graaf.*

A Den band van 't
Balleken, waar door
't aan de Lijf-moe-
der vast was, afge-
sneden.

BB De Eyeren, zo als
die in de Ballekens
gezien worden.

CC De Bloed-vaten,
zo als die na de Eye-
ren loopen.

*De 3. Figuur vertoont
de Nymph van een
Vrouw met haar Klie-
ren uyt de Figuren van
den Heer Morgagnus.*

ee De roetagtige Klie-
ren.

UYT.



R.B. Fecit

U Y T L E G G I N G

der

F I G U R E N ,

van de

ZEVENTIENDE TAFEL.

Waar in vertoont worden de rimpelen en klieren der Scheede, als ook de Sluyt-spier van den hals der Lijf-moeder, de natuurlijke holligheyt, en groote der Lijf-moeder van een houwbare Maagt, benevens meer andere merkwaardige zaken.

De 1. en 2. Figuur vertoont het voorwerp minder als 't natuurlijk is.

De 1. Figuur vertoont de Lijf-moeder van een houwbare Maagt, ontbloot van de aanhangende deelen, zo als ze van voren word gezien.

A Den bodem der Lijf-moeder.

B De plaats van den hals der Lijf-moeder.

C De Scheede.

DD De Trompetten ontrent de Lijf-moeder afgesneden.

EE De ronde banden der Lijf-moeder.

F De opening, daar de Blaas is afgesneden.

GG De Lippen der Schamelheyt na buyten omgeslagen.

H Den ingang der Scheede.

I De Kittelaar met de M daar

daar aan hangende
Nymphen.

K De Voorhuyd der
Kittelaar.

L De opening der Pis-
schagt.

*De 2. Figuur vertoont de
Lijf-moeder, en Schee-
de volgens de lengte
open gesneden.*

A Den bodem der
Lijf-moeder.

B Den Hals.

CC De Trompetten
ontrent de Lijf-moe-
der afgesneden.

D Eenige Vaten der
Lijf-moeder.

EE De Scheede vol-
gens de lengte door-
gesneden, en omge-
flagen.

F Den inwendigen
mond der Lijf-moe-
der.

GG Rimpelen in de
inwendige opper-
vlakte der Scheede.

H Klieren in de zel-
ve opper-vlakte.

I De opening der Pis-
schagt.

L De mondekens der
Buysjes, die daar ge-

vonden worden.

MNOP Verscheyde
soorten van rimpelen,
zo als ze in deze
Scheede gezien wier-
den.

*De 3. Figuur vertoont de
Lijf-moeder van een
bouwbare Maagt met
den bals, zijnde de
Scheede weg-genomen,
en van boven na bene-
den in 't midden door-
gesneden, op dat d' in-
wendige zelfstandig-
heyt, de holligheyt, en
spierige Vezelen, in
haar natuurlijke groo-
te zouden gezien wor-
den.*

A De inwendige zelf-
standigheyt der Lijf-
moeder.

B De Trompetten on-
trent de Lijf-moeder
afgesneden, in wel-
ker eenige priemkens
zijn gesteken, om
te toonen dat ze open
zijn in de holligheyt
der Lijf-moeder.

C De holligheyt der
Lijf-moeder.

D Klieren gelegen aan
't on-

't onderſte deel der holligheyt.

E De toetrekken-
de Vezelen van den hals,
zo als men ze ziet in
't agterſte deel.

F Een bondelken toe-
fluytende Vezelen,
zijnde de overige
weg-genomen, op
dat men den ingang
zou zien.

G De in 't lang een
weynig ſchuyns loo-
pende Vezelen.

I De natuurlijke hol-
ligheyt van den Hals,
waar door de Vrugt
in 't baren moet gaan.

*De 4. Figuur vertoont een
der beenen van de Kit-
telaar doorgesneden, op
dat gezien zou worden*

AB De Zenuw-ſpon-
gieuze zelfſtandigheyt
van 't Been, in welk
geen tuſſchen-ſcheyd-
ſel is.

*De 5. Figuur vertoont de
Schamelheyt van een
nieuw-gebore Kind.*

a Den ingang der
Scheede.

bb Vliezige rimpelen,
ſtaande rondom den
ingang der Scheede.

c De opening der Pis-
ſchagt.

dd De Lippen open
gelegt.

e De Kittelaar met de
daar aan hangende
Nymphen.

*De 6. Figuur vertoont het
dikſte deel van 't Trom-
pet geopent, op dat zou-
den gezien worden*

A De binnenſte Rim-
pelen.

*De 7. Figuur vertoont het
voorſte deel der Kitte-
laar met de Nymphen.*

A Het lighaam der
Kittelaar.

B De Zenuw-ſpon-
gieuze zelfſtandig-
heyt der Kittelaar,
in 't midden door een
Midden-ſchot ge-
ſcheyden.

C Het hoofd der Kit-
telaar.

DD De Nymphen,
die hier ten opſigt van
de Kittelaar kleynder
zijn als gewoonlijk.

DE DERDE VERHANDELING

D E R

HEELKONSTIGE ONTLEDING

VAN 'S MENSCHEN LIGHAAM.

V A N D E D E E L E N
D E R B O R S T .

HET I. HOOFDSTUK.

Van de Borst , en haar deelen.

TE voren is in de Inleyding gezegt , dat de middenste Buyk een holligheyt is , die zig uytstrekt van de Sleutel-beenderen tot 't ¹ Midden-rift, waar in 't Hart, met 't Harte-zakjen, de Long , 't ² Midden-schot , een deel van den ³ Slok-darm, en ⁴ Longe-pijp , met hun Vaten zijn befloten.

De Borst is van boven bepaalt door de ⁵ Sleutel-beenderen, van onderen door 't Midden-rift, van voren met 't Borst-been, aan de zyden met de Ribben, en van agteren door de Wervel-beenderen des Rugs.

Het voorste deel , dat in zommige Menschen met hayr bedekt is, word de *Borst*, en 't agterste de *Rug* genaamt.

De holligheyt der Borst is langwerpig, of by na van een eywyze gedaante, wegens 't Midden-rift, dat schuyns gelegen, en van agteren veel laager is, als van voren.

De holligheyt der Borst word verdeelt in een reg-

¹ Diaphragma. ² Mediastinum. ³ OEsophagus. ⁴ Aspera arteria. ⁵ Clavicula.

Hollig-
heyt der
Borst.

Gedaante.

ter, en linker deel, door 't Midden-schor, van welk in 't IV. Hoofdstuk zal gesproken worden.

De deelen der Borst worden afgescheyden in houdende, en gehoudene deelen, waar van eenige gemeene, en andere aan de Borst eygen zijn, gelijk in 't I. Hoofdstuk, in de II. Verhandeling gezegt is.

Haare
Deelen.

De gehoudene deelen zijn te voren genoemd. De gemeene houdende deelen, zijn hier de zelve, gelijk in de andere deelen van 't Lighaam: de Opper-huyd, de Huyd, en 't Vet, van welke in 't I. en II. Hoofdstuk der voorgemelde Verhandeling is gesproken.

De eygene houdende deelen der Borst, zijn de Mammen, Spieren, en Beenderen, die inwendig met 't Ribbe-vlies bekleed zijn.

De gehoudene deelen der Borst dienen tot de bloed-making, en om het bloed tot al de deelen van 't Lighaam te verzenden, gelijk uyt de beschrijving van 't Hart, en Longen zal blyken.

HET II. HOOFDSTUK.

Van de Mammen.

ONder de eygene houdende deelen der Borst, ver-
toonen zig eerst de Mammen, die by na aan de Vrouwen eygen zijn.

De Mammen zijn zekere verheventheden, uytstekingende op de Borst der Vrouwen, om de melk af te scheyden, en tot voedsel van 't kind te bewaren, A. Beschrijving der Mammen.

I. Fig. XVIII. Tafel.

Het getal, de plaats, en gedaante der Mammen, zijn zo bekend, datse geen beschrijving noodig hebben.

Haar groote is verscheyden volgens de jaren: want de jonge Dogterkens hebben'er nog geene; maar groeyen allengskens aan, zo datse zig op haar veertiende jaar vertooncn, wanneer ze hard, en vast zijn,

1 Membrana pleura.

en grooter worden volgens den ouderdom: ontrent de vijftig jaren verslensse ze, en hoe de Vrouwen ouder worden, hoe ze slapper worden, zo dat'er niet als 't vel overblijft.

De Mammen hebben een zeker langwerpig deel, dat ontrent 't midden uytsteekt, en de *Tepel* genaamt word a. die in Vrijsters kleyn, en rood-verwig, in bevrugte, en zuygende groter, en lood-verwig, maar in verouderde zwartagtig is.

Gevoel.

De *Tepel* is door vele Zenuwen, die'er in loopen, van een zeer scherp gevoel, zo dat 't zuigen van de kinderen, de Voedsters zeer aangenaam is.

Zy is tot uytlating van de melk doorboort met veel kleyne gaatjes, dat de uyt-cynden zijn der Melk-buysjes, die'er in eyndigen.

Rondom de *Tepel* is een ring, die in 't Latijn *Areola* geheten word. De huyd is op deze plaats teer; in Vrijsters is ze bleek; in bevrugte, en zuygende bruynagtig, en in oude Wijven zwart.

Een weynig van de *Tepel* afgelegen is een andere ring, bestaande uyt zekere kleyne knobbeltjes, die in verscheyde voorwerpen verscheyden, en doorgaans grooter als een Kennip-zaad zijn. De zelve gedrukt zijnde, vloeyt'er weyagtig vogt uyt. Ziet die knobbeltjes eenigfints afgebeeld ontrent de *Tepel* b

XVIII. Tafel, 1. Figuur.

Zelfstandigheyt der Mammen.

Aderen, en Slag-aderen.

De Mammen bestaan uyt vele Klieren, Vaten, en Ver.

De Klieren verschillen veel in groote; in die in 't bloeyen van haar jaren zijn, zijn ze zuiver wit, en in den ouderdom worden ze geelagtig.

Aderen, en Slag-aderen krijgen de Mammen van de Onder-sleutel-been-vaten, *Mam-vaten* genaamt: deze aan elke zyden van 't Borst-been nederdalende, komen na buyten, regt tegen over de Mammen, waar by nog eenige van de Tusschen-ribbige, Borst-, en Opper-buyks-vaten c. zig voegen.

Zenuwen.

Zenuwen krijgen ze van 't vijfde paar des Rugmergs, zo van de vlegting gelegen ontrent de Sleutelbeenderen, en mogelijk nog van andere, welkers gebruyk uyt 't geene in 't VI. Hoofdstuk van de I.

Ver-

Verhandeling gezegt is, klaarlijk kan verstaan worden.

Behalvén deze Vaten, zijn in de Mammen vaten, die ze *Melk-buysjes* noemen, en niet alleen dienen, om de Klieren van de melk t' ontlasten; maar ook als'er niet gezogen word, om ze in zeker hoe veel-heyte te vergaderen bb. 2. Fig.

Die Buysjes beginnen met vele kleyne takjes van XVIII. de Klieren der Mammen, en allengskens t' samen komende, maken ze dikker Buyzen, die op zommige plaatsen zo wijd, als Cellekens, en op andere weder enger zijn: in de Tepel, daar ze met hun mondekens eyndigen, zijn ze zeer eng, op dat 't zog, zonder zuynen, tot groot nadeel van 't kind, niet gedurig zou uytvloeyen. Tafel.

Den Heer *Nuk* merkt aan, dat, eer die Buysjes Vereening aan de Tepel komen, ze op verscheide plaatsen, der Buysjes door vele inmondigen, met malkander vereenigen, op dat de afgekleynsde melk, door eenige Buysjes (verstopt zijnde) niet konnende gaan, door andere zyde wegen, na de Tepel zou kunnen vloeyen aa. 4. Fig.

Deze Buysjes in de Tepel t' samen komende, maken een groot deel der zelve, en op datse malkander niet te zeer zouden drukken, legt'er op verscheide plaatsen een Klierige zelfstandigheyt tusschen; waar by ook ontelbare Vezelen komen, die aan de uytwendige deksels vast zijn, en door welke waarschijnlijk de Buysjes toegerokken, en de beweging van 't vogt bestiert word.

Op en tusschen de Klieren der Mammen, legt ge- Vet der meenlijk veel Vet, om de tusschen-heden der Klieren Mammen te vullen, en de menigte der Vaten, die zig in de zelve verspreiden, zagties t' ondersteunen.

De Mammen dienen om de melk van 't bloed af te scheiden, en die in de Melk-buysjes, tot voedsel van 't kind te bewaren.

Een gebrek, 't welk dikwils in de Mammen of Borsten der Vrouwen komt, is de *Kanker*, een gezwel, dat hard, rond, onessen, heet, pijnlijk, blauwag-

tig, en omringt is met vele blauwe Aderen; waar voor tot nog toe geen hulpmiddel is gevonden, als 't mes; maar onderneemt niet de kanker af te snyden, als hy uytnemende hard, en vast is aan de Borstspier, en tusschen-ribbige Spieren, zo dat de Borst, of Mam zig niet bewegen kan, en die onder den Oxel zig uytstrekt; voornamelijk in zulke, die door gedurige koorts vermagert, en van een zwart-gallige gematigheyt zijn; maar de kanker, die aan de voorgemelde Spieren niet vast, en alleen in de Mam of Borst, en beweeglijk is, de Lijdster jong, hebbende goede kragten, en een goed gestelte, kan volkomen genezen worden. Zie die Operatie in onze Verhandeling van de voornaamste Hand-werken der Heelkonst in 't XXII. Hoofdstuk.

HET III. HOOFDSTUK.

Van 't Midden-rift of Diaphragma.

XVIII. Tafel.

Midden-rift wat is.

Gelegent-
heyt en
vast-heg-
ting.

DE Mammen, met de Borst-spieren weg genomen, en de Borst geopent zijnde, komen wy tot 't Midden-rift, dat een Spieragtig deel is, nodig tot de ademing, en om de middenste holligheyt, of Borst van den Buyk te scheiden. Zie de 1. Fig. DD. en geheel de 5. Fig.

Het Midden-rift legt wel dwerssch, maar zeer schuyns: want van voren is 't vast aan 't Borst-been, en den omtrek van de Ribben, en van agteren strekt het zig uyt tot de Wervel-beenderen der Lenden; zo dat de holligheyt der Borst van agteren veel laager, als van voren is, en dat is de reden, als'er bloed, etter, of water in een der zyden van de holligheyt der Borst op 't Midden-rift is uytgestort, dat men de opening van agteren, tusschen de tweede, en derde, of derde en vierde valsche Ribbe, van onderen op te tellen, vier of vijf dwersche vingeren van de doorn-

agtige uytsteekfels der Rugge-graat moet maken, om 't vogt op de laagste plaats uytgang te geven.

De gedaante is by na rond, behalven de twee uyt-Gedaante steekfels of pezen, waar door 't aan de voorgemelde Wervel-beenderen vast is.

Het ¹ Midden-rift is in zijn buytensten omtrek pezig; hoe wel 't zo niet schijnt te wezen, ten zymen 't van na by beziet, en dan word het vleezig, dat 't grootste deel daar van uytmaakt AB. in zijn midden is 't geheel pezig, en van vlees ontbloot C. het welk 't Midden-punt van 't Midden-rift genaamt word, dewijl 't uyt de breede pezen van de aldaar te samen komende Spieren gemaakt word: wanneer 't pezig deel van 't Midden-rift gequetst is, kan 't niet genezen worden.

Het gebeurt zomtijds in een wonde van 't Midden-rift, schoon ze niet grooter is, als dat'er de duym, of kleyne vinger in gestoken kan werden, dat niet alleen een deel van den ³ Kartel-darm daar door tot in de Borst gaat; maar zelf de gantsche Maag, 't gene *Sennertus*, en *Pareus* in 't openen van die van zodanige wonden gestorven waren, ondervonden hebben.

Het Midden-rift bestaat ten minsten uyt twee Spieren, waar van de voorste dun, en breed is, dewijl zy wederzyds van 't Borst-been, langs de korte Ribben, tot by na aan de Wervel-beenderen zig uytstrekt.

De agterste Spier is dikker, en heeft een zeer vlee-^{xviii. Ta-}zigen Buyk B. en is in 't midden tot den doorgang sel. van den Slok-darm doorboort D. Deze neemt haar oorspronk met twee uytsteekfels FF. van de Wervel-beenderen der Lenden, welkers regter 't langste zijnde, met drie pezen vast is aan de twee eerste Wervel-beenderen der Lenden, en 't laatste van den Rug: het linker, dat korter, en zomtijds in twee verdeelt is, komt voort uyt 't laatste Wervel-been des Rugs, en 't eerste der Lenden. De breede pezen van beyde de Spieren tegen malkander aankomende, maken 't

¹ Diaphragma. ² Centrum. ³ Colon.

pezig deel van 't Midden-rift, waar van te voren is gesproken.

De laatste Spier schijnt uyt twee Spieren te bestaan, die van de twee voorgemelde uytsteekfels of pezen voortkomen.

De onderste of naar den Buyk gekeerde oppervlakte is bekleed met den ¹ Pens-zak; en de bovenste met 't ² Ribbe-vlies, op de regter zyde word het pezig deel van 't Midden-rift doorboort van de holle Ader E. van agteren in 't vleezig deel, door den Slok-darm, en ter zyden door de tusschen-ribbige Zenuwen, die naar den Buyk gaan; maar de groote nederdalende Slag-ader, en de ongepaarde Ader gaan tusschen beyde de uytsteekfels of pezen van 't Midden-rift.

Het Midden-rift krijgt aanmerkelijke Aderen van de holle Ader: want als ze door 't/zelve na de Buyk nederdaalt, geeftse aan elke zyde een aanmerkelijken tak G. Slag-adertn krijgt het van onderen van de groote nederdalende Slag-ader, en zomtijds van des Buyks Slag-ader H. waar by zig nog eenige kleyne takjes van de Lenden, of Vet-slag-aderen voegen.

Aderen
van 't
Midden-
rift.

Andere A-
deren van
't Midden-
rift, en
Slag-ade-
ren.

Boven dien, heeft 't ³ Midden-rift twee Aderkens, en zo veel Slag-aderkens in zijn bovenste deel II. De Aderen nemen aan elke zyde haar oorspronk aan 't begin der Onder-sleutel-been-ader, gelijk ook de regter Slag-ader (van den oorspronk der linker is 't niet zeker) en in 't nederdalen, geven ze hier, en daar eenige takjes aan 't Herte-zakjen, en 't ⁴ Midden-schot, en eyndelijk tot 't Midden-rift komende, verspreyden zig door 't zelve, en vereenigen door vele ⁵ Inmondigen met de eerste Aderen, en Slag-aderen.

Zenuwen.

Het Midden-rift heeft aan elke zyde een zeer aanmerkelijke Zenuw, die voort-komt met drie beginselen, van eenige Zenuwen, die uyt den hals komen, en na de armen loopen. Die Zenuw K. nederdalende, zonder eenige takjes te geven, verdeelt zig on-

¹ Peritonæum. ² Membrana pleura. ³ Diaphragma. ⁴ Mediastinum. ⁵ Inosculationes.

trent 't Midden-rift in vier, of meer takjes, waar van eenige in 't vleezig, en andere in 't pezig deel zig verspreyden: hier by komen van onderen nog eenige takjes van de Tusschen-ribbige, en mogelijk ook van de Lende-zenuwen.

Het Midden-rift drukkende in 't inademen de Ingewanden des Buyks, verlengt de Borst, en perst daar door de lugt voort, en drijft de Chiyl uyt de Maag, ook de grove vuyligheden, pis, en dat in de Lijf-moeder is: en om dat in zijn beweging de uytsteekfels het Chiyl-zakjen drukken, is het ook, om de Chiyl naar de Chiyl-buys voort te perffen.

De beweging van 't 1 Midden-rift, is ten deele natuurlijk, ten dele vrywillig. *Vrywillig*, om dat men zijn beweging kan verhaaften, en vertragen, naar den wil. *Natuurlijk*, om dat ze geschiet, 't zy dat we slapen of waken, zonder dat de wil het kan beletten.

Als men inademt, werkt 't Midden-rift: want dan is 't uytgespannen, en daalt neer na den Buyk, en als men uytademt, werkt het niet, en klimt na boven in de Borst; en gelijk de Menschen uytademende sterven, zo vind men na hun dood 't Midden-rift diep in de Borst.

Het Midden-rift gequetst zijnde, voelt de Lijder zwaarte in 't gewonde deel, word uytzinnig, heeft groote benauwtheyt in 't ademen, hoeft, gevoelt een scherpe pijn, waar na de dood gemeenlijk volgt.

H E T IV. H O O F D S T U K.

Van 't Ribbe-vlies, en 't Midden-schot.

HET 2 Ribbe-vlies bekleed inwendig de gehele holligheyt der Borst E. 2. Fig. en omvangt alle deelen, die in de zelve zijn.

't Ribbe-vlies is over al dobbel, waar van 't inwendig, dat met zijn binnenste oppervlakte, na de

XIX. Tafel.

Ribbe-vlies is dobbel.

1 Diaphragma. 2 Membrana pleura.

hol-

holligheyt der Borst gelegen, effen en glad is; de uytwendige oppervlakte van 't buytenste Vlies is ruw en oneffen, en bekleed over al de Ribben, en tusschen-ribbige Spieren. Den Heer *Ruyfch* toont tusschen beyde die Vliezen nog een ander Vlies.

Tusschen de verdobbeling van 't 1 Ribbe-vlies, loopt de ongepaarde Ader met haar takken, en de tusschen-ribbige Slag-aderen, en Zenuwen, van welke hier na zal gesproken worden.

Zijn ga-
ten.

Het Ribbe-vlies heeft eenige zichtbare gaten, waar van de onderste met de bovenste des 2 Pens-zaks over een komen, tot doorgang van den Slok-darm, holle Ader, en Zenuwen van 't dwalende paar: zijn opperste gaten zijn om den 3 Slok-darm, de 4 Longepijp, en de opperste holle Ader, door te laten.

Bloed-va-
ten en Ze-
nuwen.

Dit Vlies krijgt Aderen, en Slag-aderen van de Tusschen-ribbige, als ook van de Mam-, en Midden-rifts Vaten; Zenuwen heeft het van de Tusschen-ribbige, en Midden-rifts Zenuwen.


Het Ribbe-vlies maakt de inwendige oppervlakte der Borst effen en glad, op dat de Longen in hun beweging niet beschadigt wierden; is ook tot steunfel der tusschen-ribbige Spieren.

Het Ribbe-vlies kan ontsteken werden, en zulks wert in 't Latijn *Pleuritis*, of *Zyde-wee* genaamt, rakende zomtijds tot verzweering, die in de holligheyt der Borst uytbreekt, 't welk dan *Empyema*, of *Etterborst* geheten word. Zo de Etter op 't Midden-rift uytgestort; door hoesten, braken, pissen, of kamer-gang niet uytgeloost word, is men genoodzaakt, een opening te maken, van agteren in de laagste plaats der voorgemelde holligheyt, om ze uytgang te geven.

Zo 't Ribbe-vlies ter plaats der ontsteking aan de Long was vast gegroeyt, zou de Etter op 't Midden-rift niet kunnen vallen; maar knaagt zomtijds de tusschen-ribbige Spieren door, aldaar een gewel makende, dat moet geopent worden.

1 Membrana pleura. 2 Peritonaeum. 3 Oesophagus. 4 Aspera Arteria. 5 Diaphragma.

U Y T -



U Y T L E G G I N G

der

F I G U R E N ,

van de

AGTIENDE TAFEL.

Waar in vertoont worden de Mammen en 't Midden-rift.

De 1. Figuur vertoont de voorgemelde deelen in hun natuurlijke plaats.

A Een Mam in haar geheel.

a De Tepel.

b Den Ring met zijn knobbeltjes.

B De Mam ontbloot van haar buytenfte deksels, op dat men zou zien

cc De Bloed-vaten zo der Mam en tusschen-ribbige Vaten, als die van de onderste deelen komen.

C De t' samenvoeging van de kraakbeenige

deelen der Ribben.

D Het Midden-rift.

E De holle Ader.

F De nederdalende groote Slag-ader.

G De Lever-ader afgesneden.

HH De Nieren.

De 2. Figuur vertoont een Mam van haar dekzelen ontbloot en van 't ligchaam afgescheyden.

A De Klieren van de Mam.

bb De Melk-buysjes.

C De Tepel.

De 3. Figuur vertoont een deel van de Tepel door
eens

een vergroot - glas gezien.

A De algemeene dek-
felen afgesneden.

B De zelfstandigheyt
der Tepel, die ten
deele Klierig, Veze-
lig en vol Vaten is.

*De 4. Figuur vertoont
een deel van de Mam,
met de Tepel, op dat
men zou zien*

aa De vereening,
waar door de Melk-
buysjes met malkan-
der gemeenschap heb-
ben, uyt den Heere
Nuk.

*De 5. Figuur vertoont 't
Midden - rift uyt het
Lighaam genomen, zo
als men 't ziet aan
zijn bovenste opper-
vlakte.*

A De voorste Spier.

B De agterste Spier.

C Het peezig deel, ge-
meenlijk 't Zenuw-
agtige genaamt.

D Het gat voor den
Slok-darm.

E Het gat voor de hol-
le Ader, dat hier op
de linker zyde staat,
en nogtans op de reg-
ter zyde van 't Mid-
den - rift gevonden
word.

FF De uytsteekfels
van 't Midden - rift,
waar van 't regter,
dat hier qualijk op de
linker zyde staat, uyt
drie pezen t' samen
gestelt is.

G De Midden - rifts
Aderen.

H De Midden - rifts
Slag-aderen.

I Een kleyne Ader, en
Slag-ader, van boven
voortkomende.

K De Zenuwen van
't Midden - rift, die
van eenige Zenuwen
na de armen gaande,
af-komen.

L Andere Zenuwen,
die van de tusschen-
ribbige komen.

Het ¹ Midden-schot is een dobbel Vlies, waar door de Long, en de holligheyt der Borst, in twee gescheyden word B. 1. Fig. Midden-schot wat is.

En het is anders niet als 't binnenste deel van 't ² Ribbe-vlies, dat zig uytstrekt aan elke zyde, van agteren van de Rugge-graat, door 't midden der Borst, tot 't binnenst, en 't middenste van 't Borst-been, agterlatende 't buytenste Vlies, en tusschen beyde die Vliezen worden 't Hart, de ³ Slok-darm, de holle Ader, en de Zenuwen, die na de Maag gaan, besloten. XIX. Tafel.

Zijn Bloed-vaten heeft het van de Maag, en bovenste ⁴ Midden-rifts Vaten, als ook eenige eygene, die onmiddelyk van den tronk der Ader, en Slag-ader voort komen. Bloed-vaten.

Zenuwen heeft het van de Maag- en Midden-rifts Zenuwen, die langs dit vlies naar de Maag en 't Midden-rift nederdalende, eenige takjes aan 't zelve mede deelen.

Het Midden-schot verdeelt de Borst volgens de lengte in twee holligheden, en zo nauwkeurig dat 't bloed, etter, of water in een der zyden van de Borst uytgestort zijnde, tot de andere niet kan over gaan, als ook om 't Hart, met 't Harte-zakjen, en 't Midden-rift in den Mensch, op te schorten, op dat de Ingewanden, die'er aan vast zijn, gelijk de Maag, en Lever, het zelve niet te sterk na beneden zouden trekken.

Tusschen de verdobbeling van 't Midden-schot, even onder 't Borst-been, ontstaat zomtijds een ontsteking, die tot zweeren komt, 't welk door de koorts pijn en zwaarte op die plaats eenigfints bekend word. Zo men wist dat'er etter ware, zo moet men aldaar in 't Borst-been, met een trepaan, een opening maken, om uytgang te geven, na dat men eerst 't zelve door een kruys-wyze, of driehoekige sneede, zal ontbloom hebben.

¹ Mediastinum. ² Membrana pleura. ³ Oesophagus. ⁴ Diaphragma.

HET V. HOOFDSTUK.

Van de Borst-klier.

Wat de
Borst-
klier is.

XIX. Ta-
fel.
Bloed-va-
ten.

DE 1 Borst-klier is een op malkander gehoopte Klier, leggende van voren aan 't opperste deel van de holligheyt der Borst, en is uytgestrekt tot 't Harte-zakjen, daar ze de groote Slag-ader, en dikwils ook bovenste holle Ader, met haar verdeelingen in de Onder-sleutelbeens takken, bedekt. D. 2. Fig.

Aderen en Slag-aderen heeft ze van de Onder-sleutelbeens vaten, waar by zig nog eenige takken van de 2 Keel-, en 3 Krop-vaten voegen.

Zenuwen krijgt ze van 't agtste paar der hersenen, die nevens de Krop-slag-aderen nederdalen.

Een eygen Buys voor die Klier, is nog niet gevonden.

Deze Klier is in jonge Kinderen zeer zagt en zappig; maar in bejaarde uytgedroogt, en veel minder, als in Kinderen. In nieuw-gebore Kinderen, is ze zo groot niet als in die eenige jaren oud zijn.

Verdee-
ling.

De Borst-klier word gemeenlijk verdeelt in een regter, en linker deel, waar by zomtijds in eenige, nog een lobbeken schijnt te wezen.

Gebruyk
is onze-
ker.

Het gebruyk dezer Klier is zeer onzeker, en zal waarschiynelijk blyven, zo lang 't eygen uytloozende Vat onbekent is; men twijfelt niet of in de zelve word een vogt afgescheyden, gelijk in andere Klieren; maar zijn natuur onbekent zijnde, en waar 't na toe vloeyt, kan men waarlijk niet zeggen, dat ze dient om 't een, of 't andere vogt, af te scheyden.

1 Thymus. 2 Jugulares. 3 Carotides.

HET VI. HOOFDSTUK.

Van 't Harte-zakjen.

Het Harte-zakjen is een dik Vlies, in welkers ^{Wat 't} holligheyt 't Hart is besloten A. 2. Fig. ^{Harte-} ^{zakjen is}

Het bestaat uyt twee Vliezen: 't inwendige, dat van binneneffen, en glad is, schijnt voort te komen van de rokken der groote Vaten van 't Hart, die de zelve uytwendig bekleeden, en 't uytwendige komt van 't Midden-schot.

Zijn gedaante is boven breed, en onder spits afgaande gelijk 't Hart; maar grooter, en van 't zelve wat afgelegen, op dat 't Hart zig gemakkelijk zou kunnen bewegen.

Boven is 't vast aan de groote Vaten van 't Hart, daar het tot doorgang van de zelve doorboort is.

Het onderste of puntig, en daar ontrent gelege deel van de regter zyde, is zo vast vereenigt met 't pezig of zenuwagtig deel van 't Midden-rift, dat ze zonder scheuren van malkander niet kunnen gescheyden worden: welke vereening dient, op dat 't Midden-punt van 't Midden-rift, te beter na om hoog zou klimmen, 't welk anders in een Mensch, om dat hy meest regt over eynd is, moeyelijker is; of om te beletten dat 't niet te zeer na beneden zakke, want in Dieren, die met 't hoofd na d'aarde gaan, is 't 'er niet aan vast.

Het Harte-zakjen heeft van boven Aderen en Slagaderen van de Midden-schots, en bovenste Midden-rifts Vaten, van onderen van de onderste Midden-rifts Vaten. Het heeft ook eenige takjes van 't agtste paar Zenuwen der hersenen.

Alle deze deelen van de Borst, hebben waarschiynlijk ook Water-vaten, die zig in de Borst, of Chijl-buys ontlasten.

1 Mediastinum. 2 Diaphragma. 3 Centrum. 4 Ductus thoracicus.

N

't Har-

't Harte-zakjen omvangt 't Hart , en befchermt het, en heeft een by na klaar, en zomtijds geelagtig vogt in zig, om 't Hart te bevogtigen , op dat het gemakkelijk bewogen wierde, over welkers oorspronk d' Ontleeders verschillen.

In 't Jaar 1702. in de Maand December, heb ik met mijn Heer den Profeflor *Verheyen*, op 't Amphitheater van d' Univerfiteyt te Leuven, ontleed een Jongman, in welkers Harte-zakjen niet een druppel water wierd gevonden, die van te voren gezond was geweest.

Columbus zegt iemant gezien te hebben, die geen Harte-zakjen had.

De Wonden van 't Harte-zakjen zijn niet altijd doodelijk , dewijl *Veslingius* een voorbeeld by-brengt van een perfoon met een degen gequetst in dat deel, die genezen is , fchoon 't water in ieder klopping van 't Hart door de wonde uytvloeyde.

Lower zegt een Vrouw geopent te hebben, welkers Harte-zakjen over al zo vaft aan 't Harte was, zo dat men 't nauwlijks met de vingeren konde af fcheyden. Ook heeft men ondervonden dat'er wormen in 't Harte-zakjen waren.

HET VII. HOOFDSTUK.

Van 't Hart.

Het Hart.
XIX, Tafel.
3. Figuur.

A Ls 't Harte-zakjen is geopent , verftoont zig 't Hart: een deel, dat gansch Spierig is, gelegen in de Borft, tuffchen beyde de groote loben van de Long A B.

't Hart legt in een Mensch niet regt in 't midden van 't Lighaam, maar nader aan 't hoofd, als aan de voeten, op dat 't bloed met nieuwe lugt-deeltjes verzien, uyt de Longen in de linker holligheyt van 't Hart komende, door een korter weg te beter naar de Herffenen gedreven zou worden, tot af-fcheyding, en vervoering der geesten door de Zenuwen naar alle dee-

deelen van 't Lighaam , op dat het gedurig zig zou bewegen. Gedaante.

't Hart is van gedaante als een Pijn-appel, boven breed, 't welk de Basis is, en onder spits af gaande wert de Punt genaamt.

In bejaarde Menschen is 't Hart gemeenlijk zes dwersche vingeren lang, en boven aan zijn opperste deel, vier of ontrent vijf dwersche vingeren breed.

Met zijn opperste of breede deel (de Borst volgens de breedte zijnde aangemerkt) legt het in 't midden van de zelve, en met de punt wat na de linker zyde.

't Hart hangt vast met zijn breede deel aan vier Hegting. groote Vaten, die door dat lighaam verspreyd leggen, zijnde 't overige in 't zakjen gansch vry, op dat 't zig beter zou kunnen bewegen.

't Is bekleed met een dun Vlies, dat boven aan zijn Vlies. zijn breede deel met Vet bewassen is.

't Hart heeft twee aanmerkelijke holligheden AC. Hollighe-
4. Fig. ieder zo groot, dat ze vier, vijf of meer le- den van 't
pels vogt in zig kunnen houden. Hart.

De regter holligheyt is breeder, ook korter, en raakt tot de punt van 't Hart niet AA. maar de linker is enger, ook langer, en strekt zig uyt tot de punt van 't Hart CC.

De buytenste zyde der linker holligheyt DD. is by na driemaal dikker, als die der regter holligheyt B B.

Men vind zomtijds in de holligheden van 't Hart *Slym-proppen*, die de zelve by na vervullen. Ik heb'er zomtijds zeer groote uyt de regter holligheyt van 't Hart getrokken, die met een lange steert zig in de onderste holle Ader uytstrekten.

Die holligheden worden door een vleezig ¹ Midden-schot van een gescheyden EE. dat in de regter holligheyt is bultig, en in de linker uytgeholt. Dit schot behoort eygentlijk tot de linker holligheyt, en wijkt in zijn toetrekking na de regter.

Holle A-
der.

Ieder holligheyt heeft een zeer groote Ader, en Slag-ader. De Ader van de regter holligheyt, word om haar groote genaamt de holle Ader: deze word ontrent twee dwersche vingeren van 't Hart, verdeelt in een bovenste E. en onderste holle Ader E. welker eerste 't bloed te rug brengt van de bovenste, en de andere van de onderste deelen, naar de voorge- melde holligheyt.

3. Figuur.
Long-
slag-ader.
XIX, Ta-
fel, 3. Fi-
guur.

De Slag-ader, die uyt de regter holligheyt voort- komt, is de Long-slag-ader G. zo genaamt, om dat ze buyten 't Harte-zakjen gekomen zijnde, zig ver- spreyd door de Longen, om 't bloed, dat ze ont- fangen heeft, uyt de regter holligheyt door de zelve te voeren.

Long-
ader.

De Ader, die aan de linker holligheyt gevonden word, is de Long-ader H. en brengt door vele tak- ken, die in de Long verspreyd zijn, 't bloed te rug, dat ze uyt de takken der Slag-ader heeft ontfangen, in de holligheyt, waar aan ze vast is.

Groote
Slag-ader.

De Slag-ader, die uyt de linker holligheyt van 't Hart voort komt, word de groote Slag-ader genaamt I. en voert het bloed uyt de linker holligheyt naar al de deelen van 't lighaam.

Ooren
van 't
Harte.

Aan elke Ader boven aan 't Hart, is een aanhang- sel, gelijk een burzeken, gemeenlijk de ooren van 't Hart genaamt CD. waar in het bloed zig onthout, zo lang de holligheden van 't Hart gesloten zijn, en 't regter oor C. is grooter als 't linker D.

Klap-vlie-
zen.

Aan de monden der Aderen, en Slag-aderen, zijn zekere Klap-vliezen, die beletten, dat 't bloed uyt de holligheden niet te rug keere na de Aderen, en uyt de Slag-aderen na de holligheden.

De Klap-vliezen aan den mond van de Aderen, worden driehoekige, driepuntige, of Myters-wyze Klap-vliezen genaamt; met hun breedste deel zijn ze vast aan den mond der Aderen, en met hun puntig deel leggen ze na beneden in de holligheden.

Die Klap-vliezen worden van onderen door eenige pezige Vezeltjes, aan zekere vleezige pylaartjes, aan

z Valvula.

de

de zyden der holligheden gelegen, en spiertjes genaamt, vast gemaakt KK. LL.

Door die pylaartjes, worden de ¹ Klap-vliezen gespannen en los gelaten: want als 't Hart zig toetrekt, nadert de punt aan 't opperste deel, en ook de pylaartjes, waar door de gemelde pezige Vezeltjes ontspannen worden, en ook de Klap-vliezen, die aan de zelve vast zijn, waar door 't bloed door toetrekking van 't Hart na boven geperst zijnde, en de monden der Aderen door de Klap-vliezen gesloten vindende, loopt in de Slag-aderen; maar als 't Hart zig opent, en de punt nederdaalt, zo wyken de pylaartjes na beneden, en trekken door middel van hun pezige Vezeltjes, die aan 't onderste der Klap-vliezen vast zijn, de zelve na beneden van de monden der Aderen, tegen de zyden der holligheden van 't Hart, daar ze gespannen staan.

Hoe die driehoekige Klap-vliezen ontspannen en ontspannen worden.

Drie Klap-vliezen zijn'er aan den mond van de holle Ader a a a. die met hun breedste deel aan malkander vereenigt zijn.

Getal der Klap-vliezen aan de monden der Aderen.

Aan den mond der Long-ader, zijn'er twee bb. om dat die eenigfints ey-rond van gedaante is.

Aan den mond zo der groote, als Long-slag-ader, zijn drie Klap-vliezen, die half-maan-wyze genaamt worden; deze zijn vast met 't een eynde aan den mond der Slag-ader, en 't andere is geheel los, en ze zijn zo gestelt, dat ze 't bloed uyt de holligheden van 't Harre komende, vryen doortogt geven, en beletten, dat het na de holligheden niet te rug keere: want in 't eerste geval leggen ze tegen de zyden der Slag-ader geplakt, en in 't andere wyken'er ze van af na 't midden, en sluyten de holligheden der Slag-ader toe. Zie die Klap-vliezen toegesloten in de XIX. Tafel, 5. Fig. ccc. en tegen de zyden geplakt in de XX. Tafel, 3. Fig. ccc.

1 Valvulae.

U Y T L E G G I N G

der

F I G U R E N ,

van de

NEGENTIENDE TAFEL.

Waar in vertoont worden de inwendige deelen der Borst: als 't Ribbevlies, 't Midden-schot, en 't Harte - zakjen.

De 1. Figuur vertoont de Borst aan eene zyde geopent, in welke gezien word

A De Long in haar natuurlijke plaats.

B Het Midden-schot in zijn natuurlijke plaats.

C Het Midden - rift in zijn natuurlijke plaats.

D Een deel van de holligheyt des Buyks.

aa De gebrokene en omgeslagene Ribben.

De 2. Figuur vertoont de Borst geheel geopent.

A Het Harte-zakjen, waar in 't Hart besloten is, in zijn natuurlijke plaats.

B De Longen.

C Het Borst-been omgeslagen.

D De Borst-klier.

E Het Ribbe-vlies.

aa De gebrokene en omgeslagene Ribben.

De 3. Figuur vertoont het Hart uyt 't Ligbaam genomen, met de aanhangende tronken der groote Vaten.

A Het breedste deel van 't Hart.

B



- B De punt.
- C Het regter oor.
- D Het linker oor.
- E De bovenste holle Ader.
- F De onderste.
- G De Long-flag-ader.
- H De Long-ader
- I De groote Slag-ader.
- K De eygene Vaten van 't Hart.

De 4. Figuur vertoont het Hart volgens zijn lengte doorsneden van de punt tot aan 't opperste deel, en beyde deelen omgeslagen.

- AA De regter holligheyt van 't Hart.
- BB De regter zyde.
- CC De linker holligheyt.
- DD De linker zyde.
- EE Het Midden-schot van 't Hart.
- F Den mond van de holle Ader.
- G Den mond van de Long-flag-ader.
- H Den mond van de Long-ader.
- I Den mond van de groote Slag-ader.
- K De Spiertjes in de

- regter holligheyt.
- L De Spiertjes in de linker holligheyt.
- MM De punt van 't Hart.
- N De dwerssch loopende Vleezigheden, die door de holligheyt loopen, afgesneden, op datse het open leggen van de holligheyt niet zouden beletten.
- aa Driehoekige Klapvliezen aan den mond van de holle Ader.
- bb Driehoekige Klapvliezen aan den mond van de Long-ader.
- c Den tronk van de bovenste holle Ader.
- d Den tronk van de onderste holle Ader.
- e Den tronk van de Long-flag-ader.
- f Den tronk van de Long-ader.
- g De nederdalende groote Slag-ader afgesneden.
- h Een deel van de nederdalende Slag-ader.

De 5. Figuur vertoont een deel van de groote Slag-ader, waar door ze zig opent in de holligheyt van 't Hart, op dat de half-maans-wyze Klap-vliezen zouden gezien worden.

A Een deel van den tronk der Slag-ader.
 BB De kroon-Slag-aderen van 't Hart.
 CCC De half-maans-wyze Klap-vliezen, die den mond van de Slag-ader fluyten.

XIX. Tafel, 4. Figuur.

In de regter holligheyt zijn zekere vleezige deelen, als touwtjes, die van 't Midden-schot dwerssch na de zyde van 't Hart uytgestrekt leggen NN. welke in de toetrekking van 't Hart, de zyde na 't Midden-schot schijnen te trekken, om zijn verwijding te beletten, op dat de zyde niet te verre van 't Midden-schot afwyke.

De andere uytpuylende Vleezigheden, die men aan de inwendige oppervlakte der holligheyt ziet, zijn ten opzichte van haar gedaante, en ordere van plaats, zeer verscheyden, zo dat door de verscheyde tusschenheden, en vele hollen, de zyden en groeven oneffen zijn AC.

Zelfstandigheyt van 't Hart.

De eyge zelfstandigheyt van 't Hart, is geheel Vleezig of Spierig, en bestaat uyt vele door malkander gevlogte Vezelen: want 't Vlies van 't Hart afgescheyden zijnde, vertoonen zig aan de buytenste oppervlakte der regter holligheyt, eenige weynige dunne Vezelen, die regt na boven loopende, in 't breedste deel van 't Hart eyndigen. Zie de 6. Fig.

Slang-rings-wyze Vezelen.

XX. Tafel, 7. Figuur.

Hier op volgen de ² Slang-rings-wyze Vezelen met tweederley ordere: want die naast aan de regt loopende volgen, dalen van 't opperste des Harts na de linker zyde, en eyndigen gemeenlijk in 't Midden-schot, zo dat'er weynige zijn, die tot aan de punt van 't Hart raken A. de andere meer inwendig ge-

leggen, hebben een tegenstrydigen loop C. en door-
kruyffen d'eerste.

Aan de linker holligheyt worden van buyten geen
regt loopende Vezelen gevonden; maar vertoonen zig
de ¹ Slang-rings-wyze Vezelen, die van 't bovenste
des Harts, na de linker zyde nederdalen B. onder
welke ook aan de regter holligheyt andere leggen,
die na de zelve zyde opklimmen D. Voorts zo door-
loopen deze vleezige Vezelen niet alleen de uytwen-
dige zyde, gelijk die van de regter holligheyt; maar
ook 't ² Midden-schot, zo dat men niet twyfelt, of
dit schot behoort tot de linker holligheyt.

Boven dien, loopen vele Vezelen der linker hollig-
heyt tot de punt, daar ze in hun loop, door mal-
kander gewrongen worden, als een omgewronge doek.
Zie de 8. Fig.

Lower merkt aan, dat'er behalven de uytwendige
schuyns loopende Vezelen, nog andere loopen, aan
beyde holligheden gemeen, die niet alle van 't breed-
ste deel des Harts, tot aan de punt komen; maar dat
eenige veel korter zijn, en zo haast die van buyten
aan den middensten omtrek zijn gekomen, buygen ze
zig krom als een boog, en gaan met een schuynsen
loop in de pees, en holligheyt van de andere zyde.
Zie de 10. Fig.

XX. Tafel

De loop van die Vezelen word klaar gezien in
een gekookt Offen-hart, waar van men de ooren,
en vaten afgesneden heeft: want dan ziet ge een ster-
ke pees, die de openingen der Vaten omringt: het
deel van die pees, dat aan 't opperste van 't Midden-
schot gevonden word, is in zommige beesten tot
been verhard: 't is in de zelve pees, dat de vleezige
Vezelen, die den buytensten omtrek van 't Hart ma-
ken, na de regter zyde ingeplant worden, in plaats
dat de inwendige Vezelen, en die naast aan de hollig-
heden leggen, met een tegenstrydigen loop daar inge-
plant worden. Zie de 5. Fig.

De ooren van 't Hart worden gemaakt even als ^{Maakfel}
de holligheden: want hun binnenste oppervlakte is ge- ^{van de}
^{Ooren.}

1 Spirales. 2 Septum.

N 5

lijk

lijk met vele vleezige touwtjes doorweven, welke aan de eene zyde met 't breedste deel van 't Hart A. en met de andere aan de by-leggende Ader B. vereenigt zijnde, in den bodem van 't oor ee. verscheydentlijk door malkander gevlogten worden, waar uyt genoegsaam blijkt dat ze dienen om d'ooren te bewegen.

XX. Tafel.
3. Figuur.

Kroon-
aderen en
Slag-ade-
ren.

't Hart heeft zijn eygene Bloed-vaten, *Kroon-vaten* genaamt, om dat ze 't breedste deel van 't zelve, als een kroon omringen, en die verspreyden zig door het Hart, en de ooren. XIX. Tafel, 3. Fig. KK.

XX. Tafel.
3. Figuur.

De Slag-aderen van het Hart zijn twee, en nemen haar oorspronk aan 't begin der groote Slag-ader, even onder de half-maans-wyze ¹ Klap-vliezen dd. welke, schoon in 't begin verscheyde zyden van 't Hart loopen, komen die op den weg weder by malkander, en t' samen vereenigende, maken als een eenig Vat, welkers takken zig door 't Hart, en de ooren verspreyden.

De Kroon-ader neemt haar begin van de holle Ader, regt tegen over 't oor, en van daar na de linker zyde gaande, breyde zig uyt door 't Hart, en de ooren; hoewel men zou kunnen zeggen, dat de Kroon-ader ook twee tronken heeft, dewijl in 't regter oor ook een groote opening is, waar in een priemken d. 3. Fig. is gesteken, in welke eenige kleynder takjes eyndigen.

De takken der Kroon-ader, en Slag-aderen, gekomen zijnde tot aan de punt van 't Hart, vereenigen te samen door verscheyde inmondigen: als de Aderen met Aderen, Slag-aderen met Slag-aderen, zo dat men dikwils niet kan zeggen, hoe verre die kleyne takjes tot den een, of den anderen grooten tak behooren.

In de Kroon-ader zijn geen Klap vliezen: want als men eenig vogt in den mond der zelve spuyt, loopt het onbelemmert door de takken tot in de holligheden van 't Hart, en van de ooren: waar uyt blijkt, dat 't bloed door de Kroon-slag-ader gebragt in de zelfstandigheyt van 't Hart, en de ooren, niet alleen te rug keert door den langen weg der Kroon-ader

¹ Valvulae.

naar

naar de holle Ader; maar dat ook een deel te rug loopt door korter wegen, of takjes der Kroon-aderen, in de holligheden van 't Hart, en de ooren, in welke ze met veel mondekens eyndigen: maar in de regter holligheyt van 't Hart, en 't oor, zijn'er meer, als in de linker.

Zo dat den Heer *Vieussens*, die deze takjes der Kroon-ader aangezien heeft voor zekere Buysjes, en daarom vleezige Buysjes noemt, meent dat een byzonder vogt, of ferment in de holligheden van 't Hart, en de ooren zou gebragt worden, daar door wakker is bedrogen, gelijk den Heer *Professor Verheyen* dat klaar heeft getoont. Evenwel verdient dien Heer een grooten lof, om dat hy de voorgemelde openingen, of mondekens eerst ontdekt heeft. Zie in de XXI. Tafel, 3. Fig. verscheide mondekens van de takjes der Kroon-ader, waar door ze in de regter holligheyt van 't Hart, en 't oor, en in de holle Ader, zig van 't bloed ontlasten.

't Hart met de ooren krygen Zenuwen van 't agtste paar Hersenen, en voornamelyk van een vlegting, gelegen boven 't Hart, en de holligheyt der Borst, die van *Willis* de *Hart-zenuw-vlegting* genaamt word, en van de Tusschen-ribbige Zenuwen.

Bartholinus voegt hier by de Water-vaten, die door middel van eenige Klieren uyt 't Hart komen, en over de groote Slag-ader loopende, zig in de Borst-, of Melk-buys ontlasten.

't Hart ontfangt het wederkerende bloed uyt alle de deelen van 't Lighaam, door de holle Ader, in 't regter oor, en holligheyt, en drijft 't zelve van daar door zijn t' saamtrekking in de Long-slag-ader, en Ader, naar 't linker oor, en holligheyt, en door de zelve t' saamtrekking van daar door de groote Slag-ader, naar al de deelen van 't Lighaam te persen, om zo den gedurigen omloop van 't bloed te onderhouden.

Het bloed loopt gedurig door de Longen, op dat het by de inademing met nieuwe Lugt-deeltjes zou
 1 Ductus Thoracicus. 2 Arteria pulmonaria.
 be-loopt.

bezwangert worden, en dat de oude met 't bloed omgeloopene Lugt-deeltjes, by de uytademing zouden worden uyt gedreven.

En dewijl 't bloed uyt de linker holligheyt van 't Hart, tot al de deelen van 't lighaam door enge Buyzen moet gedreven worden; is tot dien eynde de linker holligheyt met dikker spierige zyden omringt, als de regter, die 't bloed in de Longen moet drykken van ven.

De reden, waarom 't bloed tot al de deelen van 't lighaam word gebragt, is om de zelve te voeden, en op dat in verscheide Klieren, verscheide vogten, tot zekere diensten zouden afgescheyden worden.

De wonden, die door gaan tot in de groote Vaten, holligheden, en ooren van 't Hart, zijn aanstonds doodelyk.

Pareus heeft een Edelman gezien, veggende met een degen, welke wierd gesteken onder de linker Mam, tot in het Hart, en evenwel zijn Vyand vervolgde twee hondert stappen verre; wanneer hy dood neer viel. Het Lighaam geopent zijnde, vond hy een wonde in 't Hart, waar in men een vinger konde steken, en veel bloed was uytgestort op 't ¹ Midden-rift.

Verder is te toonen, hoe 't bloed in de ongeboore Vrucht omloopt: want zo lang die in 't lighaam van de Moeder is, en niet ademt, zo loopt'er weynig bloed door de Longen, en daarom zijn'er ook in de Vrucht twee wegen ontrent 't Hart, waar door 't bloed henen loopt, die daar na gesloten zijn.

De eerste weg is 't ² *Ovale* gat, in de onderste holle Ader, en ³ Long-ader, even onder een zekere kleyne verheventheyt, tusschen de onderste, en bovenste holle Ader C. II. Fig. Dit gat is open in de Long-ader, digt by de linker holligheyt, en heeft daar een ⁴ Klap-vlies, dar'er voor hangt, waar door het bloed niet kan wederkeeren: na de geboorte groeyt dit gat toe, om dat het Klap-vlies door 't bloed, 't welk gedurig door de Long-ader toevloeyt, tegen den boord

¹ Diaphragma. ² Foramen Ovale. ³ Vena pulmon. ⁴ Valvula van

van 't gat gedrukt word, waar mede 't vast ver-
eentigt.

Dit gat is om 't bloed door de onderste holle Ader
te rug komende, doorgang te geven naar de linker
holligheyt van 't Hart.

De tweede weg is een Slag-aderlijk Kanaal, 't Slag-ader-
welk door zijn een uyteynde vast is aan de 1 Long-^{lijk Ka-}
slag-ader, en door 't andere aan de groote nederda-
lende Slag-ader C. 12. Fig. en dient om 't bloed uyt
de regter holligheyt van 't Hart in de Long-slag-^{XX. Tafel.}
ader, doorgang te geven naar de groote nederdalende
Slag-ader.

Het bloed, dat in de Vrucht, van d' onderste deelen,
en vervolgens van de 2 Moeder-koek naar 't Hart we-
der keert, gaat voor 't meeste deel onmiddelijk uyt
d' onderste holle Ader, naar de linker holligheyt van
't Hart, en 't gene door de bovenste holle Ader
komt, vloeyt in de regter holligheyt; maar daar
uyt gedreven zijnde in de Long-slag-ader, loopt 't
grootste deel door 't Slag-aderlijk Kanaal, naar de
groote nederdalende Slag-ader, zo dat in de Vrucht
weynig bloed door de Longen gaat, om dat ze niet
ademende, in de zelve geen lugt kan ontfangen, daar
al 't bloed in bejaarde, om dat die wegen gesloten
zijn, door de Longen loopt, om met de lugt bezwan-
gert te worden.

Een Kind geboren zijnde, wassen de zyden van 't
Kanaal t' samen, zo dat die weg gestopt word, en 't
bloed loopt naar de Longen, dan verdroogt dat, en
't Kanaal vermindert sterk.

1 Arteria pulmonaria. 2 Placenta. 3 Tubus Arteriosus.

UYT:

U Y T L E G G I N G

der

F I G U R E N ,

van de

TWINTIGSTE TAFEL.

Waar in vertoont worden de inwendige oppervlakte der Holligheden, en Ooren van 't Hart, als ook 't Ovale gat, De 1. 2. 3. 6. 8. 9. en 10. Fig. zijn uyt *Lower* genomen, zijnde de 5. en 7. een weynig verandert.

De 1. Figuur vertoont de linker holligheyt van 't Hart geopent.

A De opening der Long-ader.

B Den ingang van 't linker Oor.

C Het Ovale gat met uytstorting van bloed.

DD Twee Klap-vliezen staande aan den mond der Long-ader.

E Doorgang tot den mond der groote Slag-ader.

cc Vleezige Pylaartjes of Spiertjes, die in de inwendige oppervlakte uyt puylen.


De 2. Figuur vertoont het linker Oor geopent.

A Het breedste deel van 't Oor, waar mede het aan 't Hart vereenigt is.

B De pcezige cirkel, waar door ze met de holle Ader vereenigt word.

C Het bovenste deel van





van 't Oor, dat nog
gesloten is.

D Den mond der
Kroon-ader met eeni-
ge kleynder, die 't
bloed te rug brengen.

ee Vleezige Pylaartjes,
die van 't breedste
deel van 't Oor naar
den grond toe uytge-
strekt worden.

De 3. *Figuur* *vertoont*
't beginsel der groote
Slag-ader, die geopent
is, op dat men de Klap-
vliezen zou zien.

A Een deel der linker
holligheyt van 't Hart
open.

ccc Drie halve maans-
wyze Klap - vliezen
tegen de zyde der
Slag-aderen geplakt.

dd De monden der
Kroon-slag-aderen.

De 4. *Figuur* *vertoont de*
gedaante, het maaksel,
en groote der Klap-
vliezen, zo als ze in
de Slag-aderen gevon-
den worden.

abc Een van de halve-
maans - wyze Klap-
vliezen, zo als ze zig

in 't opblazen vertoo-
nen.

b Een kleynknoopjen,
dat ontstaat uyt t' sa-
menkomst der Veze-
len, waar uyt de
Klap-vliezen gemaakt
zijn.

cc Dikker en vaster
Vezelen, waar door
't Klap-vlies als een
touwtjen gespannen
word.

def Het andere Klap-
vlies.

De 5. *Figuur* *vertoont 't*
breedste deel van 't
Hart, regt van vo-
ren te zien, op dat
men de monden der af-
gesnede Vaten kan be-
schouwen.

A Den mond der hol-
le Ader.

B Den mond der Long-
slag-ader.

C Den mond der
Long-ader.

D Den mond der groo-
te Slag-ader.

aaaa De Pees, die de
monden der Vaten
omringt.

De 6. *Figuur* *vertoont de*
regt

regt loopende Vezelen, die onmiddelijk onder 't vlies van 't Hart op de uytwendige oppervlakte der regter holligheyt gevonden worden.

De 7. Figuur vertoont den dubbelen loop der Slang-rings - wyze Vezelen van 't Hart.

A De uytwendige Vezelen schuyns loopende naar beneden over de regter holligheyt of zyde van 't Hart naar de linker.

B De uytwendige Vezelen schuyns loopende over de linker holligheyt van 't Hart naar beneden.

CD De inwendige Vezelen van onder na boven loopende, over beyde de zyden of holligheden van 't Hart met een tegenstrydigen loop aan de voorgaande, en naar de tegenoverige zyde.

De 8. Figuur vertoont de lange Vezelen, die in

de punt van 't Hart, als een gewronge doek verbeelden.

A De inwendige Vezelen.

B De uytwendige.

C De voorgemelde Vezelen, die in de punt van 't Hart gewrongen zijn.

De 9. Figuur vertoont in de punt van 't Hart de gewronge Vezelen, wat van een gescheyden.

De 10. Figuur vertoont de Vezelen, die van d' uytwendige zyde van 't Hart tot d' andere uytgestrekt leggen.

A De Pees dezer Vezelen aan de regter zyde van 't Hart.

B De Pees dezer Vezelen aan de linker zyde.

C De plaats, daar ze zig krommen als een boog, eer ze aan de punt van 't Hart komen.

De 11. Figuur vertoont een Schapen-hart, gezien

zien aan de regter zyde, om 't Ovale gat aan te wyzen, dewijl men op dien tijd het Hart van een Vrugt niet kon bekomen.

AA De holle Ader open gefneden.

B Een kleyne verhevenheyt tusschen de onderste en opperste holle Ader.

C Het Ovale gat.

D Den mond der Kroon-ader, die gemeen is in Schapen, met den mond der Longe-pijps-ader.

E Het uytende van 't regter Oor.

ff Takken van des Harts-Kroon-vaten.

De 12. Figuur vertoont 't Hart aan de linker zyde gezien.

A De Long-slag-ader.

B De groote nederdalende Slag-ader.

C Het Slag-aderlijk Kanaal, 't welk 't bloed uyt 't begin der Long - slag - ader brengt naar de groote nederdalende Slag-ader.

D Het Vet van 't Hart.

E Het linker Oor.

ff Takken van des Harts-Kroon-vaten.

O

U Y T.

U Y T L E G G I N G

der

F I G U R E N ,

van de

X X I . T A F E L .

Waar in vertoont worden vele mondekens van Aderen, in de inwendige oppervlakte der regter holligheyt, en Oor van 't Hart, van den Heere *Vieussens* eerst ontdekt en beschreven voor openingen van zekere vleezige Buysjes, zo hy meent, waar in hy is bedrogen, als ook verscheide takjes van Aderen, die door d' Ooren verspreyd leggen, en van *Vieussens* geloochent worden: waar by nog iets van de Long, en Longe-pijp gevoegt is.

De 1. Figuur vertoont een Hart aan de linker zyde gezien, om aan te wyzen de Aderen, die in 't linker Oor verspreyd leggen.

A Het linker Oor van 't Hart.

B De Long-slag-ader afgesneden, zijnde de andere groote Vaten hier niet gezien.

C Het Vet boven op 't Hart.

D De Vaten van 't Hart.

E De Kroon-slag-ader een weynig neerwaarts getrokken.

FG De Kroon-ader.

cc Takken der Kroon-ader, die door de zelfstandigheyt van 't Oor loopen.

De



De 2. Figuur vertoont 't Hart aan de regter zyde gezien, om aan te wyzen de Aderen, die in 't regter Oor loopen.

ACDEF Het regter Oor, Vet, en Bloedvaten, als in de voorgaande Figuur vertoont word.

B De groote Slagader afgesneden.

C Den regter tak der Kroon-ader, die na verscheyde takjes van zig gegeven te hebben (hier zijn'er weynige afgebeeld) in de zelfstandigheyt van 't Oor, zig opent met een grooten mond in desselfs holligheyt.

e Den linker tak der Kroon-ader, die eenige takjes aan 't Hart, en 't Oor gegeven hebbende, zig met eenige mondekens in de holligheyt van 't Oor opent.

De 3. Figuur vertoont de de bovenste holle Ader, de regter holligheyt en

't Oor van 't Hart open gesneden, op dat men de mondekens der Aderen te voren vermelt zou zien.

A De bovenste holle Ader open gesneden.

B De groote Slag-ader afgesneden.

C Den mond van de onderste holle Ader na agteren omgeslagen.

D Het lidteeken van 't Ovale gat.

E Den grooten mond der Kroon-ader.

F Een van de driehoekige Klap-vliezen.

G Een ander Klapvlies opgerolt.

HH De regter holligheyt wijd geopent.

I Den Grond van 't regter Oor.

aaa Mondekens van Aderen, die in de holligheyt van 't Hart open staan, waar uyt eenige druppelen van 't in-gespuyte water vloeyen.

bbb Straaltjes van 't water, die uyt ande-

re mondekens uyt-
springen.

cc Mondekens van de
takjes der Kroon-
ader, die zig in de
holle Ader openen.

d Een priemken ge-
steken in een tak der
Kroon-ader, 't welk
in de holligheyt van
't Oor uyt komt. De-
ze tak is in de voor-
gaande Figuur met e
aangewezen.

e Een priemken ste-
kende in 't monde-
ken van een der groot-
ste takken der Kroon-
ader, die in de voor-
gaande Figuur met c
geteekent is.

*De 4. Figuur vertoon
een deel van een ge-
droogde Long, in welk
de groote gaten de
openingen zijn der Va-
ten, de overige zijn de
Blaasjes.*

*De 5. Figuur vertoont de
Klieren der Long,
welke ontrent de ver-
deeling der Longe-pijps-
takken leggen.*

A Den tronk der Lon-
ge-pijp afgesneden.

BB Haargrootste tak-
ken.

CCC De Klieren, die
ontrent de tronken
en hun verdeelingen
leggen.

HET VIII. HOOFDSTUK.

Van de Longe-pijp, Strot, en Lugt-pijp genaamt.

DE 1 Longe-pijp is een zekere lange buys, die XXII. Tafel, 1. Figuur. nederdaalt van de Keel tot de Long, in welke ze met verscheide takken zig verdeelt AB.

Tot 't vierde Wervel-been van den rug, legt ze Longe-pijp. van voren op den 2 Slok-darm, daar ze zig verdeelt in twee groote takken cc. aan elke zyde een, in de groote loben der Long, welke zig dan verder in kleynder, en minder takjes verdeelende, in de Longe-blaasjes eyndigen.

De Longe-pijp word gemeenlijk verdeelt in 't *hoofd*, *tronk*, en de *voorgemelde takken*.

't Hoofd, of begin AFD. van zommigen *Larynx* Strotten- genaamt, is dikker als den tronk, en bestaat uyt vijf hoofd.

Kraak-beenderen, die in naam, en gedaante zeer ver- Kraak-beenderen. schillen.

't Grootste, dat van voren is te zien, word genaamt 't 3 Schild-wyze Kraak-been A. en omvangt Het Schild-wyze Kraak-been. niet 't gehele 4 Strotten-hoofd: want van agteren, daar 't ontbreekt, staat het tweede.

Zijn gedaante is by na vierkant, van binnen hol- agtig, van buyten bultig, maar meer verheven in Mannen als Vrouwen, gemeenlijk *Adams-appel* ge- Adams-appel. naamt.

Aan de hoeken zijn vier uytsteekfels, twee boven, die de langste zijn aa. door welke 't aan elke zyde, XXII. Tafel, 2. en 3. Figuur. met een Zenuwagtigen-band aan 't 5 Tong-been word vast gemaakt: en twee van onderen die korter zijn bb. door welke het aan 't tweede Kraak-been vast is. In die gehangen waren is dit Kraak-been, door de koorde zomtjds gebroken.

Die Zenuwagtige-band f. 1. Fig. heeft gemeenlijk

1 Aspera arteria. 2 Oesophagus. 3 Tyroides of Scutiformis.
4 Larynx. 5 Os Hyoides.

aan elke zyde een kraak-beenig knoopjen , dat zomtijds 'er niet is.

Het ¹ Schild-wyze Kraak-been heeft van boven in zijn midden een driehoekigen groef c. 2. Figuur. tot wat eynde die is, zal in de beschrijving van 't Kraak-been gezegt worden.

Het Ring-wyze.

Het tweede is 't Ring-wyze Kraak-been , zo genaamt, naar de gedaante van een Turksen-ring , dien ze gebruyken om pylen uyt te schieten. Zijn voorste deel B. 2. Figuur, is eng, en staat laager als 't voorgaande ; maar 't agterste B. 3. Figuur, is breed en dik, zo dat het als 't steunfel is van de andere.

Derde en vierde de Spleet makende.

Het derde, en vierde zijn de ² Spleetmakende, deze zijn klein, en leggen op den boord van 't Ring-wyze Kraak-been c. 3. Figuur, maken t' samen een spleet, waar door de stem wonderlijk verandert word, en gelijken t' samen niet qualijk de tuyt van een Lampet of Tuyt-kan.

Aan de buytenste zyde van 't breedste deel is een kleyne holligheyt, en in 't Ring-wyze Kraak-been een kleyn hoofdeken, dat in de voorgemelde holligheyt ingeleed, en door een vliezigen band vast gemaakt is, op dat de Spleetmakende Kraak-beenderen te beter zig zouden bewegen; maar 't Schild-, en Ring-wyze Kraak-been raken den boord der Spleet niet aan, schoon de verscheydenheyt der beweging de gesteltenis der Spleet verandert.

Het vijfde Kraak-been is het bovenste, en word genaamt 't ³ Strot-lapken, om dat het als een lapken de Spleet komt te sluyten D. 2. en 3. Figuur.

Het is by na driehoekig, want onder breed zijnde, word het na boven allengskens enger, zo nogtans dat 't eynde niet zo scherp, maar een weynig breed is, van voren naar den mond is 't wat bultig; maar agter uytgeholt.

Van onderen heeft het een rondagtig kraak-beenig bolleken 4. Figuur, waar mede 't word gevoegt in den driehoekigen groef van 't Schild-wyze Kraak-been, maar niet tot in den grond, om dat op die plaats,

¹ Tyroides of Scutiformis. ² Arytanoides. ³ Epiglottis.

een

een vliezige band is, waar mede 't ronde bolleken met 't Strot-lapken, aan 't Schild-wyze Kraak-been vast gehegt word: wanneer 't 1 Strot-lapken regt over eynd staat, gaat dit ronde bolleken dieper in dien grøef; maar als 't de Spleet stopt, wijkt het daar van af na voren. Dit kan gevoeglijk een aangroeyfel van 't Strot-lapken genaamt worden.

Nog heeft het Strot-lapken een band, c 10. Figuur, waar door 't met zijn bultig deel in 't vlies van de Long, in 't agterste deel der zelve vast gehegt word, en 't lapken eenigfints moet volgen.

Op 't bultig deel van 't Strot-lapken, onder den voorgemelden band, legt een grooté Klier, bestaande uyt vele kleine d 2. Fig. onder is ze digt en dik; maar boven word ze allengskens dunder, zo dat de Kliertjes niet meer t'famen hangen; maar hier en daar gezaayt leggen, en 't Strot-lapken met haar Buysjes doorbooren, die als kleyne stipjes in zijn holagtige oppervlakte zig vertoonen d 3. Fig.

Het Strot-lapken staat meest altijd regt over eynd, om dat de spleet voor de ademing moet open zijn; maar word, als men zwelgt, neer gedrukt, zo door de zwaarte van 't gene ingezwolgen word, als door de Long, die na agteren schiet, waar door de band, die tusschen 't bultig deel van 't Strot-lapken, en de Long gevonden word, als dan verslapt word: want dien gespannen zijnde, kan 't Strot-lapken niet neer gedrukt, nog de spleet gesloten worden.

Ook vertoonen zig vier banden, twee aan elke zyde, een onderwaarts f. en de andere opwaarts g. die aan de zyden van 't 2 Strotten-hoofd wat meer voorwaarts uytgestrekt leggen, en worden alle vier in 't voorste deel van 't Schild-wyze Kraak-been, ontrènt 't midden ingeplant: van deze banden loopen verscheyde Vezelen, zo van de zyde der 3 Spleetmakende, als van 't 4 Schild-wyze Kraak-been naar 't Strot-lapken, welke als een anderen band schijnen te maken, waar door dit Kraak-been aan beyde de andere verknogt word ii.

1 Epiglottis. 2 Larynx 3 Arytaenoides. 4 Tyroides of Scutiformis.

Tuffchen beyde de banden , is aan elke zyde in 't voorfte deel van 't Strotten-hoofd , onder 't Strot-lapken een merkelyke dwersfch gelege holligheyt hh. die met 't Vlies der naburige deelen bekleed zijn , en in welkers grond eenige kleyne Kliertjes leggen : als 't Strot-lapken de Spleet niet fluyt , staan ze open , anders worden ze gefloten : zo by ongeluk als men lagt , of fpreekt , iet van de fpijs daar in raakt , doet men niet als hoeften , tot dat het'er uyt is.

In of ontrent de Spleet van 't Strotten-hoofd , leggen zekere Klieren , van gedaante als de letter L. die van *Morgagnus* eerst zijn befchreven. Deze Klieren zijn zeer dun , en bekleed met 't vlies der naburige deelen , en vertoonen zig als een zenuwagtigen band c.

XXII. Tafel, 2. Figuur.
Naamlooze.

Een andere ronde Klier daar ontrent gelegen , grooter als de vorige ee. zegt den Heer Profeflor *Verheyen* ook ontdekt te hebben , waar aan hy geen byzonderen naam heeft gegeven.

Die Klieren met haar Buysjes , en nog andere daar ontrent , zijn waarfchijnlijk om een lymig vogt van 't bloed af te fcheyden , tot bevogting van die deelen , op dat ze door den gedurigen doorgang van de lugt , niet verdroogt zouden worden : deze Kliertjes met de Vliezen , die ze bekleeden , verftopt zijnde , zwellen in een ¹ Keel-ontfteking , waar door in korten tijd , door 't stoppen van de Spleet , de dood kan volgen.

XXII. Tafel, 1. Figuur.

Van voren onder 't ² Strotten-hoofd , legt een groote Klier , waar van zommige 'er twee maken , om dat ze aan elke zyde van 't ³ Ring-wyze , en den eerften Kraak-beenigen ring der Longe-pijp , met een lobe af-hangt HH: deze is van boven vast aan 't Ring- , en ⁴ Schild-wyze Kraak-been , van welker laafte , de Schild-wyze Kraak-beens Klier genaamt word.

Deze Klier dient waarfchijnlijk , om zeker vogt af te fcheyden , tot bevogting der naburige deelen ;

¹ Angina. ² Larynx. ³ Cricoides. ⁴ Tyroides of Scutiformis.

len; maar tot nu is de Buys, die'er toe behoort, niet ontdekt.

Zomtijds word die Klier door zeker dik vogt zeer uytgezet, makende een groot gezwel van voren aan den hals, dat zagt, nederhangende, onpijnelyk, en beweeglyk is; het gene zeer gemeen is in de *Savoy-aarts*. Men moet in 't begin 't gezwel tragten te ver- teeren; maar zo dat niet gelukt, en gedurig aan- groeyde, moet een opening gemaakt worden volgens de lengte door de huyd, en de lippen der wonde van een gehouden zijnde, moet 't gezwel met een bequaam werktuyg vast gehouden, en allengskens met een Sny- mesken uytgesneden worden. De wonde moet niet toe- genaayd, maar wat afgewassen, en de lippen met een incarnativen band aan beyde eynden worden opge- rold, die agter aan den hals begint, en waar van beyde hoofden over de wonde gaan, by malkander gebragt worden.

Aan den ingang van de Keel, en bovenste deel van 't ¹ Strotten-hoofd, legt aan elke zyde een Klier, de *Amandelen* geheten, welke, om dat ze niet tot 't Strotten-hoofd, maar tot de Klieren des monds be- hooren, onder die beschreven zullen worden.

De Kraak-beenderen van 't Strotten-hoofd wor- den bewogen door veertien Spieren, zeven aan elke zyde, waar van vier gemeene, en d' andere eygene zijn. De eygene zijn, die haar oorspronk in 't Strot- ten-hoofd nemen, en in 't zelve zig inplanten, en de gemeene zijn, die van andere deelen haar begin nemen, en zig in 't zelve inplanten; maar om dat een Spier behoort tot het deel, welk zy beweegt, is die verdee- ling niet genoegzaam.

Het zal dan beter zijn die Spieren in uyt- en in- wendige te verdeelen, om dat de vier gemeene uyt- wendig, en op de andere zijn gelegen.

't Eerste uytwendige paar word genaamt 't ² Borst- Het Schild-
wyze
Kraak-
been neer
trekkende
paar. been-schildwyze Kraak-beens Spieren EE. om dat het voort komt van 't bovenste, en binnenste deel van 't Borst-been, en ter zyden in 't Schild-wyze Kraak-

¹ Larynx. ² Sterno-thyroides.

XXII. Tafel. 3. Fi- been ingeplant word, die twee Spieren trekken dat Kraak-been neerwaarts.

guur. Het Schild- wyze Kraak-been op- trekken- de. Het Spleet openende. Het ander uytwendig word genaamt het ¹ Tong-been-schildwyze Kraak-beens Spieren FF. dit komt voort van 't breedste deel van 't Tong-been, en plant zig in 't Schild-wyze Kraak-been, deze twee trekken dat Kraak-been opwaarts.

't Eerste inwendig paar word genaamt 't ² voorste Ring-schildwyze Kraak-beens paar: die twee Spieren komen van voren uyt het Ring-wyze Kraak-been G. en schuyns naar agteren opklimmende, planten zig ter zyden in 't Schild-wyze Kraak-been, deze trekken het Schild-wyze Kraak-been aan de zyden uytwaarts, om de holligheyt van 't Strotten-hoofd te verwyden, en de spleet te openen.

Het Spleet openende. 9. Figuur. Het tweede inwendige word genaamt 't ³ agterste Ring-wyze, Spleetmakende Kraak-beens paar AA: Deze nemen haar oorspronk van 't agterste deel van 't Ring-wyze Kraak-been, en planten zig in de Spleetmakende Kraak-beenderen: die Spieren openen de Spleet.

Het Spleet sluytende. Het derde inwendige word genaamt ⁴ 't bovenste Ring-wyze Spleetmakende Kraak-beens paar B: deze Spieren komen boven uyt de zyden van 't Ring-wyze Kraak-been, en dalen schuyns naar de Spleetmakende Kraak-beenderen der tegen over gestelde zyde A: en sluyten de Spleet.

Het zydelijk Spleet openende paar. Het vierde inwendige word genaamt het ⁵ zydelijk Ring-wyze Spleetmakende Kraak-beens paar E: deze nemen haar oorspronk ter zyden van het Ring-wyze Kraak-been, en eyndigen zydelijker in de Spleetmakende Kraak-beenderen van den zelve kant, en verwyden de Spleet.

Het Spleet sluytende paar. Het vijfde inwendige word genaamt het ⁶ Schild-wyze Spleetmakende Kraak-beens paar F. Deze Spieren leggen voor 't grootste deel onder 't Schild-wyze Kraak-been, van binnen voort komende met een

¹ Hyo-thyroides. ² Crico thyroides antic. ³ Crico-arytenoides poster. ⁴ Crico-arytenoides Superi. ⁵ Crico-arytenoides laterale. ⁶ Tyro-arytenoides.

breed begin, en planten zig in de zyden van de Spleetmakende Kraak-beenderen: deze fluyten de Spleet.

Het ¹ Strotten-hoofd heeft twee Vliezen, 't een is uytwendig, en verknogt met 't gene uytwendig de Longe-pijp omvangt: 't andere is inwendig, en 't zelve, dat van binnen den mond bekleed.

Het heeft twee takken van Zenuwen, komende van de wederkeerende: deze verspreyden zig in de Spieren van 't Strotten-hoofd, om ze te doen bewegen, en de stem te maken: want in een levendig dier gebonden, of afgesneden zijnde, maakt het geen geluyd; Slag-aderen krijgt het van den grootsten tak der ² Krop-slag-ader, en Aderen van de uytwendige ³ Krop-aderen.

Wanneer een wonde in de holligheyt van 't Strotten-hoofd door gaat, verliest de Lijder de spraak, en de lugt komt door de zelve. Die wonden zijn zeer gevaarlijk om d' engte der Spleet, die ligtelijk door 't uytstortende bloed gestopt, of door ontsteking, die'er by komt, kan toezwellen, gelijk in de Keel-ontsteking geschied, waar door de Lijder stikt.

Door uytwendige lighamen, die in 't Strotten-hoofd schieten, stikken de Menschen.

Na 't hoofd der Longe-pijp, volgt de tronk B. welke is gemaakt uyt verscheyde Kraak-beenderen, die even wijd van malkander staan, en door zekere Vliezen t'samengevoegt zijn: ieder Kraak-been heeft de gedaante van een halven ring, gelijk een C: want van agteren, daar de Longe-pijp op den ⁴ Slok-darm legt, is ze vliezig E. 3. Fig. op dat de harde Kraak-beenderen het doorzwellen der spijs niet zouden verhinderen.

Van 't ⁵ Ring-wyze Kraak-been, tot daar de ⁶ Longe-pijp zig verdeelt, telt men gemeenlijk 20. of 21. Kraak-beenderen.

Het Vlies, waar mede ze te zamen gevoegt worden, is in 't agterste deel zeer vleezig, en dobbel.

¹ Larynx. ² Arteria carotis. ³ Venæ jugulares. ⁴ Oesophagus.
⁵ Cricoides. ⁶ Aspera Arteria.

't Eerste, dat de inwendige oppervlakte der Longe-pijp bekleed, bestaat uyt zekere Vezelen, die volgens de lengte der zelve loopen, en is zeer gevoelig; zo dat als de minste spijs, of drank, in de Longe-pijp gaat, hoeft men, tot dat ze uytgedreven is, hoewel eenigen meenen dat dit Vlies nog met een dun, en ander Vlies bekleed is, waarom het zo gevoelig is.

Het volgende Vlies bestaat uyt by na geheele rond loopende Vezelen, die met de voorgaande een kruys maken; deze beyde Vliezen of Rokken te samen werkende, de eerste met de Longe-pijp te verkorten, en de andere met ze te verenigen, drijven uyt dat haar schadelijk is.

Willis voegt'er nog twee Rokken by: een Klierigen, en een Varigen Rok; de eerste is in de 11. en de tweede in de 12. Fig. afgebeeld, en bevogtigt den Klierigen Rok, ende inwendige oppervlakte der Longe-pijp, met een lymig vogt, op dat ze door de lugt niet zou verdroogen.

De andere Rok of Vlies, waar mede de ¹ Longe-pijp van buyten bekleed en met menigte Bloed-vaatjes doorweven is, kan in vele Vliesjes gescheyden worden. En door dat Vlies is de Longe-pijp aan den ² Slok-darm vast gebonden.

De Longe-pijp geeft de lugt onder 't ademen, in-, en uytgang.

Een vreemt toeval, dat zomtijds volgt op wonden van de Longe-pijp, is de *Empyssema* of Lugt-gezwel: want de wonde tot in de holligheyt door gaande; en de lugt niet onbelemmert uyt de Longe-pijp, door de wonde na buyten kunnende komen, dringtse in korten tijd over al in de Vet-blaasjes, niet alleen in den hals, die uytermaten opzwellt; maar ook door 't Hoofd, Borst, Buyk, en de Armen, zo dat de Lijder als een monster is, dit geschied ook om de zelve reden in doorgaande wonden der Borst. Zie onze Verhandeling van de Handwerken der Heelkonst, het XXI. Hoofdstuk van de Etter-borst, daar verschey-

¹ Aspera Arteria, ² Oesophagus.

de voorbeelden van de *Emphysema* by gebragt zijn.

In een ¹ Keel-ontsteking, daar de Lijder in gevaar van stikken is, gebieden de Schrijvers een opening te maken in de Longe-pijp, tusschen den derden en vierden Kraak-beenigen ring, om de lugt, die door den gewoonlijken weg naar de Longen niet onbelemmert kan gaan, daar een vryen doorgang te geven, en zo de dood des Lijders voor te komen; maar alzo ik in 't Ontleden ondervonden heb, dat de Klier aan 't bovenste deel der ² Longe-pijp gelegen, waar van te voren is gesproken, in den eenen Mensch, zomtijds grooter is, als in den anderen, en op die plaats eenige ringen bedekt, zo raad ik, als men die operatie doet, de opening zo verre na beneden te maken, als mogelijk is, zo'er maar plaats genoeg is, om de Longe-pijp behoorlijk te ontdekken, en te openen, en hier door worden de vogten van 't zelve deel afgeleyd.

HET IX. HOOFDSTUK.

Van de Long.

DE Long is een groot Ingewand, gelegen in de ^{XXII. Tafel, 1. Figuur.} holligheyt der Borst, die ze benevens 't Hart, by na vervult II.

Van boven word ze vast gehegt aan de Keel, door ^{vast-heg-} de Longe-pijp, die zig door haar verspreyd: aan ^{ting.} de Rug-graat, en 't Borst-been door 't ³ Midden-schot; als mede aan 't Hart door de Long-ader, en Slag-ader.

De Long word verdeelt in een regter, en linker deel, of in twee groote loben, die zodanig van malkander gescheiden zijn, dat ze niet als door de deelen, die zet'samen hegten, een lighaam maken. En daarom zegt men een Dier zodanige Longen te hebben, als of'er meer als een was.

Ieder groote lobe word ten minsten in twee andere

¹ Angina. ² Aspera Arteria. ³ Mediastinum.

gescheyden , of een van beyde zomtjids wel in drie
 XXII. Ta. LL. of vier , dog die fcheyding gaat ondiep , en noyt
 fel, 1. Fi. door van voren tot agteren.

guar. Als de Longe-pijp wat opgeblazen word , vertoont
 Gedaante ieder groote lobe een *Paarde-voet* KK ; maar t' famen
 der Long. zijnde aangemerkt , verbeelden ze een *verkeerden* *Offe-voet*.


De zelfftandigheyt der Long bestaat uyt zekere vlie-
 zige blaasjes , welke van de Vliezen , die de ¹ Longe-
 pijp met haar takken bekleeden , gemaakt zijn , en
 als druyven vast hangen ; zo dat uyt ieder tak der
 Longe-pijp een doorgang is tot vele blaasjes , die
 alle de een in d' ander , een gebaanden weg hebben ,
 en weder van de blaasjes tot den tak , zo dat een tak
 alleen opgeblazen zijnde , alle de blaasjes , die tot den
 zelven behoren , wonderlijk opzwellen , en de andere ,
 welke met dien tak gemeenschap hebben , ftijl leg-
 gen.

Zo een tak met de blaasjes , maakt een inwendig
 lobeken , (om ze te onderscheyden van de kleyne lo-
 bekens , te voren beschreven) dat met zijn eygen
 Vlies omkleed is , en uyt al die lobekens is t' famen
 gevoegt ; behalven de Vaten , waar uyt de gansche
 Long is gemaakt : deze lobekens worden van mal-
 kanderen gescheyden door zekere tuffchenheden , die
 volgens *Malpigi* geen enkele holligheden , of ruym-
 tens zijn ; maar van vele Vliesjes doorweven worden ,
 die of evenwijd , of met hoeken , van 't een lobeken
 na 't ander gaan , en waar door vele Bloed-vaatjes
 loopen , zo dat die tuffchen-ruymten eenige vleesag-
 rige , en doorschijnende blaasjes zijn , die met de an-
 dere gemeenschap hebben.

1 Aspera Arteria.

U Y T.





U Y T L E G G I N G

der

F I G U R E N ,

van de

XXII. T A F E L.

Waar in verthoont worden de Longe-
pijp, en Longen, benevens eenige
andere deelen.

*De 1. Figuur verthoont de
Longen met der zelve
pijp uyt 't Ligbaam
genomen.*

A Het Strotten-hoofd.
B Den tronk der Lon-
ge-pijp.

CC Der zelve twee
groote takken.

D Het Strot-lapken.

EE Borstbeen-schild-
wyze Kraak-beens
Spieren.

FF Het Tongbeens-
schild-wyze Kraak-
beens Spieren.

G Het Ring-schild-
wyze Kraak-beens

voorstte Spieren.

HH De Klier onder
't Schild-wyzeKraak-
been.

II De groote loben der
Long.

KK De onderste dee-
len der Long een
Paarde-voet verbeel-
dende.

LL De scheidningen
in de groote lobe.

a De Klier tusſchen
de takken der Lon-
ge-pijp cc.

b De Klieren, die aan
de zyde der Longe-
pijp leggen.

c De

- c De groote takken der Long-flag-ader.
- d De groote takken der Long-ader.
- e Het Tong-been.
- ff Den band tusschen 't Tong-been en 't Schild-wyze Kraak-been.
- g De Spieren weg genomen zijnde, ziet men de Kraak-beenderen van 't Strottenhoofd: in de 2. Fig. van voren, en in de 3. van agteren.
- De 2. Figuur vertoont*
- A Het Schild - wyze Kraak-been.
- B Het Ring - wyze Kraak-been.
- D Het Strot-lapken.
- aa De twee bovenste uytsteekfels van 't Schild-wyze Kraak-been.
- bb De twee onderste uytsteekfels.
- c De groeve in 't Schild-wyze Kraak-been.
- d De Klier, die op 't bultig deel van 't Strot-lapken legt.

De 3. Figuur vertoont

C De plaats van de ongenaamde Klier.

c De twee Spleetmakende Kraak-beenderen.

d De mondekens der Buysjes van de Klier, die afgebeeld is in de 2. Fig.

ee De Klieren der Longe-pijp.

De 4. Figuur vertoont 't Strot - lapken van de andere Kraak-beenderen afgescheyden, en gezien aan zijn bultige zyde.

A Het Strot - lapken met zijn rond bolleken.

B Het Strot - lapken zonder 't bolleken.

De 5. en 6. Figuur vertoonen beyde de Spleetmakende Kraak-beenderen.

De 7. Figuur vertoont 't voorste deel van 't Ring - wyze Kraak-been.

De 8. Figuur vertoont des zelfs agterste deel.

De 9. Figuur vertoont de Spie-

Spieren van 't Strotten-hoofd aan zijn agterste deel.

AA De Ring - wyze Spleetmakende Kraak-beens Spieren.

B De bovenste Ring - wyze Spleetmakende Kraak - beens Spieren.

De 10. Figuur vertoont de Spieren van 't Strotten-hoofd aan de zyde.

A Het Ring - wyze Kraak-been.

B Het Schild - wyze Kraak-been.

C Het Strot-lapken.

c Den band aan zijn bultig deel.

D De voorste Ring - schild - wyze Kraak-beens Spier.

E Den zydelijken Ring van de Schild - wyze Kraak - beens Spier.

F De Schild - wyze Spleetmakende Kraak-beens Spier.

De 11. Figuur vertoont 't Strotten-hoofd van agteren in 't midden

volgens de lengte doorsneden, op dat men 't van binnen zou zien.

AA Het Schild - wyze Kraak-been.

BB Het Ring - wyze Kraak-been.

CC De twee Spleetmakende Kraak-beenderen.

E Het Strot-lapken.

aa De mondekens der Buysjes van de Klier, op zijn bultig deel gelegen.

bb Den zydelijken band van 't Strot-lapken.

c De Spleetmakende Kraak-beens Spier, met den band bedekt.

ee De ongenaamde Klier, die de tusschen- heyt vervult der twee Spleetmakende Kraak-beenderen.

ff Sterke banden, waar door 't Schild - wyze en de Spleetmakende Kraak-beenderen aan malkander gehegt worden : deze moeten staan op den band

- onder de groote holligheden.
- gg De bovenste banden , waar door de voorgemelde Kraakbeenderen onder mal-kander , en met 't Strot-lapken vast ge-hegt worden.
- hh Grote holligheden tusschen de voorge-melde Banden gele-gen.
- ii De Vezelen, die van den bovensten Band tot aan 't Strot-lap-ken uytgestrekt leg-gen.
- k Een deel van den tronk der Longe-pijp.
- ll Klieren , die op 't Vliezige deel der Lon-ge-pijp leggen.
- De 11. 12. 13. en 14. Figuur zijn Rokken der Longe-pijp , van welke de 11. 12. en 13. uyt Willis is ge-nomen.*
- De 15. Figuur vertoont het Vlies , dat de Long bekleed.*
- A 't Inwendig Vlies-ken , dat de Long bekleed , met zijn puttekens als een ho-nigraat , uyt *Willis* genomen.
- B Des zelfs uytwen-dig Vliesken.

Deze lobekens ziet men klaar , wanneer 'er een groote tak geopent is , en als in een minder , nu in d' een , dan in d'ander word geblazen , dan zal 't lobeken tot een tak behoorende opzwellen , en zijn omtrek schoon vertoonen.

De Long heeft twee Vliezen , een uytwendig , dat dun , en uyt zenuwagtige draadtjes schijnt te zijn ge-weven , A 15. Fig. 't ander is ruuw , en wat dikker , en bestaat by na alleen uyt de eyndekens der vaarjes van de Long-blaasjes , in welk eenige puttekens zijnde , vertoont zig de inwendige oppervlakte als een honig-raat B.

Eenige Schrijvers zeggen , dat dit Vlies zodanige gaatjes heeft , dat ze 't vogt in de holligheyt der Borst kon-

konnen opflurpen, en dat niets uyt de Long, door de zelve naar de voorgemelde holligheyt kan gaan; maar dit is een verzonnen onderstelling, om uyt te leggen, hoe in de ¹ Etter-borst uyt een ² Zyde-wee ontstaan, zomtjds een deel van de Etter door den mond uytgespogen word. Dog 't is niet noodig zulke gaatjes te verziere, dewijl 't ligt gebeuren kan, dat niet alleen 't ³ Ribbe-vlies in een Zyde-wee, maar 't Vlies der Longen zelf, dikwils te samen gegroeyt zijn, en de zelfstandigheyt der Long mede is verettert, zo dat als dan de Etter ligt in de Long kan komen, en door den mond uytgespogen worden, gelijk door de volgende aanmerking word bevestigd.

Ik ben over eenige jaren ontboden, in 't Engels Gasthuys om raad te geven benevens den Doctor, en Heelmeeſter aan een Krijgs-man, die'er ziek lag. Als hy inademde, vertoonde zig een gezwel zo groot als een hennen-ey, tuſſchen de eerſte en tweede Ribbe, ter zyden 't Borst-been aan de linker zyde, dat in 't uytademen wat verminderde. Ik vraagde of hy te voren van geen pijn op die plaats geklaagt had, men zeyde ja, en dat hy Etter had gespogen; waar op my aanſtons in gedagten quam, dat ik dikwils Lighamen had geopent, daar de Long aan 't Borst-vlies vaſt gegroeyt was, gelijk hier was geſchied: want op die plaats een ontſteking gekomen zijnde tot zweering, heeft de Etter de Long mede beſchadigt, waar door ze in de Long-blaasjes in drong, en wiert uytgehoest, maar niet alleen had de Etter 't Borst-vlies en de Long doorgegeten, maar ook de Tuſſchen-ribbige Spieren en Vet-blaasjes, zo dat de lugt een doorgang vindende, van de Longen tot in de Vet-blaasjes in was gedrongen; waar door de linker zyde der Borst, Buyk en Bal-zakjen vanden Lijder was gezwollen, even gelijk de Schapen, die door de Vleeshouwers zijn opgeblazen.

Ik heb in vele Lighamen gezien, dat niet alleen de Long op zommige plaatsfen, aan 't Ribbe-vlies vaſt was gegroeyt; maar dat de Longen met 't Ribbe-

1 Empyema. 2 Pleuritis. 3 Pleura. 4 Diaphragma.

vlies, en 't 4 Midden-rift zo vereenigt waren, dat'er geen holligheyt in de Borst was.

Ook zal in Menschen, daar de Long aan 't Ribbevlies gegroeyt is, op die plaats ligter een Zyde-wee komen, als op een andere, om dat in die Vliezen, wegens haar t' samenhegting een groter belemmering tot den doorgang der vogten is, zo datse daarom ook ligtelijk t' samen verzweeren.

Om 't maakfel, en gebruyk der Longe te verstaan, moet men de Vaten kennen. Deze zijn Slag-aderen, Long-aderen, takken der 1 Longe-pijp, Zenuwen, en Water-vaten.

Onder de Aderen, en Slag-aderen zijn'er gemeene, en andere eygene.

Gemeene en eygene. De gemeene zijn, die de Long heeft tot dienst van 't gansche Lighaam, en de eygene zijn alleen tot dienst van de Long. De eerste zijn de Long-ader, en Slag-ader, onder de Vaten van 't Hart in 't VII. Hoofdstuk van deze Verhandeling beschreven.

Long-slag-ader. De Long-slag-ader is dat deel, waar door 't bloed uyt de regter holligheyt van 't Hart word gebragt in de Long, op dat het daar met nieuwe lugt zou vervult zijn, en de Long-ader brengt het zelve bloed terug in de linker holligheyt van 't Hart, van waar 't door middel der groote Slag-ader, naar alle de deelen van 't Lighaam verzonden word.

Long-pijps-takken Slag-ader. De eyge Slag-ader der Long, is de 2 Long-pijps-takken Slag-ader, haar oorspronk nemende aan 't agterste deel der groote nederdalende Slag-ader, boven 't breedste deel van 't Hart, van waar ze na de regter zyde om buygende, de Longe-pijp omhelst, en eenige takjes aan den 3 Slok-darm mede gedeelt hebbende, verzeld hare takken tot aan 't eynde der zelve D. 2. Fig. zelden word die Slag-ader alleen gevonden: maar dikwils vind men'er twee, en ook wel drie, welkers oorspronk wel een dwersche vinger meer of min, zomtijds van malkander is. Ze komen onmiddelijk voort, nu uyt de groote nederdalende Slag-ader, dan van de Tusschen-ribbige, of zo, dat 't

XXIII.
Tafel.

1 Aspera Arteria. 2 Arteria Bronchialis. 3 Oesophagus.

be-

begin der Long-pijps-takken Slag-ader, en der Tuf-schen-ribbige gemeen is.

De Long-pijps-takken Slag-ader word verzeld met een Ader van den zelve naam, die onmiddellijk voort komt van de bovenste holle Ader.

De Long-pijps takken Ader.

De Long-pijps-takken Slag-ader bezorgt het voedsel voor de takken der Long-pijp, en mogelijk ook voor de Long, en brengt waarschijnlijk de stoffe aan, tot opspanning der Vezelen, die dienen tot verenging der voorgemelde deelen: want schoon 't bloed van 't gansche lighaam, door de Long-slag-ader in ieder omloop door de Longen vloeyt, zo schijnt nogtans dit bloed, om dat het te voren in de andere deelen van 't lighaam zijn lugt-deeltjes, en 't meeste voedzame zup heeft afgelegt, niet bequaam te wezen tot de voorgemelde diensten, ten zy 't eerst in de Long, met lugt-deeltjes bezwangert word, en in de linker holligheyt van 't Hart behoorlijk opgift. De Ader brengt 't bloed, dat weder keert, te rug.

Gebruik.

Het derde soort der Vaten van de Long, zijn de takken der Longe-pijp: want gelijk in 't voorgaande Hoofdstuk is gezegt, daalt ze neder in de Long, daar ze zig verdeelt, eerst in twee groote takken, daar na in kleynder, en nog mindere, tot dat ze eindigt in de blaasjes, die de eyge zelfstandigheyt der Long uytmaken.

Takken der Longe-pijp.

De takjes, zo wel als de Longe-pijp, bestaan uyt kraak-beenderkens, en uyt vliezen.

In de twee grootste takken zijn de Kraak-beenderen als volkomene ringen; maar in de kleynder zijn ze van een ongeschikte gedaante, op dat de pijpjes, die ze t' samen stellen, op alderhande wyze verengt zouden kunnen worden, om uyt te dryven de dingen, die de Longe schadelijk zijn.

Verzelling der drie soorten

De takken der Longe-pijp, de gemeene Ader, en Slag-ader, verzellen malkander over al, zo dat de tak der Longe-pijp A. altijd is 't in midden, aan welkers eene zyde de tak der Slag-ader B. en aan de andere zyde de Ader legt.

van Vaten. XXIII. Tafel. 2. Figuur.

1 Aspera Arteria.

P 3

De

Water-
vaten.

De Long heeft vele Water-vaten ff. 1. Fig. die, uyt by na ontelbare takjes, tot grooter vaten geworden zijnde, in de Borst-buys eyndigen.

Zenuwen
der Long.

In de Long zijn veel Zenuwen, volgens getuygenis van den Heer *Willis*, die regt over 't Hart uyt het dwalende paar voort komen, en door de Long zig verspreyden.

Die Zenuwen ziet men uytgespreyd in de 3. Figuur, van de XXIII. Tafel, zo als *Willis* en den Heer *Verheyen* zeggen, de zelve zomtjids zo vertoont te hebben.

Gebruik
der Long.

De Long ontfangt de logt door de ¹ Longe-pijp in 't inademen, op dat het bloed door de Long-slag-ader, en Ader omloopende in de zelve, met de lugt bezwangert zon worden, en drijft de lugt in 't uytademen, met de oude in 't bloed omgeloopene lugt-deeltjes uyt.

De wonden der Long zijn niet altijd doodelijk, ten zy ze diep in gaan, en groote Vaten gequetst zijn, voornamelijk ontrent 't Hart. Ziet een voorbeeld by *Hildanus*, in 't II. deel van zijn Aanmerkingen de 32^{ste}. pag. 148. van een doorgaande Borst-wonde, daar de Long uyt quam, waar van een deel weg genomen, en de Lyder genezen is.

Uyt een ontsteking der Long, *Peripneumonia*, die tot zweering komt, breekt d' Etter zomtjids door, en valt op 't Midden-rift, waar uyt een *Etter-borst* ontstaat, ten ware op die plaats, de Long aan 't Borst-vlies vast was, gelijk ik gezien heb, en dan knaagt de Etter zomtjids de Tusschen-ribbige Spieren door, van buyten een gezwel makende, 't welk geopent zijnde, de Lyders meerniaals genezen.

¹ Aspera Arteria.

HET X. HOOFDSTUK.

*Van de Klieren der Long-
pijps - takken.*

Alwaar de Longe-pijp zig verdeelt in de eerste ^{Klieren} twee takken, en aan 't meeste deel der andere, ^{van de} ook op andere plaatsen aan de zyden, en aan 't on- ^{Long-} derste der takken, ziet men zekere Klieren: vele leg- ^{pijps tak-} gen dicht aan de takken, en andere verre daar van af. ^{ken.}

Het getal van die Klieren kan niet wel bepaalt wor- ^{Getal.} den, maar men zou over de hondert in een Long kunnen tellen.

De grootste dier Klieren zijn, die gemeenlijk aan ^{Groote.} de verdeeling der grootste takken leggen, en zijn dikwils grooter als een Hazel-noot; maar naar de oppervlakte der Longen, worden ze allengskens minder, en zijn eenige zo groot als een erwt.

Deze Klieren zijn zagt, hebbende een Vlies van ^{Zelfstan-} zwartagtig kouleur. ^{digheyt.}

Ze zijn verscheide van gedaante: eenige zijn by na eyrond, andere driehoekig, en hebben een effe oppervlakte, zo dat ze met regt onder de ronde Klieren gerekent worden.

Aderen en Slag aderen hebben ze van de Longe-ader, en Slag-ader.

Zenuwen krijgen ze van 't dwalende paar, voornamelijk uyt een vlegting.gelegen in 't begin van de Borst.

De uyt-loozende Buysjes van die Klieren, zijn nog niet ontdekt; 't is wel te denken, dat ze kleyn, en kort zijn, om dat ze zo na by de Long-pijps takken leggen. 't Is waarschiynlijk, dat ze zeker vogt van 't bloed af-scheyden, gelijk de andere doen; maar wat voor vogt het is, en waar 't na toe vloeyt, is onzeker: 't is wel te denken, dat die Klieren een lymig vogt af-scheyden, waar mede de inwendige oppervlak-

vlakke der Long-pijps takken word bestreken , op dat ze door de lugt niet te droog zouden worden , en om dat de groote takken van dat vogt meer nodig hebben als de kleyne , daarom zijn de Klieren daar ontrent gelegen ook veel grooter.

Maar iemand zal mogelijk zeggen , dat aan den tronk der Longe-pijp zodanige Klieren niet geplaatst zijn , en die nogtans met zo een vogt bestreken is ; men antwoord , dat boven aan de zelve , een groote Klier is , en beschreven in 't VIII. Hoofdstuk van deze Verhandeling , en aan gewezen in de 1. Figuur HH. van de XXII. Tafel , die grooter is als vele van de andere 't' samen , en dat 't afgescheyde vogt , in 't bovenste deel der Longe-pijp , van daar nederzinkt , en de pijp besmeert : boven dien zijn tot dien eynde veel kleyne Kliertjes agter aan de rokken der Longe-pijp : ook weet men nog niet , waar toe de Klieren dienen van den hals ; wiens groote Klier , in zelfstandigheyt , en kouleur zeer na by met die over een komt . Mogelijk dat die Klieren ook uytloozende Buysjes hebben , die zig in de holligheyt der Longe-pijp ontlasten .

In 't jaar 1705. heb ik in een Zoldaat , aan de rechter zyde der Longe-pijp , daar ze zig verdeelt in de eerste twee takken , een steen gevonden , van een eywyze gedaante , en zo groot , als een duyven ey , dat waarschijnlijk een steen verharde Klier was .

In de Aanmerkingen van den Heere *Kerkring* , leeft men op de XXVII. het volgende op-schrift . *Zekere Steenen , die de Long-pijps takken drukten , en de dood veroorzaakt hebben .* Zonder twijfel zijn de Steenen , die hy in de Long van dat lighaam heeft gevonden , en afgebeeld , anders niet geweest , als tot steen verharde Klieren , welke grooter en met hoeken waren , dewijl de steenen , die hy af-beeld , in plaats over een komen met de Klieren , die te voren beschreven zijn . Zie diergelijk voorbeeld by *Hildanus* in 't 2de deel van zijn Aanmerkingen de XXIX. pag. 146.

HET XI. HOOFDSTUK.

Van den Slok-darm.

DE ¹ Slok-darm is een zekere vliezige Buys, van slok-
de keel tot in de maag uytgestrekt, om spijs, ^{darm.}
en drank, daar in te brengen. Zie de 4. Fig. van de
XXIII. Tafel.

Hy legt van agteren tegen 't vliezig deel der Longe-Plaats.
pijp, op de Wervel-beenderen des hals, en rugs: ont-
trent het vijfde Wervel-been des rugs, wijkt hy wat
na de regter zyde; maar ontrent 't negende, na de
linker, en tot 't elfde gekomen zijnde, boort hy door
't ² Midden-rift, en plant-zig in den linker mond der
maag. In bejaarde is hy ontrent zo ruym, als een Ruymte.
dunne Darm.

Ontrent het vijfde Wervel-been des rugs, heeft hy
van agteren twee, en zomtijds meer, die dan minder
zijn, by een gevoegde Klieren, van gedaante, en Klieren.
groote als een Turkse-boon, die den Slok-darm van
binnen bevogtigen, op dat de Spijs te beter zou door-
gaan. Den Heer Professor *Verheyen* zegt een Lijder
gezien te hebben, die door een zwelling, en verhar-
ding dezer Klieren, elendig van honger is gestorven.
't Lighaam geopent zijnde, vond men de zyden van
den Slok-darm, door de groote perssing t' samen ge-
groeyt, en den Slok-darm onder de Klieren zeer
verhard.

Ik heb over 24. jaren binnen Yperen een Vrouw
van een Vleeshouwer gekent, die van die quaal is ge-
storven.

De Slok-darm bestaat, gelijk de Maag, en Dar-Rokken
men, uyt drie rokken: den buytensten, die Vliezig, ^{van den}
den middensten, die Spieragtig, en den binnensten, die ^{Slok-}
Zenuwagtig is. ^{darm.}

De buytenste rok is gemeen, en verknogt met dien

¹ Oesophagus. ² Diaphragma.

der Maag, en door dien schijnt hy van den Pens-zak voort te komen E.

XXIII.

Tafel.

4. Figuur.

De tweede Rok is zeer dik, en Vlees- of Spieragtig, gelijk een doorgeboorde spier, bestaande uyt tweederley soort van vleezige Vezelen: de buytenste F loopen volgens de lengte des Slok-darms, en de binnenste G zijn Ring-wys, en loopen in 't rond, zo dat ze met de vorige een kruys maken.

Tusschen den vleezigen of spierigen Rok, en den zenuwagtigen, die de binnenste is, zijn'er twee andere, waar van de geene, die naast den spieragtigen legt, bestaat uyt zekere onordentlijk loopende Vezelen, die met ontelbare Bloed-vaatjes zijn doorweven H. 4. Fig.

Vatagtige Rok.

De andere, die onmiddelijk aan den zenuwagtigen Rok vast is, bestaat uyt zekere Vezelen, die eenig-sints spieragtig zijn, en volgens de lengte des Slok-darms loopen. Deze Rok is doorzaayt met veel kleyne Kliertjes I, en daarom word hy de klierige, en de andere de vatagtige Rok genaamt.

Klieragtige.

De binnenste Rok is zeer dun, en geheel zenuwagtig K. deze schijnt verknogt te wezen met den genen, die de keel, mond, en lippen bekleed.

De binnenste oppervlakte van dien Rok, word met een wolagtige korst bekleed 5. Fig. deze korst is veel dunder dan die der Maag en Darmen; maar hy is vast van maaksel, en kan voor een byzonderen Rok gehouden worden. Dog zonder dezen, kan men in den Slok-darm vijf verscheyde Rokken tellen, te weten: de *Vleezige* E, de *Spieragtige* FG, de *Vatagtige* H, de *Klierige* I, en de *Zenuwagtige* K.

Vijf Rokken van den Slok-darm.

Gebruik der Rokken.

't Gebruik en werking van de Rokken des Slok-darms, geschied meest door den spierigen, en den zenuwagtigen Rok, dewijl de andere ten dienst van deze schijnen gemaakt te zijn.

Van den Spierigen Rok.

De Ring-wyze Vezelen des spierigen Roks, verenigen, als men iet doorzwelgt, den zelve, en drijft de stoffe, die doorgezwolgen moet worden, naar de Maag. Maar de Vezelen, die volgens de lengte loopen,

pen, ſchijnen door haar t' ſamentrekking den Slokdarm te verwijden, op dat de ſtoffe te beter doorgezwoegen zou kunnen worden.

Van den Zenuwagtigen.

De zenuwagtige Rok is voornamelijk tot het gevoel, en ſchijnt 't voornaamſte werktuyg te wezen, waar door de Ziel een denkbeeld krijgt om te drinken.

Van den Klieragtigen.

De Kliertjes van den vierden Rok dienen waarſchijnlijk om zeker vogt af te ſcheyden, tot bevogting van de inwendige oppervlakte des 1 Slokdarms.

Keel-gat.

Het begin van den Slokdarm, word gemeenlijk het Keel-gat of Pharynx genaamt, en dewijl 't dient, om de gekauwde ſpijs te ontfangen, en vorders naar den Slokdarm te dringen, geſchied dit door zes Spieren, drie aan elke zyde, welke, om dat ze in 't begin des Slokdarms eyndigen, de 2 Keel-gats Spieren genaamt worden.

't Eerſte paar, 't welk 't grootſte van alle is, zijn de 3 Hoofd-keel-gats Spieren der Ouden DD. die geloof hebben, dat ze van 't agterſte des hoofds quamen; maar ze komen voort van een verheventheyt des Wiggebeens, ter zyden de 4 Vleügel-wyze uytſteekfels, en eyndigen in 't opperſte van 't Keel-gat, deze trekken 't Keel-gat na agter.

Eerſte paar Spieren. XXIII. Tafel. 4. Figuur.

Het tweede paar word de 5 Wiggebeen-keel-gats Spieren genaamt CC. om dat ze van 't Wiggebeen beginnen, en ter zyden in 't Keel-gat tuſſchen 't eerſte, en 't tweede paar geplant worden, en dienen om 't Keel-gat na om hoog te trekken.

Tweede.

Het derde paar, zijn de 6 Priem-keel-gats Spieren BB, deze komen voor van 't Priem-wyze uytſteekfel, en eyndigen in de onderſte zyde van 't Keel-gat, wanneer alle die Spieren te ſamen werken, zo openen ze het Keel-gat, 't welk dient om de gekauwde ſpijs te ontfangen, en ingang te geven.

Gemeenlijk is 'er maar een Spier, die den Slokdarm toe trekt; maar den Heer *Verheyen* ſtelt twee onderſcheyde Spieren AA welke beyde haar oorspronk nemen agter aan elke zyde van 't 7 Schild wyze Kraak-

1 Oefophagus. 2 Pharyngi. 3 Cephalo-pharyngaus. 4 Apophyſes pterigoides. 5 Spheno-pharyngaus. 6 Stylo-pharyngaus. 7 Tyroides of Scutiformis.

been

been, en eyndigen in 't agterste des Slok-darms.

Hoe de
door-
zwellings-
geschied.

Het voornaamste werk van den Slok-darm, is spijs en drank naar de Maag te brengen, als die zal door gaan, word het Keel-gat door de zes eerste Spieren van alle zyden trekkende, geopent, en 't voorste deel des Slok-darms open staande, gelijk blijkt uyt de 4. Fig. word spijs, of drank, door de beweging der tong, en kaken, in 't Keel-gat a voort gestoten, en de eerste Spieren ophoudende aanstonts te werken, trekken beyde des Slok-darms Spieren zig te saamen, en zo de opening toetrekken, dryven ze de stoffe vorder in den Slok-darm.


In de Keel of Slok-darm, blyven zomtijds beentjes, graten, naalden, of spelden steken, zo men ze kan zien, moeten ze met den vinger, of een bequaam werktuyg uyt getrokken worden; maar zo ze dieper zijn, laat men de Lijder een kruym brood half gekauwt inzwelgen, of men doet hem braken, en zo 't niet wil gelukken, moet men 't met een bequaam werktuyg, naar de Maag doorsteken.

Door 't dikwils met werktuygen in den Slok-darm te steken, voornamelijk als 't gene door gegaan, of daar in is blyven steken, de Slok-darm bezeert heeft, ontstaat zomtijds door de ontsteking de dood, gelijk *Hildanus* door een voorbeeld bevestigt.

Zomtijds kan men vogtig, maar geen vast voedsel inzwelgen, om dat 't Keel-gat te eng, gezwollen, of andersints beledigt is. Zomtijds kan men vaste spijs, en geen vogtige inzwelgen, welke met gevaar van stikken, ter neus, en mond uyt komt, en dan is 't gebrek in 't Strotten-hoofd: want het Strot-lapken niet wel de Spleet sluytende, word ligtelijk door 't vaste voedsel neer gedrukt; maar niet door 't vogtige, welke in 't Strotten-hoofd in loopende, met geweld, en gevaar van stikken uytgedreven worden. Dit kan geschieden, door dien 't Strot-lapken beenagtig geworden zijnde, de Spleet of Glottis van 't Strotten-hoofd niet nauwkeurig sluyt. Wanneer de Spieren van 't Keel-gat of de Pharynx verlamt zijn, kan men vogtig, maar geen vast voedsel inzwelgen.

UYT-





U Y T L E G G I N G

der

F I G U R E N ,

van de

XXIII. T A F E L.

Waar in vertoont worden de blaasjes
van de Long, en de Vaten, be-
nevens de Spieren, en de Rok-
ken van den Slok-darm.

*De 1. Figuur vertoont een
grootte lob van een
Schapen-long, van bo-
ven in haar geheel, en
onder de Vliezen, waar
door de inwendige lo-
bekens te samen ver-
knogt waren, weg ge-
nomen.*

A Den mond van den
tak der Longe-pijp.

B Den mond van een
tak der Long-ader.

C Den mond van een
tak der Long-flag-
ader.

D Den tak van de

Longe - pijp, waar
aan de inwendige lo-
bekens vast hangen.

E Kleynder Takjes,
waar door de lugt
gaat tot de lobekens.

ee Inwendige lobe-
kens volgens Willis.

ff De Water-vaten,
die op de uytwendi-
ge oppervlakte loo-
pen.

*De 2. Figuur vertoont de
verzelling der Takjes
van de Longe-pijp met
de Bloed-vaten.*

A Den grooten Tak
van

van de Longe-pijp.
 aa De kleyne Takjes
 afgesneden.

B Den grooten Tak
 van de Long-slag-
 ader.

C Den grooten Tak
 van de Long-ader.

D De Long-pijps-tak-
 ken Ader en Slag-
 ader.

*De 3. Figuur vertoont
 een tak van de Long-
 zenuw ontdaan, en
 uytgespreyd, in welken
 door A een ander tak
 van Willis word aan-
 gewezen.*

*De 4. Figuur vertoont de
 Spieren en Rokken van
 den Slok-darm.*

A Des Slok - darms
 Spier.

B De Priem-keel-gats
 Spieren.

C De Wiggebeens-
 keel-gats Spieren.

D De Hoofd - keel-
 gats Spieren.

a Den ingang van den
 Slok-darm.

E Den buytensten rok
 van den Slok-darm.

FG Desselvs Spierigen
 Rok.

F Het buytenste Vlies
 van den zelven Rok.

G Het binnenste Vlies.

H Den Vatigen Rok.

I Den Klierigen Rok.

K Den Zenuwagti-
 gen Rok.

aa De bovenste Rok-
 ken afgenomen, op
 dat de onderste zou-
 den gezien worden.

*De 5. Figuur vertoont de
 wolagtige korst van
 den Slok-darm.*

*De 6. Figuur vertoont den
 Spierigen Rok des Slok-
 darms van een Os,
 van voren gezien.*

*De 7. Figuur vertoont den
 zelven Rok van agter
 gezien.*

A De buytenste ordere
 of loop der Vezelen.

B De binnenste.

DE VIERDE VERHANDELING

DER

HEELKONSTIGE ONTLEDING

VAN 'S MENSCHEN LIGHAAM.

VAN DE DEELEN
DES HOOFDS.

HET I. HOOFDSTUK.

Van 't Hoofd , en zijn deelen.

't **H**oofd , een der drie holligheden des Tronks, volgens de verdeeling van 's Menschen Lighaam , te voren in de Inleyding gemaakt , is dat rondagtig deel, dat zig uytstrekt van de kruyn , of opperste des hoofds , tot den hals.

De natuurlijke gedaante van 't Hoofd is langwerpig rond , van agteren en voren wat verheven , en op de zyden een weynig ingedrukt.

't Hoofd word gemeenlijk verdeelt in een voorste, Verdeeling des Hoofds. en agterste deel : 't voorste word 't Aangezigt , en 't agterste , en opperste , 't Bekkeneel genaamt.

In de holligheyt van 't Bekkeneel worden besloten de groote , en kleyne Herffenen , met 't verlangde Herffen-merg , als ook 't begin der Zenuwen , die uyt 't zelve voorkomen , en de Vliezen , die al deze deelen omvangen.

Onder aan 't Bekkeneel is de Rug-graat gevoegt , waar in besloten is 't Rug-merg , en beginsels der Zenuwen , die van 't zelve voortkomen met de Vliezen die ze bekleeden.

On-

I Cranium,

Deelen
des
Hoofds.

Onder de deelen van 't Hoofd, zijn als in de Borst, en Buyk, eenige houdende, en andere gehoudene; waar van eenige gemeene, en andere eygene zijn.

De gemeene houdende deelen, zijn de Opper-huyd, de Huyd, en 't Vet, van welke in de tweede Verhandeling gesproken is.

De Opper-huyd is volgens de verscheyde deelen des Hoofds, ook verscheyde: want daar ze met hayr is bedekt, is ze vast, en dik; voornamelijk op 't agterhoofd; maar in 't aangezicht zagt, en dun, en alderdunst aan de lippen.

Op 't Hoofd is weynig Vet; maar rondom de Oogen, agter de Ooren naar den Hals, en Wangen, is 'er veel.

De eygene houdende deelen, zijn de Spieren, Beenderen, en 't Panne-vlies, met eenige Klieren, Kraak-beenderen, en 't Hayr, zo men 't laatste onder de deelen van 't Hoofd wil rekenen. Van de Beenderen zal gesproken worden in de V. Verhandeling; ook van de Spieren in de VI. en van de Klieren, in verscheyde Hoofdstukken van deze Verhandeling, volgens de plaatsen, daar ze gevonden worden, en van 't Hayr, in 't volgende Hoofdstuk.

De gehoudene deelen des Hoofds zijn in de holligheyt van 't Bekkeneel besloten; gelijk de Hersenen, met de Vliezen, waar van te voren is gesproken.

HET II. HOOFDSTUK.

Van de Hayren, en 't Panne-vlies.

Hayren.

DE Hayren groeyen gemeenlijk langer, en digter by malkander op 't Hoofd, als op eenige andere plaatsen. Boven dien vertoonen zig de zelve gemeenlijk op andere plaatsen ontrent de houwbare jaren; maar op 't Hoofd, en aan de Winkbrauwen, en Oogschelen, worden ze in de Lijf-moeder met andere deelen van 't Lighaam voortgebragt,

x Pericranium.

De

De verscheydenheit van hun gedaante, kouleur, en andere byzonderheden, dewijl dit enkele nieuwsgerigheden zijn, en in de Heelkonst niet te pas en komen, zal ik stilzwijgende voor by gaan, en alleenlijk zeggen, dat ik de Hayren menigmaal met mijn Vergroot-glazen gezien heb, die zo dik als een vinger zig vertoonden, hol waren en verzien sekenen te zijn met takken en oneffenheden, als ook met vele Vaten. In de *Plica Polonica* of Hayr-vlegt, dat een Landziekte is in Polen, in welke 't Hayr zodanig in een klist, dat men genoodzaakt is 't zelve af te snyden, zypert het bloed druppelwijs uyt de eyndekens der Hayren.

Het Hayr bedekt 't Hoofd en verwarmt het. In Gebruyk der Hayren. de Lieffen en onder de Oxels is het, op dat door de bewegingen die deelen niet pijnlijk tegen malkander zouden wryven. Dat van de Winkbrauwen en Oogschelen belet, dat'er geen stof in de Oogen zou vallen, ook is het Hayr tot cieraad.

Als 't Hayr afgeschoren is, eer men tot 't Pannevlies kan komen, moet de huyd een weynig, en dan 't Vet-vlies met de voor-, en agterhoofds Spieren, en haar breedē peezen, die by na 't gantsche hoofd bedekken, opgeligt worden, en dan vertoont zig 't voorgemelde Vlies, dat onmiddeliyk 't Bekkeneel bekleed, behalven daar de Slaap-spieren leggen, daar 't dezelve onmiddeliyk bedekt. 't Is een dun, vast, en zeer gevoelig Vlies, dat ligteliyk in twee kan gescheyden worden, en eer men trepaneert, moet het been eerst daar van ontbleot worden.

Dit Vlies heeft groote gemeenschap met 't harde Herffen-vlies, dat de inwendige oppervlakte van 't Bekkeneel bekleed, en over al aan de zelve vast is: en geschied door vele Vezelen, die door de Naaden des Bekkeneels heen dringen: zo dat 't Pannevlies gequetst zijnde, de ontsteking aan 't harde Herffen-vlies ligteliyk word mede gedeelt.

Het Panne-vlies bedekt het Bekkeneel, en schijnt door 't harde Herffen-vlies, verknogt te wezen

Gebruyk van 't Panne-vlies.

1 Pericranium. 2 Cranium.

Q

met

met alle de Vliezen, die de andere beenderen bekleeden.

Als men de uytwendige deelen van 't hoofd moet door snyden op 't Bekkeneel, tot het stellen van een Trepaan, moet het 1 Panne-vlies zo verre door gesneden worden, als de boven gelege deelen: want zo dat niet geschied, als men de lippen der wonde van malkander verwijdt met *tyronden*, om die by na regt over eynde te stellen, zo kan 't Panne-vlies ten deele aan 't been nog vast zijnde, niet mede volgen met de huyd, 't welk op die plaats gespannen staande groote pijn, ontstekingen, en zomtijds zo zware toevallen maakt, als of 't harde Herffen-vlies zelf beledigt ware.

Het Panne-vlies t' samen met de breede pees der voor-, en agterhoofds Spieren geplettert zijnde, veroorzaakt zware ongemakken, welke door gesneden zijnde, die meermaals verdwynen.

HET III. HOOFDSTUK.

*Van de inwendige deelen des Hoofds,
en eerst van de Herffen-vliezen.*

ALs men de Herffenen wil ontleeden, moeten de uytwendige deelen opgeligt, 't Bekkeneel doorgezaagt, en met omzigtigheyt afgenomen worden, en dan zijn in 't zelve aan te merken de groote, en kleyne Herffenen, 't 2 verlangde Herffen-merg met de Vaten, en Vliezen, die twee zijnde, de voorge-
Inwendige deelen des Hoofds. melde deelen omvangen.

't Eerste deel, dat zig vertoont, 't 3 Bekkeneel opgeligt zijnde, is 't dikke, of harde Herffen-vlies, dat van een zeer vast geweeffel is A.

Dikke Herffen-vlies. Dit Vlies is zeer gevoelig, en met vele Bloed-vaten doorweven: met zijn buytenste oppervlakte, is 't
XXIV. Tafel, 1. Figuur. over al vast aan het binnenste van 't Bekkeneel, voor-

1 Pericranium. 2 Medulla oblongata. 3 Cranium.

na-

namelyk aan den grond, en de Naaden; maar met de zyde, die na de Herffenen ziet, is 't veel gladder, als van buyten, en boven is 't door de Aderen van de opperste langwerpige Sinus, en onder aan den grond, door de Slag-aderen, en Zenuwen, vast ge-^{Hegting.} hegt aan 't dunne Herffen-vlies.

Dit Vlies is over al dobbel, en scheidt de groote ^{Verdob.} Herffenen, tot aan 't ^{beling.} Weeragtig Lighaam, in een regter, en linker deel: en al zo die verdobbeling, om de ronde gedaante der Herffenen gekromt, en agter breed, en na voren gaande, allengskens smalder word, heeft ze om haar gelykenis, den naam van *Zeyzen* bekomen, aa 2. Fig. in oude luyden word ze zomtijds beenig gevonden.

Dit Vlies scheidt ook van agteren de groote Herffenen van de kleyne, waar door de groote opgehouden, en belet worden, als men 't hoofd na agteren beweegt, dat de kleyne Herffenen van de groote niet gedrukt worden: in vele Dieren, die zwaar zijn, en veel loopen, is tusschen de groote, en kleyne Herffenen, een uytstekend gebeente, in plaats van dat vlies, gelyk in Leeuwen, Tygers, Honden, bespeurt word. Het dikke Herffen-vlies word zomtijds in oude luyden, op verscheide plaatsen beenig gevonden.

Tusschen de verdobbeling van 't dikke Herffen-vlies, zijn vier groote Aderen, die in 't Latijn *Sinus* ^{Vier groo-} genaamt worden, waar by zommige nog eenige kleyn- ^{te Aderen} der voegen. ^{of Sinus.}

De eerste is de opperste langwerpige *Sinus* c 1. en 2. ^{1. en 2.} Fig. die voort-komt met een eng begin, uyt een kleyn gaatjen, onmiddelyk boven 't uytsteeksel, dat men de Hane-kam noemt, en na boven gaande, door 't midden van 't Voorhoofds-been, aan 't opperste van den *Zeyzen*, word die allengskens wyder, en loopt onder de Pylnaat, tot agter aan de kleyne Herffenen. ^{Figuur.} ^{Eerste.}

De tweede, en derde, die met de voorgaande te samen vereenigt zijn, worden de zydelijke genaamt ^{Zydelyke.} DD: en leggen tusschen de verdobbeling van 't dikke ^{1. Figuur.}

1 Corpus callosum.

Q 2

Herf-

Herffen-vlies, daar de groote Herffenen van de kleyne gefcheyden worden, van welke eene na de linker, en de andere na de regter zyde nederdalende tot 't onderfte van 't ¹ Bekkeneel, eyndigen in de inwendige ² Krop-aderen.

Vierde.

De vierde Ader of Sinus E 2. Fig. is veel kleyn-der, en korter als de voorgaande; en begint van de opperfte langwerpige, daar hy met de zydelyke Sinus verknogt is, en gaat tuffchen de groote, en kleyne Herffenen, naar de ³ Pyn-appel klier.

Onderfte
langwer-
pige Sinus.

Aan 't onderfte gedeelte van de Zeyfen, by 't ⁴ Weeragtig Lighaam is nog een Ader F 2. Fig. die eenige de onderfte langwerpige Sinus noemen, en ontlaft zig van zijn bloed in de vierde Sinus, waar van hy een tak is.

De vierde Sinus, hier en daar eenige takjes gevende, verdeelt zig in twee groote takken, welke in de holligheden der groote Herffenen in vele takjes verdeelt zijnde, met eenige kleyne Slag-adertjes, t' famen de ⁵ Net-wyze vlegting maken.

XXIV. Tafel.

Deze groote Aderen of Sinus, leggende tuffchen de verdobbeling van 't dikke Herffen-vlies, ontfangen 't bloed, dat te rug gebragt word uyt de groote, en kleyne Herffenen, door haar takken of Aderen der Herffenen bb 1. Fig. die zig in de groote Aderen of Sinus ontlaften, welke 't zelve brengen in de inwendige Krop-aderen, zo dat die groote Aderen, of Sinus niet anders zijn, als takken van de inwendige Krop-aderen, die zig tuffchen de verdobbeling van 't dikke Herffen-vlies begeven, en andere takken of Aderen van zig geven, die zig door de Herffenen verspreyden.

De Aderen van de Herffenen, die zig in de Sinus van haar bloed ontlaften, ontrent de zelve gekomen zijnde, loopen in den Mensch naar de Sinus, fchuyns van agteren na voren, gantsch ftrydig met den loop van 't bloed, die in de Sinus gefchied: want 't bloed loopt daar in, van voren agter na 't hoofd. Het

¹ Cranium. ² Vena jugulares interna. ³ Glandula pinealis.
⁴ Corpus callosum. ⁵ Plexus choroidalis.

tegendeel gefchied in Dieren, die met 't hoofd na de aarde gaan: want daar loopen de Aderen ontrent de *Sinus* gekomen zijnde fchuyns van voren na agteren, en ontlaften haar bloed, voordeelig met den loop van 't bloed in de *Sinus*, dat van onderen na boven moet klimmen.

Eer de Aderen van de Herffenen, die zig in de opperfte langwerpige *Sinus* ontlaften, in de zelve ingaan, loopen ze wel een dwerschen vinger breed tuffchen de verdobbeling van 't dikke Herffen-vlies, en dit gefchied, om dat niet te veel bloed gelijk in die *Sinus* zou loopen: want als hy zeer verwijd is, drukt hy de Aderen, en belet dat niet te veel bloed inkomē.

De Aderen zijn in de Herffenen dunder van Vliezen als in de andere deelen van 't Lighaam, en breken door een zwaren val, of slag op 't hoofd daarom ligtelijk; en 't bloed stort uyt, tuffchen 't dikke en dunne Herffen-vlies, of in de Herffenen zelf, waar op de dood gemeenlijk volgt vroeger of later, na dat'er meer, of min is uytgestort, en dat 't Winter is of Zomer, om dat in den Zomer het bloed eer bederft. En zomtijds vind men een *Etter-gezwel* in de Herffenen.

Men vind hier, en daar in de zelve *Sinus*, eenige groote zenuwagtige Vezelen dwersch gespannen, welke dienen, om den loop des bloeds volgens de noodzakelijkhēyt verfcheydentlijk te beftieren. Zie de 2. XXIV. Tafel.
Figuur c.

Boven dien heeft het dikke Herffen-vlies zijn eygene Vaten: aan elke zyde een Slag-ader aa 1. Figuur, komende van de inwendige, 1 Krop-slag-ader: deze in 't 2 Bekkeneel gekomen zijnde, maakt zig aanftonts vast aan 't dikke Herffen-vlies, en verdeelt zig in veele takken, die zig verfpreyden in 't deel, 't welk de zyden, en 't opperfte der Herffenen bekleed. Eenige Ontleeders zeggen, dat verfcheyde takjes van die Slag-ader hun bloed in de opperfte langwerpige *Sinus* ontlaften, 't gene ik ook voor dezen gemeent heb: maar dit komt met de ondervinding niet over een, want

1 Arteria carot. 2 Cranium.

de takjes loopen over die *Sinus* heen, en openen zig in de zelve nier.

Gebruyk
van 't dik-
ke Herf-
sen-vlies.

Het dikke Herffen-vlies bekleed voor eerst de Herffenen met 't Rug-merg en de grootste Zenuwen. Ten tweeden, bevrijd het de Herffenen in een geweldige uytzetting, tegen de hardigheyt van 't ¹ Bekkeneel. Ten derden, belet het, dat 't een deel der groote Herffenen, van 't andere, en de kleyne, van de groote Herffenen, niet zouden gedrukt worden. Ten vierden ontfangt 't bloed in de groote Aderen, of *Sinus*, en mogelijk bevordert het door haar t' saamentrekking des zelfs loop.

Dunne
Herffen-
vlies.

Naar 't dikke, volgt het dunne Herffen-vlies, dat zeer teer is BB. en omvangt niet alleen zeer dicht de gantsche Herffenen, aan welkers zelfstandigheyt het zeer vast is; maar gaat boven dien in de alderdiepste vertrekken, zo dat de Bloed-vaatjes over al in zekerheyt geleyd worden.

Dit Vlies door 't groote gat van 't Agterhoofds-been nederdalende, bekleed niet alleen zeer dicht het gehele Rug-merg; maar scheyd ook 't zelve volgens zijn lengte in twee deelen. Boven dien worden de draden, waar uyt de Zenuwen bestaan, die van 't Rug-merg af komen, met dit Vlies overtrokken.

Spinne-
webba
Vlies.

Tusschen 't dikke, en dunne Herffen-vlies, daar ze de kleyne Herffenen, en 't onderste deel van 't verlangde Herffen-merg bekleeden, zeggen zommige Ontleeders, dat nog een ander zeer fijn, en doorzigtig Vlies legt E 4. Fig. 't welk nederdalende door 't groote gat van 't Agterhoofds-been, zig uytspreydtusschen 't dikke, en dunne Herffen-vlies, over 't Rug-merg. Dit Vlies word het ² *Spinne-webbe* Vlies genaamt.

1 Cranium. 2 Arachnoides.

HET IV. HOOFDSTUK.

Van de groote Herffenen, en hun holligheden, als mede van 't Weelffel, en 't helder Scheydsel.

NA de Vliezen volgen de Herffenen, die in den ^{Groote} Mensch om de uytstekentheyten der werkingen, ^{der Herffenen.} van zijn Ziel, zeer groot zijn, dewijl hy meer als eens zo veel Herffenen heeft, na groote van zijn ligchaam, als de aldergrootsten Os, en meer als een Olifant.

De groote Herffenen zijn langwerpig rond, gelijk 't ^{Gedaante.} Bekkeneel: boven tot aan 't Weeragtig ligchaam, zijn ze in een regter, en linker deel, door de *Zeyfen*, als in twee halve bollen gescheyden.

Ze bestaan uyt een grauwe, of bastagtige A, en ^{Zelfftandigheyt.} een witte zelfftandigheyt B. de mergagtige genaamt. ^{3. Figuur.} De eerste, die zagter als de mergagtige is, word gevonden in zekere uytbultingen, in de holligheden der groote Herffenen; maar legt voornamelijk in des zelfs omtrek, daar ze boven, en aan de zyden, op een byzondere wyze gevouwen, en met kronkelingen gelijk de dunne Darmen geployt legt. Deze ployen van een gescheyden zijnde, gaan ontrent de diepte van twee dwersche vingeren, al is 't dat de bastagtige zelfftandigheyt niet dikker als een halven dwerschen vinger is, om dat'er over al een deel der mergagtige word gevonden.

Die vouwen of ployen zijn over al bekleed met het ^{Ployen of} dunne Herffen-vlies, en worden door vele ^{Vouwen.} Vezeltjes, en Bloed-vaatjes t' samen gevoegt BB.

De mergagtige zelfftandigheyt tusschen de bastagti- ^{XXIV. Tafel, 1. Figuur.} ge gelegen, eyndigt binnewaarts, daar ze wat witter, en vaster zijnde, 't *Weeragtig Ligchaam* genaamt word, welk een steunfel is aan de eerste.

1 Corpus callosum.

Q 4

De

De *bastagtige* zelfstandigheyt, volgens 't gevoelen der hedendaagsche Ontleeders, is niet anders als een vergadering van zeer ontelbare kleyne kliertjes, die door 't vergroot-glas ontdekt zijn, en de Bloed-vaatjes gelijk, en druysf wys hangen BB; en de *mergagtige* bestaat uyt zeer sijne holle draadtjes C die daar na tot bondelkens vergadert, en met Vliezen bekleed zijnde, de Zenuwen uyt maken, door welke de geesten uyt de Hersenen naar alle de deelen van 't Lighaam gaan.

Die zeer sijne holle draadtjes maken in de werktuygen, daar ze eyndigen, tot aan 't ¹ Midden-punt der Hersenen, met malkander geen inmondingen; maar van 't Midden-punt, tot aan de *bastagtige* zelfstandigheyt, gelooft men dat ze 't doen: om dat men zomtijds twee of drie lepelen van de zelfstandigheyt der Hersenen verliest, zonder dat eenige van de zinnen beledigt zijn; zo dat de Ziel haar werkinge voornamelijk oeffent, ontrent het Midden punt der Hersenen.

Holligheden der Hersenen.

Ontrent 't ² Weeragtig Lighaam, zijn in de groote Hersenen, twee holligheden, welke uytgestrekt zijn, by na van voren tot agteren, en ontstaan uyt een ledige ruymte, in de *mergagtige* zelfstandigheyt uytgeholt, die van eenige de voorste, maar beter de zydelyke genaamt worden, om dat aan elke zyde 'er een gelegen is.

Om die holligheden te vinden, snyd men 't opperste deel der Hersenen af, dwerssch van voren na agteren, tot ontrent 't Weeragtig Lighaam, en als dan ontrent 't midden der Hersenen aan elke zyde, strekt men met een proevet 't Weeragtig Lighaam door, tot in de holligheden, 't een voor, en 't ander na, en de zelve zo na voren, als agteren open doende, zullen ze zig klaarlijk vertoonen DE.

XXIV. Tafel, 3. Figuur.

Deze uytgeholde ruymte, word door het Welffel en 't helder Scheydsfel verdeelt in twee holligheden, te voren vermelt, en is dit welffel een zeker *mergagtig* deel, voort komende van agteren van 't Weer-

1 Centrum. 2 Corpus callosum.

ag-

agtig Lighaam, als met twee pylaaren, daar 't ontrent de kleyne Herffenen, aan 't verlangde Herffen-merg vast is. Die twee pylaaren t' famen komende, maken 't lighaam van 't welffel uyt, dat van agteren, na voren gaande, daar gelijk als door een derde py-laar, in 't ondergelege merg geplant word, tuffchen beyde gestreepte lighamen, die in 't vervolg beschre-ven zullen worden. Dit welffel word zo genaamt om de gelykenis van het welffel van een gebouw, 't welk ondersteunt word door drie pylaren, waar van een van voren, en twee van agteren zijn, zo dat het een drie-hoek vertoont. Het welffel van agteren na voren over geflagen word gezien, in de XXV. Tafel 1. Fig. C.

Als men 't welffel nog in zijn plaats zijnde, en 't XXIV. Ta-mergagtig gedeelte C onder welk 't legt, een wey-fel, 3. Fi-guur. nig oplicht, en tuffchen 't oog, en 't ligt houd, zult ge daar onder 't 1 helder Scheydsfel zien, zo genaamt, om dat het doorzigtig is, 't welk van boven aan 't 2 Weeragtig Lighaam, waar van 't voortkomt, en onder aan 't Welffel vast is: dit zijnde weg gefneden, vertoont zig 't welffel bloot in zijn plaats, onder welk de derde holligheyt, en de vierde gevonden word, onder de kleyne Herffenen, agter in 't verlangde Herffen-merg.

Voorwaarts in ieder holligheyt van de Herffenen ziet men een zekere uytbulting, 't 3 gestreept Lig-Het ge-streept Lighaam. haam genaamt D, en naar agteren toe de 4 Schenkel E van 't verlangde Herffen-merg, waar op een der vleugelen van de 5 Net-wyze vlegting uytgespreyd legt e: alle deze, en eenige andere dingen, daar ontrent gelegen, zullen verhandelt worden in 't volgen-de Hoofdstuk; maar om dat de onderste zyden van de holligheden der Herffenen, meest tot het verlangde Herffen-merg behooren, zo zal van dit laatste korte-lijk gehandelt worden.

- | | | |
|-------------------------|--------------------|------------------|
| 1 Septum luctidum. | 2 Corpus callosum. | 3 Corpus striat. |
| 4 Cus medull. oblongat. | 5 Plexus choroid. | |

HET V. HOOFDSTUK.

Van 't verlangde Herffen-merg, de Zenuwen, Slag-aderen, gestreepte Lighamen, Net-wyze vlegting, en wat verders tot 't verlangde Herffen-merg behoort.

XXIV. Tafel, 4. Figuur.
Het verlangde Herffen-merg.

Het verlangde Herffen-merg is een zeker merg-agtig deel, als een steert, voortkomende van voren uyt de groote Herffenen, en van agteren uyt de kleyne, in den grond van 't ¹ Bekkeneel geplaatst C D.

Dit merg nederdalende door 't groote gat van 't Agterhoofds-been, word als dan 't Rug-, of Rug-graat-merg genaamt.

Met vier beginsels neemt het zijn oorspronk van de groote, en kleyne Herffenen; uyt de eerste komt het voort met twee groote, gemeenlijk de Schenkels, en uyt de tweede met twee kleynder, van *Willis* ² Steeltjes genaamt.

Ring-wyze uytbulting.

Dit verlangde Herffen-merg, heeft na den grond van 't Bekkeneel, zekere Ring-wyze uytbulting D. Maar op dat dit merg, en al wat'er toe behoort, klaarlijk zou gezien worden, moet men de groote, en kleyne Herffenen, uyt 't Bekkeneel nemen, en alles, waar door ze in den grond van 't zelve vast zijn, te weten: de Zenuwen, Slag-aderen, en Tregter afsnyden, na dat men die deelen zal vertoonen, dog niet te na aan de Herffenen, of 't Bekkeneel.

De Zenuwen onmiddelijk in 't hoofd uyt 't verlangde Herffen-merg voortkomende, zijn tien paar, dat is tien enkele aan elke zyde: deze met de Slag-aderen, en de Tregter, zijn afgebeeld in de 4. en 5. Figuur, en zijn de Zenuwen aangewezen met getalen

¹ Cranium. ² Pedunculi. ³ Medulla oblongata.

I. 2. 3,

1. 2. 3, ook ziet men in de zelve Figuren, de afgesnede Slag-aderen, en Tregter.

Om die deelen in 't uyt nemen der Herffenen klaar te toonen, moet men van voren, daar 't Voorhoofds-been doorgezaagt is, beginnen.

Het voorste deel der Herffenen wat opgeligt zijnde, vertoont zig 't eerste paar, 't welk de Reuk-zenuwen zijn II, die 't ¹ Zeef-been naderende dikker, en daarom tepelwyze uytsteekfels genaamt worden; van binnen zijn ze hol; maar in den Mensch zo zichtbaar niet, als in Kalveren, en Schapen, in welke ze zeer ruym zijn; in die geblazen gaat de lugt, tot in de holligheden der Herffenen.

Na de Reuk-zenuwen volgen twee kleyne Slag-adertjes, die van de ² Krop-slag-aderen voort komen.

Na deze, volgen de Gezigt-zenuwen 2. 2. die aan elke zyde uyt de Schenkels van 't ³ verlangde Herffen-merg voort komende, zig vereenigen voor de Tregter, en aanstonts van malkander scheydende, verzeld met eenige Bloed-vaatjes, begeven zig na 't oog van die zyde, waar uyt ze voort komen.

Na de Gezigt-zenuw volgt de Tregter b, die in de ⁴ Slym-klier eyndigt A 5. Fig. en aan de zyden, ziet men de Krop-slag-aderen aa: na deze volgt het derde paar Zenuwen, zijnde de oog bewegende 3. 3, welke uyt 't breedste deel van 't verlangde Herffen-merg, agter de Tregter voortkomende, loopen ze ter zyden voorwaarts na de oogen.

Het vierde paar, van *Willis* de Lydende genaamt 4. 4. is zeer kleyn, en komt van 't bovenste deel des verlangde Herffen-mergs, ontrent de kleyne Herffenen, en loopt met 't voorgaande paar, door 't zelve gat na de oogen.

Het vijfde paar is zeer aanmerkelijk, en bestaat uyt verscheyde kleyne Zenuwen 5. 5. welke voortkomen aan de zyden der Ring-wyze uytbulting, en eer ze uyt 't ⁵ Bekkeneel gaan, worden ze onder 't dik-

Eerste paar de Reuk-zenuwen.

Tweede paar de Gezigt-zenuwen. XXIV. Tafel, 4. Figuur.

Derde paar de Oog-bewegende.

Het vierde paar de Lydende.

Het vijfde paar.

¹ Os cribrosum. ² Arter. carot. ³ Medulla oblongata. ⁴ Glandula pituitaria. ⁵ Cranium.

ke Herffen-vlies verdeelt in drie takken, die door verscheyde gaten uyt 't zelve gaan,

Zesde
paar.

Het zesde paar is veel minder, als 't voorgaande 6. 6. en komt voort uyt de Ring-wyze uytbulting, en gaat voor 't meeste deel door 't zelve gat met de oogbewegende zenuwen naar de Oogen.

Zevende
paar de
Gehoor-
zenuwen.

Het zevende paar zijn de Gehoor-zenuwen 7. 7. deze komen voort aan de zyden van 't verlangde Herffen-merg, daar 't de kleyne Herffenen raakt, en begeeft zig met twee takken in 't gat van 't ² Steenbeen naar de Ooren.

Het agtste
paar.

Het agtste is 't dwalende paar 8. 8. en komt voort uyt 't verlangde Herffen-merg, een weynig onder 't voorgaande, het bestaat uyt vele Vezelen of kleyne Zenuwtjes, en verzeld zijnde met de Rug-mergs Zenuw, gaat het uyt 't Bekkeneel door een gat, gemaakt door t' famenkoming van twee groeven, de eene in 't Agterhoofds-been, en de andere in 't Steenbeen, door welke ook de zydelijke *Sinus* in de Kropaderen eyndigen.

Negende
paar de
Tong-be-
wegende.

Het negende paar is 't Tong-bewegende 9. 9. en bestaat uyt verscheyde kleyne Zenuwtjes, voortkomende by na van 't breedste deel des ¹ verlangde Herffen-mergs, en gaat uyt 't Bekkeneel door een gat van 't Agterhoofds-been, nevens 't groot uytsteekfel.

Het tiende paar komt voort ter zyden uyt 't verlangde Herffen-merg, daar 't zig in de Wervel-beenderen begeeft 10. 10. men twist, of dit laatste paar der Herffenen, of 't eerste van 't Rug-merg moet genaamt worden.

De Oude stelden maar zeven paar Zenuwen, die onmiddelijk uyt de Herffenen voort quamen, te weten: het 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. paar van *Willis*: want de Reuk-zenuwen zagen ze voor geen Zenuwen aan, en 't tiende paar meenden ze tot 't Rug-merg te behooren, 't vierde, gelijk het kleyn is, was by zommige onbekent, of wierd voor takjes van andere Zenuwen genomen.

Als nu de Herffenen uyt 't Bekkeneel genomen zijn,

¹ Os petrosum. ² Medulla oblongata.

kan men de zelve Zenuwen, welkers afgesneden eynden zig in de 4. en 5. Figuur vertoonen, weder zien.

Ook kan men de Slag-aderen onderzoeken, die vier zijn, te weten: twee inwendige ¹ Krop-slag-aderen aa, en twee Wervel-Slag-aderen ee, de eerste gaan aan elke zyde in 't ² Bekkeneel door een gat, dat gezien word aan 't agterste deel van den ³ Turksen-zadel, en geven eenige takjes aan de ⁴ Slym-Klier, gelegen in den zadel, en dan aan elke zyde het dikke Herffen-vlies doorboorende, word ieder verdeelt in drie groote takken, de voorste, de zydelijke, en agterste. De voorste takken t' samen komende, daar de Gezigt-zenuwen met malkander vereenigen, zenden eenige merkelijke takjes naar 't ⁵ Zeef-been. De zydelijke over de twee halve bollen der groote Herffenen dwerssch uytgestrekt zijnde, verdeelen de zelve in een voorste en agterste deel. De agterste takken agter de Tregter t' samen komende, en eenige takken ter zyden uyt schietende, loopen vereenigt zijnde met eenen tronk op de Ring-wyze uytbulting D, daar hy zig vereenigt met den tronk, die ontstaat door de vereeniging der Wervel-Slag-aderen ee, ter plaats d, welke door 't groote gat van 't Agterhoofds-been gekomen zijn tot aan 't verlangde Herffen-merg.

Slag-aderen der Herffenen.
XXIV.
Tafel,
4. Figuur.

Wervel-beens Slag-aderen.

Die Slag-aderen verspreyden verders haar takken door de Herffenen, en na dat de vlugstte deelen van 't bloed afgescheyden zijn, keert 't overschot te rug door de Aderen, die 't zelve in de *Sinus*, gelegen in de verdobbeling van 't dikke Herffen-vlies over brengen, tot in de inwendige Krop-aderen, gelijk in 't III. Hoofdstuk gezegt is, om verders na 't Hart gebragt te worden. De Slag-aderen in de Herffenen zijn dunder van Vliezen, als in de andere deelen van 't Lighaam, en daarom ligtelijk breken ze door uyterlijk geweld, gelijk als van de Aderen gezegt is.

¹ Arteriae carotides. ² Cranium. ³ Sella Turcica. ⁴ Glandula pituitaria. ⁵ Os cribrosum.

Van voren in 't breedste deel van 't ¹ verlangde Herffen-merg, daar de Gezicht-zenuwen zig vereenigen, legt de ² Tregter b, gemaakt uyt het dunne Herffen-vlies, en uytgestrekt tot aan de ³ Slym-klier, van onderen eng, van boven breeder, en van binnen met een mergagtige stoffe bekleed: aan zijn bovenste, en breedste deel omvangt hy van buyten een Spleet, die gemeenschap heeft met de holligheden der groote Herffenen, zo dat het vogt uyt de zelve, gevoegelyk tot in de Slym-klier kan over gaan.

Onder 't agterste deel der Tregter, ziet men twee uytbultingen C, die van de hedendaagsche voor Klieren gehouden worden.


¹ Medulla oblongata.
taria.

² Infundibul.

³ Glandula pitui-

U Y T.





U Y T L E G G I N G

der

F I G U R E N ,

van de

XXIV. T A F E L.

Waar in verthoont worden de inwendige deelen des Hoofds, te weten de Herffen-vliezen, de groote en kleyne Herffen, het verlangde Herffen-merg, en haar Vaten.

De 1. Figuur verthoont 't Hoofd, waar in 't Bekkeneel, en een groot deel van 't dikke Herffen-vlies is weg genomen.

A Een deel van 't dikke Herffen-vlies hier nog overig.

aa Zijn eygen Ader en Slag-ader.

B De groote Herffen met het dunne Herffen - vlies bekleed.

C De opperste langwerpige Sinus.

bb Zijn takken loopende door de groote Herffen.

DD Twee zydelijke Sinus.

De 2. Figuur verthoont de Sinus of groote Aderen van 't dikke Herffen-vlies met de Zeyfen, en een deel van de inwendige Krop-aderen, als of ze van de andere deelen gescheyden waren.

AA Een deel van 't Bekkeneel.

B Het groote gat van

- 't Agterhoofds-been.
- C De opperste langwerpige Sinus, waar in eenige dwerssch gespannen Vezelen gezien worden.
- DD De twee zydelyke Sinus.
- E De vierde Sinus afgesneden.
- F Een tak van de vierde Sinus, loopende onder aan de Zeyfen, van zommige de onderste langwerpige Sinus genaamt.
- GG Twee kromme holligheden, daar de Sinus van 't dikke Herffen-vlies met de Krop-aderen vereenigen, om 't geweld van 't nederdalende Bloed te matigen.
- HH De afgesnede inwendige Krop-aderen.
- aa De Zeyfen, met de takken, of Aderen, van de opperste langwerpige Sinus.
- bb Takken van de zydelijke Sinus, die met de Sinus der Wer-
- vel - beenderen zig vereenigen.
- cc Takken, die na de Slym-klier loopen.
- De 3. Figuur vertoont de groote Herffenen, zijnde 't bovenste deel weg genomen, op dat men de holligheden zou zien.*
- AA De bastagtige zelfstandigheyt der groote Herffenen.
- BB De mergagtige.
- C Een deel van 't Weeragtig lighaam, onder welk 't welsfel en 't helder scheyd-sel legt.
- DE Een zydelijke holligheyt der groote Herffenen, in welke gezien word.
- D Het gestreept Lighaam.
- E Een der Schenken van 't verlangde Herffen-merg.
- d Bloed - vaten, die van buyten door 't gestreept Lighaam loopen.
- e Een der vleugelen van 't Net-wyze Lighaam.

F Het dikke Herffen-vlies na agteren omgeflagen.

G De vierde Sinus een weynig uytgetrokken.

De 4. Figuur vertoont de Herffenen uyt 't Bekkeneel genomen en omgekeert, op dat men van onderen de uytgang der Zenuwen, en de ingang der Slag-aderen zou zien.

A De groote Herffenen bekleed met het dunne Herffen-vlies.

B De kleyne Herffenen bekleed met het zelve Vlies.

CD Het verlangde Herffen-merg.

D De Ring-wyze uytbulting van 't verlangde Herffen-merg.

E Het Spinne-webbevlies.

a De inwendige tak van de Krop-slagader.

b De Tregter.

c Twee Klieren leggende agter de Tregter.

d De vereeniging des tronks van de inwendige Krop-slag-aderen, met dien van de Wervel-beens Slag-aderen.

ee De Wervel-beens, of Hals Slag-aderen.

f Een tak voortkomende uyt de vereeniging der Wervel-beens, of Hals Slag-aderen, die uytgestrekt is over 't Rugmerg.

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zo veel paar Zenuwen, die binnen 't Bekkeneel uyt het verlangde Herffen-merg voortkomen.

De 5. Figuur vertoont den grond van 't Bekkeneel, waar in gezien word, hoe de Zenuwen, die uyt 't zelve gaan, onder 't dikke Herffen-vlies gedoken leggen.

A De Slym-klier.

a De inwendige Krop-slag-ader.

b De Tregter.

cc De Rug-mergs R Zc

Zenuwen , die zig zelfftandigheyt.

by 't dwalende paar De 7. *Figuur* *vertoont*
voegen. een deel van een Hayr,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ver- gezien met een ver-
volg der Zenuwen groot-glas.

gelijk te voren.

A Het Hayr.
De 6. *Figuur* *vertoont* de B Een deel van de
zelfftandigheyt der Opper-huyd.

Herffenen, zo als eeni- C De wortel van 't
ge die met een vergroot- Hayr.

glas gezien hebben. dd Eenige Vezeltjes
gelijk als takjes.

A De dekselen der De 8. *Figuur* *vertoont*
Herffenen. een deeltjen van een

B De Kliertjes van de *Menschen-hayr* , in
bastagtige zelfftandig- welk vele *Vaten* ge-
heyt. zien worden.

C De holle draadtjes
van de mergagtige

Nu moet men de *Herffenen* zien leggen, gelijk ze
natuurlijk in 't *Bekkeneel* zig vertonen, en dan de
agterfte boord van de groote *Herffenen*, aan elke
zyde van de naburige deelen afgescheyden, en voor
over geflagen zijnde, zullen de drie eerfte holligheden
der *Herffenen* tot een ruymte worden.

Net-wyze In die ruymte ziet men een 2 Net-wyze vlegting,
vlegting. bestaande uyt zeer fijne takjes van *Slag-aderen*, en
takjes der *Aderen*, van de vierde *Sinus*, die doorzaayt
zijn met vele kleyne *Kliertjes*.

XXV. Ta- Deze Net-wyze vlegting verdeelt zig in twee tak-
fel. 1. Fi- ken, welke door beyde de zydelijke holligheden dd
guur. verspreyd leggen.

Gestreepte Na voren in beyde de zydelijke holligheden, ziet
Ligha- men de 3 Gestreepte *Lighamen*; zijnde twee groote
men. uytbultingen, die van voren na malkander neygen,

1 *Cranium*. 2 *Plexus Choroidal*. 3 *Corpora striata*.

en

en by na aan een gevoegt zijn, van agteren zijn ze smalder, en meer van malkanderen gescheyden DD² en worden van voren door een mergagtig uytsteekfel, t' famen gevoegt. XXV. Tafel, 1. Figuur.

De buytenste zelfstendigheyt dezer Lighamen is grauw, en klierig, gelijk de bastagtige der Herffenen, waar door de Bloed-vaten a loopen; van binnen ziet men veel mergagtige witte streepen, als men 't bovenste wat af-schrapt, of als het in de lengte doorsneden word. 2. Figuur.

Van voren tusschen beyde die Lighamen, ziet men 't Welffel c, in 't voorgaande Hoofdstuk beschreven. Maar des zelfs voorste pylaar word in de b gezien. Welffel. 1. Figuur.

By de voorste pylaar van 't Welffel, is een Spleet c, welke door gaat tot in de Tregter.

Daar de 2 Gestreepde Lighamen eyndigen, zijn twee andere uytbultingen EE de 3 Schenkels van 't verlangde Herffen-merg genaamt, als ook de 4 Kamers der Gezigt-zenuwen, zo geheten, om dat die Zenuwen haar oorspronk uyt de zelve schijnen te nemen. In de tusschenheyt dezer Schenkels is een opening, die neerwaarts in de gemelde Spleet, en Tregter eyndigt. 2. Figuur. Schenkels van 't verlangde Herffen-merg.

Na agteren ontrent de kleyne Herffenen, zijn vier uytbultingen, of verheventheden, gelegen op 't agterste deel van 't verlangde Herffen-merg, welkers voorste g de grootste zijn, en 5 Billen, en de agterste de 6 Ballen genaamt worden. Billen. Ballen.

Dewijl dan die vier uytbultingen, aan beyde zyden, boven malkander raken, en onder met het midden van 't verlangde Herffen-merg niet vereenigt zijn, zo ontstaat daar een holligheyt, die zig uytstrekt onder de kleyne Herffenen, tot in 't verlangde Herffen-merg, voor de vierde holligheyt gehouden.

De ingang dezer holligheyt is een rond gat, gelegen ontrent de Billen, en word den Aars genaamt d, van waar een doorgang is, na agteren tot de vierde Vierde holligheyt. Den Aars. XXV. Tafel, 2. Figuur.

1 Fornix. 2 Corpora striata. 3 Crur. Medull. oblong. 4 Thalam. nervor. opticox. 5 Nates. 6 Testes.

holligheyt, en een ander na de voorgemelde Spleet, tot de Tregter.

Boven dit gat, by de twee groote takken der ¹ Net-Pijn-appel Klier. wyze vlegting, legt de ² Pijn-appel Klier e. Deze Klier word bekleed met het dunne Herffen-vlies, waar door vele Bloed-vaatjes loopen, en waar mede ze bedekt is E i. Fig. By deze Klier ziet men aan elke zyde een kleyn mergagtig takjen f, welke *Warthon* zegt Zenuwen te wezen, die in deze Klier alleen verspreyd worden.

HET VI. HOOFDSTUK.

Van de kleyne Herffenen.

XXV. Tafel, i. Figuur.

DE kleyne Herffenen zijn van gedaante als een breede platagtige bol, en wel zes maal minder, als de groote, gelegen in 't onderste, en agterste deel van 't Bekkeneel. Zie de i. Fig. FF.

Zelfstandigheyt.

Ze bestaan als de groote, uyt tweederley zelfstandigheyt; maar die wat vaster schijnt te wezen, te weten: van buyten, uyt een grauwe, of bastagtige, die klierig is F, van binnen, uyt een witte mergagtige, dat holle draadtjes zijn, welke van de eerste, als met verscheyde takjes voort-komende, na 't midden loopen, zo dat de kleyne Herffenen, in 't midden volgens de lengte doorgesneden zijnde, dit merg eenig-sints een getakten boom vertoont GG.

De buytenste oppervlakte is door vele groeven eenig-sints oneffen, die niet met kronkelingen, gelijk in de groote Herffenen, maar met geschikte streepen van de een zyde naar de andere loopen, zo dat de kleyne Herffenen, van buyten uyt vele digt by een gevoegde ringen, die evenwyd van malkander staan, schijnen gemaakt te wezen.

Worm-wys uyt-
steeksel.

Die ringen zijn grooter in 't midden, en worden na voren, en agteren gaande, allengskens minder, zo dat ze van onderen met een ³ Worm-wys uyt-

1 Plexus choroidal. 2 Glandula pinealis. 3 Processus vermiformis.
steek-

Reekfel eyndigen, welkers voorſte 't langſte, en eenigſints omgekromt zijnde, op de vierde holligheyt der groote Herſſenen legr.

Al de groeven (als tuſſchen de kronkelingen der groote Herſſenen) worden bekleed met het dunne Herſſen-vlies, waar door de Bloed-vaatjes, tot in 't binnenſte der kleyne Herſſenen gebragt, en de uytwendige zelfſtandigheyt, of ringen, t'ſamen gevoegt zijnde, gehouden worden.

De kleyne Herſſenen ontfangen wel eenige takjes van de inwendige ¹ Krop-ſlag-aderen; maar veel meer, van de ² Wervel-beens-, of Hals-ſlag-aderen, daar ontrent gelegen, waar by zig ook eenige takjes van de Aderen der zydelijke *Sinus* voegen.

De kleyne Herſſenen worden aan de zyden van 't ³ verlangde Herſſen-merg, vaſt gehegt door twee uytſteekfels, die van *Willis* ⁴ Steeltjes genaamt worden, en men ziet in ieder drie verſcheyde mergagtige uytbultingen.

De eerſte komt voort van de ronde uytbulting, en klimt ſchuyns opwaarts. De tweede daalt neder van de kleyne Herſſenen, en de eerſte doorkruyſſende, omvangt 't verlangde Herſſen-merg. De derde uyt 't agterſte deel der kleyne Herſſenen voortkomende, word geplant in 't verlangde Herſſen-merg, waar door 't zelve als met een ſtreng draden word vermeerdert.

Ontrent 't agterſte deel van 't verlangde Herſſen-merg, in den omtrek der vierde holligheyt, worden nog eenige andere rondagtige uytſteekfels gevonden, welke aan elke zyde twee, en zomtijds drie zijn, en uyt de kleyne Herſſenen voortkomende, de brugge van *Varolius* genaamt worden.

Ook hebben de kleyne Herſſenen ontrent de ⁵ Wormwyze uytſteekfels een byzonder vlegting van Bloedvaten, waar in vele Kliertjes, grooter als die van de Net-wyze vlegting, gezien worden.

¹ Arter. jugular. intern. ² Arter. vertebral. ³ Medulla oblongata. ⁴ Pedunculi. ⁵ Proceſſus vermiformis.

U Y T L E G G I N G

der

F I G U R E N ,

van de

XXV. T A F E L.

In welke ver-
toont word het binnen-
ste gestel der groote, en kleyne
Herffenen, als ook van 't ver-
langde Herffen - merg.

*De 1. Figuur ver-
toont de groote
Herffenen, zijnde
't bovenste deel
weg genomen en 't
Welffel na voren om-
geslagen.*

A De bastagtige zelf-
standigheyt der Herf-
fenen.

B De Mergagtige.

C Het Welffel na vo-
ren omgeslagen.

D Het gestreepte Lig-
haam.

E De vierde Sinus
met zijn takjes en
Slag-adertjes over de

Pijn-appel Klier uyt-
gespreyd.

dd De Net-wyze vleg-
ting met de Kliertjes.


FF De kleyne Herffen-
nen.

G Een deel van 't dik-
ke Herffen-vlies.

*De 2. Figuur ver-
toont 't
Welffel; en de Net-
wyze vlegting weg ge-
nomen zijnde, ver-
toont zig*

A De buytenste zelf-
standigheyt der Herf-
fenen.

B De zyden van de
hol-



holligheyt der Herf-
fenen.

C Het gestreepte Lig-
haam boven een wey-
nig afgeschraapt.

D Het zelve in zijn
geheel.

EE De Schenkels van
’t verlangde Herffen-
merg.

a De Bloed - vaten
van ’t gestreepte Lig-
haam.

b De voorste pylaar
van ’t afgesnede
Welffel.

c De Spleet of door-
gang tot de Treg-
ter.

d Een rond gat of
doorgang tot de vier-
de holligheyt.

e De Pijn-appel Klier.

f Mergagtige takjes
aan de zelve.

g De Billen.

h De Ballen.

FF De bastagtige zelf-
standigheyt der kley-
ne Herffenen.

GG De Mergagtige.

H ’t Eynde van ’t
verlangde Herffen-
merg.

II De mergagtige
Steeltjes, die uyt ’t
Merg der kleyne
Herffenen naar ’t ver-
langde Herffen-merg
gaan.

*De 3. Figuur vertoont de
Basis der Herffenen
van een Schaap uyt
Willis.*

A De Tepel - wyze
uytsteekfels.

B De overige deelen
van de doorsneden
groote Herffenen.

C Het gestreepte Lig-
haam.

DD De Kamers der
Gezigt-zenuwen.

d Den doorgang tot
de Tregter

E Een Klier agter de
Tregter, in den
Mensch dobbel.

FF Vervolg der Schen-
kel van ’t verlangde
Herffen - merg, leg-
gende onder de ron-
de uytbultingen.

GG De Oog-zenu-
wen.

H De Ring - wyze
uytsteekfels, die ’t
verlangde Herffen-

R 4 merg

merg nevens de kleyne Herffenen omvangen.

II Dwersch loopende streepen van't Merg, waar door de deelen des verlangden Herffen - mergs onderscheyden worden.

KK Halve bollen der kleyne Herffenen, die wat afgeschraapt zijn

L 't Eynde van't verlangde Herffen-merg daar 't Rug-merg begint.

M 't Opperste deel van 't Rug-merg.

De 4. Figuur vertoont de vierde Sinus met de Net-wyze vlegting.

A De vierde Sinus af-

gesneden ontrent zijn oorspronk.

B Des zelfs verdeling in menigte takjes, die 't grootste deel der Net-wyze vlegting uyt maken.

CC De groote takken of vlegtingen der Net-wyze vlegting.

DD De Slag-aderen, die by de Sinus komen, en t' samen door hun takjes de Net-wyze vlegting maken.

dd De kleyne takjes zo van de Slag-adertjes, als van de Sinus, die op de Pijn-appel Klier uytgespreyd leggen.

HET VII. HOOFDSTUK.

*Van het gebruyk der Herffenen, en
der zelve voornaamfte deelen.*

DAt in de Herffenen de voornaamfte zit-plaats der dierlijke geesten is, daar word niet aan getwyfelt: want de zelve in 't opperfte deel van 't Lighaam gestelt zijnde, gaan de Slag-aderen van 't Hart door een regten weg, tot de Herffenen, op dat de vlugfte deelen van 't bloed daar in gebragt, van daar na alle de deelen van 't Lighaam zouden verdeelt worden: want de Zenuwen, die eygentlijk de wegen voor de geesten zijn, nemen haar begin onmiddelijk, of door middel van 't Rug-merg uyt de Herffenen, zo dat de zelve tusschen de Herffenen, en de werktuygen der zinnen, of gevoel, verftopt, of afgesneden zijnde, de werkingen aanstonts stil staan. Ook als 't Rug-merg, in wat volmaakte dieren het zy, ontrent de Herffenen dwerssch afgesneden word, worden de onder gelege deelen, behalven de inwendige, lam, en verliezen hun beweging, dat ook gebeurt in Kikvorffen, welker Hart uytgesneden zijnde, volherden ze voort te springen. Kik- vorl-
fen sprin-
gen zon-
der Hart.

De Herffenen verftopt, of toegedrukt zijnde, houden al de deelen in hun werking op, 't gene ongetwyfelt geschied, na dien de geesten, noodig tot die werkingen, om de verftopte, of verbroke wegen, van de Herffenen naar de werktuygen niet meer kunnen vloeyen.

Het Bloed dan gebragt zijnde door de Slag-aderen in de Herffenen, verdeelen zig de Slag-aderen in oneyndige takjes, die eyndelijk in Kliertjes veranderen, de bastagtige zelfftandigheyt uyt maken; welke Kliertjes zodanig zijn, dat ze uyt 't Bloed, niet anders als de vlugfte deeltjes door laten, die om hun fijnheyt, *dierlijke geesten* genaamt worden, terwijl 't overschot van 't Bloed door de Aderen te rug keert:

de geesten in de mergagtige holle draadtjes indringen-
de, vloeyen in de Zenuwen tot verscheyde diensten,
dat zo wel van de groote, als kleyne Herffenen
moet verstaan worden.

Maar dewijl de mergagtige zelfstandigheyt der
groote Herffenen zeer veel, ja grooter is, als dat ze
geheel tot Zenuwen zou worden, schijnt een goed
gedeelte der zelve te zullen dienen, tot de inwen-
dige zinnen, zo dat men kan zeggen, dat de Ziel
bepaalt word tot de werkingen der uytwendige zin-
nen, voor zo veel de geesten de bewegingen der buy-
tenstaande voorwerpen na binnen brengen, ook tot de
inwendige, voor zo veel ze de mergagtige holle
draadtjes, die niet buyten de Herffenen gaan, door-
loopen en prikkelen.

Waarom nu de groote, en kleyne Herffenen ge-
maakt zijn, en wat haar gebruyk is, geeft *Willis* de-
ze reden. Hy meent dat in de groote Herffenen de
Inbeelding, *Geheugenis*, *Redenering*, en andere voor-
treffelijke werkingen van de Ziel geschieden, en dat
uyt de zelve de geesten vloeyen in de Zenuwen, die
dienen tot de vrywillige bewegingen, waar van wy
kennis hebben. En dat de kleyne Herffenen zijn tot
voortbrenging der geesten, die in de Zenuwen vloeyen,
welke tot de natuurlijke bewegingen strekken: gelijk
de klopping van 't Hart, de ademing, de verteering
der spijs, voortdryving der Chijl, en meer andere
werkingen, die zonder onzen wil geschieden.

De groote ruymte in 't midden der groote Herffen-
nen, de drie holligheden uytmakende, schijnt te
dienen, om een vogt t'ontfangen, dat uyt de Kliert-
jes der ¹ Net-wyze vlegting uyt zypert, en tot de
Tregter, en ² Slym-klier neder vloeyt.

Wat de uytsteekfels, uytbultingen, en meer andere
dingen, rakende de Herffenen, aan gaat, zou zeer
moeyelijk wezen, ieder werking der zelve in 't by-
zonder aan te wyzen; daarom zullen we dit stilzwy-
gens voor by gaan, en zeggen dat de arbeyd, dien
vele tot nu aangewend hebben, om 't maakfel der

¹ Plexus choroidal. ² Glandula pituitaria.

Herffenen t'ontvouwen, en de werkingen ftiptelijk te verklaren, meeft altijd vrugtelooſ geweest is. En gelijk van beyde deelen, die den Menſch t'ſamen ſtellen, niet onbekender is als de Ziel; zo is 't ook met alle de deelen, die 't Lighaam t'ſamen ſtellen: want het deel, dat aldermeeft over een komt heeft met de Ziel, te weten: de Herffenen, is ook 't alderonbekentſt.

HET VIII. HOOFDSTUK.

Van 't Rug-merg.

Het Rug-merg is voor 't grootſte deel, een ver- Het Rug-
 volg van 't ¹ Verlangde Herffen-merg, 't merg.
 welk door 't groote gat van 't Agterhoofds-been nederdalende, van naam verandert, en Rug-merg genaamt word, zijnde van zelfſtandigheyt zeer na gelijk die 't verlangde Herffen-merg, en 't ² Weeragtig Lighaam uytmaakt; maar die voornamelijk na onderen een weynig vaſter, en vezelagtiger is. Ook word in de lengte van 't Rugge-merg, zekere ſtoffe gevonden, die zo wit niet is, als de andere, maar gelijk de baſtagtige zelfſtandigheyt der Herffenen, en die waarschijnlijk klierig is, welke niet buyten, ge- Klierige
 lijk in de Herffenen, maar inwendig is gelegen, om zelfſtan-
 dat de mergagtige holle draadtjes, die van de klie- digheyt.
 rige zelfſtandigheyt voort komen, zig na buyten moeſten begeven. Zodanige ſtoffe is'er weynig in 't Rug-merg van den Menſch; maar in de honden, ſchijnt'er meer te wezen.

't Is daarom, dat van die inwendige zelfſtandig- Of van de
 heyt ook eenige mergagtige holle draadtjes ontſtaan, zelve Ze-
 die de Zenuwen uyt het Rug-merg komende verzel- nuwagtige
 len, en de geeſten daar in afgeſcheyden, tot alle de draden
 deelen brengen, onder 't hoofd gelegen: waar door voort ko-
 ſchoon de weg der geeſten, die uyt Herffenen neder- men.
 dalen, afgeſneden is, gelijk men in een algemeene lam-
 migheyt ziet, de voeding nogtans, waar toe de gee-
 ſten noodig zijn, eenigſints blyft duren.

¹ Medulla oblongata. ² Corpus calloſum.

Daar

Zenuwen,
die uyt het
Rug-merg
voort ko-
men.

Daar komen gemeenlijk uyt 't Rug-merg dertig paar Zenuwen, welke, behalven de Vliezen, die ze bekleeden, niet anders zijn als zekere mergagtige holle draadtjes, waar van eenige van voren, en andere van agteren uytkomende, aan elke zyde by een vergaderen, en tot Zenuwen worden 1. 7. 8. &c. 1. Fig.

XXVI. Tafel.
Dekfelen
van 't
Rug-
merg.

Het Rug-merg word bekleed met de zelve Vliezen van de Herffenen, en 't dunne Herffen-vlies bekleed niet alleen, maar fcheyd het ook in 't midden, ten minften in 't begin, volgens zijn lengte, in een regter, en linker deel.

Door dit Vlies worden de Aderen, en Slag-aderen ondersteunt, die met vele takjes in de klierige zelfftandigheyt en door 't Rug-merg zig verspreyden.

Spinne-
webbe
Vlies.

Tuffchen 't dikke, en dunne Herffen-vlies, legt het ¹ Spinne-webbe Vlies, ontrent 't begin der Zenuwen alderbest te zien.

Slag-ade-
ren.

2. Figuur.

De Slag-aderen van 't Rug-merg komen voort van verfcheyde takken der groote Slag-ader; want volgens de aanmerking van *Willis*, de ² Wervel-beens Slag-aderen f, aan elke zyde, van d' Onderfleutel-beens Slag-aderen E, na 't hoofd regt opklimmende, zenden tuffchen de t' famenvoeging van ieder Wervel-been een tak h, en van dezer beyde vereening D. daalt een merkelyke tak nederwaarts ll, in welchen (door 't Rug-merg uytgeftrekt zijnde) ingeplant worden boven 't Hart, de takken, die van de Wervel-beens Slag-ader voort komen.

Onderwaarts, daar de nederdalende groote Slag-ader op de Rug-graat legt, geeft ze, door ieder t' famenvoeging der Wervel-beenderen, eenige takjes door 't Rug-merg.

Sinus der
Wervel-
beende-
ren.

Ook ftelt *Willis* tweederley foort van Aderen, van welke hy eenige de ³ Sinus der Wervel-beenderen noemt, die door haar opperfte deel, met de zydelijke Sinus van 't dikke Herffen-vlies vereenigende, onder de Slag-aderlijke vlegtingen, door 't Rug-merg uytgeftrekt leggen. By deze komen nog takken van de Wervel-beens-, en ⁴ ongepaarde Ader; en onder de Nieren,

1 Arachnoides. 2 Vertebral. 3 Sinus vertebrales. 4 Azygos.

daar

daar de holle Ader op de Wervel - beenderen rust, geeft ze zo wel als de groote Slag-ader, eenige takjes aan 't Rug merg.

De 4. en 5. Figuur, in welke de Aderen en Slag-aderen, met haar ¹ Inmondigen, die hier uyt *Willis* vertoont worden, juyft zo niet zijn in den Mensch, dewijl ze uyt Schapen, Kalveren, en Verkens zijn genomen volgens zijn eygen getuygenis.

Het Rug-merg dient tot voortbrenging der Zenu-^{Gebruik}wen, die in alle de uytwendige deelen van 't Lighaam, ^{van 't Rug-}onder 't hoofd gelegen, zig verspreyden, en ook in ^{merg.}eenige inwendige, gelijk in de VII. Verhandeling, uyt de beschrijving der Zenuwen zal blijken.

't Schijnt dat de Zenuwen, die van 't Rug-merg uyt komen, meest een verknogtheyt zijn van 't ² Verlangde Herffen-merg, voor zo veel ze tot de mergagtige zelfstandigheyt der groote Herffenen behooren, en aan des zelfs klierige zelfstandigheyt vast zijn; zo dat, gelijk 't gemeen gevoelen is, die Zenuwen de geesten aan brengen, welke dienen tot de dierlijke werkingen, en dat die van de kleyne Herffenen voort-komen, tot de natuurlijke dienen: want de ondervinding leert, dat al de deelen, die hun Zenuwen uyt 't Rug-merg ontfangen, onzen wil zijn onderworpen. Waar uyt blijkt, dat by na al de mergagtige holle draadtjes, die de geesten uyt de kleyne Herffenen ontfangen, de Zenuwen van 't vierde, vijfde, zesde, en 't agtste paar der Herffenen uyt maken. Boven dien, schijnt het Rug-merg door de binnenste, en waarschiynelijk klierige zelfstandigheyt, de geesten van 't Bloed af te kleynzen, 't welk door de Slag-aderen daar gebragt word.

Hoe 't Rug-merg nader aan 't hoofd gewond, verstopt, gedrukt, of door een groote davering ontfelt word, hoe 't gevaarlijker is: want hier uyt ontstaan gemeenlijk lammigheyt, en ongevoeligheyt der ondergelege deelen: de Lyder kan geen water, nog grove uytdygsels loozen, zomtijds loopen ze af tegen zijn wil, welke toevallen minder of meerder zijn, na dat 't meer of min sterck gedrukt, gewond is, waar op meest de dood volgt.

1 Inosculationes. 2 Medulla oblongata.

U Y T.

U Y T L E G G I N G

der

F I G U R E N ,

van de

XXVI. T A F E L.

Waar in vertoont worden 't Rug-merg,
met de uytkomst der Zenuwen, en
wonderbare vlegting der Vaten.

De 3. 4. en 5. Figuur zijn uyt
Willis, en de 2. uyt *Blasius*
genomen.

De 1. Figuur vertoont 't
Rug-merg genomen uyt
de *Wervel-beenderen*,
en van zijn dekselen
ontbloot, op dat men
zou zien de uytgang
der Zenuwen.

AA Het dikke Herf-
sen-vlies ter zyden
omgeslagen.

BB Het Spinne-web-
be Vlies.

CC Het Rug-merg
met het dunne Herf-
sen-vlies bekleed.

DD De Aderen en


Slag-aderen van 't
Rug-merg, welker
laatste zo van de hals-
Slag-aderen, als van
de takken der groote
nederdalende Slag-
ader voort-komen.

1. 7. De Zenuwen uyt
't merg des hals.

8. 19. De Zenuwen
uyt 't merg des rugs.

20. 24. De Zenuwen
uyt 't merg der len-
den.

25. 30. De Zenuwen
uyt 't merg van 't
Hey-



Heylig - been.

a Is een Zenuw, die alleen schijnt te wezen, om dat zy op 't eynde uyt 't midden voort - komt ; maar dewijl ze na beyde zyden zig verdeelt, zo is 't ook een paar.

BB De Zenuwen tot buyten 't dunne Herfsen-vlies gekomen.

De 2. Figuur vertoont het merg van een Hond dwerssch door gesneden.

A Het witte deel.

B Het grauwe deel.

CC De dekselen omgeslagen.

F Een Zenuw voortkomende zo van 't bovenste D. als van 't onderste deel E.

De 3. Figuur vertoont de Wervel-beens Slag-aderen, en haar takken, loopende op de agterste oppervlakte van 't verlangde Herfsen-, en Rug-merg.

AA De agterste oppervlakte van 't verlangde Herfsen-merg.

B Een gemeen vat uyt beyde vereenigde Slag-aderen.

C Zeker Figuur in Beesten uyt de vereeniging van beyde Slag-aderen.

D De eerste vereeniging der Slag-aderen, uyt welke de Slag-ader van 't Rug-merg nederdaalt.

E De Oxel-slag-ader.

f De Wervel - beens Slag-ader.

gg Slag-aderlijke takjes loopende na de Spieren des hals.

hh Takjes, die tusschen ieder t' samenvoeging der Wervel-beenderen na 't Rug-merg loopen, en des zelfs Slag-ader maken.

ii Slag-aderlijke takjes, van welke de vlegting der Slag-aderen gemaakt word, die in de 5. Figuur vertoont word.

kk Twee Slag-aderen onmiddelijk van de groote Slag - ader voort-komende.

ll De Slag-aderen van 't Rug-merg.

De 4. Figuur vertoont de Aderen en Sinus der Wervel-beenderen.

A De opperste langwerpige Sinus afgesneden, daar hy met de zydelijke vereenigt is.

BB De zydelijke Sinus van 't dikke Herffen-vlies.

CC Zekere ronde holigheden, daar de zydelijke Sinus in de Krop-aderen eyndigen.

DD De Krop-aderen.

E De bovenste vereeniging van de Sinus der Wervel-beenderen.

FF De vereeniging tusschen de zydelijke Sinus van 't dikke Herffen-vlies, en die der Wervel-beenderen.

GG De gemeenschap van alle de Sinus, en Aderen in 't bovenste deel der Ruggraat.

HH Een Aderlijken weg uyt t' samenkomst der Aderen, en Sinus, na de Krop-aderen.

hh Inmondigen tusschen de Sinus, en Aderen der Wervel-beenderen.

ii De Wervel-beens Aderen aan haar begin afgesneden.

kk Aderen, die na voren, buyten de Wervel-beenderen leggende, uyt de Ader van de eene zyde, na die van de andere zyde loopen.

ll Aderen, die 't Bloed uyt 't Rug-merg, naar de Sinus te rug voeren.

mm Aderen, die 't Bloed uyt de Spieren des hals te rug brengen.

nn Aderen, die met de takken der ongepaarde Ader, en eyndelijk met de Lende-aderen vereenigen.

De 5. Figuur vertoont de Wervel-beens Slagader

ader uyt 't zelve onderwerp , daar de Slag-ader uyt is genomen.

de gemeenschap hebben.

ff Dwersche takken , waar door de Slag-aderen van beyde zyden gemeenschap hebben.

g Eenige Slag-adertjes , die uyt 't Heylig-been voort komen.

hh Slag-aderlijke takjes , die na de Hersen-vliezen van 't Agterhoofd loopen.

ii Slag-aderlijke takjes , die met de Gehoor-zenuwen buyten 't Bekkeneel loopen.

kk Eenige takjes , die na 't wonderlijk Net loopen , 't welk in den Mensch niet word gevonden.

aa Takken van de hals Slag - aderen , na 't Rug - merg loopende.

bb De 'onderste takken der groote Slag-ader , na 't Rug-merg loopende.

cc Takjes , die na 't agterste deel van 't Rug-merg loopen.

dd Takjes , die na 't voorste deel loopen.

ee Slag-aderlijke takjes , die in twee gespleten zijn , en aan elke zyde met 't naaste takjen der zelve zyde , en door een dwerschen tak met die van de andere zy-

HET IX. HOOFDSTUK.

*Van de Spieren des Voor-, en
Agterhoofds.*

XXVII.
Tafel.
Twee
Voor-
hoofds-
Spieren.

MEn vind in 't Voorhoofd gemeenlijk twee Spieren, een regter A 1. Fig. en een linker, die onder aan 't Voorhoofds-been beginnen, ontrent de winkbraauwen, daar ze alderdikst zijn: deze op de zyden, in 't midden van 't Voorhoofd, vereenigt zijnde, gaan na boven met een breede pees, daar ze met de Agterhoofds-spieren vereenigen.

Agter-
hoofds-
Spieren.

De Agterhoofds-spieren, die dun en kort zijn, nemen haar begin van onderen van 't Agterhoofds-been, en t'samen vereenigt zijnde, gaan ze na boven met een breede pees, die zig vereenigt met die der Voorhoofds-spieren, en niet meer dan een maken, welke boven op 't Panne-vlies gelegen zijnde, by na 't gantsche hoofd bekleed.

Als de Agterhoofds-spieren zig bewegen, trekken ze de Voorhoofds-spieren na om hoog, en dan word de huyd van 't Voorhoofd gerimpelt, en als de Voorhoofds spieren werken, trekken ze de Agterhoofds-spieren opwaarts. 't Is door die Spieren, dat zommige Menschen hun hoed, van 't agterste des Hoofds, na voren, en van voren na agteren kunnen werpen. De Voorhoofds-spieren hebben elk een Zenuw, voortkomende van den oppersten tak der voorste Zenuw, van 't vijfde paar der Herffenen.

Zo men op 't Voorhoofd, daar de Spieren leggen, een sneede moet doen, zo moet men ze niet dwerssch door snyden.

1. Pericranium.

HET

HET X. HOOFDSTUK.

*Van de voorste deelen des Monds, en
van de Lippen, en Wangen.*

DE deelen des Monds, zijn de Lippen en Wangen, waar van de eerste twee zijn, de eene boven, en de andere onder. xxvii.
Tafel,
1. Figuur.

Het deel onder de onderste Lip, word de Kin genaamt. Kin.

De Wangen zijn die deelen, welke ter zyden van den Mond, in de Trompetters opgeblazen worden.

De Lippen en Wangen bestaan uyt de algemeene Dekfelen, Spieren, Klieren, Vaten, en een Vlies, waar mede ze van binnen bekleed zijn

Onder de Spieren der Lippen zijn eenige gemeene, en andere aan de Lippen eygen.

De Spieren, die gemeen zijn aan den Neus, en Lippen, zijn 't tweede paar, die den Neus verwyden. Gemeene
Spieren
der Lip-
pen.

L. Deze nemen haar begin ontrent den grooten hoek van 't Oog, en eyndigen ten deele in den vleugel van den Neus, en in den bovensten Lip.

De Trompet-spier V. 1. Fig. is gemeen aan de Wangen, en Lippen, zijnde voor 't grootste deel gedoken onder de andere Spieren der Lippen, en komt een voort aan elke zyde van beyde Kaak-beenderen, ontrent 't Tand-vlees, en ze eyndigen digt van binnen in beyde Lippen, deze dienen om de Wangen na binnen te brengen, en niet om ze op te spannen, daarom is ze zeer bequaam, om de spijs in den Mond, op de tanden te brengen, op dat ze beter zou gekauwt worden.

De eygene Spieren der Lippen, behooren tot een Lip alleen, of tot alle beyde. Van de eerste soort zijn'er twee, die den bovensten Lip optrekken, en twee, die den onderste neer trekken, en voor beyde de Lippen is'er een Sluyt-spier. Eygene
Spieren.

Optrek-
kende
Spieren
des boven-
sten Lips.

De Spieren, die den bovensten Lip op trekken N, nemen haar begin aan elke zyde van 't opperste Kaak-been, ontrent den ondersten omtrek van 't Oog-hol, en eyndigen in den bovensten Lip.

Neertrek-
kende
Spieren
des onder-
sten Lips.

Die den ondersten Lip neer trekken Q, en Kin-spieren genaamt worden, nemen haar begin aan elke zyde van den ondersten boord des onderste Kaak-beens, en een weynig schuyns na voren op gaande, eyndigen met een breede pees, in den ondersten Lip.

De Sluyt-spier P. omvangt beyde Lippen, rondom als een ring, en sluyt de Lippen.

Nu volgen de eygene Spieren, die tot beyde de Lippen behooren, van welke 'er drie paar zijn, 't optrekkende, het neertrekkende, en 't lange dunne paar.

Het op-
trekkende
paar.

XXVII.

Tafel,

n. Figuur.

Het neer-
trekken-
de.

Het optrekkende paar O, neemt zijn begin van ontrent 't Oog-hol, en schuyt ten deele onder de Spieren, die den bovensten Lip optrekken, en eyndigt in de t' samen komt van beyde de Lippen.

Het neertrekkende R, neemt zijn oorspronk onder, van 't onderste Kaak-been, nevens de Kin met een breed begin, en allengskens smalder wordende, eyndigt ten deele in den bovensten, en in den ondersten Lip.

Het dun-
ne.

Het dunne lange paar x, neemt zijn oorspronk meermaals met een dobbel begin, aan elke zyde van 't Juk-been, en allengskens minder wordende, eyndigt in de t' samenkomst van beyde Lippen, en trekt de zelve schuyns na agter.

Eenige beschrijven nog vier andere Spieren, twee voor den oppersten, en twee voor den ondersten Lip: de eerste beginnen aan 't voorste, en onderste deel van 't opperste Kaak-been onder den Neus, en planten zig in den bovensten Lip; en trekken dien na om hoog.

De tweede beginnen van voren ontrent het midden van 't onderste Kaak-been, en planten zig in den ondersten Lip, en trekken dien na om laag.

1 Orbita. 2 Os Zygoma.

Zom-

Zomtijds word de Mond krom getrokken door trekking, of door lammigheyt, van eenige Spieren der Lippen, dat men dus zal onderscheyden: zo de Mond uyt lammigheyt word krom getrokken, zo is 't deel, dat lam is, en getrokken word, zagt en slap, en men kan 't zelve met de hand in zijn natuurlijke plaats brengen. Het tegendeel geschied in een convulsio, daar 't zieke deel 't gezonde na zig trekt; want dat deel is hard en gespannen, en zo men 't in zijn plaats wil brengen, zal men pijn veroorzaken, dat in lammigheyt niet geschied.

De beweging der Lippen word niet bepaald volgens 't getal der Spieren, die'er toe behooren: want na dat'er meer, of min t' samen werken, zijn de bewegingen der Lippen. 't Welk in de beweging van veele andere deelen, ook moet verstaan worden.

Ieder Lip word van binnen in 't midden aan 't Tand-vlees vast gemaakt door een byzonderen band, voort-komende, zo 't schijnt, uyt de verdobbeling van 't Vlies, waar mede ze van binnen bekleed zijn; dit word beter gezien in den bovensten Lip, g 13. Fig. van de XXIX. Tafel, als in den ondersten, en dient om den Lip te wederhouden, dat die niet te verre van 't Tand-vlees zou wijken.

Deze deelen krygen Aderen, en Slag-aderen, van de uytwendige Krop-vaten.

Zenuwen hebben ze van 't vijfde, zesde, zevende, en agtste paar der Hersenen: als ook van de Zenuw, die uyt 't Rug-merg na 't dwalende paar komt.

De bovenste Lip heeft een zeker gebrek, *Hazemond* genaamt, waar mede de Kinderen zomtijds geboren worden, ook komt het door een wonde, die men verwaarloost heeft te vereenigen, en dat beyde Lippen der zelve verre van malkander met een lidteeken overtrokken zijn. Ziet om een Hazemond te snyden, mijn Verhandeling van de voornaamste Handwerken der Heelkonst Pag 34.

Zo iemand door een uytwendige oorzaak, den op-

1 Venæ jugulares. Arter. carotides.

S 3

per-

persten of ondersten Lip gescheyden had, en de Heelmeester onmiddelijk na de quetsing daar by quam, moet hy om die hegting te doen, de naalden niet laten steken in de Lippen der wonde, ten ware in jonge Kinderen, die men van schreyen niet kan af houden, gelijk men doet in een Hazemond, daar men de kanten der scheyding heeft moeten af snyden. Maar men neemt een kromme naald met een gewaste draad, en de eene Lip der wonde met de vingeren tegen houdende, steekt men die door beyde Lippen der scheyding, en de draad door gehaald zijnde, snyd men dien af, en doet dit zo dikwils als noodig is, knoopende ieder draad ter zyden de wonde op een kleyn compresken met een dobbel knoop, en snyd dien af ontrent den knoop. Een van mijn Vrienden heeft my verhaalt een Heelmeester te kennen, die de Hazemonden op geen andere manier snyd.

HET XI. HOOFDSTUK.

Van de Spieren des onderste Kaak-beens.

Onderste
Kaak-
been is al-
leen be-
wegelijk.
Des zelfs
Spieren.
Slaap-
spier.
XXVII.
Tafel,
1 Figuur.

HET onderste Kaak-been is in den Mensch alleen bewegelijk, en heeft aan elke zyde zes Spieren; tot zijn beweging, twee, die 't opwaarts, twee, die 't neerwaarts, en twee, die 't zydewaarts bewegen.

De eerste, die 't opwaarts beweegt, is de 1 Slaapspier B, zo genaamt, om dat zy op 't Slaap-been legt, deze neemt haar oorspronk met een breed begin, aan 't onderste van 't 2 Opperhoofds-been, boven de 3 Schub-wyze Naad, en van de holligheyt der slapen, gaat ze onder 't 4 Juk been, waar aan zy zig vast hegt, en gaat zig planten in 't voorste, en scherpe uytsteekzel van 't onderste Kaak-been: de inplanting dezer pees is aanmerkens weerdig, om dat ze dobbel, breed, en sterk is, en nederdaalt by na tot aan den

1 Musculus temporal. 2 Os pariet. 3 Sutura squamos.
4 Zygoma.

hork

hoek van 't onderste Kaak-been, zo dat het scherpe uytsteekfel in de verdobbeling is besloten, gelijk een degen in zijn scheede.

Wanneer men 't Been moet ontbloten, om te trepaneren, ter plaats van de Slaap-spier, zo moet de snede gedaan worden volgens den loop der Vezelen, dat is van boven na beneden, in een sneede, of in twee, gelijk de letter V, zo dat 't onderste scherpe deel na beneden is, of drie-hoekig, en kruyswys als 't niet anders wezen kan; maar 't is gevaarlijk die Spier te snyden: want zegt *Hippocrates*, zo de linker Slaap-spier word gesneden, word de regter t'famen getrokken, zo men de regter snyd, geschied het tegendeel.

De tweede, die 't opwaarts beweegt, is de ¹ *Knauw-* ^{Knauw-} spier W, en is een dobbele Spier, die men in twee ^{spier.} kan verdeelen, gelijk ook de voorgaande, uyt tweederley loop van vleezige Vezelen bestaat, waar van cenige nederdalen van 't Juk-been, en andere van 't Wange- of ² Appel-been, en zig kruyffende, plant zig de een in den hoek van 't onderste Kaak-been, en de andere een weynig voorwaart daar nevens.

De eerste, die 't onderste Kaak-been neerwaarts beweegt, is de breede, of onderhuydige, deze begint aan 't bovenste deel van 't Borst-been, van 't midden des Sleutel-beens, en 't uytsteekfel des Schouderblads, *Acromion* genaamt, bedekt alle de Spieren des hals, en plant zig buytenwaarts van onderen in den omtrek van 't onderste Kaak-been, daar na maakt ze een zeer breede pees, die al de Spieren van 't aangezigt bekleed.

De tweede, die 't neerwaarts beweegt, is de ³ *Twee-* ^{Twee-} buykige Spier S, zo genaamt, om dat die twee ^{buykigen} buyken heeft, die in 't midden door een pees van een ^{Spier.} ^{xxvii.} gescheyden zijn, en gaat door een gat van de ⁴ *Priem-* ^{Tafel.} tongbeens Spier: dit gat dient gelijk een katrol, om ^{1. Figuur.} de beweging dezer Spier te bestieren, dat zy 't Kaak-been neerwaarts zou trekken, als of zy daar haar oorspronk nam; zy begint met een buyk, van 't

¹ *Masseter.* ² *Osmalum.* ³ *Biyenter.* ⁴ *Stylo-hyoideus.*

Mam-wyze uytsteekfel, in een groeve aan zijn binnenste zyde, en eyndigt met de andere, van onderen en van binnen aan de Kin,

Uytwendige
Vleugel-
wyze
Spier.

De eerste, die 't onderste Kaak-been zydewaarts beweegt, om de spijs te malen, is de uytwendige ¹ Vleugel-wyze Spier, neemt haar oorspronk van 't uytwendig deel der Vleugel-wyze uytsteekfels van 't ² Wigge-been, en plant zig in 't opperste deel van 't agterste uytsteekfel des onderste Kaak-beens, en zomtjids in de tusschenheyt van beyde.

Inwendige
Vleugel-
wyze
Spier.

De tweede is de inwendige ³ Vleugel-wyze Spier, zy is dik en kort, neemt haar oorspronk in de holigheyt der Vleugel-wyze uytsteekfels, en hegt zig in 't binnenste deel van 't agterste uytsteekfel des onderste Kaak-beens. Beyde die Spieren worden vertoont, in de XXIX. Tafel, 13. Fig. de uytwendige C, en de inwendige D.

HET XII. HOOFDSTUK.

Van de Klieren der Keel, Kaken, Lippen en Oor-klieren

Klieren
aan de
Keel.

XXVII.

Tafel.

2. Figuur.
Getal.

An de zyden der Keel, leggen verscheide Klieren H, waar van eenige zeer kleyn, en de grootste, niet meerder als een boon zijn, de bovenste zijn zagter, en bleek, en de onderste rood van kouleur. Het getal is zomtjids tot veertien, en ook wel meer: de uytloozende vaatjes dezer Klieren zijn, zo veel men weet, nog niet bekend, en daarom ook niet haar gebruyk.

Klieren
der Kaken
en Lippen.

Ter plaats van de wangen, of kaken F, en lippen, leggen vele kleyne eyronde Kliertjes, welke door veele kleyne Buysjes, van binnen in den Mond, een vogt gelijk 't speeksel uytstorten.

De Lippen zijn wegens de Klieren onderworpen zekere gezwellekens, *Lip-knoopen* genaamt, waar uyt

¹ Alaris extern. ² Os sphenoides. ³ Alaris intern.

ik

ik (die verwaarlooft zijnde) vervaarlijke kankers heb
 zien ontstaan: daarom moeten ze, zo haast dit quaad
 vernomen wert, uytgesneden worden; dat aldus ge-
 schied. Men keert den Lip door den duym, en voor-
 sten vinger het binnenste buyten, en maakt een kruys-
 wyze sneede op den lip-knoop zonder dien te raken,
 en dan scheyd men hem van de naburige deelen, en
 trekt hem uyt. Ook steekt men wel een kleyne krom-
 me naald, verzien met een draad kruyswys onder
 den lip-knoop, en dan de draden na zig halende,
 snyd men met een puntig mesjen dezelve wat diep in
 't gezonde af: maar als hy grooter is, en den lip uyt-en
 inwendig heeft bezet; kan men dien, eerst een loode
 plaat in den mond, tusschen den lip en 't tand-vlees
 gestelt hebbende; daar op af snyden, het bloed stel-
 pen, en verders genezen.

Onder de klieren, die 't speeksel afkleynzen, zijn De Oor-
 de ¹ Oorklieren de voornaamste, van welke aan yder ^{klier.}
 zijde, digt by 't voorste, en onderste deel van
 't Oor, agter den hoek van 't onderste Kaak-been,
 een gelegen is C. deze ² op een getaste klier is onder
 dikker en breeder als boven, en besluyt na voren in
 zig nog een ander langwerpige ronde klier.

Het uytloozende vat dezer klier, is zeer aanmer- ^{Het uyt-}
 kelijk, en begint uyt de zelve met veel kleyne takjes, ^{loozende}
 en tot een groote buys geworden zijnde D. gaatse ^{vat.}
 over de ³ Knauw-spier E. een weynig schuyns neder-
 waarts, tusschen de Trompet-spier, en kaak-klieren,
 en opent zig ontrent 't midden der kaak, binnen in
 den mond, met een tamelijke opening. Als die buys
 door scherpe vogten door geknaagt, of door onvoor-
 zigtigheyt des Heelmeesters, of andere oorzaak af-
 gesneden, of verbroken word, veroorzaakt dit een
 gedurige uytvloeging van 't speeksel. Ik heb over vele
 jaren te Parijs een Heelmeester gesproken, die zo
 een gebrek hadde, waar van hy niet kon genezen
 worden.

Deze klieren hebben vele aderen, en slag-aderen,

1 Parotis. 2 Glandul. conglomer. 3 Masseter.

Bloedva-
ten en ze-
nuwen
der klie-
ren.

komende van de ¹ Krop-aderen ; en slag-aderen , en ze-
nuwen van 't vijfde , zesde , zevenste , en 't agtste
paar der hersenen.

Een Dogterken 14. jaren oud , krygt een gezwel
aan de linker Oorklier , dat allengskens aanwassen-
de , zo groot als een vuyft is geworden. Het gezwel
was zonder pijn , hard , bewegelijk , en natuurlijk
van kouleur. Vele in- , en uyt-wendige middelen zijn
meer dan vijf jaren te vergeefs gebruykt. De Ouders
verzogten mijn raad , ik zeyde dat het uytgesneden
moest worden , 't welk is geschiedt van mijn Heer
Provoost , oudsten Heelmeeſter. De Oorklier uyt geno-
men zijnde , woeg over de drie oncen , en is de dogter
volkomen genezen en leeft nog ; maar heeft tot nu ,
zijnde 24. jaren oud , noyt de maandſtonden gehad ,
dies ſe niet gezond is , zo dat naderhand op die plaats
eenige lijmige zappen zijn vergadert.

HET XIII. HOOFDSTUK.

Van de Oogen , en der zelve deelen.

Plaats.

Gedaante.

HEt Oog legt in een holligheyt voor in 't ² Bekke-
neel , het *Oogbol* genaamt , en is van een ronde
gedaante , als den ³ Oog-bol ontbloot is van de de-
len , die hem omringen ; maar daar mede vereenigt
zijnde , is 't pyramidagtig , welkers puntige deel na
binnen , en 't breedſte na buyten legt.

Verdec-
ling van
't Oog.

Men kan 't Oog verdeelen in den Oogbol , die een
rond lighaam is , beſtaande uyt 't ⁴ Hoorn-vlies , en
al wat'er in beſloten is ; als ook in zijn uytwendige
deelen , dat klieren , ſpieren , vet , zenuwen , bloedva-
ten , en de Oogſchelen zijn.

Oogſche-
len.

De Oogſchelen , zig eerſt vertonende , zijn voor
yder oog twee ; d'eene de onderſte , en de andere de
opperſte , die in den menſch de grootſte en bewege-
lijkſte is. De plaats , daar de Oogſchelen vereenigen ,

Hoeken
der Oo-
gen.

¹ Venæ & Arteriæ jugulares. ² Cranium. ³ Oculi globus.
⁴ Cornea.

WOR-

worden de hoeken genaamt; die aan de zijde van den neus is, word den grooten; en die van de andere zijde den kleynen hoek genaamt.

De Oogschelen bestaan uit de opperhuyd, de huyd, ¹t vetvlies, spieren, een kraak-beentjen, en de hayrtjes.

De huyd met d'opperhuyd is als die d'andere deelen van 't aangezigt bekleed, en eyndigt onder den boord van yder Oogscheel; daar ze doorgaat, is het tot doorgang van de hayrtjes, op welke plaats de huyd vereenigt met een ander vlies, dat effen, dun, en zeer gevoelig is, en 't inwendig deel der Oogscheelen, als ook het buyten ¹ Hoorn-en ² Bind-vlies, te gelijk met een opperhuyd bekleed.

Dat'er vetvlies in de Oogschelen word gevonden, Vetvlies. blijkt uyt 't ³ lugt-gefwel in de Oogschelen als de lugt in de vet-blaasjes indringt.

Aan de Boorden der Oogschelen, is een kleyn boogwijs kraakbeentjen, dat met een vliesjen bekleed is, uytgestrekt van 't eens eynde tot 't andere, dat de Grieken *Tarsus*, en de Latijnen *Cilium* noemen, waar in de hayrtjes vast staan, en zijn om dat 't stof, en kleyne diertjes in 't oog niet zouden raken.

Tot beweging van de Oogschelen zijn drie spieren, welker eerste, en tweede, de half rondagtige genaamt worden: beyde komen ze met een gemeene pees aan den grooten hoek van 't Oog; de bovenste loopt boven E door de opperste, en de onderste Oogscheel F, en ze planten zig omtrent den kleynen XXVII.
Taf. I.
Figuur. hoek van 't Oog; deze zijn ten minsten yder een dwerschen vinger breed, en dienen om de Oogen toe te sluyten. Vele maken hier van maar een spier: uyt den loop dezer vezelen blijkt het, dat men op de Oogschelen volgens hun lengte moet snijden. En als men d'opening in een *Traan-fistel* moet vergrooten, of zo 'er geen is, een maken, staat wel, agt te neemen dat men de pees dezer spieren niet af-snijdt: want dat zou de Oogschelen doen intrekken, en een groote mismaaktheyt veroorzaken.

1 Cornea 2 Adnata. 3 Emphysema.

De Ophef-
fer.

De derde spier is de opheffer van de opperste Oogscheel, neemt haar begin in den grond van 't Ooghol, digt aan 't gat, daar de gezigt-Zenuw door komt naar 't Oog, en geplaatst zijnde met een eng en vleezig begin op de regte spier, die 't Oog opheft, eyndigt met een breede pees G in 't voorgemelde kraakbeentjen, aan den Boord van de opperste Oogscheel, en in de 2. fig. A. deze dient om de opperste Oogscheel na boven te bewegen, en 't Oog t^o ontdekken.

XXVII.
Taf.
A. Figuur.

De Oogschelen worden zomtijds vrijwillig bewogen, en dikwils zonder dat we daar op denken; de laatste beweging geschied zeer gezwind, en alle oogenblikken, terwijl men waakt.

Dienst der
Oogsche-
len.

De Oogschelen dienen om de oogen te bedekken, en te beschermen tegen uytwendige ongemakken, voornamelijk als we slapen, en om het vogt, door eenige klieren in 't Oog gebragt, gelijkelijk te verdeelen, en 't ² Hoornvlies daar door glad, zuiver, en doorzigtig te onderhouden.

Door gebrek van de eerste vorming zijn beyde Oogschelen zomtijds geheel, of ten deele aan een gegroeyt, zo dat 't oog niet kan ontdekt worden: wanneer 't maar ten deele is, zo is die vereeniging meest altijd na de zijde van den kleynen hoek; ter plaats der vereeniging is een linie, die de scheyding maakt van beyde de Oogschelen.

Om dit te helpen, kan men met een schaar, aan de eene punt een knoopjen zijnde, onder de linie in-
steken, en de zelve zonder de Oogschelen te quetsen, tot aan den kleynen hoek doorsnijden; of men steekt een proevet, voorzien met een groeve onder de linie, die men wat opheft, en met een snij-mesken doorsnijdt.

Dienst der
Wink-
braau-
wen.

Boven aan yder opperste Oogscheel, ziet men de Winkbraauwen, dat zekere hayrtjes zijn, die de Latijnen *Supercilia* noemen, en strekken tot cieraad, ook om dat 't zweet geen hinder de Oogschelen zou toebrengen.

1 Orbita. 2 Cornua.

Daar

Daar zijn twee klieren in 't Oog, waar door een vogt van 't bloed word afgefcheyden, tot bevogting van de Oogen. De eerſte heeft haar plaats in den grooten hoek van 't Oog A. en word eygentlik de *Traanklier* genaamt. In den menſch is ſe kleyn; maar in Offen, en Schapen, die een derde Oogſcheel hebben, grooter, uyt welke klier twee, of drie uytloozende buysjes komen, die aan de binnenſte oppervlakte van die Oogſcheel zig openen, en in den menſch nog niet ontdekt zijn.

Traanklier.
3. Figuur

Dit kleyn kliertjen door een tegen natuurlijk vogt doordronken, of geulcereert zijnde, vergroot of waſt zomtijds uit, en is ſpongieus rood en zonder pijn, luyſterende na de geneeſmiddelen; vaak is de uytwaſſing vaſter wit of loodverwig en pijnlijk, en luyſtert niet als na de operatie, welke aldus geſchied. Men neemt een naalde met een draad, die men dwers door de uytwaſſing ſteekt, en bind de zelve, en met een hand de eynden der draad ophoudende, trekt men ze zagtjes op, en ſnijdt ſe af met een ſchaar, lancet, of ſnymesker, digt ontrent het kleyn kliertjen, zorg dragende 't zelve niet te quetſen, want dat zou een gedurige traning veroorzaken: d'uytwaſſing en 't kliertjen zijn van malkander t' onderſcheyden, om dat ſe niet van de zelve kouleur zijn.

Onder de opperſte Oogſcheel, boven aan den ingang van 't Ooghol, legt een andere klier, die geen naam heeft, en met meer regt de *Traanklier* kan geheten worden, om dat ſe veel meer vogt aſſcheyd. Deze begint aan den kleynen hoek, en ſtrekt zig uyt na den grooten B. dezelve is verdeelt in verſcheyde lobbekens, tuſſchen welke eenige regte zenuwagtige ſtreepen voortkomen, die waarschynelik d'uytloozende buysjes zijn, en loopen van boven na beneden, onder 't binnenſte vlies der opperſte Oogſcheel, ontrent welkers boord men gelooft dat ſe met hun openingen eyndigen 3. fig. hoewel ze in den menſch niet ligt te vinden zijn; maar in wel Offen. Deze klier

Onge-
naamde
klier.

xxvii.
Taf.
3. Figuur

1 Caruncula lachrymalis

zwelt

zwelt zomtijds door een dik vogt op, en zinkt uyt haar plaats.

Digt aan den grooten hoek van 't Oog, op den boord van yder Oogfcheel zijn twee kleyne gaatjes, ² *Traan-Stippen* genaamt, die den ingang zijn van twee kleyne buysjes, welke van onderen t' saamen komende, in een zakjen eyndigen, dat men Traan-zakjen noemt. Dit zakjen is verzien met kleyne kliertjes, gelijk 't binnenste vlies van den neus, en legt regt onder de pees van de twee halfrondagtige spieren der Oogfchelen, in den grooten hoek van 't Oog, en heeft onder een kanaal, waar mede 't eyndigt in de hol ligheyt van den neus a. 9. fig. XXVIII. Taf. zo dat die kleyne buysjes met het traan-zakjen, en 't kanaal, niet anders als een uytbreyding zijn van 't vlies, 't welk van binnen den neus bekleed.

Kliertjes
der Oog-
fcheelen.

Behalven deze deelen ziet men nog inwendig aan den boord van yder Oogfcheel van 't een eynde tot 't ander, een rye 3 stippen, dat gaatjes der uytloozende buysjes van zekere kleyne kliertjes zijn, niet grooter als 't *beulzaad*, gelegen drie, of vier in een streep, binnen aan de boorden van de Oogfchelen.

Haar ge-
bruyk.

Deze kliertjes scheiden een vogt van 't bloed af als uyt wasch en vet t' saamen gestelt, om de boorden der Oogfchelen te besmeeren, op dat door 't gedurig tegen malkander slaan der zelve 't vliesjen van 't kraakbeentjen niet bezeert worde, bloot rake, en bederve.

Gebruyk
der Oog-
klieren,
en van ee-
nige an-
dere de-
len.

Eer we tot de spieren van 't Oog over gaan, moet ik iet zeggen van 't gebruyk der klieren, en eenige andere deelen, te voren beschreven. En gelijk de mensch moet leven in de lugt, even als de Visschen in 't water; op dat de lugt 't Hoornvlies, aan welke 't bloot legt, niet te zeer verdrooge; en 't stof met andere kleyne diertjes, die 'er in zweeven, en gedurig aan plakken, 't zelve niet zouden verduyfteren, zo is 't, dat de voorgemelde klieren onder de Oogfchelen, met haar buysjes gedurig daar op water storten, waar by de opperste Oogfchelen komen-

1 Orbita. 2 Puncta lachrymalia. 3 Puncta. 4 Cornea.

de,

de, gedurig op en neer bewegen, zonder dat we daar op denken, om alzo 't water over al te verdeelen tot bevoogting van 't Hoorn-vlies; op dat het door dat middel, zuiver, klaar, en doorzigtig zou gehouden worden.

Maar nadien 'er meer water vloeit tot den dienst, waar van nu gesproken is, als nodig is, zo word het overschot vergadert aan de onderste Oogscheel, na den grooten hoek, die wat laager als de kleyne legt, waar door het gebeurt, telkens als we wakende, d' oogen sluyten, en openen, zonder dat we daar op denken, dat een deel van 't water in de traan-stippen indringt, en nederdaalt in 't Traan-zakjen, en 't kanaal tot in de holligheyt van den neus.

Dewijl 't water van de oogen door de traan-stippen, traan-zakjen en 't neus-kanaal in de holligheyt van den neus moet vloeyen, en de traan-stippen verstopt zijn, zal daar uyt ontstaan een gedurige overloop van tranen; of zo 't neus-kanaal alleen verstopt is, komen daar uyt verscheide soorten van Traan-fistels; zomtijds ook door overvloed, en scherpte van 't water word het Traan-zakjen, te zeer verwijd en door-knaagt, waar uyt andere Traan-fistels geboren werden. Van der zelfver genezing is gesproken in mijn verhandeling der voornaamste Handwerken der Heel-konst in 't 27ste Hoofd-stuk. Ziet ook een byzondere aanmerking om de Traan-fistel uyt verstopping van 't neus-kanaal ontstaan te genezen in de byzondere Heel- en Genees-konst der Oog-ziekten derde deel pag. 20.

Men vind in 't Ooghol veel vet, dat 't Oog omringt, de tusschenheden der spieren vervult en der naamlooze klier, en der vaten, om 't Oog te verwarmen, te bevoogtigen, en beter te doen bewegen, als ook om zijn gedaante effen te maken.

Het Oog word bewogen door zes spieren, waar van vier regte, en twee schuynse zijn.

De eerste der regte legt aan 't opperste van 't Oog E, en trekt het na om hoog: De tweede vind

1 Sæcul. Lachrymal. 2 Adducens 3 Abducens.

men

Spieren
van 't
Oog.

XXVII.
Tafel. 4.
Figuur.

men aan 't onderste van 't Oog F, regt tegen over, en trekt het na beneden: De derde, en vierde hebben haar plaats aan de zijden, en trekken 't Oog na de zijde van den grooten, of kleynen hoek; die 't na den grooten hoek trekt, word de 1 nahalende G. en die 't na den kleynen trekt, de afkeerende genaamt H.

Deze vier spieren nemen haar oorspronk in den grond van 't Ooghol, rondom het gat, daar de gezigt-Zenuw door gaat, en regt na voren gaande eyndigen ze met een breede, dunne, en sterke pees, tusschen 't 2 Hoorn- en Bind-vlies, daar 't Hoorn-vlies doorzigtig word.

Als die vier spieren t' samen werken, trekken ze 't Oog na binnen, en houden 't in de zelve plaats onbewegelijk.

Schuynse
spieren, of
draayers.
Bovenste
schuynse.

XXVII.
Tafel. 4.
Figuur.

Katrol-
spier.

Van de tweede schuynse spieren, is een de dunste, de langste, en de bovenste I neemt haar oorsprong in den grond van 't Ooghol, by na daar de 3 Nahalende spier voortkomt, van daar nederdalende na den grooten hoek, loopt die door een kraak-beentjen, gemaakt als een 4 katrol, i dat door een vliezig bandeken aan 't opperste deel van 't kaak-been vast is, en daarom katrol-spier genaamt; aan dit kraak-beentjen word ze omgeboogt, en na 't opperste van 't Oog gaande onder de spier, die 't na om hoog trekt, cyndigt ze in den 5 Oog-bol, daar d' 6 afkeerende spier zig inplant, en draait 't opperste van 't Oog na den grooten hoek.

Onderste
schuynse.

De onderste schuynse spier K, neemt haar begin van 't onderste, en by na uytwendige deel van 't 7 Ooghol, aan de zijde des grooten hoeks, en schuyns voortgaande aan 't onderste deel van 't Oog, na den kleynen, eyndigt met haar pees ter plaats der voorgaande, en beweegt 't bovenste deel van den Oogbol na den kleynen hoek.

Die zes spieren worden in haar plaats vertoont, in de 2. fig. in 't regter Oog, d' 8 optrekkende

1 Cornea. 2 Adnata. 3 Adducens. 4 Trochlea. 5 Oculi globus. 6 Abducens. 7 Orbita. 8 Attollens.

a, de af-keerende d, en de bovenste schuynse, of ka-
 trol Spier e, en in 't linker Oog, de 1 neertrekken-
 de b, de 2 nahalende c, en de onderste de schuyn-
 se p.

De voorgemelde zes Spieren hebben nog andere Andere
 naamen; de 3 Optrekkende word ook de hoogmoedi- naamen
 ge geheten, om dat die 's Menschen Oog na om hoog der Oog-
 trekt. De Neerttrekkende de Ootmoedige, of Neder- spieren.
 ge, om dat die 's Menschen Oogen na de aarde keert. Hoog-
 De Nahalende word anders de Drinke-broer ge- moedige.
 noemt, om dat die drinken door die Spier 't Oog na Ootmoe-
 den Beker draayen. De 4 Af-keerende word de 5 Ver- dige.
 ontwaardige geheten, nadien men stuurs ziende, Drinke-
 de Oogen buytenwaarts af-keert. De schuynse wor- Veront-
 den ook Minnaars Spieren genoemd, om dat de Min- weerdige.
 nende zydelinks malkander, als met draayende Oogen Minnaars
 aanzien. Spieren.

Als een of meer Spieren van 't Oog door een won-
 de afgesneden, of door etter verteert zijn, word de
 Oog-bol getrokken na de tegenoverige zyde door de
 kragtige werking der tegenwerkende Spieren, gelijk
 in vele andere ledematen geschied, of zo de Zenuwen
 van de zelve verstopt of toegedrukt zijn, zo dat de
 geesten niet doorvloeyen, verslappen de Spieren, en ver-
 liezen haar beweging, waar door 't Oog dikwils ten
 deele of geheel uyt 't 6 Oog-hol valt.

De deelen van 't Oog, buyten den Oog-bol gele-
 gen, volgens de verdeeling te voren gemaakt, beschre-
 ven zijnde, laat ons nu van den 7 Oog-bol spreken, Oog-bol,
 die, behalven de Vaten, uyt Vliezen, of Rokken,
 en doorzigtige Lighamen is t' samen gestelt.

De Vliezen worden van eenigen verdeelt, in ge- Eygene en
 meene en eygene. De gemeene zijn twee, 't 8 Bind- gemeene
 vlies, en 't Naamlooze-vlies, waar by andere een Vliezen,
 derde voegen.

Dit derde Vlies, is een uytbreyding van dat 't inwen-
 dig deel der Oog-scheelen bekleed, gelegen op 't Bind-
 vlies, waar mede 't volherd, en zig uytstrekt niet

1 Deprimens. 2 Adducens. 3 Attollens. 4 Abducens. 5 In-
 dignatorius. 6 Orbita. 7 Oculi globus. 8 Conjunctiva.

alleen, tot den omtrek van 't doorzigtig Hoorn-vlies; maar bekleed ook 't zelve, gelijk te voren is gezegt.

Aangeboren of Bind-vlies.

XXVII.
Tafel.

Het tweede, is 't aangeboren of Bind-vlies, om dat 't Oog daar door aan 't ¹ Oog-hol vast is gehegt, zijnde een uytbreiding van 't ² Panne-vlies, dat zig uytstrekt van den omtrek des ³ Oog-bols, tot aan den circul van 't doorzigtig ⁴ Hoorn-vlies: dit Vlies is dat gemeenlijk 't wit van 't Oog genaamt word A, 4. Fig.

Het heeft een scherp gevoel, en is met vele Aderen en Slag-aderen doorweven, die in d'ontsteking der Oogen geweldig opzwellen, en daarom ligtelijk gezien worden.

Het derde gemeene Vlies, word het Naamlooze, en by andere 't Pezige genaamt, om dat door de breede pezen der vier regte Oog-spiere, die over den Oog-bol uytgestrekt zijn, gelijk een Vlies gemaakt word.

Als de voorgaande deelen weg genomen zijn, is'er niets overig, als de bloote Oog-bol A, die aan de Gezigt-zenuw D alleen vast is.

Gezigt-zenuw staat niet regt tegen over den Oog-appel.

Deze Zenuw word van agteren in den Oog-bol niet ingeplant, regt tegen den ⁵ Oog-appel; maar een weynig laager, zo dat de Midden-lijn van die Zenuw, tot den Oog-appel door 't opperste deel langer, als door 't onderste is. Zie de XXVIII. Tafel, 1. Figuur.

Eygene Vliezen: XXVII.
Tafel.

De eygene Vliezen van 't Oog zijn drie: Het ⁶ Hoorn-vlies, het Druyf-bezie Vlies, en het ⁷ Netwyze Vlies.

Het Hoorn of Harde Vlies.

Het Hoorn-vlies a, 5. Fig. is 't aldergrootste, en omvangt den geheelen Oog-bol: 't is hard, dik, en van 't dikke Herffen-vlies komende, waarom 't ook 't ⁸ Harde vlies genaamt word. Zijn voorste deel is glad, en doorzigtig, als de hoorn van een Lantaarn, en daarom Hoorn-vlies genaamt, en kan in zeer

¹ Orbita. ² Pericranium. ³ Oculi globus. ⁴ Cornea, ⁵ Pupilla. ⁶ Uvea. ⁷ Retina. ⁸ Sclerotica of dura.

veel Vliesjes verdeelt worden, tusschen welke dikwils eenige kleyne gezwelletjes ontstaan: 't overige grootste deel is niet doorzigtig, en van kouleur gelijk 't dikke Herffen-vlies.

Het Druyf-bezie Vlies onmiddellijk gelegen onder Druyf-be-
't Hoorn-vlies, word in 't Latijn *Uvea* genaamt b, ^{zie Vlies.}
om de gelykenis, die 't heeft met 't Vlies van een
Druyf-bolleken, daar de staart af is; in 't Grieks
heet men *Choroides*, om dat, gelijk 't Vlies Chorion
dient, om de vrugt te omvangen in de Lijf-moeder,
en de Vaten te ondersteunen, die voedsel aanbrengen,
zo ook omvangt dit Vlies de voornaamste deelen,
welke dienen tot 't gezigt, en ondersteunt de Vaten,
die tot die deelen loopen.

't Is veel dunner als 't voorgaande, en van 't dun-
ne Herffen-vlies komende, maar dikker als 't zelve,
zijnde teer, en over al zeer duyster, om dat het met
zekere zwarte stoffe is bestreken.

Dit Vlies kan in twee onderscheyde Vliezen ge-
scheyden worden, en bekleed van agteren, en ter zy-
den het geheele 1 Hoorn-vlies, en heeft de zelve ge-
daante; 't is op verscheyde plaatsen daar aan vast,
door middel der Zenuwen, Aderen, en Slag-aderen,
die door 't Hoorn-vlies booren, en zig in dit Vlies
verspreyden. En als 't 2 Druyf-bezie Vlies, ontrent
den circul van 't doorzigtig Hoorn-vlies komt, maakt
het zig rondom vast aan den 3 Hayr-wyzen Band,
waar van in 't vervolg zal gesproken worden, al-
waar het den 4 Regen-boog voort brengt.

De Regen-boog is dat deel van 't Druyf-bezie Regen-
Vlies B, 't welk gezien word dwerssch door 't door-^{boog.}
zigtige Hoorn-vlies, en is gelijk een breede ring, die
in zommige Menschen van een verscheyde kouleur is,
als blauw, zwart &c. tusschen welke altijd nog eeni-
ge andere vermengt zijn, waar van dit deel door ge-
lykenis des Regen-boogs de Regen-boog genaamt
word, en volgens die kouleur zegt men dat de Oo-<sup>Kouleur
der Oo-
gen.</sup>
gen blaauw, zwart, of anders zijn.

1 Cornea. 2 Uvea. 3 Ligament. ciliar. 4 Iris.

Oog-
appel.XXVII.
Tafel.

Men ziet in 't midden van den Regen-boog een gat, dat zwart en altijd rond is in den Mensch, de 1 Oog-appel genaamt, om de stralen van 't licht voor 't gezigt door te laten, e en c 5. Fig.

Die zwartheyt van den Oog-appel is, door dien 't 2 Druyf-bezie Vlies met een zwarte stoffe is bestreken, gelijk te voren is gezegt.

De Regen-boog onbelemmert zwemmende in 't waterig vogt, is bewegelijk, zo dat, ten dien opzichte de voorwerpen klaar, kleyn, of van na by gezien worden, en den Oog-appel zig vernauwt, en de Regen boog verbreed word: het tegendeel geschied door voorwerpen, strydig met de voorgaande.

De ondervinding leert, dat onmiddelijk agter den Oog-appel, in 't waterig vogt, zomtijds een Vlies komt, 't welk 't gezigt vernietigt, om dat de stralen van 't licht door den Oog-appel gestopt zijnde, tot op 't 3 Net-wyze Vlies niet door gaan, om de voorwerpen af te beelden, welk Vlies gemeenlijk *Cataracta* genaamt word; en tot wegneming van 't welk men gewoon is, een naalde in 't Oog te brengen, agter den Oog-appel, om dat Vlies neer te drukken, tusschen 't glasagtig vogt, en den Regen-boog.

De ondervinding leert ook, dat, als men meende een Vlies neergedrukt te hebben, na de dood bevonden wierd, 't kristallyne vogt te wezen, zo dat het een groot geheym is, eer men de operatie doet, te zeggen, of 't gezigt door een Vlies, of door 't verduyftert kristallyne vogt vernietigt is, ten zy na dat de operatie eenige dagen gedaan is: want zo de Lyder dan de voorwerpen onderscheyden ziet, zonder dat hy een convex glas moet gebruyken, is 't een zeker reeken, dat het een Vlies was, 't welk neer gedrukt is; maar zo hy de voorwerpen niet kan zien, zonder hulpe van 't voorgemelde glas, is 't zeker dat men 't kristallyne vogt heeft neer gedrukt.

Voegt'er by, dat den Edelen Heer *Woolhouse*, my geschreven heeft, dat 't gezigt wel twintigmaal ver-

1 Papilla. 2 Uvea. 3 Retina.

nie-

nietigt word door 't verduyftert kryftallyne vogt, dat een *Glaucoma* is, als eens door een Vliezige *Caracta*.

Het derde eygen Vlies is 't ¹ Net-wyze, dat on-Net-wyze middeljik onder 't Druyf-bezie Vlies legt; dit Vlies ^{Vlies.} is zeer zagt, dun, teer, en witagtig van kouleur, zijnde een uytbreyding van de mergagtige draden der Gezicht-zenuw, c 5. Fig. en omvangt onmiddelijk 't grootfte deel van 't glasagtige vogt, dewijl 't uytgeftrekt is tot den ² Hayrwyzen-band, waar aan 't vast gehegt word: deze Vliezen worden nauwkeurig ver- toont, in de 2. Fig. van de XXVIII. Taf.

Ontrent den omtrek van 't doorzigtige; Hoorn- vlies, is een vliezige, witagtige, en kleyne circul, waar aan 't ⁴ Druyf-bezie Vlies, de ⁵ Regen-boog, als een deel van 't zelve, en 't Net-wyze Vlies vast zijn gehegt; 't is ook digt aan dien band, dat 't Druyf-bezie Vlies vast is aan 't niet doorzigtige in- wendige deel van 't Hoorn-vlies. Deze circul word genaamt den Hayrwyze-band, van wiens omtrek zeer vele kleyne zwarte vezelkens op 't voorfte deel van 't glasagtig vogt, tot aan 't kryftallyne uytge- ftrekt leggen cc, 6. Fig. die de hayrwyze uytftreek- ^{Hayrwyze} fels des voorgemelden bands geheeten zijn, en ook ^{uytftreek-} helpen tot zwartheyt van den Oog appel. ^{fels.}

Daar zijn in den ⁶ Oog-bol drie vogten, het wate- rig, kryftallyne, en 't glasagtig vogt.

Het waterig vogt zo genaamt, ter oorzaak van de ^{Het wate-} kouleur en vloeybaarheyt, die 't heeft met gemeen water, ^{rig Vogt.} is nogtans lymiger, als 't zelve.

Dit vogt vervult de gantsche ruymte, die ^{gevon-} den word tuffchen 't doorzigtige Hoorn-vlies, 't ^{xxvii.} Tafel, kryftallyne vogt, en 't voorfte deel van 't glasagtig ^{5. Figuur.} vogt. Als dit vogt door quetfing van 't doorzigtige Hoorn-vlies is uytgelopen, of vermindert door een groote ziekte, word den Oog-bol flap, de Regen- boog gerimpelt, en de Lyders hebben moeyte, om de voorwerpen te onderscheyden; maar gezond wor- dende, en 't Hoorn-vlies geheelt zijnde, word het

¹ Retina. ² Ligamentum ciliare. ³ Cornea. ⁴ Uvea. ⁵ Iris. ⁶ Oculi globus.

weder van zelfs herstelt, als men zig in een donkere plaats stil houdt.

Het kry-
stallyne
Vogt.

Het krystallyne vogt, oneygentlijk zo genaamt, om dat het eer onder de vaste deelen, als vogten moet gestelt worden 2, is zeer klaar, en doorzigtig als krystal, en van een platagtige, ronde gedaante; van voren zo bultagtig niet, als van agteren, waar door 't in een holligheyt midden in 't voorste deel, dat zeer dun is, overtrokken word, en regt tegen over den 1 Oog-appel is geplaatst.

Tusschen de vingeren gevreven is het eenigfints zagt, en slymig, en bestaat uit vele zeer dunne schellekens, gelijk ajuynen, waar van 't een in 't ander besloten is, gelijk zommige ronde doosjes van verscheide groote, die 't een 't ander omvangingen.

Twee Geleerden dezer eeuw hebben geschreven, dat de *Cataracta* niet anders is als een verduyftering van 't krystallyne vogt, om dat ze in verscheide Menschen de operatie van de *Cataracta* gedaan hebbende, altijd na de dood bevonden, dat ze 't krystallyne vogt verduyftert zijnde, neer gedrukt hadden. Maar den Heer de *Woolhouse* Oculist heeft my dikwils geschreven, dat ze daar verscheide vliezige *Cataracten*, zo in Menschen, als Beesten gevonden hebben, zo dat men nu niet meer twyfelt, of daar zijn ook vliezige *Cataracten*, gelijk de Ouden die beschreven hebben, hoewel ze zo dikwils, als de verduyftering van 't krystallyne vogt, niet voor vallen, gelijk gezegt is. Ik heb onlangs in een jongen Heer een vliezige *Cataracta* gezien in 't waterig vogt, tusschen 't doorzigtige Hoorn-vlies en den Regen-boog, tegen den Oog-appel.

Het gebeurt zomtijds dat 't krystallyne vogt verhard, en verduyftert; en in de operatie tusschen den 2 Regen-boog, en 't glasagtig vogt neer gedrukt zijnde, daar na opklimt, nabuyten komt door den Oog-appel, en zig zet in 't waterig vogt, tusschen den Regen-boog, en 't doorzigtig 3 Hoorn-vlies, tegen

1 Pupilla. 2 Iris. 3 Cornea.

den

den Oog-appel, waar door een onverdragelijke en pynelijke ontsteking ontstaat, welke verdwijnt, wanneer 't zelve door den 1 Oog-appel te rug keert.

Om 't krystallyne vogt na buyten door den Oog-appel komende, en die toevallen veroorzakende, weg te nemen, maakt men een opening, by na geheel de dwerscheit van 't doorzigtige 2 Hoorn-vlies, en neemt 't zelve met een kleyn lepelken uyt, zo nogtans, dat de opening ontrent 't laagste deel van 't Hoorn-vlies geschied, waar na de Lyder verbonden moet worden met een compres, nat gemaakt in twee deelen water, en een deel brandewijn; 't uytgeloopen waterig vogt word, 't Hoorn-vlies geheelt zijnde, van zelf herstelt.

Het glasagtig vogt 3, is het gesmolte glas gelijk, ^{Glasagtig vogt.} maar klaarder, en bestaat uyt eenige vliezige cellen, en doorzigtige draden, met een gemeen Vlies omvangen, waar in een vogt, by na 't waterig vogt gelijk, onthouden word.

Dit vogt vervult de ruymte, die gevonden word tusschen den 3 Hayrwyzen-band, 't krystallyne vogt, en 't 4 Net-wyze Vlies, dat twee deelen van drie of daar ontrent van den 5 Oog-bol uytmaakt, gelijk in de 5. Fig. van de XXVII. Tafel gezien word.

Dat'er een omloop geschied van de drie vogten der Oogen, blijkt uyt de aanbrengeende, en wegvoerende Vaten, *Hayr-vaten* genaamt, van den Heere Hovius vertoont, ook van de Heeren van de Koninklijke Academie der Wetenschappen te Parijs in de Maand September 1716. door den Heer Duverney aangewezen.

De Slag-aderen der Oogen komen voort van de ^{Slag-aderen der Oogen.} takken, zo der uyt-, als inwendige Krop-slag-aderen, welker eerste zig verdeelen in de uytwendige, en de tweede in de inwendige deelen van 't Oog.

Aderen hebben ze van de uyt-, en inwendige Krop-Aderen. aderen.

En gelijk de Oogen zijn voor 't gezigt, zo heb- ^{Gezigt-zenuwen.}

- | | | | |
|-----------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 1 Pupilla. | 2 Cornea. | 3 Ligamentum ciliare. | 4 Retina. |
| 5 Oculi globus. | | | |

ben ze twee Gezigt-zenuwen D, die 't tweede paar zijn van de Herffenen: als een of beyde der Oogen verftopt worden, maakt dit een blindheyt in een, of beyde Oogen, zonder dat men eenige ontfteltenis daar in kan zien, welk gebrek van de Latijnen *Gutta Serena* genaamt word.

Eenige beweeren dat dit gebrek meest altijd voortkomt door de fmelting van 't glafagtig vogt, 't welk te dun geworden zijnde, de ftralen van 't ligt niet meer kan modifieren, zo dat 't beeld der voorwerpen niet meer op 't 1 Net-wyze Vlies word afgebeeld, waar uyt een blindheyt ontftaat, hoewel 't Oog zo zuiver, en klaar is, als in zijn natuurlijke gefteltenis.

Zenuwen tot de beweging. Tot beweging van de Oogen, is 't derde, vierde, en by na geheel 't zesde-paar der Zenuwen, en zy hebben boven dien nog takken van 't vijfde, en zevende paar.

Van 't gebruyk der Klieren, Spieren, en Vet, is te voren gefproken.

Dienst der Vliezen. Ook dienen de Vliezen, of Rokken, om de vogten te behouden; en 't doorzigtige deel van 't Hoornvlies is, om de ftralen van 't ligt door te laten: de 2 Regen-boog of 't voorfte deel van 't 3 Druyf-bezie Vlies, verengt en verwijd den 4 Oog-appel tot 't gezigt; maar 't agterfte deel, welk 't Net-wyze Vlies omvangt, belet dat de ftralen van 't ligt niet door gaan; en 't Net-wyze Vlies is als een witte doek, waar op de beelden der voorwerpen van 't gezigt afgebeeld worden.

Dienst der Vogten. De vogten verbreken de ftralen van 't ligt zodanig, dat, die van een zeker ftip van 't voorwerp af-komen, ook op een zeker ftip van 't Net-wyze Vlies vallen, en die van verfcheyde ftippen des voorwerps af-ftuyten, ook op verfcheyde ftippen van dit Vlies ontfangen moeten worden, waar uyt een beeld word afgemaakt in den grond van 't Oog, dat over een komt met 't voorwerp, dat gezien word, waar door de Ziel kennis krijgt van 't buyten fttaande voorwerp.

1 Retina. 2 Iris. 3 Uvca. 4 Pupilla.

Zom-

Zomtijds stort door een slag op 't Oog veel bloed in 't waterig vogt, zo dat het t'eenemaal verduyftert, en 't gezigt vernietigt word, indien 'er zo veel is, dat het niet kan verdreven worden, moet men 't doorzigtige ¹ Hoorn-vlies dwers ontrent 't onderste deel doorsnyden, zonder den ² Regen-boog te quetsen, om 't bloed uyt te laten, dat zonder pijn geschied.

Het werktuyg hier toe, moet wel-snydende, en niet puntig wezen, om den Regen-boog niet te beschadigen; de ³ Oog-bol moet wel vast gezet worden, eer de in-snyding geschied, en zo door de eerste in-snyding 't bloed niet uyt komt, kan men die twee-, of driemaal hervatten, dewijl 'er voorbeelden zijn, dat 't Hoorn-vlies geheelt is zonder by na eenig lidteeken, hoewel 't niet altijd zo gelukt: want zo de insnydingen gedaan worden op Oogen met toe-vloeying, zweeren, of ontsteking, daar 't geweesel, en de vaten, zeer verwijd zijn, zo vloeyd het voedsaam zap, veel in, en hegt zig ordentelijk daar aan vast, en is oorzaak van het lidteeken.

HET XIV. HOOFDSTUK.

Van den Neus.

DE Neus word van zommige verdeelt in een in-xxvii. ¹ wendig, en uytwendig deel: tot 't inwendig ^{Tafel.} behooren 't ^{2.} ^{Figuur.} ⁴ Zeef-been, de spongieuze beenderkens, 't binnenste Vlies van den Neus met de Reuk-zenuwen: 't uytwendige deel maken uyt de Beenderen, en Kraak-beenderen.

De Neus is gemeenlijk dat deel, 't welk midden in ^{De Neus.} een wel gemaakt aangezigt, boven de opening van den Mond, tot aan 't Voorhoofds-been meest uytsteekt.

Het verhevenste deel I, volgens de lengte, word ^{Des zelfs} de Rug van den Neus geheten, en 't spits gedeelte i, ^{deelen.}

¹ Cornea. ² Iris. ³ Oculi globus. ⁴ Os cribrosum.

de graat. Het uytreynde beneden k, word de top, of ²t rond; de zydelijke deelen K, de vleugels, en ²t onderste, dat naast aan de Lippen is, de pylaar genaamt.


De Neus word door een Midden-schot gescheyden in twee groote holligheden, welkers ingang van buyten de Neus-gaten zijn, waar door de lugt naar de Longen in gaat, als men inademt, en uyt gaat, als men uyt ademt.

Die holligheden gaan eerst opwaarts naar ²t Zeefbeen, en de spongieuze beenderkens; en van daar grooter wordende, gaan ze boven ²t verhemelte na ²t agterste, en binnenste van den Mond.

De gesteltenis dezer holligheden, eerst na boven gaande, maakt, als men in-ademt, dat de Reuk-deeltjes met de lugt gedreven worden op de takjes der Reuk-zenuwen, die door ²t binnenste Vlies van den Neus verspreyd leggen.

En op dat de lugt beter in de ¹ Longe-pijp, en Longen, en van deze in die holligheden zou gaan, is de opening agter in den Mond, die gemeenschap heeft met beyde, regt boven de Spleet van ²t ² Strotten-hoofd, en een weynig voorwaarts ²t ³ Lelleken, zo dat de lugt van dien weg niet afwyken kan. Hier van zal in ²t XIX. Hoofdstuk gesproken worden.

¹ Aspera arteria. ² Larynx. ³ Epiglottis.



U Y T L E G G I N G

der

F I G U R E N ,

van de

XXVII. T A F E L.

Waar in vertoont worden de Oogen;
de Spieren van 't Aangezicht, en
cenige Klieren.

*De 1. Figuur vertoont de
Spieren van 't Aange-
zicht.*

A De Voorhoofds-
spier.

B De Slaap-spier.

C Een deel van de
Spier, die 't Oor op-
trekt, 't welk in den
Mensch noyt ge-
schied.

D De Spier, die 't Oor
agterwaarts trekt, dat
in den Mensch zom-
tijds geschied, gelijk
in 't XVI. Hoofd-
stuk zal gezegt wor-
den.

EF De Spieren, die
de Oog-schelen fluy-
ten.

G De Spier, die de
bovenste Oog-scheel
optrekt.

H Het opperste Kaak-
been.

I Een kleyn Spiertjen,
van anderen niet aan-
gewezen, en moge-
lijk eygen aan dit
Lighaam.

K Den Neus verwy-
dende Spier van 't eer-
ste paar.

L Den Neus verwy-
dende Spier van 't
twee-

tweede paar.

M De Ring - wyze
Spier tot verenging
van den Neus, die
volgens eenigen niet
gevonden word.

N De Spier, die de
bovenste Lip alleen
opligt.

O De Spier, die bey-
de Lippen opligt.

P De Sluyt-spier der
Lippen.

Q De Spier, die de
onderste Lip alleen
neertrekt.

R De Spier, die bey-
de Lippen neertrekt.

S De twee - buykige
Spier.

T Het onderste Kaak-
been.

V De Trompet-spier.

W De Knauw - spier.

X De dunne lange
Spier der Lippen.

Y Een deel der Te-
pel - wyze Spier, die
't Hoofd buygt.

Z De Oor-klier.

*De 2. Figuur vertoont de
Spieren der Oogen, de
Klieren van den hals,
Lippen, en Kaaken.*

*Het regter Oog word
vertoont nederwaarts
hangende, en 't linker
om hoog opgetrokken;
zijnde de beenderen
van 't Oog-hol eenig-
sints gebroken, op dat
men alle de Spieren in
haar plaats kan zien.*

A De Spier, die de
bovenste Oog-scheel
opligt, en na boven
op 't Oog-hol uyt-
gespreyd is.

B Den Oog-bol.

a De Spier, die 't reg-
ter Oog na boven
trekt.

b De Spier, die 't lin-
ker Oog na beneden
trekt.

c De nahalende Spier
van 't linker Oog.

d De af-keerende Spier
van 't regter Oog.

e De katrol Spier.

f De katrol zelve.

g De onderste schuyn-
se Spier van 't linker
Oog.

h Den Oog-appel.

i De Gezigt-zenuw.

C De Oor-klier.

D De Speeksel-buys.

E

E De Knauw-spier.
 F De Klieren der Lippen en Kaaken.
 G Een priemken in de Speekfel-buys gesteken.
 H De Keel-klieren.
 I De rug van den Neus.
 K De vleugels van den Neus.
 i De Graat.
 k Het rond van den Neus.

De 3. Figuur vertoont den Oog-bol, met den boord der bovenste Oog-scheel, om de Traan-klieren te zien.

A De Traan-klier, gemeenlijk zo genaamt.

B De Naamlooze-klier.

ccc De Traan-buysjes, die van binnen ontrent den boord der Oog-scheel eyndigen.

D De Gezicht-zenuw.
 ee De Hayrtjes aan den boord van de Oog-scheel.

De 4. Figuur vertoont

den Oog-bol uyt het Oog-bol genomen; met de Spieren.

A Het aangeboren of Bind-vlies.

B Den Regen-boog.

C Den Oog-appel.

D De Gezicht-zenuw.

E De Spier, die 't Oog optrekt, of de hoogmoedige.

F De Spier, die 't Oog neertrekt, of de nederige.

G De nahalende, of Drinke-broer.

H De af-keerende, of Verontweerdiger.

IK De Minnaars-spieren.

I De bovenste schuynse, of Katrol-spier.

i De Katrol uytgenomen met de Spier.

K De onderste schuynse Spier.

aa Den ingang der Zenuwen in de Spieren.

De 5. Figuur vertoont de Oog-bollen met de Gezicht-zenuwen; zijnde de linker in zijn geheel, en de regter in 't midden

den door gesneden, in welke de uytvloeying der vogten door 't verwriezen belet is.

A Den Oog-bol in zijn geheel.

B Den Regen-boog.

C Den Oog-appel.

D De vereeniging der Gezigt-zenuw.

E Een deel der Gezigt-zenuw met den Oog-bol in 't midden door-gesneden.

a Het harde of niet doorzichte deel van 't Hoorn-vlies.

b Het Druyf - bezie Vlies.

c Het Net - wyze Vlies.

d Het doorzigtige deel van 't Hoorn-vlies.

e Den Regen - boog zijnde een deel van 't Druyf-bezie Vlies.

o De Hayrwyze uytsteekfels.

i Het Waterig vogt.

2 Het Krystallyne vogt.

3 Het Glasagtig vogt.

De 6. Figuur vertoont het Glasagtig vogt met 't Krystalline in zijn midden.

a Het Krystallyne vogt.

bb Het Glasagtig vogt.

cc De Hayrwyze uytsteekfels.

d De Vaten van 't Net-wyze Vlies, die aan de uytgenome vogten blyven vast hangen.

De 7. Figuur vertoont het Krystallyne vogt, zo als 't van voren word gezien.

De Neus bestaat uyt de Opper-huyd, de Huyd, 't Vet-vlies, Spieren, Beenderen, Kraak-beenderen, Vliezen, en andere Vaten. Andere deelen des Neus.

De Huyd van den Neus is dun, en zonder Vet, op dat ze niet wanschappen zou worden, onder 't Midden-schot; in de pylaar is ze dik, en spongieus.

Het bovenste deel van den Neus bestaat uyt verscheide Beenderen: daar zijn 'er twee, die 't eerste paar van 't opperste Kaak-been maken; aan de zyden een weynig agterwaarts, staan de opperste deelen van 't derde paar des opperste Kaak-beens; en in 't midden, word de Neus van boven tot onderen, in twee groote holligheden gescheiden, door 't Ploeg-yzer-been. Ook zijn in ieder holligheyt van den Neus, de onderste, en opperste spongieuze Beenderkens, welker laatste zeer dun, en gekronkelt zijn, en van binnen veel hollekens en cellekens hebben, die met een Vlies bekleed zijn, waar in de Reuk-zenuwen zig verspreiden, zo dat die Beenderkens met hun Vlies, dat eygentlijk 't werktuyg van den Reuk is, in een kleyne plaats een groote uytgestrektheyt, en oppervlakte hebben, op dat het van vele Reuk-deeltjes, op vele plaatsen te gelijk, aan gedaan zou worden, waar door de zin van den Reuk volmaakt is; voornamelijk als de Reuk-deeltjes, bestaande uyt olyagtige, en vlug zout, door een sterke inademing (welk de ziel is van den Reuk, om zo te spreken) met geweld op dit Vlies gedreven worden.

Onder de Beenderen van den Neus, kunnen ook 't Nagel-, en plat-beentjen gestelt worden, welkers eene oppervlakte naar 't Oog, en de andere na den Neus gekeert staat, makende de uytwendige oppervlakte der opperste spongieuze Beenderkens, en naar agteren 't zydelijke deel van den Neus.

Het bovenste deel van den Neus uyt Beenderen bestaande, is onbewegelijk; maar by na is 't onderste deel geheel uyt Kraak-beenderen gemaakt, en word bewogen door twee Spieren aan elke zyde. Kraak-beenderen.

1 Os vomer.

De

Eerste
Spier.

De eerste K , neemt haar oorspronk ontrent de naad , waar door 't Voorhoofds-been t' samen gevoegt is met 't eerste paar Beenderkens van 't opperste Kaak-been , met een eng begin , en allengskens breeder wordende , plant zig in de vleugel van den Neus.

Tweede
Spier.

De tweede L , begint onder 't Oog-hol , en eyndigt ten deele uytwendig aan de vleugel van den Neus , en in de bovenste Lip ; deze twee Spieren verwyden den Neus.

Eenigen stellen een Ring-wyze Spier M , tot verenging van den Neus ; maar die word altijd niet gevonden : want als de Neus door de vorige Spieren verwijd is , en die niet werken , trekt de Neus zig van zelf toe door de Kraak-beenderen , zo dat ze niet noodig is.

Getal der
Kraak-
beende-
ren.

Men telt in den Neus gemeenlijk vijf Kraak-beenderen , by welke den zeer vermaarden *Ruyfch* nog vier andere gevonden heeft.

Het eerste , en bovenste Kraak-been A , is by na langwerpig vier-kant , zijnde 't bovenste deel rondagtig aan zijn omtrek , en wat oneffen , waar door 't aan 't beenig deel van den Neus vast gemaakt word met een brèeden en sterken band , strekkende zig neerwaarts uyt , volgens de lengte van den Neus.

Het onderste Kraak-been B , is een weynig kleynder , aan beyde eynden in den omtrek rondagtig , en aan de zyden wat uyt geholt , zijnde schuyns geplaatst , en tot 't uysterste van den Neus uytgestrekt.

De kleyne Kraak beenderkens leggen tusschen 't bovenste , en onderste , en is des zelfs gescheydentheyt , op dat de Neus zig te beter zou buygen.

De voorgemelde Kraak-beenderen zijn zomtijds verscheyden in groote , gedaante , en getal , volgens de verscheyde onderwerpen.

De Kraak-beenderen strekken zig onder niet uyt , tot 't uysterste van den Neus , zo dat 'er nog een deel der vleugels zonder Kraak-been is , en gemaakt word door de gemeene dekselen.

Het laatste , en grootste Kraak-been is , 't welk het onderste deel van 't Midden-schot uyt-maakt , en den
Neus

Neus in twee deelen fcheyd, en word van boven vast gehegt aan 't beenig gedeelte van 't Midden-schot, strekkende zig regt uyt, volgens de lengte van den Neus. Zie de 7. Fig.

XXVIII
Tafel

Dit Kraak-been heeft, behalven twee platte zyden, vier hoeken, van welke de agterften, en voorften, by na regt zijn; maar de voorften, en onderften t' famen komende, maken een zeer ronde verheven oppervlakte, die verscheyden is, volgens de veelderley gedaante en groote des Neus.

Dit Kraak-been word bekleed met een dik Vlies, met ontelbare Bloed-vaten doorweven, en menigte Kliertjes doorzaayt: deze Kliertjes gedrukt zijnde, geven een slymig vogt uyt, waar mede de holligheden van den Neus gedurig bestreken worden, uytmakende 't grootste deel van 't snot, zo dat dit Vlies met regt het Snot-vlies genaamt word.

De Bloed-vaten van dit Vlies AA, worden klaar gezien in die geworpt zijn, gelijk ook in de andere deelen des Hoofds, om dat de strop de Aderen in den Hals, ligter als de Slag-aderen toe drukt, en vervolgens belet dat 't bloed uyt 't Hoofd naar 't Hart niet te rug keere, waar door 't in de Aderen zig beter vertoont.

Dit Vlies bekleed 't overige van beyde holligheden van den Neus, daar 't niet minder Bloed-vaten, en Kliertjes heeft (behalven aan de zyden, daar 't aan de ondergelegene deelen zeer vast is) als daar het 't Midden-schot bekleed.

Behalven dit Vlies, toont den Heer Ruysch, nog een ander, dat zeer dun is, en van 't Been-vlies van 't beenig gedeelte van den Neus komt, en zijn eygene Vaten heeft.

De Neus heeft Aderen, en Slag-aderen, welke laatste komen van een tak der uytwendige ¹ Krop-slag-ader, en de eerste van de uytwendige ² Krop-ader.

De Reuk-zenuwen, zijnde 't eerste paar der Hersfenen, komen door de gaatjes van 't ³ Zeef-been met

¹ Carotis. ² Jugularis. ³ Os cribrosum.

veel kleyne rakjes , en verspreyden zig in 't Vlies , waar mede de holligheden van den Neus bekleed zijn.

Het deel van den Neus , dat bewogen word , krijgt Zenuwen van 't vijfde paar , die ook dienen tot 't gevoel.

De holligheden van 't Voornoofts-been , ¹ Wigge-been , en der Kraak-beenderen , ontlasten zig in de holligheden van den Neus. Ook ontlast zig daar in 't vogt , komende van de Oogen , door de Traan-stippen , 't Traan-zakjen , en 't Neus-kanaal , die als een uytbreyding van 't binnenste Vlies des Neus onder de deelen der Oogen beschreven zijn.

Nog zijn 'er twee kleyne buysjes , of gaatjes in ieder holligheyt van den Neus , die naar 't binnenste des Monds gaan.

Het binnenste Vlies van den Neus , Snot-vlies genaamt , verslapt zomtijds door een te dik vogt in de eene of de andere plaats , waar door 't verlangt , en uytgerekt word , zo dat 't in een , of beyde Neus-gaten , na buyten , of binnen in 't agterste van den Mond agter 't ² Lelleken neder zakt , en een gezwel maakt , *Polypus* of *Slym-prop* genaamt. Zie wat ik daar van gezegt heb , in mijn Verhandeling van de voornaamste Handwerken der Heelkonst , in 't XXIV. Hoofdstuk.

Als een deel van den Neus ter plaats van de Kraak-beenderen niet t' eenemaal afgesneden is , moet de wonde toegenaayd worden.

¹ Os sphenoides. ² Uvula.

HET XV. HOOFDSTUK.

*Van de holligheden van het Voor-
hoofds-been, Zeef-Wigge-been, en
Kaak-beenderen, en der zelve
Vliezen.*

DE Verhandeling der holligheden dezer Beenderen behoort eygentlijk tot de beschrijving der Beenderen; maar om dat ze met 't Snot-vlies bekleed zijn, en zig in de holligheden van den Neus ontlasten, is 't beter die nu te beschrijven.

Daar zijn in 't Voorhoofds-been, tusschen beyde de Hollighe-
tafelen, onmiddelijk boven den Neus, en Winkbraau- den van 't
wen, twee ruyme holligheden a d, XXVIII. Taf. Voor-
8. Fig. die gemeenlijk door een beenig schar, van been.
malkander zijn gescheiden: zomtijds is 'er maar een
holligheyt aan de regter, of linker zyde, en zomtijds
zijn 'er geen.

In de opperste spongieuze Beenderkens, 't welk Spongiag-
deelen zijn van 't 1 Zeef-been, gelegen aan 't opper- tige Beenderkens.
ste der holligheden van den Neus, vind men veel cel-
lekens, in gedaante en groote zeer verscheiden b b, XXVIII.
c c, die ontrent 't Voorhoofds-been weyniger, en Taf.
neerwaarts gaande, in grooter getal zijn, hoewel 't 8. Figuur
in alle Menschen niet gelijk is. Alle die cellekens
hebben gemeenschap met malkander.

Tusschen beyde de tafelen van 't 2 Wigge-been, Hollighe-
zijn twee groote holligheden c f, die in 't midden den van 't
volgens de lengte van 't Hoofd door een beenig schar Wigge-
van malkander zijn verdeelt. Zomtijds is de eene been.
holligheyt veel grooter als de andere, en dikmaals
zijn 'er geen.

De grootste holligheyt is in 't derde, en grootste Hollig-
been van 't opperste Kaak-been, boven de opperste heyt in 't
Maal-tanden, in ieder 3 Kaak-been een b b, 9. Fig. Kaak-
beeen.
XXVIII.
Tafel.

1 Os cribrosum, 2 Os sphenoides, 3 Os maxillare.

V 2

waar

waar van zomtijds een dezer holligheden door een beenig schot in een voorste, en agterste holligheyt word gescheyden.

Worden
alle be-
kleed met
een Vlies.

Alle die holligheden worden bekleed met 't zelve Vlies, waar mede de holligheden van den Neus van binnen bekleed zijn; maar het heeft daar zo veel bloedvaten, nog kliertjes niet, zo dat 't snot hier afgescheyden, niet zo veel, nog dik is, als op andere plaatsen.

Die holligheden hebben gemeenschap met de holligheden van den Neus, door zekere gaten, zo dat de lugt onder 't ademen, door de Neus-gaten daar in, en uyt kan gaan.

Een voornaam Heelmeeſter te Parijs heeft my verhaalt gezien te hebben, dat een *Polypus* of *Slym-prop*, zijn eerste begin nam van 't Vlies, 't welk de holligheyt van 't Kaak-been bekleed, en zo na buyten, door 't gat van gemeenschap, in de holligheyt van den Neus was gekomen. En gelijk 't zelve Vlies de andere holligheden ook bekleed, zo kan de *Slym-prop* uyt die andere holligheden ook voort komen; en dit is mogelijk de reden, dat die zomtijds zo moeyelijk genezen, en tot den grond uyt getrokken wert.

Behalven deze holligheden, zijn 'er nog twee kleine gaatjes, in ieder holligheyt des Neus; een gelegen aan 't voorste, en binnenste deel der zelve, die door gaan in den Mond, en dienen om 't vogt, 't welk nederdaalt door 't Neus-kanaal, waar van te voren is gesproken, in den Mond te brengen: want zo men van de zyde des Neus een fijn buysjen in een van die gaatjes steekt, en daar mee eenig vogt in spuyt, zal men 't vogt aan de andere zyde, agter de opperste Snytanden, zien uyt springen.

Verschey-
de gevoe-
lens, ra-
kende 't
gebruik
dezer Hol-
ligheden.

Ontrent 't gebruyk der voorgemelde holligheden, zijn verscheyde gevoelens. Eenige meenen, dat ze dienen tot ligtigheyt van die Beenderen: andere zeggen dat ze gemaakt zijn om 't snot, 't welk in 't Vlies, waar mede ze bekleed zijn, afgescheyden word, te ontfangen, en eenigen tijd te behouden.

Zom-

Zommigen gelooven dat die holligheden , en 't Vlies , dat ze bekleed , gemaakt zijn tot een nutter gebruik , en dat het snot alleen dient om dit Vlies te bevogtigen , op dat het door de lugt , die 'er gedurig door gaat , niet te veel zou verdroogen ; 't welk daar na (te veel afgescheyden , of te dik geworden zijnde , niet meer dienstig is om 't Vlies te bevogtigen) als onnut , na buyten word gebracht.

Anderen meenen , dat waarschijnlijker is , dat die holligheden zijn tot een beter weerklank voor de stemme. En zommigen zeggen , dat 't Vlies , waar mede ze bekleed zijn , gelijk ook de holligheden van den Neus , dienen met de zelve , om de lugt met Reukdeeltjes bezwangert te ontfangen , en alzo 't werktuyg van den Reuk te wezen.

U Y T L E G G I N G

der

F I G U R E N ,

van de

XXVIII. T A F E L.

Waar in meest al de deelen van 't Oog ver-
toont worden, benevens de Kraak-been-
deren van den Neus, en de hollighe-
den van 't Voorhoofds-been, Wigge-
en Kaak beenderen, met de celle-
kens der spongieuze Beender-
kens, zo ontbloot, als met
hun Vlies bekleed.

*De 1. 2. 3. 4. 5. 6. en
7. Figuur vertoont de
deelen in hun natuur-
lijke groote.*

*De 1. Figuur vertoont
den Oog-bol ontbloot
van de Spieren.*

A Den Oog-appel.

B Den Regen-boog.

CA De Midden-lijn
van de Gezicht-zenuw
af, tot den Oog-ap-
pel is langer boven,
als onder.

D De Gezicht-zenuw.

*De 2. Figuur vertoont
den Oog-bol, en eenige
Vliezen, of Rokken,
die afgescheyden zijn.*


A Een deel van 't niet
doorzigtige Hoorn-
vlies in zijn natuur-
lijke plaats.

BC Een groot deel
van 't zelve omgesla-
gen.

B Agterwaarts

C Voorwaarts.

DD.



DD Het grootste deel van 't Druyf-bezie Vlies in zijn natuurlijke plaats.

E Een deel van 't zelve Vlies omgeslagen.

F Het binnenste vliessen van 't Druyf-bezie Vlies, met zijn Bloed-vaten, afgescheiden van 't tweede door den Heer *Ruyfch*, waar aan hy zijn naam gegeven heeft.

G Een deel van 't gemelde Vliessen naar agteren omgeslagen.

H Het Net-wyze Vlies met zijn Bloedvaatjes.

I Den Oog-appel.

K De Gezicht-zenuw.
aa De vaten, die door 't Druyf-bezie Vlies loopen.

b Den boord, daar 't Druyf-bezie Vlies doorgesneden is.

De 3. Figuur vertoont den Oog-appel met den Regen-boog.

A Den Oog-appel.

B Den Regen-boog.

C De Hayrwyze uytsteekfels.

De 4. Figuur vertoont een zyde van den Neus, in welke de Kraakbeenderen gezien worden.

AB De twee Kraakbeenderen, die van ouds bekend zijn.

A het bovenste. B 't onderste.

C De vleugel van den Neus, die niet kraakbeenig is.

D Driekleynder kraakbeentjes, de Ouden onbekent.

De 5. Figuur vertoont de andere zyde van den Neus, in welke te zien is

A Een deel van 't bovenste Kraak-been.

B Een deel van 't onderste.

C Het grootste deel van de andere Vleugel.

D Twee van de kleine Kraak-beentjes.

d Het derde, en kleynste.

De 6. Figuur vertoont de
V 4 *Kraak-*

Kraak-beenderen van de zyde van den Neus, gelijk die van Ruysch gevonden zijn.

A Het bovenste Kraak-been.

BC Twee kleyne Kraak-beenderen van anderen niet beschreven.

D Het onderste Kraak-been.

De 7. Figuur vertoont 't schot of 't scheydsel der Neus-gaten met de Bloed-vaten en Kliertjes.

A Het onderste deel van 't schot van den Neus, met het Snot-vlies bekleed, waar in vele Bloed-vaten zijn. Dit schot heeft ook geen Kraak-been in zijn onderste en voorste deel.

aa Een menigte stippen, die gedrukt zijnde, snot uyt geven.

B Een deel van 't schot van 't Snot-vlies ontbloot, en alleen bekleed met 't Vlies, gevonden door den

Heer Ruysch.

C Een deel van 't schot, t' eenemaal van de Vliezen ontbloot.

D Het voorste en onderste deel van 't schot, daar 't Kraak-been ontbreekt.

De 8. Figuur vertoont de holligheden van 't Voorhoofds-been, en Wigge-been, benevens de cellekens der spongieuze Beenderkens, welke aan de linker zyde van hun Vlies ontbloot zijn, en aan de regter daar mede bekleed; zijnde aan die zyde 't opperste deel dier Beenderen weg genomen.

ABC Het voorste en onderste deel van 't Bekkeneel.

AA Den boord van 't boven de Oogen, in de rondte doorgezaagt Bekkeneel.

BB Den boord van 't ontrent 't Agterhoofds-been dwerssch doorgezaagt Bekkeneel.

CC Patten, waar in

't onderste deel der groote Herffenen legt.

D Een pijp gesteken in een der Neus-gaten, in welke geblazen zijnde ziet men

a Het Vlies in een der holligheden van 't Voorhoofds-been in zijn geheel, zijnde op gegaan gelijk een blaas.

bb Het zelve Vlies van de cellekens der spongieuze Beenderkens op gaande gelijk verscheyde blaaskens.

c Het zelve Vlies in de holligheyt van 't Wigge-been opgaande als een groote blaas.

d eef De voorgemelde holligheden en cellekens der spongieuze Beenderkens in de andere zyde ontbloot van hun Vlies.

De 9. Figuur vertoont de holligheyt in 't Kaak-been.

A Den Neus.

B Een deel van 't Voorhoofds-been.

C Een buys, of pijp in 't andere Neus-gat gesteken.

DE Het onderste en voorste deel van 't Bekkeneel.

E De bovenste Tand.

F Een deel van 't Juk-been, zijnde een uytsteeksel van 't Slaap-been.

a Het Neus - kanaal eyndigende in een van de Neus - holligheden onder 't onderste spongieuze Beenderken.

bb Het beenig gedeelte van 't Kaak-been op die plaats weg genomen zijnde, vertoont zig 't Vlies, 't welk die holligheyt bekleed in zijn geheel, en word door 't blazen in de pijp C, opgeheven als verscheyde groote blaazen.

HET XVI. HOOFDSTUK.

Van de Ooren.

Het Oor word gemeenlijk verdeelt in een uyt- en inwendig Oor: door 't uytwendig versta ik niet alleen 't geen van buyten word gezien; maar ook dat zig uytstrekt tot aan 't ¹ Trommel-vlies, de gehoor-weg genaamt.

XXIX. Het bovenste deel van 't Oor A, word de ² Vleugel
Tafel, genaamt: 't onderste deel, dat zagt is en nederhangt,
¹ Figuur. 't ³ Lelleken B: de omtrek van 't Oor of eerste vouw
Vleugel. C, noemt men de ⁴ Oor-rand: het deel wat inwaarts
Lelleken. gelegen of tweede vouw D, tegen dit aan staande,
Oor-rand. de ⁵ Tegen-rand: de holligheyt van 't Oor EE,
Tegen- noemt men de uytwendige ⁶ Schelp: 't uytsteekfel F,
rand. na de slaap van 't Hoofd, om dat 'er zomtijds hay-
ren uyt groeyen, noemt men de ⁷ Bok: en 't tegen
Den Bok. over staande uytsteekfel by na aan 't verhevenste der
Schelp G, word de Tegen-bok genaamt.

Tegen- Het uytwendig Oor word t' samen gestelt van de
bok. Opper-huyd, een dunne Huyd, Kliertjes, 't Vet-vlies,
Deelen weynig Vet, een Kraak-been, Spieren, Bloed-vaten
van 't en Zenuwen.
Oor.

XXIX. Het Kraak-been A. 2. Fig. heeft een grooten om-
Tafel. trek, die allengskens verminderende de Schelp B
maakt, en eyndelijk een kanaal DE, de Gehoor-
weg geheten. Dit kanaal is boven vliezig, en onder
kraak-beenig DD, daar 't door eenige tusschen-
snydingen is gescheiden, en eyndigt aan den mond
van zeker beenig deel A, 3. Fig. waar aan 't vast
gehegt word door een Vlies, zo dat dit beenig deel
den Gehoor-weg verlengt, en daar door ten deele been-
nig en kraak-beenig word.

Dit beenig gedeelte van den Gehoor-weg is aan
't ⁸ Steen-been vast verknogt, en heeft een opening,
by na van een ronde gedaante.

¹ Tympanum. ² Ala. ³ Lobus. ⁴ Helix. ⁵ Antihelix.
⁶ Concha. ⁷ Tragus of Hircus. ⁸ Os petrosum.

Dir

Dit kanaal of gehoor-weg, ten deele Kraak-beenig, ten deele Beenig, gaat in 't begin van onderen na boven, dan van agteren na voren, en eyndelijk van boven na beneden, tot aan 't ¹ Trommel-vlies B, 3. Fig. maar altijd voorwaarts, door welk 't eynde van dezen weg gesloten is, en het 't uytwendig Oor van 't innerlijke affcheyd. Dit Trommel-vlies is dun, ^{Trom-}sterk, droog, en doorzigtig, schuyns geplaatst, met ^{mel-vlies} zijn bovenste deel na buyten overhellende, en is van buyten altijd bekleed met een ander dun Vliesjen, als de Opper-huyd.

Gehoor-
weg.

Trom-
mel-vlies

De Gehoor-weg word van binnen bekleed met de Huyd, zijnde een uytbreying van die van buyten 't Oor bedekt.

Kliertjes

Aan zijn uytwendige oppervlakte, ziet men rond-om vele kleyne Kliertjes E, 2. Fig. die 't Oor-smeer van 't bloed affscheyden, en 't zelve ieder door een buysjen, tusschen de kleyne hayrtjes, in den Gehoor-weg F af leggen, 't welk dient om de Ondieren, die in de lugt zweven en 't stof te wederhouden, op dat het Trommel-vlies niet beschadigt zou worden. Maar gelijk dit vogt zijn nuttigheden heeft, heeft het ook zijn ongemak: want zo men niet zorgvuldig de Ooren zuyvert, word het daar in opgehoopt, verdikt, en belet de lugt in te dringen, zo dat 'er zomtijds oortuytingen en doofheyt uyt ontstaan.

Zomtijds gebeurt het, dat de Gehoor-weg in Kinderen, die ter werelt komen, door een Vlies gesloten is, waar door ze niet alleen doof, maar ook stom kunnen worden: zo 't Vlies uytwendig is, moet het doorgesneden worden, waar in men een steek-wiekje brengt, tot dat het lidteeken gemaakt is, en zo 't Vlies ontrent 't Trommel-vlies legt, is 't moeyelijk te helpen.

De meeste Menschen kunnen hun Ooren niet bewegen, zo dat de Spieren, die veel Ontleeders daar aan toe schrijven, niet schijnen te dienen om ze te bewegen.

Over vele jaren heb ik gezien te Parijs, dat mijn

1 Tympanum.

Heer

XXIX.
Tafel.

Heer Mery sprak over de Spieren van 't Oor, en zeyde dat ze was van de natuur der Ezels, en op den zelve tijd het regter Oor beweegde hy dikwils naar agteren, zo dat waarschijnlijk de Spier C 2. Fig. (waar van eenigen een band maken), die voortkomt van 't agterste deel van 't ¹ Steen-been, boven 't ² Mam-wyze uytsteekfel, en in 't bultig deel van 't Kraak-been, dat de Schelp maakt, ingeplant word, in dien Heer bequamer moet wezen, als in andere Menschen, welke beweging van 't Oor niet kan geschieden, zo 't Kraak-beenig kanaal van den Gehoorweg, door een Vlies aan 't beenig gedeelte niet los vast gehegt, en door eenige vliezige tusschen-snydingen niet gescheyden ware.

De gesnede wonden der Ooren moeten toe genaayd worden. *Ambrosius Paré* wil, dat men om die hegting te doen, alleen de Huyd met de naalde zal doorsteken, zonder 't Kraak-been te raken; maar ik heb in die wonden zomtijds het Kraak-been doorgesteken, zonder dat 'er eenig toeval is gevolgt.

't Uytwendig Oor beschreven zijnde, laat ons nu het Steen-been bezien; zijnde een deel van 't Slaap-been, waar in alle de werktuygen van 't Gehoor befloten zijn. Hier vind men holligheden, die men kennen moet om te weten hoe 't Gehoor geschied, en door wat weg de zenuw van 't Gehoor in 't Steen-been gaat.

De eerste is de holligheyt der Trommel: de tweede is de Schelp, of Voor-huys, zo genaamt om dat het een gemeene weg is tot het Slek-huys, en den Doolhof; de derde is 't Slek-huys: en de vierde, die uyt drie half cirkel-wyze kanalen gemaakt is, noemen eenigen alleen den Doolhof: de vijfde is een holligheyt, waar in de zenuw van 't Gehoor gaat: de zesde is een holligheyt, waar door 't harde deel der Gehoorzenuw gaat: de zevende is een opening, waar aan een Kraak-beenig, en Vliezig kanaal is gevoegt, eynigende agter in den Mond.

De holligheyt van de Trommel legt onmiddelijk

¹ Os petrosum. ² Apophys. mastoid. ³ Os temporal.

ag-

agter 't Trommel-vlies, daar aan volgt wat inwaarts de Schelp, 't Slek-huys, en de Dool-hof: het Slek-huys ziet men voorwaarts na 't aangezigt, en heeft het gat, dat agter na den Mond gaat, aan zijn punt, en aan zijn breedste deel der holligheyt, waar in is 't zagte deel der Gehoor-zenuw, en 't gat, waar door de harde tak in gaat: de Dool-hof legt van agteren, en de Schelp in 't midden, tusschen 't Slek-huys, de Dool-hof, en de Trommel.

De Trommel, die de eerste holligheyt is, in welke eenige dieptens en verheventheden zijn, heeft met verscheide holligheden van 't 1 Mam-wyze uytsteeksel gemeenschap, en kan door 't Aanbeelt, en den Hamer, die t'samen ingeleed zijn, in twee holligheden gescheiden worden; van die twee is d'een d'opperste, en d'agterste, en van gedaante langwerpig rond, zonder dat ze met een Vlies bekleed is, en de andere is onderwaarts meer na voren, deze is rond, en word eygentlijk de holligheyt der Trommel geheeten C.

Deze holligheyt is gescheiden van 't uytwendig Oor, door 't Trommel-vlies, gelijk te voren is gezegt, en is uytgeholt aan zijn uytwendige oppervlakte, en binnen na de Trommel bultig door een Spier, die den steel van den Hamer, waar aan zy vast is, trekkende, maakt dat 't Trommel-vlies inwaarts wijkt in de holligheyt van de Trommel: deze holligheyt heeft een zeer dun Vlies, behalven rondom de ovale venster, daar in de zelve 't Been bloot is.

In de holligheyt van de Trommel zijn vier Beentjes, vier Spieren tot beweging, een Gat, en twee Vensters.

Het gat is geplaatst aan 't voorste deel van de holligheyt van de Trommel, daar aan is een kanaal vast gehegt, ten deele Kraak-beenig, ten deele Vliezig, 't welk eyndigt aan 't agterste deel van 't inwendig 2 Vleugel-wyze uytsteeksel van 't 3 Wigge-been; by eenigen de Water-weg genaamt en 't kanaal van Eu-

1 Apophys. mastoides; 2 Processus pretragoides. 3 Os sphenoides.

Adchius. Dit kanaal gaat schuyns van agteren na voren de breedte van een duym tot 't agterste van den Mond, aan 't eynde van 't Verhemelte, en is bekleed van binnen met een klierig Vlies, dat een vervolg is van dat den Neus van binnen bekleed: de opening van dit kanaal is van buyten met een Spier omkleed; maar die dient om den Slok-darm te verwyden, en mogelijk om die opening te sluyten, als 't noodig is. Deze opening is als een halve maan, en zo gestelt, dat de lugt, die ingeademt word, door den Neus niet kan voorby gaan naar de Long, zonder in te dringen in die opening van 't kanaal, na de holligheyt der Trommel.

Ronde
Venster.

Ovale
Venster.

Beyde de Vensters leggen in 't midden van den grond van de holligheyt der Trommel, de een boven de ander. De eerste en kleynste, die rond, en een verheven boord heeft, is gestopt met een dun, en doorzigtig Vlies: deze Venster maakt het breedste uyt-eynde van 't agterste kanaal van 't Slek-huys: de opperste Venster, die ovaal is, word gestopt door den voet der Stegel-reep, zonder daar aan vast gehegt te zijn door een Vlies, waar door de kleyne Spier vast gehegt in 't knoopen van de Stegel-reep, de zelve ter zyden trekkende, de Venster een weynig opent, en alzo lugt laat gaan in de Schelp, of 't Voor-huys, dat 'er onder legt.

XXIX.
Tafel.

De vier Beentjes besloten in de holligheyt der Trommel, zijn de Hamer, 't Aanbeelt, de Stegel-reep, en een ander kleyn, plat, rondagtig Beentjen.

De Hamer b 3. Fig. heeft twee deelen, te weten: 't Hoofd, en de Steel. De Steel heeft twee kleyne scherpe uytsteekfels, digt ontrent 't Hoofd, welker een korter en dikker is, als 't ander; het dunste, dat lang, en scherp is als een doorn, is noyt in die lengte vertoont als van den Heere *Rau*, vermaard Hooglee-
raar in de Ontleeding te Leyden: door 't langste de-
zer uytsteekfels, en tot aan 't eynde der Steel, is dit
Beentjen vast aan 't Trommel-vlies, en ontfangt een
Spier, waar door 't vast is aan de Trommel: het
hoofd van den Hamer maakt een rond uytsteekfel,
waar

waar in van agteren een holligheyt is, bepaalt door twee verheventheden. Zie ook in de 4. Fig. a, den Hamer, met de andere Beentjes in hun natuurlijke grootte, en plaats t' samen gevoegt, en in de 5. Fig. gescheyden. XXIX. Tafel.

In 't Aanbeelt zijn des zelfs Lighaam, en twee uytsteekfels, zo genaamt Aanbeelt van zijn gelijkenis, gelijk ook de Hamer a, 3. Fig. 't een uytsteekfel is korter, en dikker als 't ander, 't welk dunder, langer, en aan 't eynde wat gekromt is. 't Uyt-eynde van zijn Lighaam eyndigt agter met een rond uytsteekfel, dat van voren twee holligheden heeft, die door een kleyne verheventheyt gescheyden zijn.

Deze twee Beentjes zijn t' samen gevoegt door 't onderlinge ontfanging, en met Kraak-been op die plaats niet bekleed: want 't Aanbeelt ontfangt in beyde zijn kleyne holligheden de twee kleyne verheventheden van 't hoofd des Hamers, en de holligheyt van die Hamer ontfangt de verheventheyt, die beyde de holligheden van 't Lighaam des Aanbeelts van mal-kander scheyd.

Het kortste en dikste uytsteekfel van 't Aanbeeld word in een holligheyt ontfangen, van agteren in 't opperste deel der Trommel, en is daar door een fijn Vlies vast gemaakt: aan 't uyt-eynde van 't langste uytsteekfel is een zeer kleyne holligheyt, waar in een der zyden van 't kleyn plat rondagtig Beentjen vast gehegt is, door een Kraak-been, zo dat het voor een aangroeyfel kan genomen worden; en met de andere zyde, is 't in een kleyne holligheyt van de punt, of knoopjen der Stegel-reep, met welk het is t' samen gevoegt door 't ondiepe geleding. d 4. Fig.

Het vierde beentjen is de Stegel-reep, dat de zelve XXIX. Tafel. zeer wel gelijkt, C 4. en 5. Fig. want men ziet zijn Stegel-onderste, en breedste deel, als ook opperste of punt: reep. ook mede de zyden, en de vensters, of gat, dat in 't midden is. Het onderste, en breedste deel aan de zyde, daar 't in d' ovale venster word ontfangen, is niet nauwkeurig plat; maar een weynig bultig; en

1 Ginglymus. 2 Anthredia.

de

de andere zyde, die na binnen ziet, is holagtig, gelijk ook de zyden: zo dat de omtrek der venster, binnen hol, en buyten bultig is, behalven 't opperste deel, dat met een kleyn knoopjen eyndigt, en van boven een kleyne holligheyt heeft, waar in 't kleyn rondagtig beentjen ontfangen word.

De Venster, die in 't midden van de Stegel-reep is, is gestopt door een zeer fijn Vlies, 't welk rondom 't gat vast is, alleen aan de eene zyde, zo dat de verdieping, die binnen in de Stegel-reep is, een holligheyt uytmaakt met 't Vlies, die nog tamelijk groot is, zo veel de kleynheyt van 't beentjen toelaat.

De meeste Ontleeders schrijven dat die Beentjes geen ' Been-vlies hebben; maar den vermaarden *Ruyfch* toont niet alleen het tegendeel, gelijk ik gezien heb; maar de Bloed-vaatjes zelf, die 'er door loopen, welke zeer veel in 't kortste, en dikste uytsteekfel van 't Aanbeelt gezien worden.

't Is aanmerkens weerdig, dat die Beentjes, gelijk ook 't Slek-huys, en de drie half cirkel-wyze kanalen, in jonge kinderen by na van de zelve zelfstandigheyt, gedaante en groote zijn, gelijk in de oude Menschen, daar al de andere Beenderen nog zeer onvolmaakt zijn, zo dat ze door den ouderdom sterker, en harder worden.

Vier Spieren. Eerste. Tot beweging van deze drie Beentjes, zijn vier Spieren, welke voortkomen van den omtrek der holligheyt van de Trommel. De eerste komt van 't agterste deel, en verdeelt zig in twee pezen, welker een korter en dunder is, de andere langer en dikker: de kortste maakt zig vast in 't langste uytsteekfel van 't Aanbeelt, en de langste plant zig tusschen 't Hoofd, en de steel van den Hamer, zonder dat ze verder gaat. 't Is de lange pees, die d'Ouden kenden voor de koorde van de Trommel, zonder daar iet anders van te zeggen, en van andere is gehouden voor een tak van 't harde deel der Gehoor-zenuw, die dwersch over 't Trommel-vlies ging, zonder daar aan vast te zijn; maar dat is niet te denken, dewijl 't beenig

z Periostium.

kanaal, waar door hy loopt in zijn uytgestrektheyt, nergens open is, en geen anderen uytgang heeft, als 't gat, dat gevonden word tusschen 't ¹ Mam- en ² Priem- wyze uytsteekfel, zo dat dit is de pees van een Spier, welkers vleezig deel men klaar ziet.

De tweede Spier komt voort onder de eerste, uyt ^{Tweede} een beenige holligheyt, by na in 't onderste der Trom- ^{Spier.} mel met een dikken vleezigen Buyk, en plant zig in de punt, of knoopjen der Stegel-reep, met een zeer kleyne pees e, 4. Fig.

De eerste dezer Spieren trekt door haar langste pees den Hamer na agteren, en door de kortste, die ontrent 't uyteynde van 't langste uytsteekfel des Aanbeelts is ingeplant, trekt zy 't na de zelve plaats. De tweede Spier de Stegel-reep ook trekkende na agteren, en ter zyden, opent de ovale Venster: en 't is door die opening, dat de lugt in de Trommel, gemeenschap heeft met die in de Schelp of Voor-huys, in 't Slek-huys, en in de drie half cirkel-wyze kanalen, of Dool-hol is; dat niet zou kunnen geschieden, zo de ovale Venster door een Vlies, gelijk men voorwend, gestopt ware: boven dien zo dit Venster altijd gestopt was, zou de lugt in de voorgemelde holligheden maar zagtjes kunnen bewogen worden, en een doof geluyd maken, even als een Trommel zonder gat.

De derde Spier, by eenige de uytwendige genaamt, om dat zy aan de buytenste zyde, van den beenigen weg, die agter na den Mond gaat, geplaatst is, zig in een zeer schuynse holligheyt verbergende, loopt tot in de Trommel, en plant zig in 't kleynste uytsteekfel van den Hamer, en trekt dien voorwaarts om het Trommel-vlies te ontspannen.

De vierde of inwendige Spier f, om dat zy in 't ^{XXIX.} half beenig kanaal, in 't Steen-been uytgeholt gele- ^{Tafel.} gen is, en daar haar oorspronk neemt, digt aan 't ^{4. Fig.} kanaal, dat na 't agterste des Monds gaat, plant zig met een zeer sterke pees, in 't agterste deel der steel van den Hamer, die met de andere zyde vast

¹ Apophysis mastoides. ² Apophys. styloides.

is aan 't Trommel-vlies, waar door de Hamer door die Spier binnen na de Trommel getrokken zijnde, 't Vlies, waar aan ze vast is, ook na binnen trekt.

In 't Oor ontstaan ontstekingen, die zomtijds zweeren; zo dat d'etter ter Ooren uytloopt, en door haar scherpte de beenderen bederft, veroorzakende een ongenezelijk quaad: zo dat de beentjes van 't Gehoor, 'tzy door spuyten, als andersints ter Ooren uytkomen.

Als deze Lyders, Neus, en Mond toefluytende, sterk blazen, worden pluymen, of andere ligte stoffen, buyten op 't Oor-gat gelegd, met groot geweld door de lugt weg gedreven.

Om dit te verklaren, laat ons den Water-weg bezien, die binnen in de Trommel begint. 't Is buyten twyfel, als de beentjes van 't Gehoor ter Ooren uyt komen, dat het Trommel-vlies verbroken, of los geraakt is ergens aan de zyden, daar 't vast was, en by gevolg is de weg na buyten dan open, waarom als zodanige Neus en Mond gesloten houden, en sterk blazen, zo kan de lugt na de Máag, Longen, Mond, nog Neus gaan, dies zal ze ingaan, daar ze geen tegenstant vind, en die niet vindende in den Waterweg, die agter in den Mond, en na de Trommel gaat; dies wort de lugt met geweld daar in gedreven, tot binnen in de Trommel, en geen tegenstant vindende door 't Trommel-vlies, nu verbroken, gaat ze noodzakelijk door den weg van 't Gehoor, zo dat de pluymen, of andere ligte stoffen buyten op 't Oor-gat gelegd, met geweld weg dryven.

Ook zijn 'er, die den rook van Tabak buyten door 't Oor-gat doen uyt vliegen, 't gene geschied op de zelve wyze, gelijk de lugt: want als de rook in den Mond getrokken word, om zo te spreken, word die, Neus, en Mond gesloten zijnde, in den Water-weg gedreven tot in de Trommel, doende op 't Trommel-vlies een groot geweld, en breekt 't zelve, of maakt het los aan de zyde, daar 't minst vast is, en zo de deur gebroken, of open zijnde, vliegt de rook daar buyten.

Zeker Heelmeester te Parijs, behandelende een Been-bederving binnen in 't Oor, met uytvloeying van etter, door den weg van 't Gehoor, en op 't Mam-wyze uytsteekfel; ja zelf door den Mond: denkende, dat de etter quam van 't harde Herffen-vlies, verstoute zig een trepaan op 't Mam-wyze uytsteekfel te stellen, maar bevond dat hy op 't voorge-melde Vlies niet quam, en de trepaan onnoodig was.

Nu volgt van de tweede holligheyt te spreken; van het Voor-huys, of de Schelp, om dat ze eenigfints de Oesters gelijk is. Die holligheyt heeft geen Vlies, als eenigen willen, ook niet de drie half cirkel-wyze kanalen, of Dool-hof: In de Schelp zijn zeven openingen: de eerste is het ovale Venster, en heeft gemeenschap met de holligheyt der Trommel, en is gestopt door 't breede deel der Stegel-reep; door die opening is 't, dat de uytwendige lugt van den Mond, door 't kanaal, of Water-weg, die agter in de zelve eyndigt, in de Trommel gaande, gemeenschap heeft met de lugt in de Schelp, in 't Slek-huys, en in de drie half cirkel-wyze kanalen, of Dool-hof: door de tweede opening, heeft de Schelp gemeenschap met 't voorste kanaal van 't Slek-huys, en door de vijf andere met de drie half cirkel-wyze kanalen, of Dool-hof: die zes openingen zijn nergens mede gestopt.

De derde holligheyt is 't Slek-huys E, zo genaamt om de gelijkheyt door haar Slang-wyze drayingen; van binnen is 't gemaakt uyt twee kanalen, welker een 't voorste, en 't andere 't agterste is, die van malkander zijn gescheyden door een kleyn beenig plaatjen, dat ten uystersten dun is, en voort komt uyt het pyramid-wyze Lighaam van 't Slek-huys, welk 't midden uytmaakt, en door een Vlies, dat met de eene zyde vast is aan 't kleyn beenig plaatjen, en met de andere aan de tegen overige zyde van 't Slek-huys, en zig in twee verdeelende, bekleed het beyde de kanalen, aan hun binnenste oppervlakte.

De Schelp
of Voor-
huys.
Tweede
hollig-
heyt.

Slek-huys.
Derde
hollig-
heyt.
XXIX.
Tafel.
1. Figuur.

1 Carica. 2 Apophysis mastoides.

X 2

Het

Het Slek-huys van buyten, zo wel als 't beenig plaatjen met 't Vlies van binnen, loopen van het breedste deel tot aan de punt in een slangetrek of krukling, van twee omdrayingen en een half. Deze twee kanalen hebben aan hun breedste deel een opening, staande d' een tegen over d' ander; die aan 't voorste kanaal gevonden word, staat open in de Schelp, of Voor-huys, onder d' ovale Venster; maar die van 't agterste, en de ronde Venster genaamt, is gestopt door een Vlies, zo dat de lugt van de Trommel door die opening niet gaan kan naar de Schelp, nog naar de drie half cirkel-wyze kanalen of Doolhof.

Die twee kanalen, van het breedste deel van 't Slek-huys, tot aan de punt, worden hoe langs hoe enger, na dat ze de punt naderen, daar de een in de ander komt, door een zeer kleyn gaatjen, zo dat de lugt, die van de Trommel door d' ovale Venster in de Schelp of Voor-huys, en uyt deze in 't voorste kanaal van 't Slek-huys gaat, een groote perssing, in den doorgang van dit kleyn gaatjen lijd, van waar ze door 't agterste kanaal te rug keerende, tegen 't Vlies, stoot; dat de ronde Venster in de Trommel stopt, en mogelijk den zelve indruk maakt, als de uytwendige lugt op 't Trommel-vlies.

Men zegt dat te *Syracusa*, een Stadt in Sicilien, een Huys is als een Slek-huys, dat eertijds diende voor 't Gevangen-huys, en als *Denys* de Tyran, het droevig geweest der gevangenen, die sterven moesten, van verre wilde hooren, liét hy hen daar in zetten, zo dat hy het kon weten.

Dool-hof. De vierde holligheyt is de Dool-hof D, en bestaat
Vierde uyt drie half cirkel-wyze kanalen, waar van 'er een
hollig- is agter de langwerpige ronde holligheyt der Trommel,
XXIX. tusschen beyde de andere, die aan 't agterste, en bin-
Tafel. nenste deel van ² Steen-been zijn. Deze eyndigen in
3. Figuur. de Schelp of Voor-huys, door vijf openingen: 't eer-
ste kanaal eyndigt met zijn opperste uyteynde in 't
hoogste van de Schelp, en met zijn onderste in 't

1 Tympanum. 2 Os petrosum.

laag-

laagſte, en agterſte deel; het tweede en derde, waar van 't een boven 't ander is, vereenigen door twee openingen, in 't agterſte, en middenſte deel van 't ¹ Steen-been, en maken vereenigt zijnde een opening in 't agterſte deel der Schelp; 't ander uyteynde van 't opperſte kanaal opent zig in 't hoogſte der Schelp, en 't onderſte in 't laagſte der zelve. Die drie half cirkel-wyze kanalen in de Schelp, of Voor-huys open zijnde, met de opening van het voorſte kanaal van 't Slek-huys, kan de lugt ligtelijk in de hollig-heden ſpelen.

De vijfde holligheyt in 't Steen-been is, daar de ^{Vijfde} zenuw van 't Gehoor in gaat, als zy uyt de ^{holligheyt} Herſſe-^{voor de} nen komt, die gezien word zonder 't Been te breken, ^{Gehoor-} zo haalt het ^{zenuw.} ² Bekkeneel open is: deze holligheyt is diep, en aan het breedſte deel van 't Slek-huys: in den grond van die holligheyt zijn twee gaten of wegen, welker een enger en korter is, en 't andere wyder en langer; het kortſte is gemeenlijk in 't onderſte, en 't langſte is in 't opperſte van die holligheyt, in welkers grondeen kleyne ruymte is, die dieper gaat als 't overige, 't welk het breedſte deel van 't Slek-huys maakt, waar aan 't zagte deel der Gehoor-zenuw vaſt is, zonder van binnen in 't Slek-huys te gaan, gelijk eenigen gezegt hebben, dat zou geſchieden door een gat, dat aan den grond van 't Slek-huys gevonden word, en andere door vele kleyne, gelijk de Reuk-zenuwen door 't Zeef-been gaan, dat zo niet is; van dit zagte deel der Gehoor-zenuw, gaat een kleyn takjen door 't eerſte, en kleynſte gaatjen in de Schelp of Voor-huys. In deze holligheyt verdeelt zig dat takjen in vijf kleynder, welke vijf openingen in gaan van de drie half cirkel-wyze kanalen, en de zelve t' eene-maal doorloopen.

De zefde holligheyt in 't Steen-been, is 't tweede ^{zefde hol-} en grootſte gat, dat zig op doet in de holligheyt, ^{ligheyt.} daar de Gehoor-zenuw in gaat: 't is de opening van een kanaal, dat begint in 't opperſte deel; in 't eerſte een weynig opklimmende, gaat het tuſſchen 't Slek-

¹ Os petrosum. ² Cranium.

huys, en 't opperste kanaal des Dool-hofs, en nederdalende, gaat het na boven d' ovale Venster en de holligheyt, in welke de Stegel-reeps Spier legt, tusschen de Trommel, en de Schelp, en eyndigt met zig om te drayen, onder 't uytwendig deel van 't Steen-been in een gat, tusschen 't ¹ Mam- en ² Priemwyze uytsteeksel. Het harde deel der Gehoor-zenuw, dat hier door loopt, uyt dit gat komende, loopt naar 't aangezigt, en verspreyd zig met verscheyde takken in 't zelve en in den hals, waar van een merkelyke tak zig vereenigt met een tak van 't vijfde paar der Herffenen, uytkomende door een gat aan 't onderste van het Oog-hol.

Zevende
hollig-
heyt:

De zevende holligheyt is 't kanaal, dat van de holligheyt der Trommel, na 't agterste des Monds gaat, de Water-weg genaamt.

Behalven de voorste Zenuwen, krijgt 't uytwendig Oor nog Zenuwen van een van 't Rug-merg, tusschen 't tweede en derde Wervel-been des hals, waar van drie takjes zig verspreyden in 't agterste van 't Oor, des zelfs lelleken, en in 't kraak-beenig gedeelte van den Gehoor-weg.

De Slag-aderen van 't Oor komen van de uytwendige ³ Krop-slag-ader, waar van een agterste tak is, en een voorste, die men in de slaap van 't Hoofd voelt kloppen, welke haar takjes door 't Oor verspreyden; de Aderen komen van d' uytwendige ⁴ Krop-ader.

't Uytwendig Oor is om 't geluyd, dat in de lugt verspreyd word, eenigzints te verzamelen, op dat het te kragtiger binnen in 't Oor gebragt wierd; en de schuyns of kromheyt van den Gehoor-weg is, op dat de lugt met geen geweld op 't Trommel-vlies aankome.

En gelijk 't Trommel-vlies 't uytwendig Oor van 't innerlijke afscheyd, zo belet het, dat de inwendige werktuygen van 't Gehoor, door de koude lugt niet beschadigt worden, waarom 't kanaal van

¹ Apophysis mastoides. ² Apophysis styloides ³ Arteria carotis.
⁴ Vena jugularis.

Eustachius agter in den Mond eyndigt: want de lugt van den Mond na de holligheyt der Trommel gaande, is matiglijk verwarmt.

En gelijk 't door de Spieren, meer of min gespannen word, zo word ook de lugt in de Trommel en in de andere holligheden, meer of min sterker geperst of bewogen, die dan 't Vlies in 't Slek-huys, en de Zenuwen in de drie half cirkel-wyze kanalen, die 't onmiddelijk werktuyg van 't Gehoor zijn, aan doende, krijgt de Ziel kennis van het geluyd.

HET XVII. HOOFDSTUK.

Van het Tong-been.

ONder de werktuygen der uytwendige zinnen, ^{XXIX. Tafel.} die niet gelijk 't gevoel, door 't grootste deel van ^{7. en 8. Figuur.} 't Lighaam verspreyd zijn, moet beschreven worden 't ^{De Tong} werktuyg van den smaak, 't welk de Tong is, beginnende van 't ^{'t voor-} Tong-been, waar aan ze vast is, en de ^{naamste} zelve tot een steunsel verstrekt. ^{werktuyg}

Dit been word in 't Grieks genaamt *Os hyoides* en *hypsiloïdes*, om dat het van gedaante als de letter U ^{van den} is. In jonge kinderen bestaat het uyt vijf, zeven, en ^{Smaak.} zomtijds uyt meer beentjes; in bejaarde Menschen ^{Het Tong-} uyt drie, die door een kraak-been aan malkander vast ^{been.} zijn, welker middenste A 't breedste deel is, en de ^{Zijn de-} twee zydelijke BB worden de Hoornen genaamt. ^{len.}

De lengte van 't breedste beentjen, is ontrent een dwerschen duym; zijn breedte een halven dwerschen vinger; maar is verre na zo dik niet; van binnen is 't wat uytgeholt, en van buyten bultig; de holligheyt naar 't ^{7. en 8. Figuur.} Schild-wyze Kraak-been gekeert, is met veel Vet verzien, en ontfangt het regt staande 3 Strotlapken.

De lengte van de Hoornen is de breedte van anderhalven vinger, en ze zijn zo breed als een slooy; de

1 *Os hyoides.* 2 *Cartilago scutiformis.* 3 *Epiglottis.*

eynden van de Hoornen staan naar agter ontrent twee dwersche vingeren, meer of min van malkander.

Dit been legt binnen aan 't agterste der Tong, en 't bovenste deel des Schild-wyze Kraak-beens van 't Strotten-hoofd, staande de Hoornen na 't agterste van 't Lighaam.

XXIX.
Tafel.
7. Figuur.

Door de uyteynden dezer Hoornen d, word dat been aan elke zyde vast gemaakt door een band, aan de bovenste uytsteekfels van 't Schild-wyze Kraak-been. Ook word het vast gebonden aan elke zyde, aan de uyteynden der ¹ Priem-wyze uytsteekfels, door een langen band cc, die begint; daar de Hoornen vast gehegt zijn aan 't middenste, en breedste been van 't Tong-been, welke banden op zommige plaatsen kraak-beenig zijn, en meest daar ze beginnen.

By de beweging van de Tong, word dit been mede bewogen door vijf paar Spieren, die vijf aan elke zyde zijn, en krijgt ieder Spier haar naam van 't deel, daar ze uyt komt, en van 't deel, daar ze zig inplant.

Op dat 't gene van de Spieren, en 't Tong-been te zeggen valt, klaarlijk verstaan werde, moet men letten, dat 't Hoofd in deze Figuur zo geplaatst is, dat van onderen de boord van 't onderste Kaak-been A gezien word, om dat als dan de Spieren beter gezien worden.

XXIX.
Tafel.
6. Figuur.
Eerste
Spier van
't Tong-
been.

De eerste Spier D, neemt haar begin van 't binnenste, en opperste deel van 't Borst-been, na boven gaande, en op de ² Longe-pijp, en ³ Schild-wyze Kraak-been geplaatst zijnde, eyndigt ze in 't breedste deel van 't Tong-been. Deze word de ⁴ Borst-been Tong-beens Spier genaamt; en trekt 't Tong-been regt neerwaarts.

Aan de binnenste zyde dezer Spieren, ziet men gemeenlijk een pezige dwersch of schuyns loopende linie, als in de regte linie des Buyks.

Deze Spieren leggen onmiddelijk onder de gemeene dekselen, en zijn vereenigt op de zyden, met mal-

¹ Apophysis styloides. ² Aspera Arteria. ³ Apophys. styloides
⁴ Sterno-hyoidens.

kander door een witte vliezige streep. Hier is het, dat de gemeene dekselen doorgesneden zijnde, van malkander gescheiden moeten worden, om de Longe-pijp t' ontblooten, als men de *Strot-snee* of *Laryngotomia* doet.

De tweede word de ¹ Raven-beks Tong-beens Spier ^{Tweede} genaamt E, deze is langer als de voorgaande, en ^{Spier van} neemt haar oorspronk van 't Raven-beks-wyze uyt- ^{'t Tong-been.} steekfel des Schouder-blads, en plant zig in de hoornen van 't Tong-been.

Die Spier word in 't midden pezig, en dan weder vleezig, gelijk die 't onderste Kaak-been neerwaarts beweegt, zo dat ze de twee-buykige van 't Tong-been kan genaamt worden, ze moest in 't midden pezig zijn, om dat ze met de zelve geplaatst is op de inwendige Krop-ader: want zo die Spier vleezig was op de Ader, zou ze werkende, die gedrukt, en 't bloed in zijn loop belet hebben: deze Spier alleen werkende, trekt het Tong-been schuyns neerwaarts aan een zyde, en beyder' famen werkende, trekken ze 't schuyns neerwaarts aan beyde zyden.

De derde word de ² Kin-Tongbeens Spier genaamt ^{Derde} G, deze is breeder, en korter, en neemt haar oor- ^{Spier van} spronk aan 't binnenste deel van 't onderste Kaak- ^{'t Tong-been.} been, ontrent de Maal-tanden, en plant zig in 't ^{XXIX.} breedste deel van 't Tong-been, die 't zelve ^{Tafel.} of schuyns ^{6. Figuur.} na boven trekken.

De vierde is de regte ³ Kin-Tongbeens Spier ^H, tot ^{vierde} onderscheyd der voorgaande, die de schuynse kan ge- ^{Spier van} naamt worden, ze komt van binnen aan de Kin, en ^{'t Tong-been.} plant zig in 't breede deel van 't Tong-been, die 't zelve regt om hoog trekt.

De vijfde is de ⁴ Priem-Tongbeens Spier ^F, neemt ^{De vijfde} haar begin van 't Priem-wyze uytsteekfel des Slaap- ^{Spier van} beens, en eyndigt in de hoornen van 't Tong-been, ^{'t Tong-been.} daar ze aan 't breede deel vast zijn. Deze Spier is doorboort tot doorgang van de twee-buykige Spier, die 't onderste Kaak-been neerwaarts beweegt.

¹ Coraco-hyoideus. ² Genio-hyoideus, of Mylo-hyoideus.
³ Genio-hyoideus. ⁴ Stylo-hyoideus.

HET XVIII. HOOFDSTUK.

*Van de Tong.*Vast-heg-
ting.

DE Tong word agter aan 't Tong-been, en 't Strotten-hoofd vast gehegt: onder aan 't onderste Kaak-been door de Spieren, en heeft van onderen een vliezigen band; zomtijds zig zo verre uytstreckende, dat hy in kinderen 't zuigen, en in ouden de spraak belet, waarom hy moet met groote voorzigtigheyt door-gesneden worden, op dat door 't bloeden de dood niet volge, gelijk zomtijds is gebeurt.

Uyt wat
deelen de
Tong be-
staar.

De Tong bestaat meest uyt spierige Vezelen, en zekere repeltjes, klieren, vaten, en vliezen, die de Tong bekleeden. Boven op de Tong ziet men vele groeven, en een streep, volgens de lengte in 't midden lopende.

Daar zijn vier paar Spieren tot beweging van de Tong, dat is vier aan elke zyde, en ze word nog bewogen in 't byzonder door de spierige Vezelen, waar uyt ze meest bestaat.

Eerste
Spier voor
de Tong.

De eerste is de ¹ Kin-Tong Spier M, neemt haar oorspronk van binnen onder de Kin van 't onderste Kaak-been, en plant zig van onderen in 't midden der Tong, by na door der zelve lengte, eenige dezer Vezelen loopen by na regt lynig na de Tong, andere loopen na voren, en zommige na agteren.

En om den verscheyden loop dezer Vezelen, word de Tong verscheydentlijk bewogen; want door de agterste word de Tong uytgesteken, en door de voorste ingetrokken.

Tweede
Spier.

De tweede is de ² Grond-Tong Spier, komt van 't breedste deel des Tong-beens, en plant zig in, ontrent 't agterste deel der Tong, deze trekt de Tong neerwaarts naar agteren.

¹ Genio-glossus. ² Basio-glossus.

De

De derde is de ¹ Hoorn- Tong Spier O, neemt ^{Derde} haar oorspronk ontrent 't uyteynde des Hoorns van ^{Spier.} 't Tong-been, en plant zig ter zyden in de Tong; een dezer Spieren alleen werkende, trekt die na de een, of andere zyde, en t' samen werkende houden ze de Tong uytgestrekt.

De vierde is de ² Priem- Tong Spier P, komende ^{vierde} van 't Priem- wyze uytsteekfel des Slaap-beens, en ^{Spier.} plant zig in de zyde, ontrent 't midden der Tong; een dezer Spieren alleen werkende, trekt die na de een of andere zyde, en t' samen werkende trekt de Tong inwaarts.

Eenige voegen 'er nog twee by aan elke zyde, de eerste is de ³ Hoorn- Tong Spier D, gelijk een der ^{XXIX.} voorgaande, neemt haar oorspronk aan 't begin des ^{Tafel,} Hoorns van 't Tong-been, daar zy met 't Kraak- ^{9. Figuur.} been vast is, en plant zig onder in de Tong, makende door de t' samenkomst als een boog. Deze drukken de Tong zagtjes neer.

De tweede de ⁴ Maal-tandens Tong Spier E, neemt haar oorspronk met een breed begin aan d' inwendige zyde van 't onderste Kaak-been, ontrent de wortels der Maal-tanden, en dwerssch naar den grond der Tong loopende, eyndigt in den band, waar door de Tong in den Mond vast gehegt is. Deze Spieren t' samen werkende, ligten 't voorste deel der Tong regt om hoog, en agterwaarts naar 't Verhemelte; maar een alleen werkende, ligt die na de zyde schuyns opwaarts.

Alzo de eyge zelfstandigheyt der Tong uyt spierige Vezelen bestaat, zo hebben ze daar in een verscheyden loop. Daar zijn 'er, die volgens de lengte der Tong van agteren na voren, door 't midden loopen, en deze trekken 't puntig deel der Tong na agteren; andere loopen aan de regter zyde, en trekken 't zelve na de zyde, ook aan de linker zyde. Daar zijn 'er, die dwerssch van de een zyde der Tong na de andere loopen, en zijn met de eerste doorvlogten: deze maken de Tong rondagtig, en langer: ook zijn 'er die

¹ Cerato-glossus. ² Stylo-glossus. ³ Chondrio-glossus.
⁴ Mylo-glossus.

schuyns loopen, en de Tong na agteren trekken. Men vindt 'er, die regt van boven na beneden volgens de dikte loopen, deze doen de onderste zyde na bovenste naderen, waar door de Tong dunder, breeder, en platter word. Zie de eyge zelfstandigheyt der Tong D II. Fig.

XXIX.
Tafel.

De Tong heeft verscheyde Vliezen, 't eerste en onderste is pezig, en word gemaakt van de pezen der vleezige Vezelen; op dit Vlies ziet men verscheyde tepeltjes, als kleyne *Padde - stoeltjes*, waar van de meeste zijn aan 't eynde der Tong, andere zijn boogwyze, en zommige puntig B, die zig na agter omkrommen. Daar zijn 'er ook eenige weynige aan 't agterste deel der Tong, die grooter en van een ronde platte gedaante zijn C.

10. Fig.

Deze tepeltjes gaan door de gaatjes van 't tweede, of Net-wyze Vlies, en zijn bekleed met een derde Vlies, dat zeer dun is, dienende tot een opperhuyd. Deze tepeltjes, voornamelijk de eerste, en laatste, zijn 't werktuyg van den smaak.

Klieren
der Tong.

Behalven die tepeltjes, ziet men op de Tong, zeer veel kliertjes A 10. en 11. Figuur, die in 't voorste deel der Tong weynig grooter als een *Moslaart-zaad* zijn; maar worden na agteren allengskens grooter, en dienen om een deel van 't speeksel af te scheyden, om de oppervlakte der Tong te bevochtigen.

De voorgemelde Vliezen bekleeden de Tong over al, maar van onderen is geen Net-wyze Vlies, nog tepeltjes, en daarom geschied de smaak daar niet.

Bloed-va-
ten der
Tong.

De Tong heeft Slag-aderen van de uytwendige Krop-slag-aderen, en Aderen van de inwendige Krop-aderen, welke in de Keel-ontsteking, zomtijds met voordeel geopent worden; en leggen onder aan de Tong, een aan elke zyde ontrent 't midden.

Zenuwen.

Zenuwen krijgt ze van 't vijfde, en negende paar der Herffenen, die zig in de Vliezen en door de Tong verspreyden.

Een Dogter 20. jaren oud, kreeg een *Kikvorsch-gewel* of *Rapula* onder de Tong, allengskens zonder pijn aangroeyende, dat in 4. jaren zo groot als een

kaats-

kaatsbal wierd; het gezwel puyldte ſterk uyt onder de Kin, en de Tong was na 't Verhemelte gedreven, zo dat ze qualijk ſprak. Ik heb met den Here Verhulſt, voornaam Doctor dezer Stadt, 't gezwel geopent met een groote opening, waar uyt geel vogt ſprong, gedrukt zijnde, quam 'er ſtoffe als kuyt van haring uyt. Ik heb d'opening van binnen vaak met *olie van Kamfer* aangeraakt, om 't Vlies, waar in de ſtoffe gemeenlijk legt, te verteeren, en vorders zuiverende middelen gebruykt, zo dat ze haalt genezen is. Vijf jaren daar na is 't gezwel allengskens aangegroeyt; maar zo groot niet als te voren, en is eyn- delijk, van zelf open gebroken zijnde, met uytloop van veel etter, de Lydſter genezen.

Vele Schrijvers getuygen dat uyt gezwellen onder de Tong, men een Steen gehaalt heeft.

Als in de wonden der Tong, een ſtuk r'eenemaal afgeſcheyden is, kan dat niet meer aangroeyen; maar nog een weynig vaſt zijnde, moet het niet afgeſne- den, maar onder en boven genaayt, en de draad kort gelaten worden, dan gebeurt het, om dat de Tong in een warme plaats is, dat het ligtelijk geneest.

HET XIX. HOOFDSTUK.

*Van de Klieren des onderſten Kaak-
beens, en die onder de Tong leggen,
als mede van 't Tand-vlees,
Lelleken en de Amandelen.*

MEn vind aan ieder zyde, ontrent 't onderſte Klieren Kaak-been, twee Klieren, een uytwendige, van 't on-
derſte
Kaak-
been. en een inwendige.

De uytwendige is kleyn, leggende ontrent 't mid- den der lengte van 't onderſte Kaak-been.

De andere is groot, en geplaatſt onmiddelijk onder 't onderſte Kaak-been, nevens de ' Kin- Tong-beens

Genio-hyoidens.

Spier

XXIX.
Tafel.

Spier, en is een op een getaste Klier, Q 6. Figuur, haar agterste deel naar 't Mam-wyze uytsteekfel, is dikker, ronder, en rooder, als na voren, daar ze allengskens dunder, en witter word.

Deze heeft een uytloozende Vat, dat uyt de zelve met veel takjes voort-komt, waar by zig zomtijds een ander takjen voegt van de onder de Tong gelege Klieren, en eyndigt in den Mond, agter de onderste Sny-tanden.

Die Klieren hebben Bloed-vaten, en Zenuwen, met de naburige deelen gemeen, en dienen om een deel van 't speekfel af te scheyden, en door 't uytloozende Vat in den Mond te brengen.

Zomtijds vergroot die Klier in de Krop-gezwellen zeer: zo ze door 't gebruyk van uyt-, en inwendige middelen, niet wil verdwynen, nog tot zweering komen, en zo ze bewegelijk is, is 't best die uyt te snyden, gelijk ik heb gezegt van de Oor-klier, in 't XII. Hoofdstuk van de IV. Verhandeling.

Klieren
onder de
Tong.

Onder de Tong, legt aan ieder zyde, nog een andere op een getaste Klier, langer en dunder als de voorgaande. Zie de zelve omgeslagen aan de zyde der Tong BB 9. Fig.

De uytloozende vaatjes dezer Klieren, die verscheyde zijn, eyndigen ontrent de breedte van een vinger van de onderste Sny-randen, daar ze zig van 't afgescheyde speekfel ontlasten.

Tand-
vlees wat
is.

Het Tand-vlees is anders niet, als 't binnenste vlies van den Mond, (verzien met eenige Kliertjes, waar uyt eenig vogt zypert) om de tanden in de kaskens der Kaak-beenderen, benevens de vliezige banden der zelve vast te binden, zo dat het verslapt, of weg ge-geten zijnde, de Tandén waggelen, en uyt vallen. Die bedorve Tandén hebben, krijgen zomtijds kleyne gezwellekens aan 't Tand-vlees, die men rijp zijnde, met een vlijm moet openen, en een Tand moettende trekken, moet het Tand-vlees eerst daar van los gemaakt worden.

In een Vrouw van 40. jaren, welker voorste Tandén van 't onderste Kaak-been uyt waren, heb ik uyt

't

't Tand-vlees een vervaarlijke Kanker zien voort komen.

Onder 't Vlies, 't welk het Verhemelte van den ^{Klieren} Mond bekleed, ziet men vele kleyne Kliertjes a, on- ^{van 't Ver-} trent zo groot als een *Geers-zaad*, die zig door kley- ^{hemelte.} ne buysjes, welker mondekens aan de inwendige op- ^{XXIX.} pervlakte gezien worden, van 't vogt ontlasten. ^{Tafel.} 13. Fig.

Na voren leggen ze merkelyk van malkander; maar agter op een getaft zijnde, maken een dikke Klier b, die men de *op een getaste Klier* van 't Verhemelte zou mogen noemen.

In de gezwollen van 't Verhemelte des Monds, die tot zweering komen, moet men de etter niet lang in laten, op dat ze 't been niet bederve.

In 't agterste van den Mond, boven 't ¹ Strotten- ^{Het Lel-} hoofd, hangt een zeker klierig, lang stom-puntig ^{leken.} deel C, dat 't Lelleken genaamt word, van groote, en gedaante, als 't opperste lid van een kinds vinger, maar boven wat breeder als onder.

Het ² Lelleken word bewogen door twee Spieren ^{Zijn Spie-} aan elke zyde, een uyt-, en inwendige. ^{ren.}

De uytwendige komt van 't ³ Kaak-been, boven ^{Uytwen-} den laatsten of agtersten Maal-tand, en gaat langs ^{dige.} een beenig haakjen, dat gevonden word aan 't eynde van 't binnenste ⁴ Vleugel-wyze uytsteekfel van 't ⁵ Wigge-been, gelijk door een katrol, en plant zig in 't Lelleken, waar door die *Spier* 't Lelleken op trekt als een pak, dat aan 't eynde van een koorde vast ge- maakt is.

De inwendige komt voort van onderen van 't bin- ^{Inwendig.} nenste Vleugel-wyze uytsteekfel, en langs 't zelve op- ^{ge.} klimmende, plant zig ook in 't Lelleken: die Spieren aan beyde zyden werkende, trekken 't Lelleken om hoog, waarschijnlijk tot gemakkelijker doorzwel- ging der spijs. Deze twee Spieren zijn om haar kleynheyt, met een en de zelve letter f geteekent.

Ook word het Lelleken opgehouden met vier vlie- ^{Banden.} zige banden ee, twee aan elke zyde.

1 Larynx. 2 Uvula. 3 Os maxillare. 4 Processus Pterygoid.
5 Os Sphenoid.

Het

Het Lelleken ontsteekt zomtijds, en zwelt of verflapt en verlangt door een slymig vogt, zo dat men die gebreken wel moet onderscheyden, om dat 't eerste met verzagende, en verkoelende, en 't tweede met heete en verdroogende middelen, gelijk *Peper*, *gebrande Aluyn*, *Granaat-schellen* moet geholpen worden, en die niet helpende, is men genoodzaakt een deel van 't Lelleken af snyden; dat in *Noorwegen* zeer gemeen is, ter oorzaak van een zinking op dat deel, dat de inwoonders van dat koude Land, in den winter onderworpen zijn.

De Amandelen zo genaamt om de vrugt, die ze gelijken, zijn twee Klieren, gelegen binnen aan de zyde der Keel, wat laager als 't Lelleken.

In ieder is een holligheyt van een eyronde gedaante, in welke verscheide mindere openingen zijn, die gedrukt zijnde, een dik slymig vogt geven.

Deze hebben Aderen, en Slag-aderen van de takken der 1 Krop-aderen, en 2 Slag-aderen, als mede Zenuwen. Zenuwen van 't vijfde paar der Hersenen.

De Amandelen krijgen zomtijds een ontsteking, die tot zweering raakt, veroorzakende een groote moeyte in 't zwelgen; zo haast men gevoelt dat 'er etter in is, moet 't gezwel met een vlijm open gesteken worden.

XXIX.
Tafel.

Agter 't Lelleken is een zeer groot gat B, 13. Figuur, dat aanstonts in twee verdeelt word, in ieder van welke een kleyne vinger kan gesteken worden. De gaten hebben gemeenschap met de holligheden van den Neus, en worden met een klierig Vlies bekleed, gelijk de zelve.

Hun ge-
bruyk.

Dewijl 't 3 Lelleken, en de Amandelen klierige lighamen zijn, dienen ze om een zeker vogt van 't bloed af te scheyden, voornamelijk de laatste, dat wat slymiger is als 't speeksel, en bevogtigt benevens 't zelve de Keel, en de daar ontrent gelegene deelen.

Ik heb gezien in die de pokken hadden, dat 't Lelleken door een zweer weg ge-geten was, 't welk

1 Vena jugular. 2 Arter. carot. 3 Uvula.

uyt een andere oorzaak ook kan komen, en men zegt dat zodanige niet klaar kunnen spreken, en zomtijds van Teering sterven, waar uyt eenigen besluyten, dat 't Lelleken dient tot de spraak, en om de koude lugt te matigen; maar anderen beweeren, dat de heescheyt in 't spreken voort komt, om dat de Spieren, en Kraak-beenderen van 't Strotten-hoofd op den zelven tijd beschadigt zijn geweest, welke niet meer gelijk te voren gestelt zijnde, kunnen ze de doorgaande lugt niet kragtig genoeg bewegen, om een klare stem te maken.

De doorgang der holligheden van den Neus, tot agter in den Mond, laat de lugt tot de in- en uyt-ademing door: want als die wegen belemmert zijn, kan men niet als met den Mond open ademen: boven dien, kunnen door die wegen, de vuyligheden van den Neus, agter in den Mond ontlast worden.

't Is op die plaats agter in den Mond, dat 't klierig Vlies des Neus, door een dik vogt beladen zijnde nederzakt, en een gezwel maakt agter 't Lelleken, dat men *Slym-prop* of *Polypus* noemt, gelijk ik gezegt heb, op 't eynde van 't XIV. Hoofdstuk, in de IV. Verhandeling.

I Larynx.

Y

UYT-

U Y T L E G G I N G

der

F I G U R E N ,

van de

XXIX. T A F E L.

Waar in vertoont worden de werktuygen van 't Gehoor, de Tong, en 't Tongbeen met hun Spieren, Klieren, en eenige andere deelen des Monchs.

De 1. Figuur vertoont 't uytwendig Oor.

A De Vleugel.

B Het lelleken van 't Oor.

C Den Oor-rand.

D Den Tegen-rand.

EE De uytwendige Schelp.

F Den Bok.

G Den Tegen-bok.

De 2. Figuur vertoont het omgekeerde Oor.

A Den omtrek van 't Oor.

B Het buytenste der Schelp.

C Een Spier.

DE Den Gehoor-weg.

DD Het Kraak-beenig deel van den Gehoor-weg.

E De Kliertjes op de buytenste oppervlakte des Gehoor-wegs.

F Mondekens der buysjes van de kliertjes in den Gehoor-weg.

De 3. Figuur vertoont 't overige van den Gehoor-weg en 't inwendig Oor.

A Het beenig gedeelte van den Gehoor-weg. B



- B Het Trommel-vlies. zijn natuurlijke plaats.
- C De holligheyt der Trommel. D De Borst - been Tong-beens Spier.
- D Plaats van den Dool-hof. E De Raven-bek Tong-beens Spier.
- E Het Slek-huys. F De Priem-Tong-beens Spier.
- a Het Aanbeelt. G De schuynse Kin-Tong beens Spier.
- b Den Hamer, een weynig uyt zijn plaats. H De regte Kin-Tong-beens Spier.
- De 4. en 5. Figuur ver-
toont de beentjes van
't Gehoor in hun na-
tuurlijke groote.*
- I De twee-buykige Spier in haar natuur-
lijke plaats.
- a Den Hamer. K De zelve uyt haar
natuurlijke plaats.
- b Het Aanbeelt. L Het puntig deel der
Tong.
- c De Stegel-reep. M De Kin-Tong-Spier.
- d Het rond Beentjen. N De Grond-Tong-
Spier.
- e De Spier van de Ste-
gel-reep in de 4. Fi-
guur. O De Hoorn-Tong-
spier.
- f De inwendige Spier
des Hamers in de 4.
Figuur. P De Priem-Tong-
Spier.
- De 6. Figuur vertoont
een deel van 't Hoofd,
leggende op de kruyn,
op dat de Spieren der
Tong, en van 't Tong-
been gezien wierden.*
- Q De Klier van 't on-
derste Kaak-been.
- A Een deel van 't on-
derste gebroke Kaak-
been.
- De 7. Figuur vertoont
het Tong-been half zo
groot als natuurlijk;
en van voren gezien.
En 't zelve in de 8.
Figuur van agteren
gezien.*
- B Het Juk-been.
- C Het Tong-been in

A Het breedste deel.

BB De Hoornen.

CC Banden , waar door 't Tong-been vast gebonden word aan 't uyteynde van 't Priem-wyze uytsteekfel in de 7. Fig.

dd De uyt-eyndender Hoornen van 't Tong-been , welke door een band zijn vast gebonden aan de opperste uytsteekfels van 't Schild-wyze Kraak-been in de 7. Fig.

De 9. Figuur vertoont de Tong van onder gezien.

A Het puntig deel der Tong.

BB De Klieren onder de Tong aan de zyden omgeslagen.

C Het Tong-been.

D De Hoorn-Tong Spieren in alle Lighamen niet gevonden.

E De Maal-tandens Tong-Spier.

MNOP De zelve Spieren, gelijk ze zijn in de 6. Fig.

De 10. Figuur vertoont de bovenste oppervlakte der Tong.

A De Kliertjes.

B De puntige Tepeltjes.

C De ronde platte Tepeltjes.

De 11. Figuur vertoont een deel der bovenste oppervlakte der Tong, met een vergroot-glas gezien.

ABC Dezelve deelen, gelijk in de 10. Figuur.

D De eygene of spierige zelfstandigheyt der Tong.

De 12. Figuur vertoont het Verhemelte des Monds ten deele met Kliertjes.

A De Kliertjes van 't Verhemelte.

aa De Zenuwen, die na de Kliertjes gaan.

De 13. Figuur vertoont 't Hoofd leggende op de kruyn.

A Het groot gat van 't Agterhoofds-been.

B Een gat agter 't Lleleken , dat gemeen-

meenschap heeft met b Een deel van't Ver-
de holligheden van hemelte, daar de
den Neus tot adem- Kliertjes op malkan-
ming. der leggen.

C De uytwendige c Het Lelleken.

Vleugel-wyze Spier. d De Amandelen.

D De inwendige Vleu- ee Banden van't Lel-
gel-wyze Spier. leken.

EE De overige dee- f Twee Spieren van't
len van 't onderfte Lelleken.

gebroke Kaak-been. g De band der boven-

a De Kliertjes van 't fte Lip.

Verhemelte.

DE VIJFDE VERHANDELING

D E R

HEELKONSTIGE ONTLEDING

VAN 'S MENSCHEN LIGHAAM.

VAN DE BEENDEREN.

HET I. HOOFDSTUK.

*Van de natuurlijke gestaltenisse
der Beenderen.*

IN 't II. Hoofdstuk van de I. Verhandeling is ge-
sproken van de natuurlijke gestaltenisse der Been-
deren, behoorende tot alle in 't gemeen, en tot de

eendaantige deelen; nu zal het oogmerk zijn de zelve in deze Verhandeling aan te toonen.

Eerst moet iet gezegt worden van hun natuurlijke gestaltenisse, zo veel ze tot ieder Been in 't byzonder behoort, waar van het eerste 't Been alleen aan gaat, en het tweede zo veel 't met het andere is 't samen gevoegt.

Eerste gestaltenis van 't Been.

Van de eerste soort worden 'er vijf gestelt. De eerste is 't lighaam of 't voornaamste deel van 't Been, tusschen beyde de eynden, en dat in veele Beenderen by na 't gehele Been uyt maakt. Dit deel is meest altijd harder als eenig deel van 't Been; en de ¹ Beenwording begint hier meest altijd eerst, als van 't midden naar den omtrek; egter eenige zeggen, dat het Voorhoofds-been in de vrugt van ontrent drie maanden, beenagtig zou beginnen te worden, van den omtrek naar 't midden, dat dit Been eygen is.

Tweede.

De tweede is 't ² Uytsteekfel, dat een verhevenheit is der zelve zelfstandigheyt des Beens, en altijd minder als 't Been, waar van 't een uytsteekfel is, als te zien is in de uytsteekfels der Wervel-beenderen, onderste Kaak-been, en in meer andere.

Derde.

De derde is 't ³ Aangroeyfel, Dog al wat in oude Menschen een uytsteekfel is, word in kinderen een aangroeyfel genaamt, om dat men dan bevind, dat het gelijk aan 't Lighaam is gevoegt, of 't voornaamste deel van 't Been, door middel van een kraak-beenige zelfstandigheyt is, welke in bejaarde in Been verandert zijnde, een uytsteekfel word genaamt.

Onderscheyd der uytsteekfels en aangroeyfels.

Het onderscheyd der uytsteekfels, en aangroeyfels, word genomen van de gedaante, en 't gebruyk, en zo zijn 'er, die rond zijn, en 't Hoofd genaamt worden, gelijk in 't Dye-been, en andere. Zommige zijn langwerpig, en worden de Hals genaamt.

Hun gebruyk.

Het gebruyk der uytsteekfels, en aangroeyfels, is om de ⁴ Geledingen te maken, en oorspronk, en inplanting te geven in de Spieren, en Banden, als mede om de kragt der Spieren te vermeerderen.

¹ Ossificatio. ² Apophysis. ³ Epiphysis. ⁴ Articulationes.

Daar

Daar de Beenen met 't Lighaam, of voornaamste deel van 't Been vereenigen, gaat tusschen beyde een deel van 't 1 Been-vlies in met vele Bloed-vaten, om de stoffe tot voedsel voor 't binnenste deel van 't Been, en voor de Vliezen van 't merg te voeren, en 't merg af te scheiden, ook tot voedsel der uytsteekfels, en in de zelve een mergagtig zap af te scheiden.

Ook komen de banden hier tusschen beyde uyt, daar ze ten uystersten ingesloten zijn, en zelf in Been veranderen, als de 2 Aangroeyfels in 3 Uytsteekfels verandert, en vereenigt met 't Lighaam, of voornaamste deel van 't Been zijn, waar door de banden een meerder vastigheyt krijgen, en ook de 4 Geledingen.

De bederving in d' uytsteekfels der Beenderen komende, eet schielijker voort, oorzaak zijnde als in 't Lighaam, of in 't voornaamste deel van 't Been, om dat de eerste zagter, als 't laatste zijn: ook geschieden de afscheydingen van de eerste gemeenlijk met kleyne brokjes, en in korter tijd, het tegendeel in 't laatste, die gemeenlijk meer tijd noodig hebben, en met platte schilfers afscheyden.

Het gebeurt zomtijds in jonge kinderen door een uytwendige oorzaak, dat 't aangroeyfel van 't lighaam of voornaamste deel des Beens af scheyd; 't welk moeyelijk is te herstellen, om dat 't aan 't Been niet vast is, door een effen oppervlakte; maar door verscheyde verheventheden, en verdiepingen, gelijk in de geledingen, die men *Ginglymus* of onderlinge Ontfanging noemt.

De vierde natuurlijke gestaltenis van 't Been zijn de De vierde. holligheden, van welke vele zijn. Als eerst die, waar door de *Geledingen* geschieden.

Deze zijn diep, gelijk men ziet aan de groote holligheyt, of panneken van 't ongenaamt Been; of ondiep, en vlak, als in 't panneken van 't Schouderblad.

Eyndelijk behoort tot die gestaltenis de effenheyt, vijfde.

en oneffenheyt. Zo is het ¹ Bekkeneel agter t' eene-maal oneffen, tot beter inplanting der Spieren, en op andere plaatfen effen.

De natuurlijke gestalteniffe van 't Been als 't met andere vereenigt is, raakt hun verfcheyde t' famenvoegingen, die verfchillen, na dat de Beenderen onder malkander verfcheyden zijn.

Indien de Beenderen wegens hun maakfel daar in de zagte deelen gelijk zijn, dat ze bestaan uyt een vergadering van vezelen, en kleyne cellekens, en als de zelve een voedzaam zap ontfangen, waar door ze gevoed, en vergroot worden, is 't met reden, dat de ziekten der Beenderen vergeleken worden met die der zagte deelen.

En zo 't voedzaam zap in de een of de ander ftel staat, om dat de vezelen, of cellekens verbroken, geplettert, of toegedrukt worden, of dat 't zelve te dik, te lymig, of gestolt is; dat, of een van dat verandert in 't kort de natuurlijke gestaltenis der deelen; de vezelen en cellekens, waar uyt ze bestaan, ontfangen meer voedzaam zap als noodig is; om dat 't niet kan voort loopen, zo dat ze vergroot, en uytgezet worden, waar uyt het een, of 't ander gezwel ontftaat, waar aan men verfcheyde namen geeft, zo dat 't gene in de zagte deelen *Ontfleking*, *Rooze*, of anders genaamt word, in de Beenderen een *Exostosis* is.

Het voedzaam zap in zijn loop belet zijnde, word meermaals fcherp en inetende, waar door 't de vezelen, en cellekens verbreekt, of weg knaagt: zo dat die ziekte in de zagte deelen zijnde een zweer, in de Beenderen ³ een bederving geheten word.

Men ziet niet alleen een over-een-komft tuffchen de ziekten der Beenderen, en die der zagte deelen, ten opzigt van de gezwellen, en zweeren; maar ook in alle ziekten, die door een uytwendige geweldige oorzaak komen: want zo door een val, of flag, met een plomp werktuyg de uytwendige Vezelen van 't Been plat of krom geflagen zijn, zonder blijkbare

¹ Cranium. ² Phlegmone. ³ Caries.

ſcheyding, zo is dat een plettering; in de zachte deelen den zelve naam behoudende.

Indien de plettering van 't Been een ſcheyding heeft, zo is 't een dubbele breuk, dikwils gevolgt met aſſcheyding van 't Been: even als een gepletterde wonde niet genezen word; zonder aſſcheyding van 't geplettert vlees.

Zo de ſcheyding in 't Been zonder plettering is, is 't een enkele breuk; die als een wonde, tot genezing de vereeniging vereyſcht.

De vereeniging der Vingeren of der Lippen, 't zy dat ze veroorzaakt is door een gebrek van de eerſte vorming, of door de handeling van een zweer, die veronagtsaamt is; word niet qualijk vergeleken by de t' ſamengroeying der 1 Geledingen, bekend onder den naam van *Anchyloſis*.

En gelijk zommige zachte deelen, als 't 2 Net, de 3. Nugtere, en 4 Omgewonde Darm, uyt hun plaats wyken, door uytwendige, en geweldige oorzaken, of van een inwendige oorzaak, gelijk door eenige vogten, die te zamen, of ieder alleen bequaam zijn, de ringen der Spieren des Buyks t' overweldigen, en de Vezelen van den Pens-zak week te maken, zo verwekken die oorzaken in de Beenderen de zelve gebreken, en 't gene in de zachte deelen een *Scheurſel* is, word in de Beenderen een 5 *Uytleding* genaamt.

Eyndelijk zo de doorgaande wonden, tot in de holligheyt der Borſt, zomtijds oorzaak zijn, dat 't Bloed op 't 6 Midden-rift uytſtort, zo ziet men 't zelve in de breuken des 7 Bekkeneels, die noyt zonder uytſtorting van 't Bloed op 't dikke Herſſen-vlies zijn, als de breuk door beyde tafels gaat.

1 Articulationes. 2 Omentum. 3 Intestinum jejun. 4 Ilium.
5 Dislocatio. 6 Diaphragma. 7 Cranium.

HET II. HOOFDSTUK.

*Van de t' samenvoeging der
Beenderen.*

BEhalven de zagte deelen van 't Lighaam, waar uyt de Mensch bestaat, heeft hy ook verscheide Beenderen, die aan malkander gevoegt, en met banden vast gebonden zijn, door welke hy regt over eynde staat, zig buygt, en veelderley bewegingen verrigt, en op dat die bewegingen te ligter geschieden, zijn'er eenige holligheden der Beenderen van binnen, zo wel als de hoofden van buyten met Kraak-been bekleed zijn, dat effen en glad is; voornamelijk in die Beenderen, waar in een openbare beweging is, en om dat Kraak-been altijd in dien staat te houden, word het gedurig besproeyd met een slymig vogt, als 't wit van ey, dat afgescheyden word van 't Bloed in zekere vliezige zakjes, leggende aan de inwendige oppervlakte der vliezige Banden, die 't lid omvangen, en 't zelve in de tusschenheyt der Geleding storten: als dit vogt ontbreekt, worden de Kraak-beenderen droog, en oneffen, waar uyt een gekraak in de Geledingen der Beenderen ontstaat, als men ze beweegt.

Zomtijds wort dit vogt in te groote hoeveelheyt afgescheyden in de Geledingen; en verdikkende, is 't een inwendige oorzaak, dat de Beenderen uyt hun plaats gedreven worden, en uytleeden: te scherp zijnde, knaagt het d'eynden der Beenderen door, zo dat 't voedsaam zap in de *Geleding* uytstortende, de Beenderen aan malkander groeyen, en 't lid onbewegelijk word.

De t' samenvoeging der Beenderen is tweederley, ¹ *Geleding* en ² *t' Samengroeying*.

Geleding. De *Geleding* is een t' samenvoeging der Beenderen met beweging, en de t' Samengroeying is een t' samenvoeging der Beenderen zonder beweging.

1 Articulatio. 2 Symphysis.

De

De Geleding is tweederley, een ¹ losse Geleding, en een ² vaste Geleding. Losse en vaste Geleding.

De losse Geleding is, als de beweging der t' samen-gevoegde Beenderen zeer klaar, en zichtbaar is. De vaste Geleding is, als de beweging kleyn en duyster is.

De losse Geleding is drierley, een ³ diepe Geleding, een ⁴ ondiepe Geleding, en een ⁵ onderlinge Ontfanging. Drierley losse Geleding.

De diepe Geleding is, als d' ontfangende holligheyt diep, en 't hoofd, dat 'er in ontfangen word, groot en rond is, gelijk in 't hoofd van 't Dye-been met de holligheyt of 't panneken, daar 't in sluyt. Diepe Geleding.

De ondiepe Geleding geschied; als de ontfangende holligheyt ondiep, en 't ontfangen hoofd plat is, gelijk in 't ⁶ Opper-arm-been met 't panneken van 't Schouder-blad, maar die Geleding kan tot de voorgaande gebragt worden, om dat ze alleen verschilt in meer, en minder. Ondiepe Geleding.

De onderlinge Ontfanging, die eygentlijk een double ondiepe Geleding is, geschied, als 't een Been 't ander ontfangt, en weder van 't andere ontfangen word: als in 't ⁷ Elle-been met 't Opper-arm-been; of als 't Been, dat een ander ontfangt, niet van 't zelve, maar van een derde word ontfangen, gelijk in de schuynse uytsteekfels der Wervel-beenderen. Onderlinge Ontfanging.

De Been-breuken in de losse Geleding, zijn dikwils oorzaak, dat de Beenderen aan malkander groeyen, om dat 't voedsaam zap van 't gebroke Been in de Geleding uytstort, en een Weer of Callus maakt, waar door de Beenderen met malkander vereenigen, en t' samen groeven.

Het zelve geschied ook door een wonde, die door gaat tot in de Geleding, met quetsing van 't Been: want om dat men in beyde die gevallen, onder 't verbinden, niet wel kan, of mag 't lid bewegen, zo verhardt het vogt, dat dient om de Geleding te besmeeren, met 't voedsaam zap van 't gequetste Been.

¹ Diarthrosis. ² Synarthrosis. ³ Enarthrosis. ⁴ Anthrodia.
⁵ Ginglymus. ⁶ Os humeri. ⁷ Cubitus.

dat in de Geleding zig uytstort, en maakt 't lid onbewegelijk.

Dit geschied ook door een ¹ Etter-gezwel, in de holligheyt der ² Geleding, daar d' etter de Beenderen bederft; en als d' af-scheyding geschied, stort het voedsaam zap zig in de Geleding, en vereenigt de Beenderen, daar 't bedorve Been is afgescheyden; en daarom in deze gevallen moet de Heelmeester dit voorzeggē.

Driederley De 3 vaste Geleding is ook driederley.

Vaste Geleding. De eerste is de 4 vaste diepe Geleding, en geschied, als een groot rond hoofd in een diepe holligheyt ontfangen word, en maar een kleyne, of duytere beweging is, gelijk men ziet tusschen de ⁵ Koot, en 't ⁶ Schip-wyze Been.

Vaste ondiepe Geleding. De tweede is de 7 vaste ondiepe Geleding, en geschied, als 't plat rond eynde van een Been ontfangen word in d' ondiepe holligheyt van een ander, en een duytere beweging is; maar deze kan tot d' eerste gebragt worden, om reden te voren gezegt.

Vaste Geledings onderling Ontfanging. De derde is de 8 vaste Geledings onderling Ontfanging, en geschied, als 't een Been ontfangen word in de holligheyt van een ander, en dat zelve op een andere plaats ontfangt, en maar een duytere beweging is, gelijk men ziet in de Koot met het Hielbeen.

De t' samengroeying is driederley, de *Naad*, de *Gelykheyt*, en de *Spyker-wyze invoeging*.

Naad. De Naad is een t' samenvoeging der Beenderen zonder beweging, daar twee onderscheyde Beenderen, aan hun zyde tandagtig zijn, als een zaag, gelijk in de Beenderen van 't ⁹ Bekkeneel, die t' samen gevoegt zijn.

Zomtijds zijn eenige tandagtige uytsteekfels breed, en driehoekig van gedaante, van *Vitruvius Securiculæ* genaamt, om dat ze een bijlken gelijken, en dit is de sterkste t' samenvoeging van alle de Naden.

¹ Abscessus. ² Articulatio. ³ Synarthrosis. ⁴ Enarthros. Synarthros. ⁵ Talus. ⁶ Os Naviculare. ⁷ Arthrod. Synarthros. ⁸ Ginglym. Synarthros. ⁹ Cranium.

De ¹ Gelijkheyt is een t' samenvoeging der Beende-^{Gelijk-}ren zonder beweging, gelijk de ² Naad, daar een en-^{heyt.}kele streep tusschen beyde, regt, of krom loopt, als in de Beenderen van 't opperste Kaak-been; maar als men die Beenderen nauwkeurig van malkander scheidt, ziet men dat ze wederzijds meest al in een gevoegt zijn door kleyne tandekens, om welke reden die t' samenvoeging onder de Naad kan gestelt worden.

De ³ Spyker-wyze invoeging is een t' samenvoeging ^{Spyker-}der Beenderen zonder beweging, als een ingeslage ^{wyze in-}spyker in een gat, gelijk de tanden zijn in de kaskens ^{voeging.}der Kaak-beenderen.

De Beenderen worden ook t' samengevoegt zonder eenig middel, gelijk men ziet in de Naad, en de Ge-^{Zonder}lijkheyt in bejaarde, of door tusschen komen van ee-^{middel.}nig middel; en deze is drierley, de ⁴ Vleezige, ^{Door}^{middel.}⁵ Kraak-beenige, en ⁶ Bandige t' samenvoeging.

Van de Vleezige t' samenvoeging geven de Schry-^{Vleezige.}vers voorbeelden in 't ⁷ Tong-been, en Schouderblad, t' samengevoegt aan andere Beenderen; door de Spieren; dog die Spieren voegen eygentlijk die Beenderen aan andere t' samen, om ze te bewegen; want die Beenderen worden aan andere Beenderen door banden vereenigt.

De Kraak-beenige t' samenvoeging der Beenderen ^{Kraak-}ziet men in 't ⁸ Schaam-been, en andere plaats, daar ^{beenige.}de Beenderen door het Kraak-been zijn t' samengevoegt, als tusschen de Wervel-beenderen, en de Ribben met 't Borst-been, die meest altijd zo blyven.

De Bandige t' samenvoeging der Beenderen, be-^{Bandige.}speurt men tusschen 't hoofd van 't ⁹ Dye-been, door een sterken band, vereenigt in 't panneken van 't ¹⁰ On-^{genaamt} Been, ook tusschen 't ¹¹ Scheen-, en Dye-been.

De banden, waar mede de Beenderen t' samen gebonden zijn, worden zomtijds met weyagtig vogt

¹ Harmonia. ² Sutura. ³ Gomphosis. ⁴ Syssarcosis. ⁵ Synchondrosis. ⁶ Synsarcosis. ⁷ Os hyoides. ⁸ Os pubis. ⁹ Os femoris. ¹⁰ Os innominat. ¹¹ Tibia.

doordronken, waar door ze verslappen, en uyt hun plaats wyken; dat moeyelijk te genezen is.

De Banden zwellen op door een vogt, en beletten de beweging der ¹ Geleding, wanneer het slymig vogt verdikkende, een *Anchylofis* maakt.

't Is noodzakelijk voor den Heelmeeſter, kennis te hebben, hoe de de Beenderen zijn t' ſamen gevoegt: want zonder dat, zou hy niet weten, als ze uytgeleed zijn, maar ze ook niet kunnen herſtellen; want om dit wel te doen, moet men op drie dingen letten, op de plaats, daar 't Been is uyt gegaan, op den weg, waar door 't is gegaan, en waar 't wederhouden word.

In een Uytleding mag aanſtonts 't Been herſtelt worden, eer men het verbinden kan; maar in een Breuk, moet alles gereed zijn, eer men 't Been herſtelt.

Hoewel men in 't herſtellen der uytgeleede Beenderen, en andere heekonſtige Hand-werken moet agt geven, hoe de Beenderen zijn t' ſamen gevoegt, zo zijn evenwel de namen daar van weynig in gebruyk: behalven de Naad, waar van dikwils word geſproken in de breuken des ² Bekkeneels, en andere ziekten des Hoofds, dies men hier wijdloopiger van de zelve zal handelen.

De Naad word verdeelt in een waare, en valſche Naad.

Waare
Naad.

De waare Naad is, die door zekere tandagtige uytſteekfels, als twee zagen, is t' ſamen gevoegt, en is drierley, de ³ Kroon-naad, de ⁴ Hoek-naad, en de ⁵ Pyl-naad.

Kroon-
naad.

XXX. Taf.
1. Figuur.

De Kroon-naad a, zo genaamt, om dat d' Ouden aldaar de kroon droegen, loopt van voren dwerſch over 't Hoofd, van 't een Slaap-been tot 't ander; door deze Naad is 't, dat 't Voorhoofds-been met de Opperhoofds-beenderen is t' ſamen gevoegt.

Hoek-
naad.

XXX. Taf.

De Hoek-naad c, 2. Figuur loopt agter dwerſch over 't Hoofd, door die Naad zijn de Opperhoofds-

¹ Articulatio. ² Cranium. ³ Sutura coronalis. ⁴ Lambdoides. ⁵ Sagittalis.

been-

beenderen vereenigt met 't Agterhoofds-been, en ten deele met de Slaap-beenderen.

De ¹ Pijl-naad b, i. Figuur zo genaamt, om dat De Pijl zy regt loopt door 't opperste van 't Hoofd, als een naad. pijl van de Kroon-naad, tot aan de Hoek-naad, door deze zijn de Opperhoofds-beenderen t' samen-gevoegt. In kinderen is 't Voorhoofds-been in 't midden gemeenlijk door een Naad in twee gescheyden, en men zegt dat de Pijl-naad in de zelve, tot aan den Neus zig uytstrekt. Zie de 3. Fig. aa.

XXX. Taf.

Zomtijds vind men, dat de waare Naden op eenige plaatsen de gedaante van een stentel hebben, en ze ook gevonden worden, daar ze natuurlijk niet moeten zijn; waar op wel moet gelet worden in de Hoofdwonden: men ziet zomtijds in 't Agterhoofds-been, meest in kinderen, zelden in bejaarden, een zekere verandering der Naden, byzonderlijk in die een breed ³ Bekkeneel van agteren hebben, zo dat dit Been uyt vele andere bestaat, maar niet in alle Bekkeneelen op de zelve manier: want in eenige is dit Been in twee verdeelt, door een dwersche Naad, gelijk ik zo een Bekkeneel van een bejaard Mensch heb, wiens Voorhoofds-been door een ⁴ Naad in twee verdeelt is: in andere ziet men dat Been anders gestelt.

De tweede soort van Naden zijn de valsche, zo genaamt, om dat men geloofde, dat de dunne kant van 't opperste deel der Slaap-beenderen legt op 't onderste deel der Opperhoofds-beenderen, gelijk de schubben der Vijschen op malkander leggen, en daarom Schub-naad genaamt; maar zo men die Beenderen van malkander scheyd, ziet men dat ze wederzijds vol groeven en kleyne verheventheden zijn, waar door ze zig met malkander invöegen, en eenigfints een waare Naad maken; maar ze is niet zichtbaar, om dat ze bedekt word met den dunnen kant van 't ⁵ Slaap-been.

Valsche Naden.

Deze Naad loopt van den grond der ⁶ Mam-wyze uytsteekfels, na boven met een kring-wyze linie,

¹ Sutura Sagittalis. ² Lambdoides. ³ Cranium. ⁴ Sutura. ⁵ Os temporale. ⁶ Apophys. mastoid.

en omringt aan elke zyde van 't Hoofd het Slaap-been, en daalt eyndelyk neder na den grond van 't Oor, en voegt te samen d' Opperhoofds-beenderen, 't Agterhoofds-been, en 't Wigge-been, met de Slaap-beenderen.

Eenige beschrijven nog andere Naden, die niet anders zijn als deelen der voorgaande, die wat verder uytgestrekt zijn.

De Naden dienen, om de verscheide Beenderen van 't Bekkeneel t' samen te voegen, en 't Bekkeneel schijnt uyt verscheide Beenderen te zijn gemaakt, zo dat ze door 't aankomende voedsel, in nieuw gebore kinderen zeer los, en door Vliezen vereenigt zijnde, beter zouden vergroot, en uytgezet worden, gelijk ze om de zelve reden in 't baren zeer ligt over malkander schuyven, en 't Hoofd kleynder maken, dies de baring daar door te ligter geschied.

Gebruyk
der Na-
den.

De Naden beletten ook, dat de breuk van 't een Been niet word gemeen gemaakt aan 't andere, en geven doorgang aan vele kleyne Bloed-vaatjes, en Vezelen, die 't Panne-vlies met het dikke Herffen-vlies gemeen heeft.

Andere willen dat ze dienen, om de dampen der Herffenen uytgang te geven.

Eenige zeggen, dat de Bekkeneelen der Mooren geen Naden hebben; maar *Riolanus*, een Moor te *Parijs* ontledende, heeft het tegendeel getoont.

Het gebeurt zomtijds in oude Menschen, dat de Naden zo vernietigt zijn, dat men ze niet meer zien kan.

Die de Naden zo gesloten hebben, dat men ze niet meer bespeurt, hebben gedurig Hoofd-pijn, Vallende ziekte, en andere gebreken, waarom *Hippocrates* zegt, dat 't Hoofd van hun beter is gestelt, die veele Naden hebben, als die geene hebben.

In verouderde Hoofd-pijnen scheidt de Naden zomtijds van malkander, gelijk gezien is in den geleerden Heer *Paskal*, waar van ook voorbeelden by

1 Cranium. 2 Pericranium.

Hip-

Hippocrates, Galenus, en andere Schrijvers gevonden worden.

Het ¹ Bekkeneel, 't welk geen Naden heeft, breekt door vallen, of slaan, ligtelijk, en veroorzaakt lange scheuren.

In kinderen, die een ² Water-hoofd hebben, fcheyden de Beenderen van 't Bekkeneel van malkander, gelijk ik te *Parijs* gezien heb in een Kind van 6. jaren, 't welk zeer dun, en op zommige plaatsen veel gaten had; daar de ³ Pijl-naad de ⁴ Kroon-naad raakte, waren de Beenderen van malkander gefcheyden de breedte van drie dwersche vingeren.

Op de Naden moet niet getrepaneert worden, dan in hoogdringenden nood, voornamelijk niet op de Pijl-naad, om dat daar onder, d' opperste langwerpige Sinus van 't dikke Herffen-vlies, in een groe-ve van d' Opperhoofds-beenderen legt, die vol Bloed is.

HET III. HOOFDSTUK.

Van 't Merg der Beenderen.

DAar is niets in 't Lighaam, dat zijn byzonder, en werktuygig maakfel niet heeft, en zo mer- 't met d' eersten opflag van 't oog niet ondekt, zo word het gevonden door de Sny-konst, 't Vergroot-glas, of door de Redenering.

Het Merg, dat een Lighaam zonder ordere of ge-
daante fchijnt te wezen, is 't famen gestelt uyt on-
eyndige, kleyne, vliezige blaasjes, die gemeenschap
met malkander hebben, en zijn befloten in een ge-
meen Vlies, 't welk doorweven is met zeer veel
Bloed-vaten en Zenuwen, zo dat het ook gevoel
heeft; want zo men het Been van een levenden Hond
afzet, en laat rusten, tot dat de grootste pijn voor-
by is, en men dan met een bequaam werktuyg in 't

Het Merg
der Been-
deren.

¹ Cranium. ² Hydrocephalus. ³ Sutura Sagittalis. ⁴ Coronalis.

Merg steekt, begint de Hond zig met groot geweld te bewegen, en te schreeuwen.

Zomtijds staat een scherp vogt stil in 't Vlies, dat 't Merg omvangt, en veroorzaakt groote pijn, en als men van buyten daar op met de vingers drukt, is 'er geen pijn, nog gezwel; maar als de zwellingsig van buyten vertoont, is 'er gemeenlijk een Ettergezwel in de zelfstandigheyt van 't Been.

Deze blaasjes hebben een zeer fijne olyagtige stoffe daar in, van 't bloed afgescheyden, en bestaat uyt veel fijnder deeltjes als 't Vet, waarom 't warm zijnde van een aangename smaak is, ook zegt men dat het zeer voedende, en 't zaad vermeerderende is.

Waar 't
gevonden
word.

Onthouden in de voorgemelde kleyne Vliezige blaasjes, word het in de holligheden der groote, en lange Beenderen, gelijk in 't ¹ Opper-arm-been, ² Elle-been, ³ Dye- en ⁴ Scheen-been &c. gevonden, die van binnen als een pijp hol zijn. Maar in de Beenderen, die van binnen spongieus of vol kleyne cellkens zijn, word alleen een mergagtig zap gevonden, dat niet in vliezige blaasjes, zo veel bekend is, gelijk in de voorgaande groote lange Beenderen, word onthouden. Zodanige spongieuze Beenderen zijn meest d'uytsteekfels, en by na al de Beenderen van 't ⁵ Bekkeneel, als ook de Ribben, de Ongenaamde Beenderen, en andere meer. Dit mergagtig zap is wit van kouleur; maar in de voorgemelde groote en lange Beenderen, daar 't Merg in kleyne vliezige blaasjes word onthouden, en van een vaster maaksel is, is 't eenigfints roodagtig.

Gebruik
van 't
Merg.

Het Merg is van groote nuttigheyt; want voor eerst zo dringen de fijnste deelen tusschen de Vezelen der harde, en drooge Beenderen, om de zelve te bevogtigen, te verzagten, en eenigfints buygzaam te maken, op dat ze niet ligt breken zouden.

Dat zodanige fijne deelen van 't Merg, tusschen de Vezelen der Beenderen indringen, blijkt uyt 't geen men ziet in de Geraamten: want zo men 't Merg niet

¹ Os humeri. ² Cubitus. ³ Os femoris. ⁴ Tibia ⁵ Cranium.

t'eenemaal uyt de Beenderen gedaan heeft, ziet men na eenigen tijd, dat het door de warmte smeltende, uyt de Beenderen als een dauw uytzweet, en van wit geel word, 't welk anders niet is, als de fijnste deelen van 't Merg, die na gebleven zijn, en tusschen de Vezelen der Beenderen doordringen.

Ook breken de Beenderen van oude Menschen, hoewel zeer hard, nogtans ligt, om dat ze van 't Merg beroofd zijn, 't welk niet meer indringt tusschen de Vezelen der Beenderen, om de scherpte van 't zout, en aardagtig voedsel te matigen, zo dat hun Beenderen breken gelijk d' oude takken van boomen, by gebrek van voedsel: want men ziet, dat 't Merg gevonden in Beenderen van Menschen, die oud gestorven zijn, anders niet is als een weyagtig vogt, dat al zijn oly of vettigheyt verloren heeft; en zo hun Beenderen breken, worden ze niet dan langzaam genezen, om dat het Weer zo traag aangroeit.

Men moet dan niet verwondert zijn, dat zodanige Menschen sterven, by gebrek van natuurlijke warmte; want hun bloed heeft al zijn oly, en geesten verloren, zo dat het onbequaam is tot de beweging.

Het tweede gebruyk van 't Merg is, om de holligheden der Beenderen te vullen: want zommige Beenderen moeten hol zijn, op dat ze door hun groote niet te zwaar zouden wezen, en zo moeten de Dyescheen, en eenige andere Beenderen, een zeker dikte en lengte hebben, op dat 'er genoegsame ruymte voor de Spieren, en inplanting der Pezen zou zijn; maar indien ze met die dikte en lengte binnen vast, en niet hol waren, zouden ze groote moeyte veroorzaken aan die ze zou moeten bewegen.

Men gelooft gemeenlijk, dat 't Merg der Beenderen, met het wassen der Maan vermeerderd, als of de aangroeying, en vermindering van 't wassen, of afgaan der Maan voortquam: maar de Heer *Robault* heeft meer dan 25. jaren aangemerkt, dat de Beenderen der Beesten in de Maan vol Merg waren, en het in zommige vermindert was, zo wel in de volle

Maan, als in 't wassen of afgaan derzelve, zo dat de meerder of minder hoe-veelheyt van 't Merg niet afhangt van de Maan of haar verandering.

't Is dan te gelooven, dat de vermindering van 't Merg in levende Dieren een gemeene oorzaak heeft met de vermindering der andere zagte deelen, name-lijk gebrek van voedsel, groote oefeningen des Lighaams, ziekte, grooten ouderdom, of zware en langdurige hertstogten. En om dat 't Merg van een veel zagter en fijner gestel is als 't Vlees, is 't te denken dat het haastiger verteert word als 't Vlees: 't gene ook van de in 't bloed onthouden stoffe, waar uyt ze beyde voortkomen, kan verstaan worden.

De Ouden meenden, dat de Beenderen gevoed wierden uyt 't Merg: want ziende dat de meeste Beenderen hier mede vervult waren, en de kouleur van 't Merg eenigfints gelijk was aan dat der Beenderen, en voornamelijk dat het Been over al daar mede doordronken was, hebbenze niet getwyfelt of de Beenderen wierden daar door gevoed.

Hoewel dit gevoelen eenigfints waarschiynelijk is, kan 't nogtans ligtelijk wederlegt worden, als men agt geeft dat 'er veele Beenderen zijn, die geen Merg hebben, gelijk men ziet in de Tanden en eenige andere holle Beenderen van 't ¹ Bekkeneel en 't opperste Kaakbeen, als mede in die menigte der holligheden in 't ² Tafelscheydsel des Bekkeneels van den Olyfant, welke, daar van niet gevoed konnende worden, een ander voedsel noodig hebben.

Ook is 'er geen gelijkenis tusschen 't Merg en de Beenderen, om die te voeden: want de zelfstandigheyt der Beenderen is grof, en aardagtig; en die van 't Merg is zwavelig, en fijn van deelen. Ook kan men niet zien, hoe 't Merg onthouden in de holligheden der Beenderen die zou konnen doordringen, gelijk vereyft word, om te voeden. Zo dat waarschiynelijk 't Merg van 't voedsel der Beenderen word afgescheyden, terwijl 't groffte tot voeding van dezelve be-
steed word.

1 Cranium.

2 Diplös.

De

De hedendaagsche Ontleeders denken, dat de Beenderen, even als de andere zagte deelen uyt 't Bloed gevoed worden. Dit word bevestigd door veele kleyne Bloed-vaatjes, die men zeer onderscheydentlijk in 't ¹ Been-vlies, en in Beenderen van jonge Dieren ziet: want de dienst van 't Been-vlies, is in opsigt der Beenderen, 't gene het dunne Herffen-vlies is in opsigt van de Herffenen: want 't ondersteunt een oneyndig getal van Bloed-vaatjes, welke loopen in 't Been en in de Vliezen van 't Merg.

Het Been-vlies is veel vaster vereenigt met de Beenderen in jonge Kinderen als in oude Menschen: ook vind men veel meer Bloed-vaatjes in 't Been-vlies van d'eerste, als in de laatste; want na dat 't Been vergroot, zo worden de vaatjes zo gedrukt, dat 'er vele verstoppen, en gelijk 'er dan niet meer Bloed doorgaat, als noodig is om de Beenderen te voeden, zo is 't dat ze dan niet meer groeyen.

Men ziet dit klaarlijk met een Vergroot-glas: want als men 't Been-vlies opgeligt heeft, dat vol Zenuwen en Bloed-vaatjes is, en het voor 't Oog stelt, zal men vele druppelen Bloeds (die uyt de gebroke Vaatjes gelekt zijn) gewaar worden, die door kleyne gaatjes in 't Been inbooren.

D'uytwendige Tafel van 't ² Bekkeneel word gevoed uyt 't Bloed, 't welk gebragt word door de Slag-aderen van 't ³ Panne-vlies; maar de inwendige Tafel word gevoed door de Slag-aderen, die zig verdeelen in 't dikke Herffen-vlies: zo dat de Beenderen, die hol zyn, en Merg in zig besluyten, niet alleen gevoed worden door de Slag-aderen, die zig in 't Been-vlies verdeelen; en in d'uytwendige opper-vlakte inbooren; maar ook door die, welke zig verspreyden in 't Vlies, dat van binnen 't Merg bekleed, en die in d'inwendige opper-vlakte ingaan.

Dit word bevestigd door duyzende kleyne gaatjes, die men zeer onderscheydentlijk ziet in d'inwendige opper-vlakte van die holle Beenderen, door welke zeer vele Slag-aderkens inbooren, komende van 't Vlies,

¹ Periostium. ² Cranium. ³ Pericranium.

't welk van binnen het Been bekleed, en alle de vliezige blaasjes van 't Merg omvangt.

En gelijk 'er meer holle Beenderen zijn, die geen Merg in zig besluyten, en van binnen met een Vlies bekleed zyn; is 't waarschijnlijk, dat se ook op die manier gevoed werden.

Men zal mogelijk zig verwonderen, hoe een en 't 't zelve zap, gelijk 't Bloed, zo veel verscheide deelen, gelijk de Beenderen, Vlees, en al d'andere deelen zijn, kan voeden: dog 't is geen grooter wonder, als dat uyt een en dezelve aarde zo veel verscheide kruiden dagelijks gevoed worden.

HET IV. HOOFDSTUK.

Van 't Bekkeneel en zyn eygene Beenderen.

Uyt de t'samenvoeging der Beenderen, ontstaat een Denk-beeld van 't Geraamte; waar in veel treffelyke dingen zyn besloten, nodig om te weten, zo tot kennis, als genezing van de ziekten, die 'er in ontstaan. Het word gemeenlijk verdeelt in drie deelen: het *Hoofd*, den *Tronk*, en de *Uyt-cynden* of *Ledematen*.

Beenderen des Hoofds.

Het Hoofd bestaat uyt 't ¹ Bekkeneel en de Kaakbeenderen, met het ² Tong-been, waar van gesproken is in 't XVII. Hoofdstuk van de IV Verhandeling.

Het Bekkeneel heeft verscheide Beenderen, die met malkander t'samen-gevoegt zynde, een groote holligheyt maken, waar in de groote en kleyne Herffenen, met 't verlangde Herffen-Merg, en hun Vliezen besloten zijn, en beschermen ze tegen uytwendige ongemakken.

De natuurlijke gedaante van 't Bekkeneel is langwerpig rond: van voren en van agteren verheven, en aan de zyden wat ingedrukt. De verheventheyt is van voren korter als van agteren, en ook wat enger: 't Bekkeneel is van voren en van agteren verheven, om de groote Herffenen beter te omvangen.

¹ Cranium.

² Os hyoides.

Het

Het Bekkeneel bestaat uyt agt Beenderen, waar van 'er zes eygene, en twee zijn, die met deze en 't opperste Kaak-been gemeen zijn.

Alle de Beenderen zyn door Naden t'samen gevoegt, gelijk ook de gemeene met die van 't opperste Kaak-been, en daarom hebben ze geen beweging, gelijk in 't vervolg blyken zal.

De Beenderen van 't ¹ Bekkeneel bestaan gemeenlijk uyt twee Tafels, hoewel 'er plaats en zyn, daar ze niet gevonden worden, en daar is geen Diploë of Tafel-scheydsel. D'eene legt inwendig, die de dikste, effenste, en bedekt is met 't ² Panne-vlies. D'andere legt inwendig, 't welk de dunste en hardste is, en word om haar broosheyt de *Glazen-Tafel* genaamt: ze is over al vast aan 't dikke Herffen-vlies, meest in den grond, en aan de Naden. Men ziet op verscheide plaatsen in die Tafel eenige groeven, die anders niet zyn, als zekere indrukkingen der Slag-aderen van 't dikke Herffen-vlies, gemaakt niet alleen door 't kloppen van dezelve, als de Beenderen nog teer waren, maar tot dat die volgroeyt zyn.

Tusschen beyde Tafels zyn on-eyndige kleyne beekene Cellekens, die de Grieken *Diploë* of *Tafel-scheydsel* noemen: de Latynen heeten die *Meditullium*, het midden van 't Bekkeneel beteekenende. Men ziet die Cellekens zeer klaar in Menschen, die even gestorven zijn, voornamelijk ter plaats van 't Voor-hoofd, of daar de Beenderen alderdikst zyn. In dezelve zijn vele kleyne Lighaamtjes, *Caruncula* genaamt, als ook een mergagtig zap, en zeer veel Bloed-vaatjes, die niet alleen voedsel voor de Beenderen aanbrengen, maar ook dit mergagtig zap af scheyden.

Als men trepaneert en Bloed gewaar word, is 't een teken, dat men tot aan 't Tafel-scheydsel is gekomen, en die Bloed-vaatjes geopent zyn, wanneer men zeer voorzigtig in 't booren moet zijn, op dat men 't dikke Herffen-vlies met 't Been niet doorboore, waar op de dood zou volgen.

Zomtijds breken door een val of slag op 't Hoofd

¹ Cranium.

² Pericranium.

de Bloed-vaatjes in 't ¹ Tafel-scheydsel, zo dat 't Bloed uytstort, en komt te bederven, zonder dat men uytwendig eenig teeken ziet, zo dat 't Bloed scherp wordende, de binnenste Tafel doorknaagt, en de Vliezen met de Herffenen bederft, waar uyt niet zelden de dood ontstaat.

Zomtijds is 'er een quaadaardige vogtigheyt in 't Tafel-scheydsel, die allengskens bedervende, beyde de Tafels weg-knaagt, en uytnemende groote pijn veroorzaakt in 't ² Panneylies; voornamelijk in verouderde Pokken, en als 'er Tophi komen. Ook heb ik aangemerkt dat d'opperste Tafel bedorven zijnde, zeer groote *Fungi* of uytwassingen van vlees uyt het Tafel-scheydsel op 't Voorhoofd groeyen.

Beenderen De eygene Beenderen van 't ³ Bekkeneel zyn 't Voor-
des Bekke- hoofds-been A, de twee van 't Opper-hoofd B, het Ag-
neels. terhoofds-been C, en de twee Slaap-beenderen E.

XXX Taf.
r Figuur.

Het Voor-
hoofds-
been.

Het Voorhoofds-been A maakt 't voorste van 't Bekkeneel, zijn gedaante is half rond; en van buyten effen, behalven aan de zijden naar de Slapen, daar 't zomtijds een scherp kant heeft; maar van binnen in d'inwendige Tafel zijn op zommige plaatsen eenige groeven, en op andere vele indrukkingen, voornamelijk aan 't onderste deel, daar 't een weynig bultig is, en 't bovenste deel van de hollen maakt, daar d'Oogen in leggen; welke groeven en indrukkingen gemaakt zijn door 't kloppen der Slag-aderen van 't dikke Herffen-vlies, en door de darmwyze kronkelingen, en zwaarte der voorste lobben der groote Herffenen.

In Kinde-
ren.

In Kinderen is dit Been in 't midden in twee gescheyden door een ⁴ Naad, die zig uytstrekt van de Pijl-naad tot aan den Neus, die in bejaarde Menschen gemeenlijk zijn t'samengegroeyt, zo dat de Naad niet meer gezien word; in zommige Menschen, maar zelden, ziet men die tot in hoogen ouderdom, dat meer in Vrouwen geschied.

Onlangs een kruyswyze snede doende in 't midden van 't Voorhoofds-been, vond ik die Naad geheel in

¹ Meditullium. ² Pericranium. ³ Cranium. ⁴ Sutura.

iemant, die 30 Jaar oud was; waar op wel moet agt genomen worden, dat men die niet neme voor een barst; om ze t' onderscheyden, zo, let dat de Naad altijd wat ongelijk is, en vele hoeken heeft, 't gene men in de Barst niet vind.

Het Voorhoofds-been is dikker als d'Opperhoofds-beenderen; maar gemeenlijk zo dik niet als 't Agterhoofds-been: ter plaats, daar 't ontrent de Slaap-beenderen met d'Opperhoofds-beenderen t'samen gevoegt word, is 't zeer dun, ook daar het 't opperste deel maakt van de Oog-hollen; hier kan men iemant onmiddellijk boven d'Oogen, met een scherp werk-tuyg, als een priem, zeer ligt dood-steeken door een kleyne wonde; om dat de groote Herffenen, en haar Vliezen gequetst worden.

Het Voorhoofds-been is t'samen gevoegt van boven, en ter zyden met de Opperhoofds-beenderen door de Kroon-naad a, als ook van onderen met 't 1 Zeef-been, 2 Wigge-been, en de drie eerste Beenderen van 't opperste Kaak-been: ook met twee Beentjes, die tot de opperste spongieuze behooren, leggende in 't hol aan de inwendige zyde, daar 't Oog in geplaatst is, als 't 3 Plat Beentjen, en 't Os Unguis. xxx. Taf. 1. Figuur.

In de binnenste opper-vlakte van 't Voorhoofds-been, ziet men zomtijds een by na rond putjen; waar in men de top des kleynen Vinger kan steeken, in welkers grond veel kleyne gaatjes zijn tot doorgang der Bloed-vaatjes: een diergelijk putjen word dikwils gezien ontrent de Pijl-naad; of wat van dezelve afgelegen. Zo by geval daar een Trepaan op gestelt word, is 'er een groote Bloedstorting te vreezen, en gevaar van 't dikke Herffen-vlies te quetsen. Ziet in de 4. Fig. XXXI. Tafel. Een aanmerkelijk putjen.

Dit Been heeft aan zijn onderste deel vier uytsteekfels: twee aan elke zyde, gelegen aan de vier hoeken van de Oogen f g; die aan de groote of inwendige hoeken der zelve leggen, en zijn t'samen gevoegt met 't opperste 4 Kaak-been; en die aan de kleyne of uyt- xxx. Taf. 1. Figuur.

1 Os cribrosum. 2 Os sphenoides. 3 Os planum.

4 Os maxillare.

wendige leggen, met het tweede Been van 't opperste Kaak-been.

Het Voorhoofds-been heeft drie gaten. Twee zyn 'er gemeenlijk aan 't onderste deel, ter plaats van de Winkbrauwen: zomtijds zijn 't maar twee groeven e, door welke een tak van 't vijfde paar zenuwen der Herffenen gaat, die zig verdeelt in de Huyd en Spieren van 't Voor-hoofd, ook in d'opperste Oog-sche-len: van binnen onmiddelijk boven 't uytsteekfel, dat men de *Hane-kam* noemt, is nog een gat p. 5. Fig. waar in het vast is gehegt, omtrent de diepte, van twee linien breed, in de inwendige Tafel, 't beginsfel van d'opperste langwerpige Sinus van 't dikke Herffen-vlies, en waar door eenige Bloedvaatjes ingaan, die 't voedsel voeren tot d'inwendige Tafel.

Boven dit gat is een uytsteekfel, dat in 't begin heel fcherp is, en *Doorn* geheten word, waar aan een groeve volgt, die voortgaat in d'inwendige Tafel in 't midden tot aan de Pijl-naad. In die groeve is vast gehegt de opperste langwerpige Sinus van 't dikke Herffen-vlies; waar op wel agt moet genomen worden, als men ontrent die plaats trepaneren moet, om dat die Sinus vol Bloed is. Ook is de voorgemelde groeve zomtijds niet zeer zigbaar, en word het fcherp uytsteekfel niet altijd gevonden; hier mag men niet trepaneren.

Het Voorhoofds-been is inwendig uytgeholt, om te beter de voorste lobben der groote Herffenen te behouden.

Hollig-
heden.

In dit Been zijn twee ruyme holligheden, gelegen aan 't opperste van den Neus boven de Winkbrauwen, tusschen beyde de Tafels.

Die holligheden zijn in alle Menschen niet even groot, en zomtijds is d'een holligheyt grooter als d'andere.

Bartholinus zegt, dat die holligheden niet gevonden worden in kinderen nog geen Jaar oud. Ten tweeden in die kamus zijn. Ten derden in die, wier Voorhoofds-been door een naat in twee verdeelt is; maar in de twee

z Crista galli.

laat-

laatste heeft men zomtijds die holligheden gevonden.

Deze holligheden zijn gemeenlijk van malkander gefcheyden door een dun beenig fchot. Zomtijds is 'er maar een groote holligheyt aan de linker zyde, die tuffchen beyde de Tafels de breedte van twee dwersche Vingeren ingaat, zo als ik te *Parys* in een Bekkeneel by den Heer *Duverney* gezien hebbe: zomtijds is 'er maar een holligheyt aan de regter, of een aan de linker zyde.

Die holligheden zijn van binnen bekleed met een klierig Vlies, doorweven met veel Bloed-vaten, en is een uytbreyding van 't Vlies, 't welk van binnen de holligheden van den Neus bekleed, en ze hebben gemeenschap met 't opperfte, en binnenfte van den Neus door twee gaten; zijnde in elke holligheyt van den Neus een, gelijk in 't XV. Hoofdstuk van de IV Verhandeling gezegt is.

Deze gaten vind men van agteren tuffchen 't opperfte deel der Kaak-beenderen, daar ze t'samen gevoegt zijn met d' uytsteekfels van 't Voorhoofds-been, die aan de groote, of inwendige hoeken der Oogen leggen.

In Schapen, Offen en andere Dieren zyn die holligheden grooter als in den Mensch, waar in zomtijds Wormen groeyen, zo dat, die deze Ziekte kennen, een opening maken op die plaats van 't Hoofd, en 'er de Wormen uyt trekken.

Alzo 't Vlies, waar mede die holligheden van binnen bekleed zijn, word bevogtigt door zeker Vogt, het Snot genaamt, gelijk in 't XV. Hoofdstuk van de IV Verhandeling gezegt is, zo gebeurt het, dat 't zelve te veel afgefcheyden, en te dik geworden zijnde, in de Wonden, tot in die holligheden doorgaande, uytkomt, en van onverftandige Heelmeesters voor de zelfftandigheyt der Herffenen genomen word, zo dat ze de Lijders trepaneren, meenende dat zeer noodzakelijk is, gelijk ik weet binnen *Parys* gebeurt te zijn, daar in zo een geval een Heelmeester twee trepanen had gefteelt. Hier uyt is te zien, hoe dat men een nette kennis van die holligheden hebben moet, en
daar

daar by omzigtig zijn, zo zal men bevinden, dat zulke hoofdwonden gemeenlijk zo zware toevallen niet hebben, als die uytgang geven aan de zelfstandigheyt der Heersenen.

Een Heelmeester heeft my verhaalt, dat iemand gewond zijnde tot in een dezer holligheden, en hy hem verbindende en zijn Neus latende snuyten, het snot zag uyt die holligheyt weg schuyven, en ter Neus uyt komen.

De zekere tekenen, dat de wonden doorgaan tot in die holligheden, zijn, eerst, als 't snot daar uyt komt; Ten tweeden, als men de Neus en Mond toefluyt, en sterk blaast, zo word de keers uytgeblazen, die men voor de wonde houd; Ten derden, zo men een bitter vogt in de wonde giet, proeft den Lijder de bitterheyt in den Mond; Ten vierden, zo men met eenig vogt daar in spuyt, zal 't vogt ter Neus uyt loopen.

Pareus in 't X. Boek sprekende van de wonden des Hoofds, zegt in 't 21. Hoofdstuk, dat die holligheden vol zijn van wit slymig vogt, en vol lugt, en meent met anderen, dat de wonden tot in deze holligheden doorgaande, altijd open blijven.

Men zou met reden kunnen vermoeden, of dit zomtijds niet geschied om de bederving der Beenderen.

Hildanus in de 2. Aanmerking, 400. van zijn 2. Stuk spreekt daar van aldus: de wonden in die holligheden doorgaande, worden niet ligt genezen, en veranderen zeer dikwils in loopende gaten, en quaadaardige zweeren (want ten zy de Heelmeester voorzigtig en wel ervaren is) zo werd in de zelve een vogt vergaard, dat verrottende, de Beenderen bederft. De wonden dezer holligheden hebben met d'Oogen zo groote gemeenschap, dat ik ondervonden, en gezien hebbe, dat verrotte, en scherpe etter, welke uyt de wonden in die holligheden vloeyt, tegen, en op 't Bind-vlies is neder gezonken; en 't Oog uyt zijn plaats gedrongen heeft.

Fallopins in zijn Boek van de Hoofdwonden 't 12. Hoofdstuk, zegt, dat de breuk tot in deze holligheden

den doorgaande, zo word de wonde noyt toegeheelt, zo wel om de droogte des Beens, als door de lugt, die men in-ademende, gedurig door d'opening naar buyten vliegt: en zegt, dat hy ze noyt heeft zien sluyten, als in een Kind, in welk de holligheyt met sponsigues vlees vervult wierd, en daarom stelt hy de genezing zeldzaam.

In 't Jaar 1701. te *Leuven* zijnde, heb ik bezogt een Apoteker, die over eenige jaren een doorgaande wonde tot in de linker holligheyt van 't Voorhoofdsbeen had: niet tegenstaande de zware kwetsing, is hy evenwel genezen, egter bleef op die plaats een kleyne ronde opening, waar in men ontrent een middelmarige erwet kon leggen; zo dat de lugt onder 't ademen, als die opening niet gestopt is, met groot geweld daar door gedreven wierd, zo als ik met mijn hand gevoelt hebbe, en zeyde dat hy niet lang zou kunnen leven, indien ze moest open blyven, nadien hy zig, als ze wat lang open is, zeer benauwt gevoelt, zo dat hy om dit ongemak voortekomen, die altijd moest gesloten houden met een steek-wiekjen, dat hy dagelijks vernieuwt, en daar in houd met een vast klevende plaaster.

Die benauwtheyt ontstaat, om dat zekere hoeveelheyt van lugt, in yder in-ademing door d'opening na buyten vliegt, en niet gaat naar de Longen, daar ze noodig is om 't dikke wederkeerende Bloed te verdunnen, te verwarmen, en weder bequaam te maken tot den omloop en 't leven, dat by gebrek van lugt-deeltjes, niet verdunt zijnde, zo loopt het Bloed trager door de Longen, en zou eyndelijk stil staan, en de dood veroorzaken.

Zomtijds is 't, dat de Vliezen, die deze holligheden van binnen bekleeden, ontsteken, en tot zweering komen; waar uyt een onlijdelijke pijn ontstaat: zo men wist dat 'er etter is, mag men op die plaats vryelijk een trepaan stellen, om ze uytgang te geven, en de bederving van 't Been voortekomen.

Van 't gebruyk dezer holligheden is gesproken in 't XV. Hoofdstuk van de IV. Verhandeling, en
zijn

zijn dezelve afgebeeld in de 8. Fig. van de XXVIII. Tafel a d.

d' Opper-
hoofds-
beende-
ren.

Nu volgen d'Opperhoofds-beenderen B, zo genaamt om dat ze 't opperste van 't Hoofd uytmaken, en worden in 't Latyn *Ossa parietalia* genaamt, om dat ze ten deele de zijden van 't Hoofd maken.

Gedaante.

Hun gedaante is by na vier-hoekig, en zo dik niet als 't Voorhoofds-been, van buyten tamelijk effen; maar van binnen hebben ze vele groeven, gemaakt door 't kloppen der Slag-aderen, die alhier zeer veel in 't dikke Herffen-vlies gevonden worden: die groeven zijn grooter, en dieper omtrent de ¹ Slaap-beenderen, en van daar naar 't Opper-hoofd opklimmende, worden ze allengskens minder, zo dat ze eyndelijk verdwijnen.

Behalven deze groeven, vind men van binnen in die Beenderen op de zyden der Pijl-naad, aan 't opperste deel twee kleyne holligheden, zomtijds meer, al of ze met den top van den Vinger ingedrukt waren, in welke veel kleyne gaatjes zijn, die doorgaan tot in 't ² Tafel-scheydsel: en is 't dikke Herffen-vlies aan 't Been in deze holligheden zo vast vereenigt, dat het dikwils, als men 't ³ Bekkeneel opligt, op die plaats scheurt.

Door die kleyne gaatjes, en meer andere gaan zeer veel takjes Slag-aderen, die van 't dikke Herffen-vlies komen, naar 't Tafel-scheydsel, en keeren vele adertjes te rug: en 't zijn deze kleyne vaatjes, die brekende, als men 't Bekkeneel opligt, vele druppelen Bloeds geven, die men op 't dikke Herffen-vlies, en aan d'inwendige opper-vlakte van 't Bekkeneel ziet.

t' Samen-
voeging.

De Opperhoofds-beenderen worden met hun voorste deel t' samen gevoegt met 't Voorhoofds-been, door de Kroon-naad a, en zijdelijke uytsteekfels van 't ⁴ Wigge-been; van agteren met 't Agterhoofds-been, door de ⁵ Hoek-naad c, van onder, daar ze dunst zijn, met 't opperste, en dunne deel der ⁶ Slaap-beenderen, door de ⁷ Schub-naad d, en van

¹ Ossa temporum. ² Diploë. ³ Cranium. ⁴ Os sphenoides.

⁵ Sutura lambdoïdes. ⁶ Ossa temporalia. ⁷ Sutura squamosa.

boven

boven met malkander door de Pijl-naad b.

Daar de Pijl- en Kroon-naad in Bejaarden t' samen komen, is in nieuw-gebore Kinderen een groot deel t'eenemaal vliezig c, 3. Fig. daar men 't kloppen der Slag-aderen van d' ondergelege Hersenen kan zien; deze plaats word gemeenlijk de *Fonteyn* genaamt, en word lang na de geboorte beenig.

Verscheide Schrijvers getuygen dit deel nog vliezig gevonden te hebben in Bejaarden, dat in zommige al-tijd zo blijft.

Kinderen, die een Lende-vang hebben (een Land-ziekte in *Engeland*) hebben dit deel nog vliezig, om dat al hun Beenderen nog zagt zijn.

Deze Beenderen zijn van binnen als uytgeholt, om de Hersenen te beter t'omvangen. Men vind dikwils in die Beenderen twee kleyne gaatjes, ontrent 't agterste deel der 1 Pijl-naad, by de 2 Hoek-naad, door welke d'aderen gaan, die 't bloed te rug brengen in d'opperste langwerpige Sinus uyt de dekselen van 't Hoofd van 't dikke Hersen-vlies; men heeft deze gaatjes ook gevonden op 't opperste van 't Hoofd.

De wonden, en pletteringen van de zyden des Hoofds, zijn gevaarlijk, om dat de Beenderen hier zeer dun en niet met eenige Spieren bekleed zijn, als alleen aan 't onderste deel met 't opperste, en dunste deel der Slaap-spielen; zo dat ze door een slag of val ligtelijk breken.

Ten tweeden, om dat alhier vele, en groote takken van aderen en slag-aderen in 't dikke Hersen-vlies loopen, die daar door ligtelijk breken, zo dat haar Bloed uytstort op de vliezen der Hersenen, waar door de dood word veroorzaakt.

Als men op de Opperhoofds-beenderen moet trepaneren, daar de Bloed-vaten loopen in 't dikke Hersen-vlies, moet men op de tweede of inwendige Tafel gekomen zijnde, in 't booren zeer voorzigtig voort gaan: want die vaten leggen in de grœeven van d'inwendige Tafel: zo dat, indien men ze geheel wilde

1 Sutura sagittalis.

2 Lambdoides.

doorbooren, zou men in de groeven eer door zijn, als op andere plaatsen; waar door de vaten zouden geopent werden, die een zeer gevaarlijke Bloed-storting veroorzaken.

Agter-
hoofds-
been.

XXX. Taf.

1. Figuur.

Het vierde Been van 't 1 Bekkeneel is 't Agterhoofds-been c, dat gemeenlijk het dikste van alle is, hoewel niet over al: want daar de kleyne Hersenen leggen a a, 5. Fig. is 't zeer dun, en doorzigtig, daar 't ook geen twee Tafelen heeft. Maar om die dunheyt is 't bekleed met de t² samengevlogte 3 Spalkwyze en 4 Tafel-spier, alwaar het uytwendig zeer oneffen is, tot beter inplanting derzelve.

XXX. Taf.
2. Fig.

't Agterhoofds-been, dat ook ten deele t'onderste deel van 't Hoofd uytmaakt, bestaat in jonge Kinderen uyt vier Beenderen, die allengskens een worden, en is zomtijds in twee verdeeld, gelijk 't Voorhoofds-been. Daar de 5 Hoek- en 6 Pijl-naad t' samen komen, vertoont zig zomtijds zeker Beentjen d, onderscheyden van 't groote, zeer geroemt voor de valende Ziekte.

Zijn ge-
daante.

't Is van gedaante langwerpig vierkant, zo, dat de eerste hoek gevonden word aan 't eynde der Pijl-naad; de tweede, en derde, aan de agterste zyde van 't 7 Slaap-been; en de vierde, daar dit Been is t'samen gevoegt is met 't agterste deel van 't 8 Wigge-been, en vry stomp is: van binnen is 't uytgeholt, en van buyten bultig.

't Samen-
voeging.

't Agterhoofds-been is t' samengevoegt met zijn opperste, en zydelijke deelen, met de Opperhoofds-beenderen, door de Hoek-naad; met zijn onderste zydelijke deelen, met 't 9 Steen-been, en agterste deel van 't Slaap-been; en met zijn onderste deel aan 't agterste deel van 't Wigge-been; daar men in Kinderen een Kraak-been ziet, 't welk in Bejaarden in Been verandert zijnde, daar aan gegroeyt is, en met 't zelve maar een Been uyt te maken. Ik heb een

1 Cranium. 2 Complexus. 3 Splenius. 4 Trapezius.
5 Sutura lambdoides. 6 Sagittalis. 7 Os Temporale.
8 Os sphenoides. 9 Os petrosum.

Bek

Bekkeneel, waar in dat Kraak-been in geen Been verandert is.

Aan zijn onderste deel zijn twee platte, langwerpige uytsteekfels *aa*, die met een effen en glad Kraak-been bekleed zijn, staande nevens 't groote gat, daar 't Herffen-merg door gaat, een weynig voorwaarts; welke ontfangen worden in twee kleyne, ook met Kraakbeen bekleede holligheden van 't eerste Wervelbeen des Hals, dienende tot buyging, en opheffing van 't Hoofd: ook ziet men binnen in 't Bekkeneel regt over deze, een weynig voorwaarts, twee andere kleynder uytsteekfels.

XXX. Taf.
4. Fig.

Onmiddelyk agter die twee platte, langwerpige, uytsteekfels, zijn twee kleyne holligheden, in welkers grond de ingang is van een weg, waar van aanstonds zal gesproken worden.

In 't inwendig deel van dit Been zijn vier aanmerkelyke holligheden of putten: twee, die d'opperste, en kleyenste zijn *b*, een aan elke zyde, boven in 't opperste deel, waar leggen de agterste lobben der groote Herffenen, in welke putten dit Been niet zeer dik is. Twee, die d'onderste, en grootste zyn *aa*, waar in de kleyne Herffenen leggen, op welke plaats 't Been zeer dun is, gelyk te voren gezegt is.

Holligheden of Putten.
5. Figuren

Behalven die holligheden, zijn'er uytwendig nog twee; maar veel kleynder, en ondieper als de voorgaande, leggende aan elke zyde ontrent het groote gat van 't Agter-hoofds-been *bb*. Van binnen in dit Been zijn nog drie groote groeven. D'eerste begint, daar de ¹ Pyl-naad met de ² Hoek-naad t'samen komt: deze nederdalende, zomtyds wat na de regter, en anders na de linker zyde tusschen beyde de opperste putten, tot ontrent half dit Been, eyndigt in beyde de andere, (maar is niet altyd even zichtbaar) welke tusschen d'opperste, en d'onderste zydelings afloopende *dd*, eyndigt aan een gat *c*, dat gemaakt word door t'samenkomst van twee groeven, een in dit, en de andere in 't ³ Steen-been.

XXX. Taf.
4. Fig.

XXX. Taf.
5. Fig.

1 Sutura Sagittalis. 2 Lambdoides. 3 Os petrosum

A a

D d

De voorgemelde zydelings afloopende groeven worden gevonden zo wel in 't 1 Slaap-been, als in 't Agterhoofds-been, en fomtyds alleen in 't Slaap-been, zonder dat in 't Agterhoofds-been eenig teeken is.

In d'eerste groeve legt d'opperste langwerpige Sinus van 't dikke Herffen-Vlies, wiens begin vast gehegt is in een gat van 't Voorhoofds-been, leggende onmiddelyk boven 't uytsteekfel, dat men de *Hanekam* noemt, welke opklimmende midden door dat Been na de lengte van 't Hoofd in een groeve van d'Opperhoofds-Beenderen loopt, (die ook niet altyd zichtbaar is) onder de Pyl-naad, daar hy aan vast is, tot aan de Hoek-naad, en dan in deze groeve, tot ontrent half dit Been, eyndigt die in de zydelijke Sinus, welke in beyde de andere groeven, die zydelings afloopen, geplaatst zijnde, eyndigen in beyde d'inwendige Krop-aderen.

Dient op den loop van deze Sinus, 't welk Aderlyke bloedvaren zyn van 't dikke Herffen-Vlies, geliet te werden, op dat men in de Breuken van 't Agterhoofds-been moettende trepaneren, die, zo veel mogelijk is, myde; of als 't niet anders wezen kan, dezelve door onvoorzigtigheyt niet opene van binnen aan 't onderste deel van dit Been, onmiddelyk agter en boven 't gat; daar 't verlangde Herffen-merg door gaat, is nog een scherp uytsteekfel, waar door de onderste, en fomtyds de bovenste putten eenigfints van malkander gescheyden worden, waar aan 't dikke Herffen-Vlies zeer vast is, en de kleyne Herffenen aldaar eenigfints in twee deelen scheyd: waarom men ook op deze plaats niet moet trepaneren; 't is hier, dat in Honden, Leeuwen, en andre Dieren een eenig uytsteekfel is, waar door de groote van de kleyne Herffenen gescheyden worden; maar in Menschen geschied dit door de verdobbeling van 't dikke Herffen-Vlies, gelijk in 't 3 Hoofd-stuk van de 4 Verhandeling gezegt is.

Het Agterhoofds-been heeft drie gaten: een zeer

1 Os temporale.

groot

groot B , staande midden aan 't onderste deel van dit Been , door welk 't verlangde Herffen-merg komt uyt de Herffenen , en de Wervel Slag-aderen gaan tot dezelve.

Ontrent dit groote gat , een weynig na voren ter zyden , is aan elke zyde een minder , dat byna rond , of langwerpig rond is , door welke de Zenuwen van 't negende paar der Herffenen na de Long gaan. Van binnen in 't Bekkeneel is dit gat zomtyds dobbel ; maar die twee gaten vereenigen zig tot een in 't uytwendig deel van 't Bekkeneel , zo dat de Zenuwen , die hier door gaan , in haar begin in twee takken gescheyden zynde , in den uytgang met malkander vereenigen.

Aan 't opperste en agterste deel van 't gat van binnen in 't Bekkeneel , daar de zydelijke Sinus van 't dikke Herffen-Vlies uytgaan , is een opening , die 't eynde is van een weg , wiens ingang begint in den grond van een kleyne holligheyt , onmiddelyk agter de platte langwerpige uytsteekfels a a , die nevens de voorste zyden van 't groote gat van 't Agterhoofds-XXX. Taf.
4. Fig.been leggen : deze weg loopt ontrent de lengte van twee linien breed in 't Been : het Vat daar in onthouden , opent zig onmiddelyk in de *Sinus Vertebralis* , of Wervelbeens-Aderen F 4 Fig. XXVI. Taf. dat hun beginsel is : zo dat 't Bloed in de zydelijke Sinus van 't dikke Herffen-Vlies , zig ontlast door twee wegen. Het meeste gaat na de inwendige ² Krop-Aderen : en 't andere naar de *Sinus Vertebralis*. Men vind die wegen zomtyds aan een zyde , en zomtyds beyde gesloten , en dan loopt 't Bloed van de zydelijke Sinus naar d'inwendige ³ Krop-Aderen.

Behalven de voorgemelde gaten , is in 't onderste deel van dit been aan elke zyde een groot gat , gemaakt door t'samenkomst van twee groeven ; waar van de breedste is in 't Agterhoofds-been , en d'andere in 't onderste deel van 't Steen-been. In 't midden der opperste van dit gat , is een kleyn beenig uytsteekfel , waar aan 't dikke Herffen-Vlies vast is:

1 Cranium. 2 Venæ jugular. internæ. 3 Venæ jugular. internæ.

A a 2

waar

waar door 't gat in twee gefcheyden word. Door 't voorfte gaat de Zenuw van 't agtste paar der Herffenen, met de rug mergs-Zenuw, en door 't agterfte gaan de zijdelijke Sinus van 't dikke Herffen-Vlies, daar ze eyndigen aan d'inwendige Krop-Aderen.

Aan de regter zijde heb ik gezien dat gat in twee verdeelt door een dun beenig fcheydsfel, zo dat die deelen door een byzonder gat gingen, ziet dat gat getee kent met de Letter e, in de 5. Fig. van de XXX. Tafel.

Slaap-
beende-
ren.

Tot de eygene Beenderen van 't 1. Bekkeneel, behooren voor 't laaste de 2 Slaapbeenderen E. 1. Fig. XXX. Taf. Deze worden in 't Latyn genaamt *Ossa temporum*, omdat 't Hayr hier alder-eerst grys word, 't gene de jaren en den tijd beteekent.

Ze leggen ontrent 't onderfte van 't 3 Bekkeneel, een aan elke zijde onder de Opperhoofds-beenderen: hun bovenfte deel is by na rond van gedaante: ook zijn ze hier zeer dun, en doorzigtig, zo dat waarfchynelijk hier geen twee tafelen zijn, maar om de dunheyt eenigfints te vergelden, zijn ze bedekt met de Slaap-fpiere: inwendig zijn ze uytgeholt, om 't middelste, en 't onderfte deel der groote Herffenen beter t'omvangen, daar men ook eenige indrukkingen en groeven ziet, gemaakt, zo door de darmwyze kronkelingen, en zwaarte van de Herffenen, als door 't kloppen der Slag-Aderen, die zig hier in 't dikke Herffen-Vlies verdeelen.

Het onderfte deel dezer Beenderen is dik, oneffen en zeer hard, daarom 't 4 Steenbeen genaamd, en ze zijn t'samen gevoegt met hun opperfte, dunste, of grootfte deel, aan 't onderfte van d'Opperhoofds-beenderen, door de Schub-naad, als ook aan 't Agterhoofds-been, en voorfte zydelijke uytsteekfels van 't 5 Wiggebeen.

Het onderfte deel, 't welk 't 6 Steen-been is, word

1 Cranium. 2 Ossa temporalia. 3 Cranium.
4 Os petrosum. 5 Os Sphenoides. 6 Os petrosum.

t'samengevoegt met 't onderste , en zydelijke deel van 't Agterhoofds-been , en 't agterste zydelijke van 't 1 Wigge-been.

Deze Beenderen hebben yder drie uytsteekfels. 'T Uytsteek-
eerste is t'samengevoegt door een naad met een an- fels.
der uytsteekfel , komende van 't tweede Been des op-
perste Kaakbeen , dat uytwendig aan den kleynen
hoek van 't Oog staat. Deze uytsteekfels zo verenigt
maken 't 2 Juk-been F. 4. Fig 't welk buyten ver-
heven , en inwendig gebogen is : tusschen welk en 't Bek-
keneel een merkelyke afgegentheyt is ; het strekt
zich uyt ontrent den kleynen hoek van 't Oog
tot aan 't uytwendig Oorgat , en komt wederzijds
voort met een breed begin , en word in 't midden ,
daar die uytsteekfels t'samen gevoegt zyn , dun en
kleyn.

Dit Been schynt te dienen tot bescherming van de
Rees der Slaap-spier , die hier onder door gaat.

Het tweede is 't 3 Mamwyze uytsteekfel , D. 1.
Fig. zo genaamt, om dat het na 't eynde van een Koe-
tepel gelijkt : zyn plaats is agter 't uytwendig oor-
gat , en heeft van binnen veele holligheden , die ge-
meenschap hebben met de Trommel van 't Oor: aan
zijn binnenste zijde heeft het een holligheyt , of groe-
ve ; waar in 't hoofd van de tweebuykige Spier legt,
die 't onderste Kaakbeen na beneden beweegt.

Het derde is 't 4 Priemwijze uytsteekfel g , dat Priem-
lang , en scherp is , staande onder aan 't Steen been , wijze uyt-
digt by 't gat aan de uytwendige zijde , daar d'in- steekfel.
wendige 5 Krop-Aderen beginnen.

In Kinderen is 't kraakbeëneg ; maar in bejaarden
beëneg ; het scheidt , als men 't 6 Bekkeneel lang laat
koken , ligtelijk af , waar om 't voor een aangroey-
fel kan genomen worden : ook word het zelden ge-
vonden in Bekkeneelen , die uyt de aarde zijn ge-
graven , en is zomtijds als een krom gebogen haak.

Onder aan 't begin van 't eerste uytsteekfel , 't
welk 't 7 Jukbeen maakt , digt aan 't uytwen-

1 Os Sphenoides. 2 Os Sygoma. 3 Apophysis Mastoides.

4 Apophysis Styloides. 5 Venæ jugulares internæ.

6 Cranium. 7 Os Sygoma.

4. *Figuur.* dig Oorgat, een weynig voorwaarts, zijn twee hol-
ligheden, met een effen, en glad Kraakbeen bekleed,
f, in welke de twee langwerpige hoofdekens van een
der uytsteekfels aan elke zijde van 't onderste Kaak-
been niet ontfangen worden, gelijk men gemeent
heeft: want die hoofdekens worden even, voor en
buyten, op een verheventheyt met de Slaap beende-
ren t'saamen gevoegt, gelijk yder, die 't wil on-
derzoeken, zal bevinden.

Voor een vierde uytsteekfel der 1 Slaap-beenderen
kan genomen worden, 't 2 Steen-been, zo genaamt
om zijn hardigheyt, 't welk 't onderste deel dezer
Beenderen is.

Dit Been is in kleyne Kinderen een aangroeyfel, dat
met de punt van 't Mes ligtelijk kan afgescheyden
worden: het komt voort van 't Slaap-been met een
breed begin, en eyndigt onder aan den grond van 't
Bekkeneel met een spits eynde: uytwendig is 't zeer
ongelijk; maar inwendig wat effener, hebbende
nogtans hier, en daar, eenige kleyne verhevent-
heden.

Van binnen dit Been, zijn de werktuygen van
't gehoor besloten.

Gaten van
't Slaap-
been.

In de Slaapbeenderen zijn verscheide gaten, zo in-
als uytwendig: inwendig zijn'er twee, in 't midden
van 't agterste deel van 't Steenbeen: 't grootste is,
waar in de gehoor-Zenuw ingaat g, 5. Fig. die zig
verdeelt in twee takken, waar van een de zagte, en
d'andere de harde is, door 't ander, dat kleynder is,
gaat een Slag-Ader.

Uytwendig zijn'er vyf. 'T eerste is 't uytwendig
Oor-gat of weg, e 4. Fig. dat alleen van buyten ge-
zien word.

Het tweede is een gat, dat schuyns loopt door dat
Been, leggende agter 't 1 Mamwijze uytsteekfel, door
welk een groote Ader gaat, die een deel van 't Bloed
te rug brengt, dat verdeelt is geweest aan de gemee-
ne dekselen, en spieren, die een deel van 't Agter-
hoofd bekleeden. Deze Ader ontlast zig in de zydelijke

1 Os temporale. 2 Os petrosum. 3 Processus mamillaris.

Sinus

Sinus van 't dikke Herffen-Vlies', daar ze begint te krommen. In zommige Bekkeneelen is dit gat aan een zyde: zomtijds zijn'er geen van beyde: en in dit geval ontlast zig 't Bloed van die Vaten in d'uytwendige 1 Krop-Aderen, met welke ze door haar takken gemeenschap hebben.

Het derde is een gat of weg, waar door d'inwendige 2 Krop-flagader gaat i, de ingang van dezen 4 Figuur. weg staat regt voor 't gat, daar d'inwendige Krop-Ader begint, en loopt schuyns van agteren na voren, en ontrent een dwerschen vinger breed weegs gedaan hebbende, eyndigtze ontrent 't agterite deel der Zadel, daar binnen in 't 3 Bekkeneel een gat of opening gezien word k, 5. Fig. 't welk 't eynde van dezen weg is: door dit zelve gat gaat de tusschenribbige-Zenuw uyt het Bekkeneel.

Het vierde gat is tusschen 't 4 Mam-en 5 Priemwyze uytsteeksel, door welk de harde-tak der gehoor-Zenuw uytkomt.

Het vyfde is een weg, die na 't inwendig Oor, na de Trommel loopt, en 't eynde is van den Water-weg.

Alzo de zes eygene Beenderen van 't Bekkeneel nu beschreeven, gemeenlijk die zijn, die in de Hoofdwonden breken: zullen we hier iets van dezelve aantekenen.

Men kan in de Breuken van 't Bekkeneel zig bedriegen, en een Barst voor een Naad nemen: want als ze digt by de Naad is, is d'oneffenheyt van deze zomtijds oorzaak, dat ze niet gekent word, zo dat ze word verwaarloost: gelijk *Hippocrates* getuygt hem gebeurt te zijn, in zijn *Boek van de Hoofdwonden*, in zekeren *Autonomus*, zo dat hy die eerst kende, als het te laat was.

Ik heb over vele jaren te *Parys* van myn Heer *Duverney* gehoord, dat zomtijds 't Bekkeneel van Jongelingen door een val, of slag ingedrukt word, en zo blyft het gehele leven, zonder eenig ongemak; in ouderen van Jaren gequett zijnde, is 't gebeurt dat

1 Venæ jugular inter. 2 Arteria carot. 3 Cranium.
4 Processus mammillaris. 5 Styloides.

d'indrukking voor een Breuk wierd genomen , en twee trepanen op de zelve gesteld wierden ; maar by ongeluk was de Breuk ter zyden : na vier dagen de Lyder gestorven zijnde , bevond men dat de Breuk meer als een dwersfen Vinger breed , van de indrukking was.

Zomtijds worden'er oneffenheden op 't Bekkeneel gevonden , veroorzaakt door 't voedsaam zap , dat buyten de beenige buysjes stort , en daar verhard.

Zomtijds breekt het 1 Bekkeneel aan de tegenoverige zyde, daar 't geslagen was : ook word het Bloed op de Vliezen der Herffenen uytgestort op een andere plaats , als daar de wonde was.

Zomtijds heb ik gezien , dat de onderste tafel van 't Bekkeneel gebroken word , en d'opperste geheel blijft.

Het Bekkeneel van oude Luyden , hoewel zeer hard , breekt nogtans ligt ; om dat het van zijn Mergagtig zap berooft is.

Over vele jaren was te *Parys* een Vrouw, die Aalmoessen ontfong in de helft van haar Bekkeneel , 't welk door een voorgaande zweer afgescheyden , door den Heelmeester afgenomen was; en nadien ze de helft van 't dikke Herffen-Vlies bloot hadde , zo was het, dat iemant op die plaats , haar met den top van den Vinger schielyk aanraakte , zo dat ze schreeuwde , en zeyde , datze duyzend brandende kaerffen zag.

HET V. HOOFDSTUK.

Van 't Wigge-been , en Zeef-been.

DE Beenderen gemeen aan 't 2 Bekkeneel , en opperste Kaakbeen , zijn twee.

Het Wigge-been.

Het Wigge-been van de Grieken *Os Sphenoides* genaamt , niet om dat het een Wigge gelykt , maar om dat het als een Wigge , tusschen alle de Beenderen van 't Bekkeneel , in-zit **D. 4. Fig.** waar

1 Cranium. 2 Cranium.

van

van 't als de grond is , waarom 't ook in 't Latyn *Os basilare* geheten word.

Het bestaat in Kinderen uyt vier Beenderen , die door Kraakbeen te samen gevoegt zijn , welke daar na tot een Been worden , als de Kraak-beenderen in Been verandert zijn.

Dit Been is dikker aan zijn agterste deel , A , daar ^{xxxI.} 't vast gegroeyt is met 't Agterhoofds-been , als in ^{Taf. 1. Fig.} eenige andere deelen ; zijnde zeer ongelijk van gedaante , en moeyelijk om te beschryven ; het raakt aan alle de Beenderen van 't ¹ Bekkeneel : van voren is 't te samen gevoegt met 't Voorhoofds-been , ² Zeef-been , en 't tweede , en derde Been van 't opperste-Kaak-been : ter zyden met de Slaap-en Opperhoofds-beenderen : van onderen met den ³ Ongepaarden ploeg , als ook met 't onderste van 't Agterhoofds-been , 't ⁴ Streenbeen , 't derde , en vierde van 't opperste Kaak-been.

Het heeft aan zijn buytenste deel vyf uytsteekfels. ^{Uytsteek-} Eerst zijn'er twee , die de grootste zijn ; van voren ^{fels.} aan elke zijde een , die worden vleugelwyze genaamt , welke een deel van de Oog-hollen maken van binnen in den grond aan d'uytwendige zijde , gelijk ook 't voorste deel van de Slaapen des Hoofds.

Onder aan de zijde van dit Been zijn nog twee andere , onmiddelijk agter het derde en vierde Been van 't opperste Kaak-been , waar aan die uytsteekfels vast zijn , welke , om dat ze de vleugelen van een Vleermuys gelijken k , van de Grieken *Pterygoides* genaamt worden.

Onder aan 't eynde van d'inwendige zijde dezer ^{XXX. Taf.} vleugelwijze uytsteekfels , is gemeenlijk een beenig ^{4. Figuur.} haakjen ; waar langs gelijk door een katrol de uytwendige Spier gaat , die 't ⁵ Lelleken na om hoog helpt bewegen.

Het vyfde is een kleyn uytsteekfel , dat van onderen midden aan dit been staat , en ontfangen word in een groeve , in 't agterste , dikste , en breedste deel van

¹ Cranium. ² Os cribros. ³ Os vomer. ⁴ Os petrosum.
⁵ Uvula.

den Ongepaarden ploeg. Eenigen voegen daar nog twee andere by, die d'agterfte deelen van dit Been uytmaken, en eyndigen tegen 't ¹ Steen-been, ontrent de gaten, daar d'inwendige ² Krop-flag-aderen ingaan.

Dit Been bestaat uyt twee tafels, een inwendig, en d'andere is binnen in 't ³ Bekkeneel, aan welke vier uytsteekfels zijn, welke om de gelijkenis met de voeten van een Ledekant, van de Grieken *Clinoides* geheten worden.

XXX. Taf.

5. Figuur.

De twee voorfte, die de grootfte zijn nn, komen voort met een breed begin, en allengskens minder wordende, eyndigenze in een fcherpe punt: de twee agterfte zijn kleynder, en fteken zo verre niet uyt, maar verbeelden gelijk een muur, en worden van velen voor een uytsteekfel v genomen: dikwils nogtanszig in de breedte uytftrekkende, eyndigenze met twee punten.

Tuffchen die uytsteekfels is een holligheyt l, welke men om de gelijkenis met de zadel van een Paard, in 't Latyn *Sella Turcica*, of *Equina* noemt, waar in de ⁴ Slijm-klier geplaatft is.

Verschey-
de gaten.

Men vind aan elke zyde van 't ⁵ Wigge-been verscheyde gaten. Eerftelijk is'er een onmiddelijk boven 't voorfte uytsteekfel, dat een der voeten van een Ledekant gelijkt o o, door welke de Gezigt-Zenuw naar 't Oog gaat.

In 't voorfte zydelijk uytsteekfel van 't Wigge-been, dat van binnen den grond, en d'uytwendige zijde maakt van 't Oog-hol, is een spleet, die omtrent zeven of agt linien lang is m, welke beneden onder 't gat, daar de Gezigt-Zenuw door gaat, byna rond, en veel breeder is, als boven, daar ze eyndigt met een langen en fcherpen hoek.

Door deze spleet gaan verscheyde Zenuwen in 't Oog-hol.

Eerftelijk het derde paar van de Herffenen, om de Oogen te bewegen. Ten tweeden 't vierde paar van

¹ Os petrosum. ² Arter. Carot. ³ Cranium. ⁴ Glandula pituitaria. ⁵ Os Sphenoides.

Willis, genaamt de lijdende Zenuwen. Ten derde by na geheel 't zefde paar. Ten vierden loopt hier door de opperfte tak der voorfte Zenuw van 't vyfde paar: 't is deze tak, die gaat door een gat of groeve van 't Voorhoofds-been.

Onmiddellyk aan 't onderfte deel van die spleet naar 't agterfte van 't Hoofd, is een gat a in dit Been, dat den grond van 't Bekkeneel niet door boort, maar een foort van Kanaal maakt, ontrent de lengte van een linie, dat zig opent agter 't Oog-hol, aan 't opperfte der ruymte, die tuffchen 't uytfteekfel is, gelijkende den vleugel van een Vleer-muys, en tuffchen het derde Been van 't opperfte Kaakbeen. Door dit Kanaal gaat de onderfte tak der voorfte Zenuw van 't vyfde paar.

Ontrent twee linien breed van dat Kanaal, fchuyns naar 't agterfte deel van 't Bekkeneel, is een gat in dit Been i i, van een ovale gedaante, leggende aan de agterfte zijde der zadel, door welke de agterfte Zenuw van 't vyfde paar gaat.

Schuyns agter dit gat in dat Been, is een kleynder, by na rond h h, door welk gaat een tak van d'inwendige ¹ Krop-Slagader, die zig terftont vast hegt aan 't dikke Herffen-Vlies, en vele takken maakt, die zig verdeelen in 't deel van 't dikke Herffen-vlies, dat de zijden en 't opperfte der Herffenen bekleed. Door dit gat gaat een Ader, komende van 't dikke Herffen-vlies, zig ontlaftende in de inwendige ² Krop-Ader.

In den grond, en aan 't opperfte zydelijk uytwendig deel van 't Oog-hol, boven den fcherpen hoek der spleet, in 't voorfte zydelijk uytfteekfel van dit Been, is een kleyn gaatjen, door welk een kleyn takjen van een grooten tak der inwendige Krop-Slag-ader gaat, dat naar 't Oog zig wend: de groote tak verdeelt zig by na geheel in dat deel van 't dikke Herffen-vlies, dat 't voorfte deel der Herffenen bekleed.

Tuffchen beyde de Tafelen van dit Been, onder

¹ Arteria Carot. ² Vena jugular.

de

de 1 turksche Zadel , zijn twee ruyme holligheden , beschreven in 't XV. Hoofdstuk , van de IV. Verhandeling en afgebeeld in de XVIII. Tafel 8. Fig. c. f.

Zeef-
been.

Het tweede en laatste Been van 't 2 Bekkeneel is 't 3 Zeef-been , zo genaamt , om dat het met veel schuyns , en regt loopende gaatjes doorboort is als een zeef; door welke de takjes der Reuk-Zenuwen gaan naar 't Vlies , dat van binnen den Neus bekleed , dat eygentlijk 't werktuyg van den Reuk is.

XXX Taf.

Het heeft zijn plaats in 't midden onder aan den grond van 't Voorhoofds-been , in 't inwendig deel , aan 't opperste van den Neus , tusschen beyde de on-effene verheventheden E. E. 5. Fig. die 't opperste deel der Oog-hollen maken; zo dat het met zijn voorste, en zydelijke deelen daar mede te samen gevoegt is: en met zijn agterste aan 't voorste deel van 't 4 Wigge-been.

Uytsteek-
fels.

Dit Been bestaat uyt verscheyde deelen. 'T eerste is langwerpig vierkant , en doorboort met veel kleyne gaatjes, als een Zeef, van boven in 't midden volgens de lengte van dit Been wat voorwaarts , is een uytsteeksel 1, 5. Fig. XXX. Tafel, en 3. Fig. 't XXXI. Tafel, dat men om de gelykenis met een 5 Hanekam, dien naam geeft, welk het tweede deel is. Aan 't onderste van dit Been , dat van binnen , en van boven aan de holligheden van den Neus is , is een ander uytsteeksel , waar door 't eerste, dat vol gaatjes is, volgens zijn lengte aan 't voorste deel in twee gescheyden word , en 't derde deel is.

Dit uytsteeksel voegt zig in een groeve , of verdobbeling van den 6 Ongepaardenploeg , en zomtijds is 't daar mede verknogt.

XXXI.
Spongiag-
rige Been-
cerkens.

Een ander deel van dit Been , zijn de opperste spongieuze Beenderkens c. 3. Fig. om dat ze van binnen verscheyde Cellekens d d hebben als een spongie , en vervullen van boven by na 't opperste der holligheden van den Neus , met welke die Cellekens door eenige

1 Sella tursica. 2 Cranium. 3 Os cribrosum. 4 Os sphenoides. 5 Crista galli. 6 Os Vomer.

kleyne gaatjes gemeenschap hebben , zo tot uytgang van 't Snot , dat in die Cellekens door 't Klierig-vlies afgescheyden word , als tot doorgang van de lugt , bezwangert met de reuk-deeltjes.

Deze zijn vast verknogt van voren met 't opperste deel van 't ¹ Kaakbeen , daar t'samen gevoegd is met een der uytsteekfels van 't Voorhoofds been , leggende aan den grooten hoek van 't Oog : aan de zyden , en van agteren met het langwerpig vierkant Beentjen , dat eerst beschreeven is , makende met 't zelve een verknogtheyt : van agteren zijn ze bepaalt door 't voorste deel van 't ² Wigge-been , waar aan ze mede verenigt zijn.

Deze Beenderkens zijn dun als papier , en in sommige Dieren op een wonderlijke manier gekronkelt , makende van binnen veel Cellekens , op dat ze hier door een meerder oppervlakte verkrygen : de uytwendige oppervlakte dezer Beenderkens is bepaalt door twee kleyne en zeer dunne , die 't inwendig deel der Oog-hollen maken. 'T eerste , dat dieper in 't hol legt , word genaamt het ³ Plat-beentjen : 't is van gedaante langwerpig vierkant : van boven is t'samen ^{Het Plat-beentjen.} gevoegt met 't Voorhoofds-been van onderen met 't ⁴ Kaakbeen : van agteren met 't Wigge-been , en van voren met 't volgende.

Boven , daar dit Beentjen t'samen gevoegt is met 't Voorhoofds-been , is een kleyn gaatjen ; waar door een takjen gaat van 't vyfde paar Zenuwen der Herfsenen , naar 't Vlies , dat van binnen den Neus bekleed , komende van den oppersten tak der voorste Zenuw.

Het andere kleyn Beentje , dat'er névens legt , word om dat het dun , en doorzigtig is , gelijk de nagelen der Vingeren , *Os unguis* genaamt ^{Het Nagelbeen.} ^{XXX. Taf.} ^{1. Figuur.} i : het maakt den grooten hoek van 't Oog , en word ligt gebroken ; waarom 't in opgegrave Doodshoofden zelden word gevonden. Van agteren is dit Beentjen te samen gevoegt met het voorgaande : van boven met 't Voor-

¹ Os maxillare. ² Os Sphenoides. ³ Os planum.

⁴ Os maxillare.

hoofds-been : van voren en van beneden met het Kaakbeen.

Aan zijn voorste zijde is het wat uytgeholt , in welke een deel van 't ¹ Traan-zakjen legt, waar door 't overfchot van 't vogt , dat van buyten 't Oog bevogtigt , nederdaalt van binnen in den Neus : beyde die Beenderkens behooren tot d'opperste spongieuze , en maken met de zelve een verknogtheyt.

Verscheyde Ontleeders zeggen , dat in 't *Os unguis* een gat is , waar door 't vogt , 't welk 't Oog van buyten bevogtigt , naar 't binnenste van den Neus zou loopen ; maar dat is een dwaling , want dit Vogt loopt niet door 't gat van 't Beentjen , maar door 't Neus-Kanaal , dat is aan de inwendige zijde van 't Kaakbeen , beneden den grooten hoek van 't Oog.

De opperste spongieuze Beenderkens zijn bekleed met het binnenste Vlies van den Neus ; dat eygentlijk het werktuyg van den Reuk is ; en hoe die Beenderkens meer gekronkelt zijn , en meer Cellekens hebben , hoe dit Vlies hier door in een keyne plaats , een meerder uytgestrektheyt , en grooter oppervlakte krygt , en bequamer is om aangedaan te kunnen worden van vele reuk-deeltjes op vele plaatsfen te gelijk ; waar door de Reuk volmaakter is , voornamelijk als de reuk-deeltjes , bestaande uyt olyagtige vlug-zoute delen door een sterke in-ademing ('t welk de ziel is van den Reuk om zo te spreken) met geweld op dit Vlies gedreven worden , gelijk te voren in 't XIV. Hoofdst. IV. Verhandeling in de beschryving van den Neus nog gezegt is.

Het *Os unguis* of Nagel-been , is , dat men gemeenlijk brand , als 't bedorven is , tot genezing der Traanfistel ; maar gelijk de bederving van dit Beentjen , dat zo dun als papier is , door bequame Genees-middelen genoegzaam kan gestut worden , en dat men , 't schoon 't niet zeer gevoelig , met een gloeiend Yzer niet kan doorbooren , zonder 't inwendige Vlies van den Neus , dat zeer gevoelig is , te branden , kan 't van een quade zweer gevolgt worden ; daarom is 't , dat eenige heden-daagsche Heelmeesters allen dit Beentjen doorbooren ,

1 *Sacculus lachrymalis.*

't welk

't welk zeer dun zijnde, door een bequaam werktuyg ligtelijk kan geschieden.

Dit moet te meer gedaan worden, om dat 't voornaamste inzicht is tot genezing der ¹ Traan-fistel door verstopping van 't Neus-kanaal veroorzaakt; want in andere is 't niet noodig, dat men 't brand, of doorsteekt, en 't is tot wegnemen der bederving, en doorgang te geven aan 't overige van 't Vogt, 't welk 't Oog van buyten gedurig bevoogtigt, en van binnen naar den Neus, om dat 't door 't Neus-Kanaal verstopt is, niet kan gaan.

HET VI. HOOFDSTUK.

Van de Kaak-beenderen.

DE agt Beenderen, waar uyt 't ² Bekkeneel bestaat, beschreeven zijnde, komen we tot beyde Kaak-beenderen, waar van 't een 't opperste, en 't andere 't onderste is.

Het opperste Kaak-been is in den Mensch kort, en half rondagtig van gedaante; van boven breed; van onder smal, en wat uytgeholt; maar in de meeste Dieren van voren lang uytstekende.

In den Mensch is 't opperste Kaak-been onbeweeglijk, en bestaat uyt negen Beenderen; vier aan elke zijde, en een in 't midden.

Het eerste paar zijn de Neus-beenderen h, die 't opperste deel derzelve uytmaken: deze zijn dun, langwerpig en vierkant van gedaante: door hun opperste deel, zijn ze t'samen gevoegt met 't Voorhoofds-been, door hun onderste met de Kraak-beenderen van den Neus, met hun eene zijde aan 't Kaak-been, en door d'andere met malkander: die twee Beenderen worden ondersteunt door 't opperste deel van den ³ Ongepaarden ploeg.

Het tweede paar zijn de Wang-beenderen k, zo genaamt, om dat ze aan elke zijde het uytstekenste deel

¹ Fistula lachrymalis. ² Cranium. ³ Os Vomer.

van 't aangezigt maken , dat men de *Wangen* noemt: in 't Latyn word het *Os malum* genaamt , om dat op die plaats de Wang als een Appel voorwaarts uytbult.

Van buyten zijn ze eenigfints vierhoekig ; maar een der zijden , die den buytenften hoek van 't Ooghol , en meer als 't derde deel van den omtrek maakt , is gekromt als een boog ; van voren zijn ze tamelijk effen , en wat bultig , maar van agteren aan d'andere zijde wat uytgeholt , en van binnen spongieus.

Yder dezer Beenderen heeft drie uytsteekfels ; met het eerste is t'famen gevoegt door een Naad , met een ander uytsteekfel van 't Slaap-been , en maken het Juk-been ; vorders is dit Been t'famen gevoegt door 't tweede uytsteekfel met het Kaakbeen , ontrent den grooten hoek van 't Oog , en door 't derde met een uytsteekfel van 't Voorhoofds-been , ontrent den kleynen hoek , ook met 't voorste zydelijke uytsteekfel van 't Wigge-been.

Aan zijn voorste , en agterste zijde , is een gaaten , ook wel twee , waar door eenige bloed - vaatjes gaan tot voedsel van dat Been.

Van't derde
de paar.

De Beenderen van 't derde paar zijn d'aldergrootste , en worden daarom de Kaak-beenderen , genaamt I : aan hun ondersten omtrek , hebben ze veel diepe holligheden , of kaskens voor de Tand en : van boven maken ze door een uytsteekfel een deel der Ooghol , en zyden van den Neus : die Beenderen zijn zeer ongelijk , en van voren aan hun onderste deel , boven de Tand en wat uytgeholt.

XXX. Taf.
Figuur.

De zelve maken van onder by na geheel het Verhemelte van den Mond E , behalven een kleyn deel van agteren , dat voltrokken word door de Beenderen van 't vierde paar : aan hun opperste deel , onmiddelijk onder den grooten hoek van 't Oog , hebben ze van binnen in de voorgemelde uytsteekfels een groeve , die zig vereenigt met een andere , in 't voorgaande Hoofdstuk , in 't *Os unguis* , of *Nagel-been* aangemerkt , waar uyt een meerder groeve komt , in welke 't

I Os Sygoma.

I Traan-

• Traan-zakje legt ; maar gelijk de groeve van dit Been allengsken enger word , zo verandert die van onder in een Kanaal , 't Neus-Kanaal genaamt , en eyndigt met een opening van binnen in den Neus , onder 't onderste spongieus Beentjen.

× Dit Kanaal word inwendig bekleed door d'uytbreyding van 't vlies , dat van binnen den Neus bekleed , en geeft doorgang aan 't overige vogt , het welk 't Oog van buyten bevogtigt , en van binnen na den Neus.

Ook is dit Been t'samen gevoegt door 't voorge- melde uytsteekfel met een der uytsteekfels van 't Voor- hoofds-been , leggende aan den grooten hoek van 't Oog , als ook met 't *Os unguis* , en Plat-beentjen , en 't Been van den Neus , te gelijk met zijn uytwendi- ge zyde , dat een uytsteekfel is , met 't *Os malum* ; daar 't een deel van 't onderste van den Oog-hol maakt , en een Kanaal heeft , waar door een tak der Zenuw van 't vyfde paar der Herffenen gaat , welke voortlopende , en verzeld met eenige Bloedvaatjes , komt door een gat van dit Been uyt van voren , on- middelijk in 't ¹ Oog-hol , en geeft eenige takjes aan de Tand en van 't opperste Kaakbeen , en aan de Spie- fen van de Kaaken , Lippen ; en Neus.

Van onderen en naar agteren is dit Been t'samen ge- voegt met het vierde been van 't opperste-Kaakbeen met de vleugelwyze uytsteekfels van 't ² Wigge- been , en met 't onderste deel van den Ongepaarden ploeg ; ook met zijn weerga door een ³ Naad , die regt in 't midden van voren , en na agteren door 't Verhe- melte loopt.

Van binnen ontrent 't onderste van de holligheden van den Neus , zijn twee dunne langwerpige Beent- jes , in elke holligheyt een ; deze zijn vast met hun opperste deel aan 't Kaakbeen , naar 't welk ze uyt- geholt zijn , en zijn aan d'andere zyde wat bultig , en worden genaemt d'onderste spongieuze Beender- kens b.

Onder dit spongieus Beenderken is een opening , die

1 Orbita. 2 Os sphenoides. 3 Sutura.

de uytgang is van 't Neus-kanaal , welke van 't gemelde Beentjen in de Figuur wel gedekt is ; maar aangewezen word door 't Priemken g , dat boven aan den grooten hoek van 't Oog , in 't begin van 't Kanaal is ingesteken , en onder 't Beentjen uytkomt.

Wegen
naar
de hollig-
heden des
Neus.

Agter de middenste , en opperste Sny - tanden , daar de Kaak-beenderen t'samen gevoegt zijn , is een holligheyt , in welkers grond twee kleyne gaatjes zijn , die doorgaan tot binnen in den Neus , in elke holligheyt een ; en 't is door deze wegen , dat een deel van 't vogt , 't welk uyt het ¹ Traan-zakken , door 't Kanaal in den Neus komt , van voren in den Mond vloeyt , terwijl 't overige loopt boven 't Verhemelte agter na dezelve : behalven die twee , is'er een kleyn digte by , dat zomtijds in den Neus eyndigt , agter een van d'andere gaatjes , of in de tusschenheyt , daar die Beenderen t'samen gevoegt zijn , waarschynelijk dat'er een vaatjen doorloopt.

Hollig-
heyt des
Kaak-
beens.

Dit Been heeft van binnen een zeer aanmerkelijke holligheyt , 't welk de grootste is van al , die in de beenderen van 't ² Bekkeneel gevonden worden , en is bekleed met een klierig Vlies.

Beenderen
van't vier-
de paar.

De Beenderen van 't vierde paar , die van agteren 't Verhemelte helpen volmaken , zyn dunder van agteren , ook op de zyden , en van voren , daar ze met de Kaak-beenderen t'samen gevoegt zijn , als ook aan hun agterste zyden , daar ze met een ongelijk uytsteeksel t'samen gevoegt zijn met de Vleugel-wyze uytsteekfels van 't ³ Wigge-been , en 't agterste deel van 't Kaak-been : dit Beentjen is in 't midden van 't Verhemelte met zijn weerga t'samen gevoegt , en ze maken van binnen in den Neus door hun t'samen voeging met die der Kaak-beenderen zomtijds een groeve , in welke 't onderste deel van den ⁴ Ongepaarden ploeg ontfangen word. Ziet dit Beentjen in de XXXI. Tafel 3. Figuur. h h.

¹ Saccul. lachrymalis.

² Cranium.

³ Os sphenoides.

⁴ Os vomer.

Aan de agterfte zydelijke deelen is een gat , waar door een tak gaat van de agterfte Zenuw van 't vyfde paar : deze tak gaat in zijn begin door een Kanaal , van agteren na voren , dat men vind in den grond van 't Vleugel wyze uytsteekfel , en komende in de ruymte , die'er is tuffchen 't agterfte deel van 't Kaak-been , en 't voorgemelde uytsteekfel , daalt die neder door een ander Kanaal , welkers uytkomst dit gat is , en loopt zo naar 't Vlies , dat het Verhemelte van den Mond bekleed : meest altijd is'er nog een kleynder , of twee , by 't voorgaande , waar door eenige Bloed vaatjes gaan , komende van de Krop-ader en Slag-ader.

De Beenderen van 't Verhemelte van den Mond bederven zomtijds in die de Pokken hebben , en ze worden ligtelijk doorknaagt , om dat ze zeer dun zijn ; als dit gebeurt , brengt het een groote verandering in de fpraak : om dit ongemak te helpen , vind men in de 500 tal, 14. Genezing van *Amatus Lusitanus* , een kleyn Werk-tuyg , om dit gat te stoppen : 't is een kleyn Zilver-plaatjen , in welkers midden een opening is , waar door men een kleyn stukjen Spongje doet gaan , en 't wel vast maakt , 't welk men dan in 't gat van 't Verhemelte fteekt : die Spongje door 't vogt opzwellende , plakt het Plaatjen zo naauwkeurig tegen 't gat , dat men 't zonder moeite niet kan afkrijgen.

Gelyk de vier laafte Beenderen , twee aan elke zyde , 't Verhemelte van den Mond uytmaken , maken ze ook de zyden van de holligheden van den Neus , waar langs de lugt door de Neus-gaten , naar 't agterfte van den Mond , en vorders in de Longepijp gaat : welke holligheden in 't midden gefcheyden worden door ² den Ongepaarden ploeg G , dat een eenig Been is van 't opperfte Kaak-been. xxx. Taf.

Dit Been word zo genaamt , om de gelijkenis van een Ploeg-yzer : zomtyds is 't enkel , dun , en doorzigtig , en heeft aan zijn agterfte , en bovenfte deel een groeve l , in welke ontfangen word 't kleyn xxx. Taf. 4. Figuur.

1 Vena jugular. en arteria carot. 2 Os vomer.

uytsteekfel van 't Wigge-been, daar 't ook breeder is, als op een andere plaats: zomtyds is 't dobbel, hebbende twee onderscheyde tafelen, die van onder met malkander verknogt zijn, tusschen welke een merkelyke ruymte is.

Met zijn voorste en opperste deel is dit Been vereenigt met het onderste uytsteekfel van 't Zeef-been, en met zijn onderste deel word het zomtijds ontfangen in een groeve, gemaakt door de t'samen voeging der Beenderen, die 't Verhemelte van den Mond maken: van voren opwaarts ondersteunt het de Beenderkens van den Neus, en ontfangt een van de Kraak-beenderen des zelve, en ze scheyden gezamentlijk door een schot G I van boven tot beneden, en van agteren tot voren den Neus, in een regter, en linker holligheyt, en de spongieuse Beenderkens van malkander. Ziet de 3. 5. en 6. Fig.

XXXI.

Taf.

3. Figuur.

De vier eerste Beenderen van 't opperste Kaak-been worden t'samen gevoegt door 2 naden, en niet door 3 gelijkheyt: want zo men die Beenderen nauwkeurig van malkander scheyd, ziet men datze wederzyds meest in een gevoegt zijn door kleyne tandekens, waarom die Beenderen door Naden t'samen gevoegt zijn.

Onderste
Kaak-
been.

De Beenderen van 't opperste Kaak-been beschreven zijnde, komen we tot 't onderste. Onder alle de Dieren is de Mensch alleen, die 't onderste Kaak-been kleyn en kort heeft, na de groote van zijn Lighaam, zijnde van gedaante mede half rondagrig, waar in de schoonheyt van 't Aangezicht bestaat: maar in andere Dieren, die geen handen hebben, en hun voedsel met den mond van d'Aarde rapen, is 't van voren lang-uytstekende: in d'Apen is 't kort, om dat ze zig eenigfints van de handen bedienen.

In Kinderen ziet men dit Been in 't midden van de Kin langen tijd door een Kraak-been in twee gescheyden, 't welk daar na allengskens in Been verandert, en een Been uytmaakt p q.

XXX. Taf.

1. Figuur.

'T is van gedaante als de Letter U: men ziet aan

1 Os sphenoides. 2 Sutura. 3 Harmonia.

der

den bovensten omtrek, verscheyde diepe kaskens, in welke de onderste Tandén leggen.

Den onderste omtrek van dit Been, word de grond genaamd, en 't middenste de Kin, daar dit Been breed en dik is: 't heeft een uyt-en inwendigen boord: van buyten, en voornamelyk van binnen in 't midden van de Kin is 't wat oneffen, door een kleyn ongelijk uytsteeksel, tot beter inplanting der Spieren: de uyteinden van den grond worden de hoeken geheeten, daar dit Been platagtig is, welke eyn-digt met twee uytsteeksels, welker voorste n scherp is, en in 't Latyn *Corona* genaamt word: in dit uytsteeksel word de Pees van de Slaap-spier ingeplant, waarom d'uytleeding van 't onderste Kaak-been zeer gevaarlijk is, zo 't niet haast hersteld word.

Het agterste uytsteeksel o is wat langer, en eyn-digt met een langwerpig plat hoofdeken, dat met Kraak-been bekleed is, en word ingeleed aan elke zyde met 't Slaap-been, niet in een holligheyt, gelijk men altijd gemeent heeft, maar even voor, en buyten dezelve, op een verheventheyt, gelijk aldereerst getoont is door den Heer *Rau*, tusschen welke geleding een kleyn plat Kraak-been gevonden word, om dat 't onderste Kaak-been lighter zig zou bewegen, zo na onderen, na boven, als na de zvdén, waar door 't knauwen en spreken beter geschied. En dient die holligheyt in 't Slaap-been aan elke zyde, tot plaatsing van zekere vliezige zakjes, die een slymig vogt in zig behouden, en in de geleding storten, tot beter beweging van 't onderste Kaak-been. Men ziet in 't hoofd van een wild-Verken, dat de geleding van 't onderste Kaak-been niet geschied in een holligheyt van 't Slaap-been; maar even voor de zelve op een verheventheyt, gelijk ik heb gezien by den Heer *Bleyswyk* Lector van d'Ontleeding, en Heel-konst te Delft.

Van binnen onder de voorgemelte uytsteeksels, heeft dit Been twee gaten, een aan elke zyde p, welke grooter zijn als die van buyten ontrent de Kin q gezien worden: door de binnenste loopt een tak van de

agterste Zenuw van 't vyfde paar, een Ader, en Slag-ader, komende van d'uytwendige Krop-Ader, en Slag-ader; en die gaan na d'onderste Tand; befloten in een gemeen Vlies, en deze alle in een bijzonder beenig Kanaal, dat loopt onder de kaskens der Maal-Tanden, na voren, boven 't onderste, en spongicus deel van dat Been: eenige takken van die vaten komen uyt door twee kleynere gaten ontrent de Kin, en verspreyden zig in de Huyd, en Spieren der onderste Lip.

De Kaakbeenderen dienen tot steunsel van 't grootste deel des Aangezigts; en ook om de Tandent'ontfangen, en door de werking der Spieren van 't onderste Kaak-been, de onderste tegen de bovenste aan te brengen, mede om de lugt op een zekere manier te bewegen, tot het maken der verscheide stemmen.

Ik heb gezien in een Bekkeneel, dat 't agterste uytsteeksel van 't onderste Kaak-been aan een zyde vast gegroeft was aan 't Slaap-been, zo dat de Kraak-beenderen op die plaats in Been verandert waren.

In 't Jaar 1714 quam een Dogter van 17 Jaren by my, die 't onderste Kaak-been, door te wyd te gapen aan beyde zyden, voorwaards uytgeleed had; ze kon niet spreken, den mond niet toe doen, en niet zwelgen. Ik heb 't aanstonts hersteld, als men zien kan in 't IV. Hoofdstuk, II. deel, van de voornaamste Handwerken der Heelkonst.

HET VII. HOOFDSTUK.

Van de Tand.

DE dagelijksche ondervinding leert dat de Kinderen gemeenlijk zonder Tandent'ontfangen. De reden is, dat ze die niet noodig hebben: want dewyl de Vrucht in 's Moeders Lichaam niets, als vloeybaar voedsel krijgt, en geboren zijnde de Maag

Eerste reden, waarom de Kinderen

Maag onbequaam is , vaste Spijs te verteeren , zo met geen
kan ze zonder Tanden zijn. Tanden
geboren
worden.

Ten tweeden, zouden ze veel eer schadelijk als nut-
tig geweest zijn , om dat een gebore Kind de Borsten Tweede
reden.
van de Moeder eenige Maanden moettende zuigen , zo
zouden de Tepels daar door gequetst worden.

Ten derden, leggen de Tanden in de Vrugt diep in Derde
reden.
de kaskens der Kaak-beenderen , welke van buyten
zagt , teer , en bekleed zijn met sterke Vliezen , daar
ze uyt moeten komen , gelijk als het Been-vlies , en
’t Vlies , dat van binnen den Mond bekleed , zo dat ze
niet hard genoeg zijn om die Vliesen te door-
booren.

De Tanden komen in de Kinderen vroeger of later:
zommige komen met Tanden ter Wereld: in eenige
komen ze uyt in de 4 , in andere in de 6. 7. 8. 12. of
15 Maand. De twee agterste komen in zommige uyt
op het 30. Jaar , die Tanden van wysheyt genaamt
worden ; en deze zijn noyt zo groot als de andere:
in zommigen , schoon ze tot een hoogen ouderdom
geraken , komen ze noyt te voorschijn ; maar bly-
ven altyt in hun kaskens.

De kaskens in de Kaak-beenderen der Vrugt zijn
van binnen bekleed met een wit , zagt , en slymig
Vlies , waar in men vele Bloed-vaten , en Zenuwen
ziet , als een Net door een gevlogten : en hoe de Tan-
den jonger zijn , hoe dit Vlies zagter is.

Dit Vlies omvangt ’t eerste beginsel der Tanden ;
maar word nergens onafscheydelijk daar mede ver-
eenigt : want van binnen in den omtrek , vloeÿt uyt
de Slag-aderen een wit en dik Vogt als lym , dat
’t eerste beginsel is ; en de gedaante van een Tand
heeft , en dewyl’er gedurig nieuwe stoffe by komt ,
en d’een lage op d’ander legt , zo raken de Tanden
allengskens grooter , tot dat de gansche holligheyt
vervult is.

De eerste stoffe , die gestort word , is altijd har-
der als die volgt , om dat ze meer geperst word als
de laatste , en de grove deeltjes vaster tegen een wer-
den gedrongen , en eenige fijne , die tot het voort-

brengen des Beens min bequaam waren , van de andere affcheyden : want de Tand van een Vrugt uytgenomen zijnde , is hy van buyten t'eenemaal zagt ; maar van binnen hard. Dog het tegendeel verneemt men , als de Tandenuytgekomen zijn : want dan zijn ze uytwendig harder , als inwendig , 't welk door 't aanraken van de uytwendige lugt , en hun tegenmal-kander vryving ontstaat.

Men ziet hier uyt , dat de voeding der Tand en (terwijl de Vrugt nog in de Moeder is) op een andere manier geschied , als die der andere Beenderen.

De stoffe allengskens beenig wordende , maakt de Tand en , en die Beenwerding geschied in nieuwgebo-re Kinderen eer in de Sny - , dan in de Hondst-and en , en eindelijk in eenige der agterste Maal-Tand en , welke gedurig vergrootende , eyndelijk 't Vlies , waar in ze besloten zijn , en de andere beletselen , doorbo-ren ; zo dat dit Vlies inkrimpt , na dat 't opperste deel der Tand en t'eenemaal verhard is.

Dit Vlies zig meer en meer aan de kaskens der Kaak-beenderen vast makende , zo worden de Tand en hier door zeer vast gebonden : 't andere deel van den Tand , dat in de kaskens der Kaak-beenderen gedoken is , blyft eenigen tyd zagt , en sterk gedrukt zynde tusschen de Vingeren , komt'er Bloed uyt , als men ziet aan 't dikste eynde der pluymen in de vleugels van jonge Vogelen , tot dat de Tand en meer en meer aangroeiende , het allengskens verhard.

D'eerste Tand en , die in de Kinderen moeten uytvallen , hebben geen wortelen , om dat de tweede , die in 't vervolg moeten uytkomen , desselfs plaats beslaan : want zo zy'er hadden , zoudenze niet ligt uytvallen , om plaats voor de tweede te maken : en de tweede moetende uytkomen , zouden tegen d'eerste steken. Daarom als men ziet , dat een tweede Tand wil uytkomen , eer d'eerste uyt gevallen is , moet men d'eerste , die gemeenlijk Melk-Tand en genaamt worden , uyttrekken , om een vrien uytgang aan de tweede te geven , 't gene niet wel kan geschieden,

den , zo ze wortelen hadden : want dan zou 't gevaarlijk wezen die uyt te trekken , om de zwakheyt des Kinds , en de zagtheyt van 't Kaak-been , dat men zou kunnen breken.

De Tanden komen niet te gelijk uyt ; maar de een agter de andere , binnen twee jaren : want gelijk de Tanden in 't uytkomen zeer groote pijn , en andere zware toevallen veroorzaken , zo komt de een na de andere , of 't hoogften twee uyt : want zo ze alle uytquamen , zouden de Kinderen de pijn , en andere toevallen niet kunnen wederstaan , zonder ziek te zijn , of te ſterven.

De Sny-Tanden komen in het Kaak-been eerst uyt.

Daar na volgen twee Maal-Tanden , en dan de Hond-Tanden , die uytkomende , zeer groote pijn , en andere zware ongemakken baren.

Als de Kinderen twintig Tanden hebben , tien van boven , en zo veel van onderen , ſchynt het datze 'er geen meer moeten krygen , om dat de omtrek van 't onderſte , en opperſte Kaak-been in den Mond vol is , en zy hebben 'er gemeenlijk niet meer tot het derde , of vierde jaar.

Zo de Kinderen maar twintig Tanden hebben in beyde de Kaak-beenderen , waar zijn dan d'agt , of twaalf andere , die daar na uytkomen ? De vier of zes Tanden van 't opperſte Kaak-been zitten op 't agterſte deel onder 't Juk-been , en de vier of zes van 't onderſte zitten agter digt ontrent 't ſpits uytſteekſel , daar ze niet grooter als een ſtip zijn.

Die Tanden zyn voortgebragt op den zelven tyd als d'andere , maar blyven kleynder , en komen zo haalt niet uyt , om dat de Kaak-beenderen nog kleyen zijn. Zo dan de agt , of twaalf andere , komen noyt uyt , als na het vierde jaar , dat is omtrent 't vyfde , zesde , of zevende jaar , als de Kaak-beenderen grooter geworden zijn ; en deze laafte Tanden blyven altyd in hun plaats , ten zy die door eenig toeval uytvallen , of uytgetrokken worden , en komen geen andere in de plaats , als zelden ; in tegendeel de twin-

tig eerste, of de meeste van die vallen gemeenlijk uyt, en daar komen andere in de plaats.

Daarom zijn onder d'eerste, in de Kaak-beenderen van de Vrucht, twintig Tandén gemaakt. Deze tweede Tandén zijn gescheyden van d'eerste door een Vlies van de zelve natuur, als dat het eerste omwind, en waar door voedsel tot beyde gebragt word: die Tandén allengskens groeiende, en verhardende, als ze uytkomen, steken d'andere, die meermaals eerst beginnen te waggelen en uytgetrokken moeten worden uyt hun plaats, ja doen ze uytvallen.

Vernieuwing der Tandén.

Deze vernieuwing der Tandén geschied gemeenlijk eens in 't leven, en dat omtrent 't zevende, of agtste jaar, zelden op een anderen tijd, of meerder, hoewel ze zomtijds niet alle twintig uytvallen.

De reden, dat d'eerste Tandén uytvallen, is, om dat ze van d'andere voortgestooten worden, en de kaskens der Kaak-beenderen meer groeijen, of zig verwyden, als dat de Tandén om hun vastigheyt kunnen vergroot worden, waarom ze niet vast staan, en waggelen: zo dat de volgende Tandén breeder zijn, waar door de kaskens beter gevult worden: ten zy 't waar is, 't gene Fallopius zegt, dat als een Tand uytvalt, en een ander in de plaats zig opdoet, zo komt hy uyt door een nieuw kasken, en 't eerste word vernietigt.

Maar zo d'eerste Tandén niet uytvallen (welk zelden geschied, of niet haast genoeg) zo komen de tweede zomtyds door nieuwe kaskens uyt. Die van 't bovenste Kaak-been vertoonen zig gemeenlijk van buyten, en die van 't onderste na binnen, als of het een nieuwe rye Tandén ware. Waarom zo haast een tweede Tand zig vertoond om uyt te komen, eer de eerste is uytgevallen, d'eerste uytgetrokken moet worden, op dat de tweede zoude regt, en wel geplaatst zijn.

Bloedvaten en Zenuwen der Tandén.

De Tandén hebben hun Aderen, en Slag-aderen van de uytwendige Krop-aderen, en Slag-aderen; Zenuwen krygen ze van 't vyfde paar der Hersenen, van welke eenige voornamé takken in de

Kaak-

Kaak-beenderen gaande , aan yder Tand een Tak geeven.

In oude Menſchen hebben de Kaak-beenderen Tand- den van verſcheyde groote en gedaante , die alle in de kaskens zo van 't opperſte , als onderſte Kaak- been door een ¹ Spykerwyze t'ſamenvoeging ingehegt zyn , en vaſt gebonden door het Tandvlees , oney- gentlijk zo genaamt, om dat het anders niet is , als 't binnenſte Vlies van den Mond , en eenige vliezige banden : als de Tand- en bejaarden uytvallen , en geen andere in de plaats komen , groeijen de kas- kens zo toe , dat men ze niet meer ziet , en ze wor- den zo hard , dat ze de werking van de Tand- en doen , en zy daar mede kunnen kauwen.

De Tand- en worden verdeelt in *Sny-Tanden* , *Honds-Tanden* en *Maal-Tanden*. Verſchey-
dentheyt
der Tan-
den.
Getal der
Tanden.

Daar zijn gemeenlijk vyftien of zefstien Tand- en in yder Kaak-been , zelden agtien , en noyt minder als veertien. Getal der
Tanden.

Elke Tand beſtaat uyt twee deelen , uyt 't lighaam of breede deel, dat bloot², effen zonder ² Beenvlies is, en buyten 't Tandvlees uytſteekt ; en 't ander is de wortel , gedoken , en in 't kasken van 't Kaak-been vaſt gehegt.

De Heeren van de Koninglijke Academie der We- tenſchappen te *Parys* , zeggen, dat het eerſte een ſtof- fe is geheel verſcheyden van 't Been ; die ze in 't Frans noemen *L'email de la Dent* , of 't *Malicieuſel van den Tand*, welke veel witter , vaſter , gladder en har- der is als de Beenderen , en de lugt kan wederſtaan zonder te bederven ; en beſtaat uyt oneyndige kley- ne draden , die op den wortel van den Tand , (die waarlijk been is) vaſt gehegt zijn. Stofſe der
Tanden.

De vier tanden , die in yder Kaak-been regt van voren in 't midden van d'andere ſtaan , worden ge- naamt *Sny-Tanden* a , om dat ze ſcherp zijn , en de Spijs in ſtukken ſnyden : deze zijn platagtig , van buy- ten wat verheven , en van binnen uytgeholt , zo dik niet als d'andere : zomtijds zijn ze in yder Kaak- Sny-Tan-
den
XXX. Taf.
6. Figuur.

¹ Gomphoſis. ² Periosteum.

been twee , die de plaats vullen van vier andere.

De Honds-
Tanden.

De Honds-Tanden b, staan aan de zijden der Sny-Tanden , tusschen deze en de Maal-Tanden ; zijnde van groote , en gebruyk tusschen de Sny-en Maal-Tanden , en zijn zo plat nog scherp niet als de voorgaande ; maar scherp , en stomp , om de kleyne deelen der Spijs te beter vast te grypen , en van een te scheyden : die in 't opperste Kaak-been staan , worden ook Oog-Tanden genaamt , om dat hun wortels zig naar 't Oog uytstrekken. Eenige meenen , dat 't uyttrekken der bovenste Honds-Tanden schadelijk zou zijn aan 't gezigt ; dan also'er geen byzondere gemeenschap is tusschen 't Oog en die Tandden , zo schynt dat niet te wezen. Maar 't gebeurt zomtijds , dat de wortel van dien Tand met 't Kaak-been vast gegroeyt is , en in 't uyttrekken een stukken van 't Kaak-been volgt.

Hun ge-
tal.

Het getal dezer Tandden is gemeenlijk twee in yder Kaak-been. Eenigen zeggen ; dat'er zomtijds wel drie , en meer gevonden worden.

De Maal-
Tanden.

Aan de Honds-Tanden naar agteren , staan de Maal-Tanden c , zo genaamt om dat ze de Spijs verbreken , als een Molen-steen : deze zijn grooter als de voorgaande , van boven plat , breed , en een weynig ongelijk , en dienen voornamelijk om de Spys , na dat ze eenigfints door de voorgaande Tandden bereyd is , te beter te malen , en in stukken te vryven.

De twee Maal-Tanden , nevens de Honds-Tanden , zijn gemeenlijk minder als d'andere , en hebben zomtijds zodanige overeenkomst met de Honds-Tanden , dat men niet weten kan , onder wat soort die moeten gestelt worden : daar zijn dikwils tien Maal-Tanden in yder Kaak-been : zomtijds meer in 't een als in 't andere , om dat'er nog Tandden in een hooge bejaartheyt , die men Tandden van wysheyt noemt , uytkomen.

De Sny - Tandden hebben een wortel , die van binnen hol , en meermaals regt is : de Honds-Tanden hebben 'er ook een in wat Kaak-been ze
staan

staan : die in 't opperste Kaak-been staan , zijn langer als d'andere : de twee kleynste Maal-Tanden , die nevens de Hondst-Tanden staan , hebben gemeenlijk een wortel ; zomtijds twee , die zo dik niet is , als van de Hondst-Tanden , in welke twee holligheden zijn , en in de Hondst-Tanden maar een : ook hebben die Tanden aan elke zijde een kleine groeve : de opperste der volgende Maal - Tanden hebben drie wortelen , (die meermaals op 't eynde krom zijn , of wyd van malkander staan , waar door ze vaster in 't Kaak-been gehegt worden) om dat ze door hun zwaarte na beneden zig voegen , en d'onderste hebben'er twee , om dat ze van 't Kaak-been ondersteunt zijn : zo dat die gemeenlijk een wortel minder hebben , als d'opperste , en zo d'opperste vier wortelen hebben , hebben de onderste 'er drie , dog zelden vier.

Vorders zijn de wortelen der Tanden van binnen hol , tot doorgang van een Ader , Slag-ader , en Zenuw , in een zeer dun Vlies omwonden , waar door 't voedsel , en gevoel tot de Tanden gebragt word , waarom zomtijds Bloed uyt de holle en bedorve Tanden komt ; als men iet hards daar in steekt , volgt zomtijds naar een uytgetrokken Tand bloedstorting.

De holligheden in de wortelen der Tanden , zijn aan 't eynde zeer kleyn ; maar in de grootste Tanden naar 't breede deel of 't lighaam van den Tand , wordenze allengskens grooter , en eyndigen in een grooter holligheyt in 't zelve. Zomtijds (maar alleen in bejaarden) is de holligheyt aan 't eynde van den Wortel toegegroeit , zo dat , schoon hy bederft , de lijder geen pijn gevoelt , om dat de Zenuw , die in den wortel gaat , roegedrukt is ; waar door hem alle gemeenschap met den oorspronk der Zenuw benomen word , en dies alle gevoel. En als de bloedvaten roegedrukt zijn , zo dat geen voedsel meer gebragt word tot de Tanden in d'oude Luyden , moeten ze uytvallen.

De wortel vanden Tand , die waarlijk Been is , groeyt
in

in bejaarden of die volgroeyt zijn, niet meer als de andere Beenderen : want de Tand en van een oud Man uyt 't kasken getrokken , zijn niet langer , als van een Man van middelmatige jaaren , zo dat 't geene men zegt , dat de Tand en altijd groeijen , alleen moet verstaan worden van 't breede deel , te weten 't Lighaam , of 't Malieerfel van den Tand , 't welk altyd aangroeyt gelijk de Nagelen.

Dit ziet men in bejaarden , als ergens een Tand uyt is : want de tegen overstaande word langer als d'andere , om dat hy onder 't knauwen geen tegenstand vindende , zo veel als de andere niet verslyt : want het breede deel of 't lighaam van den Tand verslyt onder 't knauwen gedurig door 't tegen malkander vryven , waar door de Tand en even groot blyven.

Men heeft in zommige Menschen gezien , dat al de Tand en uyt een stuk waren : in andere , dat drie of vier Maal-Tanden aan een gegroeyt waren , en een stuk uytmaakten.

In eenige heeft men een dobbel rye Tand en gezien : in andere zijn een of meer Tand en boven het getal , die meer , of min na buyten uytsteken , en groote mismaaktheyt veroorzaken , welke afgevylt , of uytgetrokken moeten worden.

Zomtijds zijn de wortels der Tand en vast gegroeyt aande kasken , waar op in 't uyttrekken , een stuk van 't Kaak-been en bloedstorting volgt. En zo dit voorvalt aan de bovenste Maal-Tanden , gebeurt het wel , dat 't kasken niet toe groeyt , maar open blyft , en dan kan men met een Priem steken in de holligheyt van 't Kaak-been tot onder aan 't Oog. Op de holligheyt van 't Kaak-been heeft *Higmore* de volgende aanmerking. Zeker Mevrouw vele jaren overvallen met zinking op de Tand en , die meest bedorven uytgetrokken zijn : egter bleef de pijn , tot dat ze eyndelyk den linker Hondst-Tand uyttrekken de , het kasken mede volgde , zo dat'er een doorgang was tot in de holligheyt van 't Kaak-been , uyt welke nog gedurig vlogt vloeyde , en willende den oorspronk daar van onderzoeken , heeft een Zilveren Priem

Priem gestoken in de holligheyt van den uytgetrokken Tand, die ingong tot aan 't Oog; verwonderd zijnde, heeft ze een kleyne Pen genomen, de Pluymen afgedaan, en in de holligheyt gedrongen, ontrent de lengte van een palm; hier door verschrikt zijnde, meende dat ze tot in de Herffenen gong, waar over ze mijn raad verzogt, en al d'omstandigheden onderzocht hebbende, vond ik, na dat de Pen was ingegaan, dat ze zig in de holligheyt had gekronkelt gelijk een slange-trek. En haar getoont hebbende de gedaante van de holligheyt, is gerust geweest, en heeft naderhand gemelde uytvloeying met gedult verdragen.

De wortelen der Maal-Tanden, die aan 't eynde gekromt zijn, of wijd van malkander staan, zijn gevaarlijk om uyt te trekken.

Daar zijn Maal-Tanden, die drie wortelen hebben, welke zo wel t'samen geplakt zijn, dat ze maar een wortel maken; die Tanden zijn ligt om uyt te trekken.

De *Prins van Arenberg* bewaard een Tand van een jongman, waar in twee aderen Goud zijn, zo dik als een spelde.

In die, welker Tanden digt by malkander staan, gaat de bederving ligt over van den eenen Tand tot den anderen, en die konnen zo wel niet gezuuyvert worden, als die verder van een staan.

Men heeft dikwils ondervonden, dat de Tanden door een inwendige oorzaak los worden, en van zelf vast raken.

Het gebeurt zomtijds, dat de Tanden zwart, en in 't vervolg, door goed voedsel weder wit worden.

Als men een Tand uyt trekt in een Kind, daar geen andere in de plaats moet komen, groeijen de Tanden allengskens by malkander, zo dat'er geen Tand schynt t'ontbreken, 't gene niet geschied in bejaarden, om dat 't Kaak-been hard geworden is, en 't kasken groeyt toe, ten ware een deel van 't kasken der bovenste Maal-Tanden mede volgde, zo dat'er een doorgang was tot in de groote holligheyt van 't Kaak-been.

De

De eygen stoffe der Tanden is ongevoelig; maar zo men ze aanmerkt, als een t'saamstelling van Been, Aderen, Slag-aderen, Zenuwen, en Vliezen; die ze omringen, zijn ze zeer gevoelig.

Dat een Tand ongevoelig is; blijkt als men die vylt, om dat de Zenuw; en andere deelen; waar door hy gevoelt, tot aan 't uyteinde niet komen.





De Tanden dienen eerst om de Spijs te verbreken; en te malen. Ten tweeden tot cieraad van den Mond. Ten derden tot making van de Stem, welke twee laatste diensten door de voorste Tanden geschieden.

Verrotting der Tanden. De verrotting der Tanden van 't onderste Kaak-been is zomtijds oorzaak, dat het bederft, waar op pijn, ontsteking, en zweering ontstaan, die van buyten doorbrekende, een pijp-zweer veroorzaakt; en niet kan genezen worden, ten zy men de bedorve Tand uyttrekt, en de bederving van 't Kaak-been, en andere toevallen wegneme, die de genezing beletten: als een Tand t'eenemaal buyten zijn kassen geweken is, kan hy daar in niet meer vast groeijen.

Hard gezwel aan 't onderste Kaak-been. Zomtijds onstaat aan 't onderste Kaak-been een hard gezwel, dat men met verteerende middelen niet zal genezen, ten zy men eerst de bedorve Tand uyt trekke.

Zeven soorten van Operatien op de Tanden. Op de Tanden worden gedaan zeven soorten van Operatien. De eerste is de Tanden te openen, of van malkanderen te doen wyken, als ze te sterk gesloten zyn. De tweede is, schoon te maken, als ze vuyl zijn. De derde is, te beletten, dat ze niet bederven. De vierde is, de gaten te stoppen, die'er ingekomen zijn. De vyfde is, te vylen, als ze te lang, en ongelijk zijn. De zesde is, uyt te trekken, als ze bedorven zijn, en de zevenste is, konstige in plaats van de natuurlijke te stellen. Onder de de Beenderen van 't Hoofd, mag gesteld worden het Tonge-been. Maar alzo d'Ontleeding der Tonge vereyft, dat het Tonge-been daar nevens word beschreven, zo is dit gedaan in 't XVII. Hoofdstuk der voorgaande Verhandeling.





U Y T L E G G I N G

der

F I G U R E N ,

van de

XXX. T A F E L.

In welke aangewezen worden de Beenderen
des Hoofds.

*De 1. Figuur vertoont
de Beenderen des Hoofds
op de zyde.*

A Het Voorhoofds-
been.

C Het Agterhoofds-
been.

H Het Tepel - wyze
uytsteekfel.

E Het Slaap-been.

a De Kroon-naad.

b De Pijl-naad.

c De Hoek-naad.

d De Schub-naad.

e Een gat, en zomtyds
een groeve in den
bovensten boord van
't Oog-hol , waar
door een Zenuw gaat.

f g De uytsteekfels

van 't Voorhoofds-
been.

h Het eerste paar Been-
deren van 't opperste
Kaak-been , maken-
de 't opperste van den
Neus.

i Het Nagel-been.

k Het tweede Been
van 't opperste Kaak-
been of Wange-been.

l Het derde Been van
't opperste Kaak-been,
dat het grootste is.

m De Tanden.

n Het voorste uyt-
steekfel van 't opper-
ste Kaak-been.

o Het agterste uyt-
steekfel.

C c

p q Het

p q Het onderste
Kaak-been.

p De plaats , langs
welke de Zenuw in-
gaat.

q Het gat, door welk
zy uytkomt.

r Een ander gat , door
welk een Zenuw uyt-
komt.

*De 2. Figuur vertoont
het Bekkeneel van ag-
teren.*

B C D b c Het zel-
ve van de eerste Fi-
guur.

d Het Driehoekig-been.

*De 3. Figuur vertoont
het Bekkeneel van een
voldragen Vrugt van
voren.*

a a De Pijl-naad tot
den Neus loopende.

b b De Kroon-naad.

c De opening de Fon-
teyn genaamt.

*De 4. Figuur vertoont het
Bekkeneel op de kruyn.*

A Het Agterhoofds-
been.

B Het gat , door welk
't verlangde Herffen-
merg nederdaalt naar
de Rug-graat.

C Het onderste deel
van 't Slaap-been.

D Het Wigge-been.

E De Beenderen van
't Verhemelte.

F Het Juk-been.

a a De uytsteekfels
van 't Agter-hoofds-
been in 't eerste Wer-
velbeen des hals ont-
fangen.

b b Twee kleyne hol-
ligheden.

c c Tepelwyze uyt-
steekfels der Slaap-
beenderen.

d d Gaten voor de zy-
delijke Sinus van 't
dikke Herffen-vlies.

e e De Gehoor-we-
gen.

f f Holligheden, waar
in men gemeent heeft
(maar qualijk) dat 't
onderste Kaak-been
ingeleed was.

g g Priem-wyze uyt-
steekfels.

h h Uytsteekfels der
Slaap-beenderen , die
't Juk-been maken.

i Een gat , door welk
de Krop-flag-ader in
't Bekkeneel gaat , en
de

de tuffchen-ribbige Zenuw uytgaat.

k k De Vleugel-wyze uytsteekfels van 't Wigge-been.

l Den Ongepaarden ploeg, of 't negende Been van 't opperfte Kaak-been.

m Een holligheyt, waar van gefproken is in de befchrijving van 't derde Been des opperfte Kaak-beens.

n De Tanden.

o Een gat, waar door de agterfte Zenuw van 't vyfde paar der Herffenen uyt gaat.

p Een gat, door welk de Krop-flag-ader in de Herffenen gaat.

q Een kleyn Beenig knoopjen van 't Agterhoofds-been, in allen niet gevonden.

De 5. Figuur vertoont 't onderfte en binnenfte van 't Bekkeneel.

A Het onderfte deel van 't Agterhoofds-been, ontrent het groote gat, alwaar een weynig ter zy-

den, het zeer dun, en doorzigtig is.

B Het eynde van 't Agterhoofds-been, daar 't met 't Wigge-been is vast gegroeyt.

C Het voorfte deel van 't Wigge-been.

D Het Vleugel-wyze uytsteekfel.

E Het Zeef-been.

a Een groote holligheyt van 't Agterhoofds-been, waar in de kleyne Herffenen leggen.

b Het verheve deel van dit Been, waar onder gevonden worden twee groote holligheden tot plaatzing der loben van de groote Herffenen, en een kleynder holligheyt of groeve, waar op pafte een deel der opperfte langwerpige Sinus van 't dikke Herffen-vlies.

c Den boord van 't doorgezaagde Agterhoofds-been, in welker midden het Ta-

- felfcheydsfel gezien word.
- d d Twee groeven van 't Agterhoofds-been, op welke paffen de zydelijke Sinus van 't dikke Herffen-vlies.
- e Het gat, waar door de zydelijke Sinus gaan van 't dikke Herffen-vlies, en eyn-digen in de inwendige Krop-aderen.
- f Het Steen-been, zijnde een uytsteekfel van 't Slaap-been, waar in de voornaamfte werktuygen van 't gehoor zijn.
- g Een gat in dat uytsteekfel, waar door de gehoor-Zenuw ingaat.
- h Een gat, door welk een tak van de inwendige Krop-flag-ader naar 't dikke Herffen-vlies gaat, en waar door een Ader uytgaat, die zig ontlaft in de inwendige Krop-ader.
- i Een gat, waar door de agterfte Zenuw van 't vyfde paar der Herffenen uytgaat.
- k Een gat nevens de turkse Zadel, door welk d'inwendige Krop-flag-ader na de Herffenen komt.
- l Een holligheyt of turkse Zadel, waar in de Slym-klier legt.
- m De Spleet, door welke de beweeg-Zenuwen gaan van 't Oog.
- a Een gat, door welk een tak gaat van 't vyfde paar Zenuwen der Herffenen.
- n n Kleyne uytsteekfels digt by de Zadel.
- o o Gaten voor de gezigt-Zenuwen.
- p Openingen der twee holligheden van 't Voorhoofds-been boven den Neus.
- r Het uytsteekfel in 't midden van 't Zeef-been de *Hanekam* genaamt.

De 6. Figuur vertoont eeni-



<p><i>eenige Tanden , op dat men de wortels zou zien.</i></p> <p>a Een der Sny-Tanden.</p> <p>b Een der Hond-</p>	<p>Tanden.</p> <p>c d e f Verscheyde Maal-Tanden , van welke eenige twee , en andere drie wortels hebben.</p>
---	---

U Y T L E G G I N G

der

F I G U R E N ,

van de

XXXI. T A F E L.

In welke eenige Beenderen vertoont worden in grooter gedaante , voornamelijk 't Wigge-been , en Zeef-been , op dat men 't gene daar in byzonders aan te merken is , klaarder zou zien ; de 1. 2. 3. en 4. Figuur zijn de helft minder als natuurlijk : en andere in haar natuurlijke grootte.

De 1. Figuur vertoont het Wigge-been omgekeert , en van buyten te zien.

A B Het agterste deel van 't Wigge-been.

A Deszelfs Lighaam ,

waar het met 't Agterhoofds-been vast gegroeyt is.

B B Twee uytsteekfels , die tegen 't Steen-been aanpallen.

C c 3

CC

C C Uytsteekfels gelijkende de vleugelen van een Vleermuys.

D De agterfte Beenderen van 't Verhemelte, of vierde paar van 't opperste Kaakbeen.

E E Voorfte zydelijke uytsteekfels Vleugel-wyze genaamt.

a a Kleyne uytsteekfels, van welke de Wigge-beens Keelspijeren schynen haar oorspronk te nemen.

b b Uytsteekfels, van welke de Spijeren van 't Lelleken komen.

De 2. Figuur vertoont het zelve Been van binnen.

A B E De zelve dingen, gelijk in de eerste Figuur, van buyten.

C D Den boord, waar door dit Been met 't Zeef-en Voorhoofdsbeen t'samen gevoegt word.

a De turkse Zadel.

b b De voorfte en

grootste uytsteekfels omtrent de Zadel.

c c De agterfte en kleynste.

1. 2. 3. 4. 5. Gaten voor de Zenuwen &c. welker laatste, om dat 't Been niet wel geplaatst, en kleyn is, niet klaar kan gezien worden.

De 3. Figuur vertoont het voorfte deel des Bekkeneels, volgens de lengte van den Neus, nevens het scheydsel doorgezaagt.

A A Het derde paar Beenderen van 't opperste Kaak-been met zijn Tand.

h Het agterfte deel van 't Verhemelte, of vierde paar.

B B De Beenderen van den Neus, of eerste paar.

C C Een deel van 't Voorhoofds-been.

D D Een deel van 't Agterhoofds-been, daar het aan 't Wigge-been gegroeyt is.

E E De voorfte zydelijke

lijke uytsteekfels, hier ten deele ver-
toont van 't Wigge-
been.

h Een deel van 't der-
de, en vierde Been
des opperste Kaak-
beens, die 't Verhe-
melte maken, F be-
hoort tot 't grootste,
en h tot 't kleynste.
De drie volgende din-
gen worden gezien
op de regter zyde.

G De Ongepaarde
ploeg of Os Vomer.

H De Hanekam.

I Het Kraakbeenig
deel van 't schot van
den Neus.

De vier volgende din-
gen worden gezien
aan de linker zyde.

a De doorgang van
de Neus-gaten agter
na de Keel.

b Het onderste spon-
gieus Beenderken.

c Het opperste spon-
gieus Beenderken.

d d Zijn hollighe-
den.

e e De holligheden in
't Wigge-been.

f f De holligheden
van 't Voorhoofds-
been.

g Een Priemken ge-
steken in 't Neus-
kanaal, 't welk uyt-
komt in de hollig-
heyt van den Neus,
onder 't onderste
spongieus Beender-
ken.

*De 4. Figuur vertoont
de putjes van binnen in
de oppervlakte van 't
Voorhoofds-been.*

A A Den voorsten
boord van 't Voor-
hoofds-been.

B Een deel naar de
Neus en Oogen door-
gezaagt.

D Een diep putjen, in
welkers grond de
gaatjes gezien worden,
tot ingang der Bloed-
vaatjes.

E Een minder put-
jen.

F Een ondieper put-
jen.

*De 5. Figuur vertoont den
Ongepaarden ploeg of
Os Vomer uytgeno-
men.*

Cc 4

A Het

A Het breedste deel, waar door het t'samen gevoegt is met 't Wigge-been.

B Het onderste deel, door 't welk t'samen gevoegt word met het derde, en vierde Been van 't opperste Kaak-been.

C Zijn voorste deel, waar door 't vast is aan 't Kraak-been van den Neus.

D Zijn agterste deel.

E Een deel afgebroken om deszelfs verdobbeling aan te wyzen.

De 6. Figuur vertoont het breedste deel van den Ongepaarden ploeg of Os Vomer, en een deel van 't Wigge-been, waar mede het t'samen

gevoegt is.

a Kleyne uytsteekfels, die op de putjes b passen.

c Grooter uytsteekfels, die op de putjes d passen.

e Een boog-wys putjen, waar op past 't uytsteekfel f, en in deszelfs midden is een diep gat of putjen g, 't welk 't scherp deel h ontfangt.

*De 7. en 8. Figuur ver-
toont de spongieuze
Beenderkens uytgeno-
men.*

A De zijde, die open is.

B Het voorste uyt-eynde.

C Het agterste uyt-eynde.

HET VIII. HOOFDSTUK.

Van de Rug-graat in 't gemeen.

HET Hoofd of eerste deel van 't Geraamte beschreven zijnde, gaan we over tot den Tronk of tweede deel, volgens de verdeeling te voren gemaakt, in 't IV. Hoofdstuk van deze Verhandeling, die t'samen gestelt is uyt de Rug-graat, Ribben, 't Borst-been, de 1 Sleutel-beenderen, Schouderbladen, en 2 naam-looze Beenderen. Waar uyt de Tronk bestaat.

Het wijde deel onder aan den Hals, word de Borst genaamt, en is bepaalt van agteren met de Wervel-beenderen des Rugs, op de zyden met de Ribben, van voren met 't Borst-been, en van boven met de Sleutel-beenderen.

De Rug-graat, die met 't Hoofd t'samen gevoegt is, en zig uytstrekt van onderen van 't zelve, tot 't onderste van den Tronk, of 3 naam-looze Beenderen, word in 't Latyn *Spina* genaamt, om dat die agter veel uytsteekfels heeft, gelijkende na de Doornen, of Graten: en is van boven tot beneden doorboort, als een Beenig kanaal, waar in 't Rug-merg met zijn Vliezen legt. Naam der Rug-graat.

Het Bekkeneel is van Been, om de Herffenen, met haar Vliezen te behouden, en te bevryden tegen d'uytwendige ongemakken, gelijk de Rug-graat is gemaakt, op dat 't Rug-merg, met zijn Vliezen, daar in besloten, en een volherding van dezelve zijnde, gelijkelyk bevryd zoud worden.

De Rug-graat, waar door 't Lighaam zig verscheydelyk beweegt, word verdeelt in vier deelen, den Hals, den Rug, de Lenden, en 't Heyligbeen: men kan'er 't Steert-been, als een vyfde deel, by doen. 'T zelve bestaat uyt verscheyde Beenderen, Wervel-beenderen, in 't Latyn *Vertebrae*, en in 't Grieks *Spondili*, genaamt. Rug-graat heeft vier deelen.

1 Clavicula 2 Ossa innominata. 3 Ossa innominata.

De Rug - graat is van onderen breed ; en na boven gaande , word ze allengskens smalder , gelijk een Pyramide.

XXXII.
Tafel.
6. en 6.
Figuur.

De Wervel-beenderen bestaan uyt twee deelen: het Lighaam , en de Uytsteekfels. Het Lighaam a , is 't grootste gedeelte , 't welk breed , rondagtig , en van onderen , en van boven plat is , en 't binnenste , of voorste deel der Rug-graat maakt ; zijn opper-vlakte bestaat uyt een dunne plaat , en 't lighaam is van binnen zeer poreus , of spongicus , op dat ze te ligter zouden wezen , en hoe 't lighaam der Wervel-beenderen grooter is , hoe 't ook poreuzer is : 't heeft ook over al veel gaatjes tot doorgang van de Bloed-vaatjes , die 't voedsel brengen.

De Uytsteekfels b , maken 't agterste deel der Rug-graat , en zijn voor yder Wervel-been zeven , behalven 't eerste , daar 't agterste ontbreekt , en 't tweede heeft 'er agt : daar zijn vier schuynse , twee bovenste opklimmende a a , en twee onderste nederdalende b b , twee dwerse aan de zyden c c , en een regte , dat als een doorn , of graat , agter in 't midden uytsteekt b , en zijn uyteynde is met Kraak-been bekleed. Zie de 3. 4. en 5. Figuur van de XXXII. Tafel.

Gaten der
Wervel-
beende-
ren.

Onmiddelyk agter 't lighaam , tusschen dit , en d'uytsteekfels , is in yder Wervel-been een gat , waar in men een middelmatige Vinger kan steken ; zo dat al de Wervel-beenderen , met hun gaten , 't een regt op 't ander gestelt zijnde , een lang Kanaal uyt-maken , waar door 't Rug-merg met zijn Vliezen gaat.

De voorgemelde gaten zijn by na overal van de zelfde groote : want schoon de Wervel-beenderen van onderen aan 't Bekkeneel nederdalende tot 't Heylig-been , gedurig grooter worden , zo worden daarom de gaten of 't kanaal niet grooter : het gat zelve van 't eerste Wervel-been des Hals is niet veel grooter als d'andere , wanneer 't uytsteekfel , of de tand van 't tweede Wervel-been , in zijn plaatsstaat , om dat dit uytsteekfel effen zo veel plaats inneemt ,
als

als noodig is, om de groote van 't gat in dit Wervel-been, met de andere eenigfints gelijk te maken.

Onder deze Wervel-beenderen, noemen eenige de onderfte, die 't Heylig-been uytmaken, onwaare, ^{Onwaare} om dat ze in vele dingen met d'andere, dieze waare Wervel-noemen, niet over een komen, en voornamelijk om ^{Wervel-beenderen.} dat ze in bejaarde onbewegelijk zijn.

De waare Wervel-beenderen zijn gemeenlijk xxiv. ^{Waare} te weten: vii. in de Hals, xii. in den Rug, en v. in ^{Wervel-beenderen, en} de Lenden.

Behalven de fterke Banden, en Vliezen, waar ^{hun getal.} me- de de lighamen der Wervel-beenderen aan malkan- der worden gebonden, en bekleed, zijn ze t'sa- men gevoegt door tweederley ^{Tweeder-} Geleding, een met ^{ley gele-} hun lighaam, en de andere door hun fchuynfe uyt- ^{ding in de} fteekfels. ^{Wervel-beende-}

De t'samenvoeging der lighamen gefchied door ^{beende-} een dik Kraak-been, dat tuffchen dezelve legt, en ^{Door} waar door ze vereenigt zijn; dit Kraak-been is ver- ^{Kraak-} knogt met 't Vlies, 't welk al d'andere Vliezen van ^{beende-} 't Rug-merg omvangt, en is dikker van voren, als ^{ren.} van agteren; maakt door zijn dikte, zagtigheyt, en buygelikheyt; dat de beweging der Rug-graat, beter en ligter kan gefchieden, en belet, dat de ligha- men der Wervel-beenderen, die hard, en vast zyn, in de beweginge der Rug-graat, niet tegen malkan- der vryven en afflyten.

De t'saamen voeging der fchuynfe uytfteekfels ge- fchied door ² onderlinge Ontfanging, mits dat'er ^{Door on-} drie Wervel-beenderen t'samen zijn: want de boven- ^{derlinge} fte fchuynfe uytfteekfels van 't middenfte worden in- ^{Ontfan-} d'ondiepe holligheden der onderfte fchuynfe uytfteek- fels van 't bovenfte ontfangen: en de onderfte fchuyn- fe holligheden van 't middenfte ontfangen de op- perfte fchuynfe uytfteekfels van 't onderfte Wervel- been.

Deze t'samenvoeging der fchuynfe uytfteekfels gefchied dus niet in alle de Wervel-beenderen: men ziet ze maar alleen in de Wervel-beenderen des Hals,

1 Articulatio. 2 Ginglimus.

en de elf bovenste des Rugs: want de bovenste schuynse uytsteekfels van 't twaalfde Wervel-been van den Rug, worden wel in de ondiepe holligheden van de onderste schuynse uytsteekfels van 't elfde Wervel-been ontfangen, gelijk al de boven gelegene; maar de onderste schuynse uytsteekfels van 't twaalfde, in plaats, dat ze d'opperste schuynse uytsteekfels van 't onderste of eerste Wervel-been der Lenden zouden ontfangen, worden in de holligheden der bovenste schuynse uytsteekfels van 't onderste, of eerste Wervel-been der Lenden, ontfangen: zo dat de schuynse uytsteekfels van 't twaalfde Wervel-been des Rugs, zo wel de onderste, als bovenste, vand'andere ontfangen worden: 't welk in geen andere Wervel-beenderen der gantsche Rug-graat geschied: en gelijk men ziet in de Wervel-beenderen des Hals, en Rugs, dat de bovenste schuynse uytsteekfels in de onderste ontfangen worden, zo bevind men het tegendeel in de Wervel-beenderen der Lenden, daar men ziet, dat de onderste schuynse uytsteekfels in d'opperste ontfangen worden.

Deze t'samenvoeging der schuynse uytsteekfels van de Wervel-beenderen, is een dobbele 1 ondiepe geleiding, behorende tot de tweede soort van 2 onderlinge ontfanging, en schoon de voornaamste beweging der onderlinge ontfanging de buyging, en de uytstrekking is; zo kan de Rug-graat op zijde bewogen worden, om dat de hoofden zo plat, en de holligheden zo ondiep zijn, en het een 3 losse geleiding is. Hoewel de beweging der Rug-graat zeer groot is, zo is nogtans de beweging van yder Wervel-been in 't byzonder zeer kleyn; maar, daar de Kraak-beenderen dikst, de doornagtige Uytsteekfels regter, stomper, en verder van malkander staan, daar is ook de beweging in dat deel der Rug-graat grooter, gelijk men ziet in de Lenden.

Uyt de t'samenvoeging der Wervel-beenderen ontstaan veel gaten op beyde zyden van de Rug-graat, waar door de Zenuwen van 't Rug-merg komen, en

Gaten
voor de
Zenuwen.

1 Anthrodia. 2 Ginglymus. 3 Diarthrosis.

eenige

eenige Bloed-vaten in gaan tot voedsel van 't Rug-merg: de groeven, die deze gaten maken in de Wervel-beenderen des Hals, zijn zo veel in 't onderste, als bovenste deel uytgesneden: dog tusschen 't eerste, en tweede Wervel-been zijn geen gaten, om dat de Zenuwen aldaar niet uytkomen, maar in de Wervel-beenderen des Rugs en der Lenden, is de groeve grooter, en by na geheel in 't onderste deel.

Zo men de Rug-graat van voren of van agteren ^{Gedaante} bezielt, is ze regt van gedaante, maar aan de een of ^{der Rug-} de andere zijde beschouwt zijnde, wykt ze na bin- ^{graat.} nen, en na buyten; maar in 't opstellen van een Geraamte, is 't niet mogelijk dit na te volgen: daarom moet ze in een dood Lighaam gezien worden; als de andere deelen, die 't beletten, weg genomen zijn: want van 't eerste Wervel-been des Hals, tot 't zevende, wykt ze wat na binnen tot beter steunfel van 't Hoofd: en van 't eerste van den Rug, tot 't twaalfde, wykt ze wat na buyten, waar door de holligheyt der Borst vermeerderd word, en ruymere plaats is voor 't Hart en Longen; maar van 't eerste der Lenden tot 't vyfde, wykt ze wat na binnen, om een tegen-gewigt te maken met 't opperste van 't Lighaam. Het Heylig-been, 't voornaamste steunfel der Rug-graat, wykt na buyten, om de holligheyt, het *Bekken* genaamt, te vergrooten, voor de uytzetting van de Blaas, en voornaamelijk in Vrouwen, ten tyde der bevrugting.

M. Poupart, Lid van de Koninglijke Academie der Wetenschappen te Parys, een Mensch geopend hebbende van 100 jaren, bevond dat de negen onderste Wervel-beenderen van den Rug, niet meer dan een Been maakten, om dat de Kraak-beenderen tusschen de zelve gelegen, t'eenemaal verbeent waren. Maar behalven de gewoonlijke dwerse uytsteekfels, waren 'er nog andere dwerse, van voren aan yder zyde op de Geleding van elk Wervel-been. Die van de regter zyde waren veel grooter, rondagtig, en bedekt met een wit schoon Been, dat nieuwliks gegroeyt was, en daar scheen van dezelve stoffe, even als gesmol-

ten

ten Metaal , tuffchen yder dezer uytsteekfels geloo-
pen te zijn , om ze vaster aan malkander te hegten.
Die van de linker zijde waren veel korter , en gele-
ken na een tepel , die de natuur ook met fchoon wit
Been begon te bedekken , als of ze dien ouden Man
had willen jong maken.

En zo groeyt zomtijds een oude boom weder , en
't verdroogt hout word bekleed met een nieuwe
fchors , die hout-agtig word , en nieuwe takken uyt-
fchiet , die lang leven.

Door een uyt-of inwendige oorzaak wyken de
Wervel-beenderen van den Rug , of Lenden na agter
allengskens uyt , waar door een Bult ontftaat , die
men te vergeefs met uyt-en inwendige middelen tragt
te genezen , zo men de uytwykende Wervel-beende-
ren met een bequaam Werk-tuyg niet allengskens in
hun plaats dryft.

Ik hebbe te *Parys* gezien in het Geraamte van een
Kind , een Bult hebbende , dat de lighamen der
Wervel-beenderen , die de Bult maakten , van vo-
ren , daar de Rug-graat gebogen was , geheel plat
gedrukt waren , en de Kraak-beenderen tuffchen bey-
de waren zeer dun , 't welk in alle Gebulte waar-
fchynelijk zo is.

In oude Luyden , die een Bult hadden , is meer-
maals bevonden , dat verfcheyde Wervel-beenderen
een Been maakten , om dat de tuffchen-gelege-
ne Kraak-beenderen t'eenemaal verbeent waren. Ik
heb gezien by myn Heer *Ruyfch* , zeven of agt Wer-
vel-beenderen van den Rug , die aan malkander vast,
en voorwaarts zo gebogen waren , dat het bovenfte
't onderfte raakte.

In 't Journal des Savans 1693. is een befchryving
van een Tronk van een Geraamte , waarin 't Darm-
been met 't Heylig-been , de vyf Wervel-beenderen
der Lenden , tien van den Rug , en alle de fchuynfe
uytsteekfels met de Ribben , die aan 't lighaam
der Wervel-beenderen , en dwerfe uytsteekfels vast zijn ,

zo aan malkander gegroeyt waren , dat ze een Been maakten.

HET IX. HOOFDSTUK.

Van de Wervel-beenderen des Hals , des Rugs , en der Lenden , of waare Wervel-beenderen.

Gemeenlijk zijn'er zeven Wervel-beenderen in den Hals , in lang-gehalsde wel agt , en dan gemeenlijk maar elf in den Rug , met zo veel Ribben aan elke zyde ; waar door de Borst korter zijnde , de Long niet vry bewogen word : men geloofst , dat zodanigen ligt tot een ¹ Teering vervallen. Die zes Wervel-beenderen hebben , zijn kort van hals , en zo men zegt , ² Geraaktheyt onderworpen.

Het eerste Wervel-been des Hals word *Atlas* genaamt , om dat 't Hoofd daar op gedragen word , en verschilt in gedaante van alle d'andere , om dat zijn lighaam dunder , en gelijk een beenige ring is. Atlas

In zijn bovenste schuynse uytsteekfels , is het een met Kraak-been bekleede ovaal-agtige ondiepe holligheyt , waar in beyde met het Kraak-been bekleede uytsteekfels des Agterhoofds-been van de zelve gedaante , staande nevens 't groote gat , ontfangen worden , waar door 't Hoofd gebogen , en uytgestrekt word : de onderste schuynse zijn breed , platagtig , rond , en wat uytgeholt. D'uytleeding van 't Hoofd met 't eerste Wervel-been des Hals is zeer gevaarlijk , om dat 't Rug-merg gedrukt word : de Kin van den lyder is op de borst , en hy kan niet zwelgen nog spreken , en sterft haast.

Dit Wervel-been heeft geen doornagtig uytsteekfel : want moerende in de half - ronde beweginge van 't Hoofd zig draijen , zou 't de werking der groote reg-

¹ Phthisis.

² Apoplexia.

te Spieren , die van 't doornagtig uytsteekfel des tweede Wervel-beens na 't Agterhoofd gaan , in de uytstrekking van 't Hoofd beschadigt hebben: 't heeft op die plaats een kleyne oneffe verheventheyt , waar aan de kleyne regte Spieren met haar begin vast zijn , gelijk 't ook van voren in 't midden van zijn lighaam heeft.

In 't inwendig , voorste , en middenste deel van zijn lighaam , is een kleyne rond-agtige met Kraak-been bekleede holligheyt , waar in een rond lang uytsteekfel , als een tand , van 't tweede Wervelbeen , met zijn voorste zyde ontfangen word.

Inwendig beneden de voorgemelde ovaalagtige holligheden der schuynse uytsteekfels na voren , zijn twee kleyne verheventheden , (onmiddelijk agter welke een kleyne groeve is) aan welker beyde een by na rondagtig bandeken vast is , zeer konstig gemaakt , gelijk een touwtjen , waar door 't voorgemelde uytsteekfel , als een tand , in zijn plaats gehouden word , op dat het Rug-merg in de beweging van 't Hoofd niet zou gedrukt worden.

Het eerste Wervel-been ontfangt van boven 't Hoofd , en van onderen het tweede Wervel-been , inwendig van voren in 't midden het tandagtig uytsteekfel , en word van geen Beenderen ontfangen.

Onmiddelijk van agteren , een weynig beneden de agterste eynden der bovenste schuynse uytsteekfels , is een groeve , waar by zomtijds een gat is , tot doorgang voor de Wervel-flagader , die na de Herffenen gaat , en voor de Wervel-ader , en het tiende paar der Zenuwen.

Onmiddelijk boven de voorgemelte groeve , eyndigen de agterste eynden der bovenste schuynse uytsteekfels met twee kleyne verheventheden , wat grooter als de voorste , waar door 't , als men 't Hoofd agterwaarts beweegt , verhindert word , dat de voorgemelde vaten niet gedrukt worden.

Het tweede Wervel-been des Hals word *Epistropheus* of drager genaamt , om dat aan 't voorste , en middenste deel van zijn lighaam , een rond lang
uyt-

uytsteekfel is a. 3. en 4. Fig dat eenigfints na een ^{xxxii.} Hond's-Tand gelykende, Tand genaamt word, op ^{Tafel.} welk 't eerste Wervel-been met 't hoofd half rond drayt.

Dit uytsteekfel is van boven aan 't eynde oneffen, in welk een band gehegt is, waar door 't benevens nog een, die beyde d'eerste Wervel-beenderen omringt, t'samen aan 't Agterhoofds-been vast gebonden word. Dit Been na voren uytleadende, maakt een doodelijke Keel-ontsteeking.

Riolanus zegt gezien te hebben in een Krygsman, dat beyde de eerste Wervel-beenderen des Hals aan een gegroeyt waren, en hy in zyn leven de beweging van 't Hoofd zo vry had, als iemand anders; maar als 't eerste Wervel-been aan 't Bekkeneel is vast gegroeyt, zo kan men 't Hoofd niet buygen, nog uytstrekken.

Vorders zyn de Wervel-beenderen des Hals minder, en vaster van maakfel, als die van den Rug, en Lenden; en is 't lighaam der vyf onderste van boven ook wat meer uytgeholt, en verzien met dikke Kraak-beenderen, tot sterker beweging van den Hals; 't lighaam der ses onderste is van voren platter, als die van den Rug, en Lenden, welke voorwaarts, en op de zyden rond uytsteken. Alle de bovenste schuynse uytsteekfels der ses onderste Wervel-beenderen des Hals zyn wat rondagtig, en d'onderste van alle zeven wat uytgeholt.

Alle de dwerse uytsteekfels der Wervel-beenderen des Hals, hebben gemeenlijk gaten tot doorgang der Wervel-ader, en Slag-ader, en zomtjids zijn sommige in twee gescheyden; die van 't eerste steken op de zyden vorder uyt als d'andere: aan de eynden zijn ze alle gespleten, behalven zomtyds een van d'eerste, tot oorspronk, en inplanting der Spieren: van boven zijn ze uytgeholt door een groeve, behalven de twee eerste, en wat na beneden hellende, waar in de Zenuwen uyt 't Rug-merg komende, ontfan-

gen , tegen de hardigheyt der Beenderen bevryd worden.

De doornagtige uytsteekfels der zes onderfte Wervel-beenderen des Hals zijn van onderen uytgeholt , en aan 't eynde gespleten , tot oorspronk , en inplanting der Spieren , behalven 't laatste , dat 't langste is , en is 't tweede dikker , als de andere , en de twee laatste regter uytstekende.

Wervel-
beenderen
van den
Rug.

In den Rug zijn gemeenlijk twaalf Wervel-beenderen 8. 19. zelden elf : in lange Menschen zijn 'er zomtyds dertien , of veertien Wervel-beenderen , en zo veel Ribben aan elke zyde gevonden.

Hun lighaam is grooter als van den Hals , en minder als der Lenden.

De dwerse uytsteekfels zijn veel grooter , zonder groeven , aan 't eynde rondagtig ; geen gaten hebbende , nog gespleten , en wat na boven , en agteren staande.

Aan 't eynde van elk dwers uytsteekfel , is een ondiepe holligheyt , behalven aan de twee laatste , die minder en korter zijn als alle d'andere , ook zomtyds niet aan 't eerste , om dat de Ribben met geen holligheden van die uytsteekfels , door middel van een hoofdeken t'samen gevoegt zijn , gelijk met de andere dwerse uytsteekfels geschied.

De doornagtige uytsteekfels zijn dikker , en langer , als die van den Hals , aan 't eynde niet gespleten , en in 't midden van den Rug meer na beneden hellende , als die van ontrent den Hals , en Lenden , welker drie laatste wat korter , ook regter uytstekende , en aan 't eynde wat stomper zijn , als de agt , die 'er boven staan.

Tulpinus zegt de doornagtige uytsteekfels van den Rug gespleten gezien te hebben.

De ondiepe met Kraak-been bekleede holligheden , met welke de Ribben aan 't lighaam der Wervel-beenderen t'samen gevoegt zijn , worden op de zelfde plaats niet gevonden : die van 't eerste , en de drie laatste Wervel-beenderen , zomtyds maar de twee , worden in yder lighaam alleen gevonden , daar alle

de

de andere holligheden , ten deele aan den onderften , en ten deele aan den opperften kant van 't lighaam der Wervel-beenderen gevonden worden.

Nu volgen de Wervel-beenderen der Lenden , ge- Wervel-
beenderen
der Lenden.
meenlijk vyf, 20. 25. Ik heb gezien , dat'er zes waren , en die van den Hals , en van den Rug als gewoon-
lijk , zijnde 't zefde aan 't Heylig been vast gegroeit , dan zo'er maarelf in den Rug zijn , zijn 'er gemeen-
lijk zes in de Lenden : en zo'er dertien zijn , zijn'er
maar vier in de Lenden.

Deze waare Wervel-beenderen zijn de grootfte der Rug-graat , en hebben tuffchen hun lighamen dikker kraakbeenige banden , als die van den Hals , en van den Rug , waarom de beweging hier ook grooter is , als in de andere deelen der Rug-graat.

De dwerfe uytsteekfels zijn lang , plat , en staan evenwyd van malkanderen , als zo veel kleyne Ribben ; maar die van 't eerfte zijn korter als d'andere : de doornagtige zijn plat en breed , aan 't eynde ftomp , half rondagtig , en staan wyder van malkanderen regt uyt , als in den Hals , of Rug : de opperfte fchuynfe zijn langer , dikker , en ronder , als die van den Hals , en van den Rug , en zo zijn ook de onderfte van 't laaftte Wervel-been des Rugs : de opperfte fchuynfe zijn ook grooter , en dikker , en hebben zichtbare holligheden , door welken ze de onderfte zydelings ontfangen.

Die byzondere t'samenvoeging der fchuynfe uytsteekfels van de Wervel-beenderen der Lenden , die in den Hals , nog Rug niet gezien word , is de reden , waarom de Rug-graat zo fterk op de Lenden na voren , agterwaards , en op de zijden kan bewogen worden ; waar toe niet weynig helpen tot de voorwaarts beweging , de dikke kraakbeenige banden , tuffchen de lighamen van die Wervel-beenderen welke dikker zijn van voren , als van agteren , en tot d'agterwaarts beweging is de groote ruymte , die tuffchen de doornagtige uytsteekfels is , en dar ze niet na boven , nog beneden , maar in 't midden regt uyt fteken.

De Koorde-danfers, die hun Lighaam zo sterk kunnen buygen, zijn het van jongs aan gewent; want dan kan de Rug-graat gelijk een baleyn gebogen worden; om dat de uytsteekfels, en boorden van 't lighaam der Wervel-beenderen, kraak-beenig, en de banden zeer zagt zijn.

Riolanus zegt ondervonden te hebben in twee Koorde-danfers, over de 20 jaren oud, dat de aangroeyfels nog in geen uytsteekfels verandert waren.

Het Rug-merg ontrent 't eerste Wervel-been der Lenden is niet meer zo zagt, als in den Rug, en word van daar nederdalende langer hoe harder, veranderende in vele kleyne draden, gelijk men ziet, als 't in warm water geweekt, van de eene zyde na d'andere gebogen word: want dan gelijkt het niet qualijk een Paarde-steert: die verandering ter plaatse der Lenden geschied mogelijk, om dat het door de sterke beweging niet zou beschadigt worden.

Uyt het maakfel, en t'samenvoeging der Wervel-beenderen, is ligt te zien, dat ze niet volkomen uytleeden kunnen: want een volkome uytleding is, als 't uytgeleede Been, niet meer 't Been raakt, waar mede t'samengevoegt was, en in de uytleding der Wervel-beenderen raken ze nog malkander met 't grootste deel van hun lighaam; zo datze maar volkomen uytleeden met beyde de schuynse uytsteekfels, of met die van een zyde alleen. Ziet wat ik van de uytleding der Wervel-beenderen gezegt heb in mijn Verhandeling, van de voornaamste Handwerken der Heelkonst in 't tweede deel 't IV. Hoofdstuk.

HET X. HOOFDSTUK.

Van de valsche Wervel-beenderen of 't Heylig , en Staart-been.

HET Heylig been is t'samen gestelt uyt eenige andere A B , die valsche Wervel-beenderen genaamt worden , om dat ze in gedaante , en t'samenvoeging , eenige gelijkenis met de waare Wervel-beenderen hebben. In Kinderen zijn ze t'samen gevoegt door Kraak-beenderen ; maar in Bejaarden in Been verandert zijnde , maken een Been ; blijvende tusschen hun lighamen , ter plaatse van de Kraak-beenderen , alleen eenige streepen over , gelijk men in 't Borst-been ziet , die beter in d'inwendige oppervlakte als uytwendig , of van agteren gezien worden.

Heylig been.

XXXII.

Tafel.

7. Figuur.

Dit Been is 't voornaamste steunsel van de Ruggraat , en van al de andere bovenstaande Beenderen , t'samen met de zagte deelen , en d'Armen. Eenigen meenen dat het 't Heyligbeengenaamt word , om dat 't eenigste was , dat ze aan de Goden opofferden.

Het bestaat gemeenlijk uyt vyf , of zes Beenderen , in welke geen beweging is

Hun getal.

'T is driehoekig van gedaante , staande 't breedste deel boven , welk ontstaat , om dat de lighamen dezer Wervel-beenderen in 't midden gelegen , van breeder gedurig smalder worden , gelijk ook doen hun dwerse uytsteekfels : het tegendeel geschied in de waare Wervel-beenderen , die nederdalende gedurig breeder worden.

Zijn gedaante.

En gelijk de valsche Wervel-beenderen in Bejaarden met malkander vereenigt zijn zonder beweging , zo hebben ze ook geen bovenste , nog onderste schuynse uytsteekfels , waar door ze t'samen gevoegt worden , behalven 't eerste en grootste , dat alleen twee bovenste schuynse heeft C C zeer gelijk aan de boven-

XXXIII.

Taf. 4. Fig.

ste schuynse der Lenden-Wervel-beenderen, in welke d'onderste schuynse van 't laatste Wervel-been der Lenden ontfangen werden, en dit Wervel-been, gelijk de boven gelegene, kan bewogen worden.

De binnenste of voorste oppervlakte van 't Heylig been is veel effender als de agterste: de onderste Wervel beenderen van 't Heylig been wyken allengskens inwaarts, tot gemak in 't zitten: zo dat 't gantsche Been van agteren bultig B, en van voren A uytgeholt is.

XXXII.

Tafel.

7. Figuur.

Dit Been is in 't midden, gelijk de andere waare Wervel-beenderen, van boven tot beneden doorboort, tot doorgang van 't Rug-merg; die doorbooring tot 't kanaal nederdalende, word allengskens enger, om dat 't Merg door vele Zenuwen, die in haar voortgang afgaan, allengskens minder, en eyndelijk vernietigt word.

Tot volkomenheyt van 't kanaal ontbreekt van boven iets van 't Been, zo dat op die plaats, daar 't kanaal begint, een holligheyt gezien word, driehoekig, van boven breed, en van onderen spits: van onderen ontbreekt ook iets f, in 't Heylig been meer, als in 't ander: 't geen mogelijk geschied, om dat 't Merg (terwyl dit Been op die plaats zig inwaarts buygt) niet zou gedrukt worden: zomtyds ontbreekt geheel 't agterste deel van 't beenig kanaal, van boven tot beneden.

XXXIII.

Tafel.

4. Figuur.

D'agterste oppervlakte van dit Been is zeer ongelijk door zekere holligheden, en uytsteekfels. De eerste holligheyt g, word onmiddelijk gevonden onder de bovenste schuynse uytsteekfels van 't eerste valsche Wervel-been; de tweede h, is wat laager, en een weynig dieper, in welkers grond verscheyde gaatjes zijn, tot doorgang der bloedvaatjes: de derde is de laagste i, en schynt door een klevne verheventheyt als in twee gescheyden, in welker bovenste een kleyne verheventheyt van 't Darm-been ontfangen word.

Hollighe-
den.

Men ziet ook van agteren aan dit Been regt in 't

i Os ilium.

mid-

midden een foort van zeer kleyne doornagtige uytsteekfels e e, en wat laager aan elke zijde een kleyn neder-, en opgaande uytsteekfel, tusschen welke 't voorgemelte beenig kanaal eyndigt.

Uytsteekfels.

Behalven de holligheden, heeft dit Been nog twee andere ondiepe met eenige kleyne verheventheden, staande aan de zijden de uytgestrekttheyt van drie der bovenste valsche Wervel-beenderen k, daar 't alderbreedste, en dikst is, waar door t'samengevoegt en door een band vast gebonden word met de 1 Darmbeenderen, en 't is om die t'samenvoeging, en om dat 't een Been is, dat 'er geen tusschenheden of gaten op de zyden konden wezen voor de Zenuwen, die uyt 't Rug-merg komen, gelijk uyt de t'samenvoeging der waare Wervel-beenderen ontstaan, zo dat die gaten in dat Been van voren en van agteren moeten wezen.

Het Heylig been heeft van voren, en van agteren aan elke zyde vier gaten a a, die regt op malkander passen, welker voorste de grootste zijn, staande tusschen de lighamen der valsche Wervel-beenderen, en hun dwerse uytsteekfels.

Gaten. XXXIII. Tafel 4. Figuur.

De agt gaten van voren en van agteren hebben gemeenschap met agt andere, vier aan elke zyde, van binnen in de voorgaande, daar de vier paar Zenuwen van 't Rug-merg moeten door komen, eer ze door de buytenste gaten kunnen uytgaan, zo dat die gaten onmiddelijk gemeenschap hebben met 't kanaal, dat dit Been van boven tot beneden doorboort; en de doorgang is van 't Rug-merg, aan welkers eynde f, aan elke zijde, 't vyfde paar Zenuwen b b van 't Heylig been, en 't zesde paar tusschen beyde in 't midden uytkomt.

Het Heylig been dient eerst tot steunsel der waare Wervel-beenderen, ten tweeden, om de 2 Darmbeenderen t'ontfangen, die met de Heup-, en Schaambeenderen het 3 Bekken maken, en ten derden, tot oorspronk, en inplanting van eenige Spieren.

Gebruik.

1 Ossa ilia. 2 Ossa ilia. 3 Pelvis.

D d 4

Zo

Zo de breuken der Beenderen van 't ¹ Bekkeneel gevaarlijk zijn , ten opzigt der Herffenen , en Vliezen , die'er in zijn , zo zijn ook de breuken van 't Heylig been , en waare Wervel-beenderen ; gelijk d'uytleedingen der laatste gevaarlijk zijn , om 't Kugmerg , dat ze in zig met de Vliezen besluyten.

XXXIII.
Tafel.
4- Figuur,

Aan 't onderste en engste deel van 't Heylig been , is vast gehegt het ² Staart-been D , en bestaat uyt drie of vier Beentjes , die van onderen door het Kraak-been vast zijn met een kleyne beweging , waar van 't eerste het grootste , en 't laatste , welkers eynde kraak-beenig is , het kleyinste is : 't is wat inwaarts gebogen , gelijk 't onderste deel van 't Heylig been , tot gemak in 't zitten.

Die Beentjes ondersteunen den Endel-darm , en zijn zo vast niet vereenigt in Vrouwen , en meer uytwaarts gekeert , als in Mannen , zo dat ze in de baring agterwaarts kunnen wyken , waar door de weg wyder word , en de Vrugt beter kan door komen.

Diemerbroek zegt een nieuw geboren Kind gezien te hebben , dat een Staart had , een halve elle lang ; waar in mogelijk meer Beentjes als gewoonlijk waren.

Harveus verhaalt gehoord te hebben van een zijner Vrienden , uyt Oost-Indiën gekomen , dat'er Menschen zijn met Staarten een voet lang.

Bourdon zegt , dat de Vroedwyven in de baring gewoon zijn 't Staart-been zomtijds agterwaarts te steken , met zo een geweld , dat'er groote pijn , en andere quade toevallen uyt ontstaan.

Het Staart-been gebroken , of uytgeleed , moet met den Vinger in den Endel-darm gestoken , na buyten gestooten , en met de andere Hand in zijn plaats gestelt worden.

1 Cranium. 2 Os Coccyx.

HET

HET XI. HOOFDSTUK.

Van 't Borst-been.

HET 't Borst-been ABC, legt van voren in 't **XXXIII.** midden tusschen de zeven bovenste, of waare **Tafel.** Ribben, welkers kraak-beenige deelen onmidde- **1. Figuur** lijk met 't zelve vereenigen. Ziet ook de **XXXII.** Tafel 1. Figuur A. De Borst is in den Mensch van voren plat; maar in anderedieren scherp uytstekende.

Dit Been is niet zo hard als de andere Beenderen; maar van binnen voos, of spongieus.

In Kinderen voor 't zevende jaar bestaat het gemeenlijk uyt agt Beenderen, die door een Kraak-been vast zijn; en na 't zevende jaar zyn'er zelden meer, dan vier of vyf, zo dat het Kraak-been, waar door ze vast zijn, allengskens verbeent, gelijk in veel andere Beenderen geschied, en een Been word; gemeenlijk nalatende twee, drie of meer streepen, ter plaatse van de Kraak-beenderen, gelijk men ook ziet in 't 2 Heylig been.

In een Geraamte, dat ik heb van een Jongman van 21. jaren, zijn drie streepen, en vier Beenderen: het bovenste en grootste A, is meer dan twee dwer- **XXXIII.** se Vingeren breed: het tweede een Vinger, en de **Tafel** twee onderste een weynig meer: op d'eerste streep **1. Figuur** past de tweede Ribbe met haar kraak-beenig deel, de derde, en vierde op de twee andere.

Te Romén in een Meysjen van omtrent zeven jaren, zegt *Valverda* in 't Borst-been elf Beenderen gevonden te hebben.

Het heeft aan zijn bovenste en breedste deel aan elke zijde een holligheyt aa, waar in de dikste eynden der 3 Sleutel-beenderen ontfangen worden: en een ander wat laager bb, voor 't kraak-beenig deel der eerste Ribbe: van boven, inwendig in 't midden,

1 Sternum. 2 Os sacrum. 3 Claviculæ.

D d 5

tuf-

tuffchen beyde de eerfte holligheden c , is 't ook gemeenlijk wat uytgefneeden , tot doorgang der Longe-pijp.

Aan beyde zijden volgens de lengte van 't Borst-been , en van onderen , zijn eenige kleyne ondiepe holligheden , in welke de kraak-beenige deelen der zeven waare Ribben d e e , ontfangen worden.

Aan 't onderfte eynde van 't Borst-been , is een Kraak-been vast gehegt , dat meermaals puntig als een zwaard is a , XXXII. Tafel. 1. Fig. waarom 't ¹ zwaardwyze Kraak-been genaamt word ; maar 't heeft niet altijd die gedaante ; want zomtijds is 't driehoekig , of in twee verdeelt , leggende 't een deel over 't ander , tuffchen welke dan d'inwendige Mam-bloedvaten gaan ; ook wel in twee gefcheyden als een vork D , gelijk in de XXXIII. Tafel 1. Figuur verbeeld word ; 't is gemeenlijk een dwerfe duym lang , zomtijds wel twee , ja vier , gelijk ik in een Mensch gezien heb.

Ook is 'er wel geen , als *Bourdon* zegt gezien te hebben.

Zomtijds is 'er een gat in , waar door de inwendige Mam-vaten gaan , voornamelijk in Vrouwen ; in Mannen komen ze meermaals aan de zijden uyt , en zomtijds gaan ze door een gat van 't Borst-been.

Gebruyk
van 't
Borst-
been.

Het ² Borst-been dient om de zeven waare Ribben , en de Sleutel-beenderen aan elke zijde t'ontfangen , en nevens d'andere deelen de holligheyt der Borst te maken , en de deelen , die'er in befloten zijn , tegen uyerlijke fchade te bevyden , en tot vasthegting van 't ⁴ Middenschot.

In een oud Man zegt *Veslingius* 't ⁵ zwaardwyze Kraak-been beenig gevonden te hebben , en uytgestrekt tot aan den Navel , dat hem zeer moeilijk viel in 't buygen van 't Lighaam.

In 't IV. Hoofdstuk van de III. Verhandeling is gezegt , als 'er etter tuffchen de verdobbeling van 't Middenschot vergadert is , dat men ze door een

1 Cartilago ensiformis. 2 Sternum. 3 Clavicula. 4 Mediastinum. 5 Cartilago ensiformis.

opening in 't Borst-been te maken , zal uytgang geven.

Door een zeker vogt komt 't ' zwaardwyze Kraak-been zomtyds te verflappen , en inwaarts te wyken , waar door de Maag met pijn gedrukt , den honger benomen , en de ingenome spijs weder uytgeworpen word : om het in zijn plaats te brengen , zet eens , of meermaals een looze kop daar op , met een wyden mond , en trekt hem schielijk af , den zelve zolang latende , tot dat den Lijder zijn adem niet vry kan halen.

HET XII. HOOFDSTUK.

Van de Ribben.

DE Ribben zijn gemeenlijk twaalf aan elke zyde , (zelden meer of min) en worden van agteren met de lighamen der twaalf Rugs Wervel-beenderen , en van voren door hun kraak-beenige deelen , voor 't grootste deel met 't Borst-been t'samen gevoegt.

Zomtyds zijn'er maar elf aan elke zyde , of twaalf aan d'eene , en elf aan d'andere zyde : ook wel aan elke zyde dertien.

Riolanus getuygt gevonden te hebben dertien Ribben aan elke zyde , de dertiende vereenigt met de naast gelegen , in 't opstellen des Geraante van *Genoveva Supplice* , een bevrugte Vrouw , die gehangen wierd te *Parys* , en door hem ontleed , niet tegenstaande ze zeyde dat ze zwanger was : en van de Heelmeesters , en Vroedwyven , die 't onderzocht hadden , niet geloofd wierd , om dat ze zo vet was : deze Vrouw had agt Wervel-beenderen in den Hals , welker tweede vast gegroeyt was met 't derde , en hadde vier Wervel-beenderen in de Lenden.

De kraak-beenige deelen der Ribben zijn by na van dezelve gedaante , als de Ribben ; maar zijn alle niet even lang : dat van d'eerste Ribbe is wel

1 *Cartilago ensiformis.*

een

een dwerfe duym lang , van de tweede wat meer , en van de zevende meer dan vier vingeren , en de volgende worden weder korter.

XXXII.
Tafel
1. Figuur.

Hier door vereenigen zig de zeven bovenste Ribben 1. 7. onmiddelijk met het Borst-been , waarom ze *waare* Ribben , en de vyf onderste 8. 12. die zo verre niet raken , *valsche* genaamt worden ; zijnde de kraak-beenige deelen der twee bovenste valsche Ribben voor een groot deel t'samen , en aan 't kraak-beenige deel der zevende waare Ribbe vereenigt , zonder eenige ruymte , of tusschenheyt na te laten , gelijk gezien word in de XXXII. Tafel 1. Figuur , en zomtyds met eenige tusschenheden , als in de XXXIII. Tafel 1. Fig. ff.

De Ribben zijn gekromt als een halve kring , maar de bovenste meer als d'onderste : ook zijn ze alle niet even lang , en breed : d'opperste is kort , platter en breeder , als d'andere : de middenste zijn langer , als de onderste , en de bovenste : de onderste hebben by na de zelve lengte , als de bovenste : maar de laatste is zeer kort , en de kleynste , 12. waar op wel moet gelet worden in 't tellen der Ribben , als men tusschen de tweede , en derde valsche Ribbe , van onderen op te tellen , een opening moet maken , om Etter , Water , of Bloed uyt de holligheyt der Borst te halen , op dat men voor de laatste , die niet verre van de Rug-graat uytsteekt , de laatste op een na niet neme : dan in vette Menschen , daar men de Ribben niet wel tellen kan , moet de opening vier dwerfe vingeren onder den ondersten hoek van 't Schouderblad geschieden. Ziet de groote en gedaante der Ribben in de 2. en 3. Figuur van de XXXIII. Tafel.

Aan d'agterste eynden , zijn de Ribben dikker , en ronder , als in 't midden , of van voren , daar ze plat , en ontrent een vinger breed zijn.

Uytwendig aan de zelve eynden zijn ze oneffen , waar uyt de banden voortkomen , met welke ze aan de lighamen der Rugs Wervel-beenderen , en dwerfe uytsteekfels gebonden worden ; maar inwendig , en op

op andere plaatsen , zijn ze tamelijk effen.

Ook zijn ze dikker aan den bovensten , als ondersten kant (behalven de eerste , die zeer plat is) en daar uyt kan men onder de Ribben aanstonts kennen , welke de regter , of linker zijn : van buyten zijn ze vast en en digt ; maar van binnen spongieus.

Inwendig aan den ondersten kant van vele Ribben , is een groeve , veel dieper in 't agterste , als voorste deel , waar in een Ader , Slag-ader , en Zenuw schuylt ; 't welk in de twee of drie onderste niet gezien word , zo dat de Vaten op die plaats wat vorder van de Ribben aflopen.

In 't openen der Borst , tot uytlating van eenige stoffe , moet men deze vaten niet quetsen , en kan men dit ontgaan , als men tusschen de Ribben snyd , van boven regt na onder , stellende de stompe kant van 't Sny-mes na boven ; maar de Ribben staan zo verre niet van een , dat men zo doende , een bequame opening zou kunnen maken : de beste manier is te snyden , volgens den loop der Ribben.

Aan 't agterste eynde van elke Ribbe , zijn twee kleyne , en met Kraak-been bekleede uytsteekfels , behalven aan de twee laatste , die elk maar een hebben , waar door ze t'samen gevoegt zijn alleen met 't lighaam , en niet met de dwerse uytsteekfels der Wervel-beenderen des Rugs , welke daarom geen holligheden hebben aan hun eynden , gelijk de andere , en waar mede alle de andere Ribben door een tweede uytsteekfel t'samen gevoegt zijn ; zomtijds heeft de eerste Ribbe maar een uytsteekfel , en dan is'er geen holligheyt aan 't eynde van 't dwers uytsteekfel des eerste Wervel-beens.

Het eerste Wervel-been , en de drie laatste hebben (zomtyds maar twee) en elk een byzonder holligheyt aan 't agterste zydelik deel , van hun Lighaam , waar mede 't eerste uytsteekfel van elke Ribbe t'samen gevoegd word ; maar het tweede Wervel-been , en de zeven , of zomtyds de agt volgende , hebben geen byzondere holligheyt aan hun lighaam , maar tusschen beyde , ten deele aan d'ondersten , en ten deele

aan den opperften kant , of boord van 't lighaam des Wervel-beens.

De t'samenvoeging der Ribben met het Borst-been is vaster met de Wervel-beenderen des Rugs , om dat het Borst-been met de Ribben bewogen word , en de Wervel-beenderen niet.

De t'samenvoeging der Ribben , met der Rugs Wervel-beenderen , kan van agteren fchuyns na voren nederdalen ; maard'opperfte zo veel niet als d'onderfte , zo dat ze met de zelve een fcherpen hoek maken , waar van ook eenige der middenfte door hun kraak-beenige deelen , van onderen fchuyns na boven , met het Borst-been zig vereenigen : ook vereenigen de kraakbeenige deelen van eenige der bovenfte valsche Ribben , voor een goed deel , met mal-kander , en fchuyns van onder na boven gaande , maken ze zig aan 't kraakbeenige deel der onderfte waare Ribben vast , waarom ze in d'inademing niet kunnen in 't rond , en na boven bewogen worden , zonder de holligheyt der Borst te verwyden , en in de uytademing nedervallende , vernauwen ze de zelve.

De kraakbeenige deelen der valsche Ribben , als men inademt , voornamelijk als d'inademing heftig gefchied , worden een weynig inwaarts getrokken , om dat ⁱ Middenrift vast is aan de kraakbeenige deelen van die Ribben ; 't welk dan werkende , trekt dezelve na binnen , en als 't in de uytademing niet werkt , komen ze weder op hun plaats.

De Ribben dienen eerst tot vastigheyt , en fterkte van de Borst , en om ze met de bovenfte deelen des Buyks uytgefpannen te houden : ten tweeden , tot steunfel van eenige by gelegene deelen ; en de Spieren , die dienen tot d'ademing : ten derden , om de inwendige deelen der Borst , en bovenfte des Buyks , van ongemak te bevryden.

Door uyterlijk geweld , fcheyden de kraakbeenige deelen der Ribben zomtyds van dezelve , en dan

word het voor een breuk van 't beenige deel der Ribbe genomen.

Op een gebroke Ribbe , volgt zomtyds een *Emphysema* , of *Lugt-gezwel* : want als de Ribbe zo gebroken is , dat de innerlijke , en uysterlijke zagte deelen , die haar bekleeden , mede gewond zijn ; zal d'uytwendige lugt van binnen in de holligheyt der Borst indringen ; maar om dat ze onder 't ademen niet zo ligt kan na buyten komen , zo om dat de Wonde van buyten eng is , als om den tegenstant der uytwendige lugt , dringt ze over al onder de Huyd , en tusschen de Spieren in de Ver-blaasjes , en maakt een *Lugt-gezwel* , 't welk zig zomtyds uytbreijdt door de Borst , Buyk , en Kloot-zakjen , zo dat de Lyders opzwellen , gelijk Schapen , die de Vleeshouwers opblazen , dat ik heb gezien , niet alleen in doorgaande Wonden der Borst ; maar ook in quetsing der ¹ Longe-pijp : ook in een Zweer van de Long , door een inwendige oorzaak , zonder quetsing van de Huyd.

Op een gebroke Ribbe , volgt ook ligt een ² Etterborst om de ontsteking , die in 't ³ Borst-vlies komt , welke tot zweering komende , en d'etter doorbrekende , loopt die op 't ⁴ Middelrif , ten ware op die plaats de Long aan 't Borst-vlies vast gegroeyt was.

HET XIII. HOOFDSTUK.

Van de Schouderbladen en Sleutel-beenderen.

DE Schouderbladen zijn twee , staande aan 't opperste van den Rug , een aan elke zyde B I. XXXII. Tafel.
Fig. en 8. Fig. 3. Figure.

In 't Grieks worden ze *Homoplate* , en in 't Latijn *Scapula* geheten.

Ze leggen met hun bovenste , en breede deel op de

¹ Aspera arter. ² Empyema. ³ Membrana pleura. ⁴ Diaphragma.

tweede, en met den ondersten hoek op de zesde waare Ribbe.

Die Beenderen zijn redelijk groot, en by na driehoekig, van boven breed, en van onderen spits afgaande.

Deelen
van 't
Schouder-
blad.

Inwendig na de Ribben, zijn die in 't midden wat uytgeholt, tot plaatsing voor de ¹ onderschouderblad Spier, en om op de Ribben te kunnen passen; maar uytwendig bultig A, dat de rug van 't Schouderblad genaamt word: de uytsteekfels, en zyden dezer Beenderen zijn veel dikker, als 't midden.

D'agterste zyde, of kant D, die na de Rug-graat ziet, is het steunfel, en eyndigt met een bovensten hoek E, en een ondersten F: de onderste zyde, die na voren ziet, tusschen den ondersten hoek, en den Hals i. 8. Fig. is de langste, en dikste, en heeft een uyt-en inwendigen boord; en de bovenste zyde, of kant, tusschen den bovensten hoek, en den Hals, is de dunste en kortste.

Het Schouderblad heeft drie uytsteekfels.

'T eerste is 't langste, en loopt agter dwersch over 't breede deel, met een verheven boord, in 't Latyn *Spina* genaamt B 8. Fig. 't eynde, dat wat gebogen, plat, buyten de andere uytsteekt, en met 't ² Sleutelbeen t'samen gevoegt is, word *Acromium* of de Top geheten G, en dient, op dat 't opper Arm-been na boven niet zou uytleeden: onder en boven dit uytsteekfel, is een holligheyt c c, tot plaatsing van twee Spieren.

Het tweede uytsteekfel H, komt voort uyt het bovenste van den Hals, daar 't dikker is als aan 't eynde, en wat laager staat; 't is na voren krom, onder uytgesneden als een halve Maan, en word om zijn gelijkenis *Ravenswyze uytsteekfel* genaamt.

Dit uytsteekfel houd 't opper Arm-been eenigzints in zijn plaats, dat het na voren niet valt, waarom d'uytleeding van dat Been zelden voorwaarts geschied.

Het derde uytsteekfel word den Hals genaamt I, en

¹ *Musculus subscapularis.* ² *Clavicula,*

is

is dat stomp uytstekende Been , dat korter en dikker is , als de andere , staande aan 't opperste zydelijk deel na den Arm , dat aan 't eynde een ondiepe holligheyt , of panneken heeft.

De ondiepe en met Kraak-been bekleede holligheyt , heeft rondom een Kraak-beenigen ring , om ze eenigfints te verdiepen ; maar alzo 't Opper-Arm-been hier mede t'samen gevoegt , tamelijk groot is , word het gróóste deel der holligheyt gemaakt door de banden , die 't Been aan de holligheyt vast binden.

De Schouderbladen zijn t'samen gevoegt met de ¹ Sleutel-beenderen , door 't eynde van 't eerste uytsteekfel , of 't *Acromium* alleen , zo dat ze op de Ribben als zwemmende , aan geen andere Beenderen vast zijn , als door Spieren , die'er uyt voortkomen , en zig inplanten , om dezelve te bewegen.

Inwendig ontrent het midden van dit Been , is een opening , zomtyds zijn'er wel meer , die van boven nederdaalt , waar in een groote Ader gaat.

De Schouderbladen maken de Geleding met een van d'eynden der Sleutel-beenderen , en met 't Opper-Arm-been , waar door de beweging van den Arm te vryer is ; om dat volgens de verscheyde bewegingen van den zelve , het Schouderblad mede volgt , als ook om de inwendige deelen der Borst eenigfints voor uytwendig ongemak te bevryden.

De ² Sleutel-beenderen , zo genaamt , om de gelijkenis met zekere Sleutels , die eertijds in gebruyk waren , zijn twee , een aan elke zyde , gelegen aan 't opperste der Borst c 1. Fig.

Hun lengte is ten minsten een halve voet , en ontrent een vinger dik.

Aan beyde eynden zijn ze krom gebogen , en ontrent het ³ Borst-been bultig , maar ontrent 't ander eynde uytgeholt. Gedaante.

In Vrouwen zijn die niet zo krom , als in Mannen , waarom de Vrouwen d'Armen niet zo vry heb-

¹ Claviculæ. ² Claviculæ. ³ Sternum.

E e

ben

ben om te werpen , als de Mannen ; maar hierom hebben zy den Hals , en Boezem effender , als deze.

Inwendig zijn ze spongicus , en uytwendig op zommige plaatsen oneffen , tot vasthegting der Spieren , en Banden ; van onderen inwaarts is een kleyne groeve , langs welke de Bloedvaten gaan.

De ¹ Sleutel-beenderen worden door 't dikke eynde t'samengevoegt met een holligheyt , aan 't opperste zydelijk deel van 't ² Borst-been , en door 't ander deel met 't *Acromium* , daar ze met sterke banden vast gebonden zijn.

Tusschen beyde ³ Geledingen dezer Beenderen met de andere , is een dik plat Kraak-been , dat in zijn omtrek vast is aan de banden , zonder dat ze met de eynden der Beenderen verknogt zijn ; maar ze zijn aan beyde opperste vlakten los , om dat de Sleutel-beenderen beter de beweging der Armen zouden volgen , dewyl ze uyt zig zelven geen Spieren , nog beweging hebben.

Die Dieren hebben Sleutel-beenderen , welke hun voorste Voeten gebruyken , (zo als de Menschen met hun Armen doen) gelijk de Apen , Ratten , Enk-hoorns , en andere.

Gebruyk
der Sleu-
tel-been-
deren.

De ⁴ Sleutel-beenderen dienen om de Armen wyd van malkander te houden , en de Schouderbladen eenigzints in hun plaats vast te stellen , op dat ze met de Armen na de Borst niet zouden vallen ; waar door de Borst in den Mensch breeder is , als in andere Dieren.

De Sleutel-beenderen van voren bedekt zijnde met de gemeene dekfelen , breken ligtelijk : en herstelt zijnde , blyven er zelden in , dewijl ze door de minste beweging van den Arm weder uytgaan , zo dat ze genezen zijnde , meest altijd een groote oneffen- heyt nalaten.

¹ Clavicula. ² Sternum. ³ Articulationes. ⁴ Clavicula.

H E T

HET XIV. HOOFDSTUK.

Van de Naam-looze Beenderen.

DE ¹ Naam-looze Beenderen zijn twee, een aan elke zijde van 't Heylig been: het zijn groote Beenderen, van binnen spongieus en ongeschikt van gedaante.

Men heeft aan de zelve geen eygen naam gegeven, om datze in Kinderen uyt drie Beenderen bestaan, zo datze ontfangen hebben drie namen, en die behouden, schoonze in bejaarden tot een Been geworden, en de kraakbeenige streepen, waar door ze in Kinderen aan malkander vast waren, verbeent, en vernietigt zijn.

'Teerste of bovenste is 't ² Darm-been A, het strekt XXXIII.
 zig uyt van den omtrek B B. tot de groote hollig- Tafel.
 heyt I. Het tweede of onderste, is 't ³ Heupe-been 6. Figuur.
 D H. En 't derde of voortste is 't ⁴ Schaam-been E F.
 Zie ook de XXXII Tafel 1. Fig. D E F.

Uyt de t'samenkomst dezer drie Beenderen in Kinderen, ontstaat een groote holligheyt of panneken, waar van 't Darm-been de helft, en de twee andere elk ontrent een gelijk deel maken.

De grond dezer holligheyt is wat oneffen, tot vasthegting van een band, waar door 't Hoofd van 't Dye-been vast gebonden word.

De Ouden vergeleken die holligheyt by een Azynmate, en noemdenze daarom *Acetabulum*: zy is geheel diep, en bekleed met Kraak-been; rondom den boord is een breede kraak-beenige ring, die in 't de Germaamtens niet gezien word, waar doorze dieper is, om 't Hoofd van 't Dye-been beter te ontfangen.

De boord dezes kraak-beenigen rings, is enger als de holligheyt, en omvangt het naauwste deel van 't Hoofd ontrent den hals.

¹ Innominatum. ² Os ilium. ³ Os ischion. ⁴ Os pubis.
⁵ Scelsta,

Deze ring, als ook de boord van 't beenig pannaken, is na 't gat van 't 1 Schaam-been G. ontrent een dwersfen vinger uytgesneden, regt daar 't Heupe-been met 't Schaam-been is vereenigt: aan welker onderfte deel een groeve is, a 6. Fig. tot doorgang eeniger Bloed-vaten.

XXXIII.

Tafel

§. Figuur.

Het Darm-been A. zo genaamt, om dat de omgewonde Darm ten deele daar op legt, is het bovenfte en breedfte deel van 't Naamloos-been. Zie de XXXII. Tafel. 1. Fig. D.

De bovenfte omtrek B B. die een halven kring maakt, is bekleed met Kraak-beenen, en word Ribbe genaamt, die heeft een uyt-en inwendigen boord: deze omtrek eyndigt van agteren na de zyde van 't Heylig been, met een dikker uytsteekfel, a 5. Fig. en van voren met een dunder a, en 't is regt in 't midden, tuffchen 't voorfte uytsteekfel en den Navel, dat de 2 doorfteking des Buyks in 't 3 Buykwater moet gefchieden.

Onder dit voorfte, een weynig boven 't pannaken, is nog een kleyn uytsteekfel, dat het voorfte en onderfte genaamt word; en wat laager, een weynig inwaarts onmiddelyk boven 't pannaken, is een groeve tot doorgang van de peezen der 4 Lende en 5 Darm-been spieren; ontrent welke de Been-ader, en Slag-ader na de Dye gaan.

Deze groeve is regt in 't Darm-been, daar 't zig met 't agterfte deel van 't Schaam-been vereenigt.

XXXIII.

Tafel

§. Figuur.

D' inwendige zyde of oppervlakte van dit Been A. op welke de Darm-beens spier legt, een der buygers van de Dye, is uytgeholt, en effen, behalven ter plaats c. c, door welke 't met 't Heylig been t' famen gevoegt, zeer oneffen is, en is de uytgeholtheit dieper, ruymér, en op die plaats het Been by na doorzigtigen veel dunder in de Vrouw, als in den Man; tot beter uytzetting en fteunfel voor de Lyf-moeder in bevrugte.

D' uytwendige zyde van dit Been A. de rug genaamt 6. Fig. is ook uytgeholt, en heeft eenige ligte

1 Os pubis. 2 Paracentesis. 3 Asites. 4 Psoas. 5 Musculus
M. internus.

indruk

ndrukken en ruwe streepen c c, tot plaatsing en vast-hegting voor 't begin der Bil-spieren, die de Dye uytstrekken, te weten: de groote, middenste, en kleyne, welke streeken in de Vrouw, niet zo zichtbaar zijn als in den Man.

Het tweede of onderste van 't Naam-looze Been, is 't ¹ Heupe-been D H: zijn bovenste deel maakt een groot deel van 't voorgemelde panneken; het voorste maakt een deel van 't groote ey-wyze gat G, en 't ander is 't, waar aan men twee uytsteekfels ziet: 't eerste is scherp b. en daarom *Spina* genaamt; het staat van agteren, en by na regt tegen over 't onderste deel van 't panneken; het tweede staat onder dit, een weynig voorwaarts, is dik en oneffen H. 6. Fig. en maakt 't onderste deel van dit Been, ontrent welk in Kinderen 't zelve door Kraakbeen met 't Schaambeent vereenigt, en in bejaarden verbeent is.

XXXIII.
Tafel.
6. Figuur.

Tusschen beyde die uytsteekfels is een groeve, langs welke d'inwendige ² Stop-spier gaat naar 't Dye Been: 't is op 't uyteinde van dit dik, en oneffen uytsteekfel dat men zit, en het is dikker in den Man, als in de Vrouw.

Aan 't agterste eynde van den omtrek van 't ³ Darm-been, en de zyden van 't Heylig-en Staart-been, als ook aan beyde voorgemelde uytsteekfels van 't Heupe-been, is aan elke zyde een sterke band.

Het derde en voorste van 't Naam-looze Been, is 't ⁴ Schaam-been E F. gelegen een aan elke zyde, van voren onder aan den Buyk, in welk 't meeste deel van 't groot ey-wyze gat is G: dit gat is gestopt door een sterk Vlies, en schied beyde Stop-spieren, die 'er tegen leggen, van malkander: aan 't opperste deel van dit gat is na binnen een lange scherpe kant d. 5. Fig. tot vast-hegting van de Spieren des Buyks; en dicht daar aan is een schuyns loopende groeve b, langs welke de Zaad-vaten gaan.

XXXIII.
Tafel.
5. en 6.
Figuur.

Het voorste deel van dit Been F vereenigt zig met zijn weerga, onmiddelijk boven de schamelheyt, door

¹ Os ischion. ² Obturator internus. ³ Os ilium. ⁴ Os pubis.

een zeer sterk Kraak-been; om welke Beenderen in een Menschen-lighaam haast van malkander te scheyden, men een zeer dun sny-mes hebben moet. Ziet ook de XXXII. Taf. 1. Fig. F.

XXXIII. Het agterste deel word vereenigt met 't ¹ Heup-
Tafel. en ² Darm-been, en maakt een deel van 't panneken I.
6. Figuur. En 't onderste deel vereenigt zig met het dik oneffen uytsteekfel van 't Heupe-been, en heeft in zijn lengte een oneffen uytstekenden boord dd, waar van de Spieren voort komen, welke de Dye inwaarts bewegen.

Ik heb te *Leuven* gezien op d'Universiteyt het Ge-raamte van een Egiptenaarster, die gehangen was, waar in de Schaam-beenderen veel laager geplaatst waren als gewoonlijk.

Beyde de ongenaamde Beenderen zijn door 't agterste, en dikste deel der Darm-beenderen, t'samen-gevoegt met de zyden van 't Heylig been, op welke plaatsen eenige met Kraak-been bekleede ondiepe holligheden, en kleyné verheventheden zyn, makende t' samen een ³ vaste onderlinge Ontfanging, die met sterke vliezige banden vast gebonden zijn.

Ik heb gezien het Darm-been zo vast gegroeyt aan een zyde met het Heylig been, dat'er niet de minste scheyding was.

Deze Beenderen van voren met malkander, en van agteren met 't Heylig been t' samen gevoegt zijnde, maken in 't midden een groote holligheyt, *Bekken* genaamt, in welke de Blaas, de Endeldarm, en in de Vrouwen de Lijfmoeder geplaatst zijn; en om dat de Lijfmoeder zig veel verder uytstrekt in bevrugte, als de deelen, die'er in leggen in de Mannen, daarom is die holligheyt in de Vrouwen grooter.

Of in de zware baringe de Darm-beenderen ⁴ van 't Heylig been, en de ⁵ Schaam-beenderen van malkander wyken; word voor, en tegen getwist: waarover *Spigelius*, van *Solingen*, *Mauriceau*, en meer anderen kunnen na gezien worden.

¹ Os ischion. ² Os ilium. ³ Ginglimus Synarthros. ⁴ Ossa ilia. ⁵ Ossa pubis.

Het

Het mank gaan aan beyde zyden, ontstaat uyt een quade vorming der holligheyt, waar in 't Hoofd van 't Dye-been ontfangen word: want over eenige jaren bezig zijnde by den Heer Duverney, met banden te bereyden, waar door 't Hoofd van 't Dye-been aan 't panneken vast gebonden word, vond ik dat zo kleyn en ondiep, dat 't Hoofd daar in niet konde komen: en ons wierd gezegt, dat het 't Dye-en Ongenaamt Been was, van zekere Vrouw, die aan beyde zyden had mank gegaan,

HET XV. HOOFDSTUK.

Van 't Opper-arm Been, en de Onder-arm Beenderen.

Het Hoofd en Tronk afgehandelt zijnde, volgen de bovenste, en onderste Ledematen.

Door de bovenste Ledematen versta ik al, wat begrepen word, van het panneken des Schouder-blads, tot 't eynde der Vingeren.

Deze worden verdeeld in drie deelen, 't ² Opper-arm Been, dat een Been is: d' Onder-arm-beenderen, die twee zijn, en de Hand, die ook in drie gedeelt word, de ³ Voorhand, waar in agt; de ⁴ Nahand, waar in vier, en de vier Vingeren met den Duym, waar in vijftien Beenderen, zonder de zaad-beentjes zijn.

Het Opper-arm-been G I. en 9. Fig. is lang, rond, xxxii. en by na regt, hebbende van binnen een groote hol-^{Tafel.} ligheyt, waar in Merg is.

Zomtijds bestaat dit Been uyt twee tafelen, tusschen welke een Tafel-scheydsel gevonden word.

Aan d'uytwendige zyde, ontrent 't midden, is 't oneffen tot beter inplanting der pees van de ⁵ driehoekige Spier.

¹ Conformatio. ² Os humeri. ³ Carpus. ⁴ Metacarpus.
⁵ Deltoides.

Zijn
Hoofd. Aan zijn bovenste eynde, is een groot, en rond
Hoofd, met Kraak-been bekleed, aan welk voorste
xxxii. deel een lange groeve begint a. in welke een van de
Tafel. Hoofden, of Peezen der ¹ Tweehoofdige Spier
9. Figuur. legt.

Dit Hoofd c, is t'samengevoegt met 't panneken van't Schouder-blad, door een ² ondiepe Geleding. Zie i. Fig. waar aan 't door een sterken band, en eenige breedte Peezen der Spieren, die 't gansche Hoofd omvangen, dienende tot beweging van dit Been, vast gebonden word.

Zelden word 't Hoofd van't Opper-arm-been uytgeleed regt na boven, nog ook na boven uyt-of-inwaarts, ten zy 't *Acromion*, of *Raven-beks-wyze* uytsteekfel gebroken word.

Het kan niet regt na boven uytleeden, om dat de Driehoekige Spier, en Pees der Tweehoofdige Spier, met de uytsteekfels dat beletten.

Ook niet na boven uytwaarts, om dat 't *Acromion* een tegenstand bied.

En niet na boven inwaarts, om dat de ³ Raven-beks Spier, beyde Hoofden, of Peezen der ⁴ Tweehoofdige Spier, en het ⁵ Raven-beks-wyze uytsteekfel zulks wederstaan.

Zo dat die uytleding meest altijd na onderen, of van onderen in-of-uytwaarts geschied; en is ook meest altijd volkomen, om dat het panneken zeer ondiep, en 't Hoofd groot is.

xxxii. Het onderste deel van dit Been is platagtig, breed,
Tafel. en voorwaarts wat gebogen, aan welkers inwendige
9. Figuur. zyde een groot uytsteekfel is d, en aan die uytwendige een veel kleynder d: van deze uytsteekfels komen veel Spieren, die na de hand gaan.

Tusschen beyde die uytsteekfels, geheel aan 't uyt-eynde, zijn'er drie met Kraak-been bekleede verhevenheden, van een gescheyden door twee groeven, dienende eygentlijk tot de ⁶ Geleding.

¹ Musculus biceps. ² Arthrodia. ³ Musculus coracoides.
⁴ Biceps. ⁵ Apophys. coracoid. ⁶ Articulatio.

De grootste verheventheyt b. is inwendig, de kleynste in 't midden, en de andere, die rondagtig is c. staat uytwendig.

Onmiddelyk boven de grootste groeve e, die tusschen de grootste, en kleynste verheventheyt is, zo van voren, als van agteren, is een holligheyt, welker voorste f. de kleynste, en de agterste g. de grootste is: die verheventheden, en groeven zijn tot de 1 Geleding, die beyde de Beenderen des Onder-arms daar mede maken.

Als d'uytrekking moet gedaan worden, tot herstelling van 't uytgeleede Opper-arm-been, moet de band niet boven de Hand, maar aan 't onderste deel van dit Been, boven den Elleboog gelegd worden.

Het Opper-arm-been gebroken zijnde, en herstelt en verbonden, mag, zo de Breuk dwers was, den Onder-arm sterk gebogen, met een sluijer aan de Borst gedragen worden; maar zo die schuyns was, is 't beter, dat hy wat meer neerhangt, om door 't gewigt des Arms te beletten, dat d'eynden van 't gebroke Been niet over malkander schieten, dat ligt geschied.

Een Jongen van 14. jaren ziek leggende, had een zeer groot en hard gezwel aan 't bovenste deel des Opper-arms, digt by de Geleding: gestorven zijnde, wierd het Been uytgesneden, en onderzocht; men vond dat het een 2 beenige uytwassing was, veroorzaakt door scherphelyt van 't voedsaam vogt, 't welk de beenige buysjes had verbroken, en uytstortende, dat Been-gezwel als een Rots voortgebragt hadde: het woeg 10. ponden, ik heb 't Been dikwils gezien, en word jaarlijks vertoont in den Hof des Konings, door den Heer *Duverney*.

De Beenderen des Onder-arms zijn twee, 't 3 Ellebeen, en de 4 kleine Pijp, en zijn uytgestrekt van de vouw des Elleboogs tot de Hand.

Het Elle-been zo genaamt, om dat het by de Romeynen diende voor een mate, legt inwendig H. en de kleine Pijp I. uytwendig.

1 Articulatio. 2 Exostosis. 3 Cubitus of Ulna. 4 Radius.

XXXII.
Tafel.
1. Figuur.

E e 5

Het

Het Elle-been is wat langer als de kleine Pijp , van onderen ontrent 't eynde dun , en rondagtig ; maar opwaarts gaande , word het allengskens dikker , en wat inwaarts gebogen.

Aan 't opperste eynde , dat veel dikker is , als 't onderste , waar door t' samen gevoegt word met 't Opper-arm-been , zijn twee uytsteekfels , gelijk twee bekken , welker agterste a , van *Hippokrates Olecranon* genaamt , 't langste , en 't voorste b 't kortste is. Zie de 10. Fig.

Tusschen die uytsteekfels , is een met Kraak-been bekleede halve-maans-wyze holligheyt c , in 't midden gescheiden door een verheventheyt , zo dat 'er twee schijnen te wezen , in welke ontfangen word de grootste , en kleinste verheventheyt van 't 1 Opper-arm-been , terwijl in tegendeel beyde uytsteekfels van 't Elle-been d ontfangen worden in de grootste groe-ve e. van 't Opper-arm-been , staande tusschen de grootste , en kleinste verheventheyt , en daar in zig bewegen , zo dat , als d'Onder-arm sterk gebogen word , een scherpen hoek maakt : met 't onderste eyn-de van 't Opper-arm-been , word 't voorste en kortste uytsteekfel of bek b. van 't 2 Elle-been ontfangen in de voorste en kleinste holligheyt van 't 3 Opper-arm-been f , staande onmiddelijk boven de grootste groe-ve e , waar door helet word , dat den Onder-arm tegen den Opper-arm niet kan komen , en als den Onder-arm sterk uytgestrekt word , word 't agterste en langste uytsteekfel of bek a , van 't Ellebeen ontfangen , en de agterste en grootste holligheit g van 't Opper-arm-been daar tegenstant vindende , kan de Onder-arm niet verder uytgestrekt worden , waar door de Arm in een regte linie blijft.

Het Opper-arm-been , en 't Elle-been zijn t'samen gevoegt door onderlinge Ontfanging , waar in geen andere beweging is in 't Elle-been , als de buyging , en d'uytstrekking , welke geschied door de Spieren.

Aan de uytwendige zyde van 't Elle-been , onmiddelijk onder de halve-maans-wyze holligheyt c , is nog

1 Os Humeri. 2 Ulna of Cubitus. 3 Os Humeri.

een kleine ondiepe met Kraak-been bekleede holligheyt, dienende om de zyde van 't plat rond hoofdeken der ¹ kleine Pijp t'ontfangen, en een tweede ² Geleding te maken met de ³ kleine Pijp.

Onmiddelijk onder die holligheyt, is een kleine diepte, aan welker onderste uytwendige zyde een kleine verheventheyt 'is, waar in de Pees word ingeplant van d' ⁴ inwendige Arm-spier.

Aan 't onderste eynde van dit Been, is een rond hoofdeken, dat ontfangen word in een ondiepe holligheyt van de kleine Pijp, agter welk een klein scherp uytsteekfel, en een kleine groeve tusschen beyde is; by na door des zelfs lengte is een scherpe kant.

De kleine Pijp A. 10. Fig. van den Onder-arm, legt uytwendig eenigfints op 't Elle-been, en is wat korter.

Zy is driekantig; maar op de buytenste zyde wat rondagrig en verheven.

Aan zijn opperste eynde is een rond plat hoofdeken e, waar in van boven een kleine, ondiepe, met Kraak-been bekleede holligheyt is, in welke ontfangen word de uytwendige ronde verheventheyt van 't Opper-arm-been, waar op dit Been zig beweegt gelijk op een spil, als men den Onder-arm in-of-uytwaarts half rond beweegt.

Aan de inwendige zyde, een weynig onder 't hoofdeken, is een kleine oneffen verheventheyt, waar in de Pees der ⁵ Tweehoofdige Spier zig vast hegt: het deel tusschen 't hoofdeken, ende de verheventheyt, noemt men den Hals.

Het onderste eynde van dit Been is breed, een weynig plat, dik, en ongelijk, aan welker uytwendige zyde een klein uytsteekfel is f, en onder in dit Been zijn twee ondiepe holligheden g, in welke twee Beentjes van de eerste rijde der ⁶ Voorhand ontfangen worden, die de Geleding maken.

Aan de buytenste zyde zijn eenige groeven, tot geleyding der Pezen, die door den ringwyzen band gaan:

¹ Radius. ² Articulatio. ³ Radius. ⁴ Brachius internus.
⁵ Musculus biceps. ⁶ Carpus.

aan de binnenste zyde is een kleine ondiepe holligheyt, in welke de zyde van 't rond hoofdeken van het onderste eynde van 't Elle-been ontfangen word.

Het Elle-been, en de ¹ kleine Pijp, verschillen in groote: 't Elle-been is dikker van boven, en dunder van onderen. In tegendeel is de kleine Pijp dikker van onderen, en van boven dunder, zo dat de Onder-arm daar door over al even sterk is.

Het Elle-been ontfangt van boven aan d'uytwendige zyde de kleine Pijp, in een kleine ondiepe holligheyt; zo dat in d'inwaarts, (Pronatio) en uytwaarts beweging (Supinatio) van den Onder-arm, de zyde van 't plat hoofdeken der ² kleine Pijp, hier in zig beweegt: en van onderen word in tegendeel het rond hoofdeken van 't ³ Elle-been ontfangen in een kleine ondiepe holligheyt van de kleine Pijp; zo dat beyde Beenderen aan de eynden malkander raken; maar in 't midden gescheyden zijn, op dat de kleine Pijp te vryer zou kunnen bewegen, en meerder ruymte wezen voor de Spieren, die tusschen beyde zijn.

In deze ruymte is een sterke vliezige band, vast gehegt aan de scherpe kanten, die regt tegen over malkander staan, in de lengte dezer Beenderen, waar door ze vast gebonden, en de binnenste Spieren van de buytenste gescheyden worden.

'T onderste eynde van de kleine Pijp beweegt zig in de holligheyt aan de binnenste zyde niet op 't rond hoofdeken van 't Elle-been, maar die Beenderen zijn hier vast met malkander vereenigt, waar door 't onderste eynde van 't Elle-been de beweging van de kleine Pijp volgt, 't gene aan de bovenste eynden dezer Beenderen niet geschied, om dat daar de zyde van 't plat rond hoofdeken der ⁴ kleine Pijp zig beweegt in d'ondiepe holligheyt van 't ⁵ Elle-been, en op d'uytwendige ronde verheventheyt van 't ⁶ Opperarm-been, waar door hier 't Elle-been de beweging van de kleine Pijp niet volgt: zo dat d'inwaarts, en

¹ Radius. ² Radius. ³ Ulna of Cubitus. ⁴ Radius. ⁵ Ulna of Cubitus. ⁶ Os Humeri.

uytwaarts half ronde beweging van den Onder-arm alleen door de kleine Pijp geschied.

Aan d'opperste, en onderste eynden van die lange Beenderen des Opper-en Onder-arms zijn veel kleine gaatjes, tot doorgang der Bloed-vaatjes.

Als de kleine Pijp gebroken is aan 't onderste eynde, daar de vierkante Spier legt, die den Onder-arm inwaarts half rond helpt bewegen, moet in 't opleggen der gereedschap gelet worden.

Eerst, moet men de band op de Breuk niet winden, gelijk in andere Breuken: want in plaats van beyde eynden des gebroken Beens t'ondersteunen, zou men die neer drukken.

Ten tweeden, moet men de Spalken boven op de Breuk niet leggen; maar alleen aan de zyden; een van binnen, en de andere van buyten, en dat op dikke drukdoeken, op dat ze aan den laatsten band, tot steunsel zouden dienen, en de eynden van 't gebroke Been beter in hun plaats blijven.

Zeker Arbeyder te *Parys*, beyde Beenderen van den Onder-arm gebroken hebbende, wilde na de konst niet verbonden worden: de Beenderen wierden niet aan een geheeld: het voedsaam zap storte op d'opper-vlakte van beyde eynden, daar 't verharde, zo dat hy op die plaats den Onder-arm kon bewegen, gelijk in een andere Geleding: gestorven zijnde, zijn de Beenderen uytgesneden; die ik dikwils heb gezien.

Zomtijds groeijen de gebroke Beenderen des Onder-arms niet aan malkander, schoon de Lijder na de konst verbonden word; gelijk te zien is by *Fabricius Hildanus*, I. Deel XCI. Aanmerking.

De Beenderen t' samengevoegt door t' onderlinge Ontfanging, gelijk tusschen 't Opper-arm-been, en de Onder-arm-beenderen geschied, worden zo ligt niet uytgeleed, als die door ² diepe Geleding t' samengevoegt zijn; om dat de banden van d'eerste sterker gesloten zijn, ook de beenderen meer verheventheden, en holligheden hebben, en worden ook niet ligt herstelt.

1 *Ginglimus*. 2 *Enarthrosis*.

In

In gefchote Wonden, en bederving der Beenderen, die altijd voort-eet in de Geleding van den Elleboog, Hand, Knye, of Voet, moet men het Lid af zetten.

HET XVI. HOOFDSTUK.

Van de Hand.

XXXII.

Tafel.

1. Figuur.

DE Hand word verdeelt in drie deelen, de ¹ Voor-hand K: ² Na-hand L: en vier Vingeren met den Duym. 1. 2. 3. Zie de II. Fig.

In de Voor-hand zijn agt Beentjes, die van binnen spongieus, en ongelijk zijn, zo in groote als gedaante, en op d'oppervlakte, daar ze met malkander, als met de naast gelege Beenderen t'samengevoegt worden, zijn ze bekleed met Kraak-been.

Ze hebben geen Been-vlies, en zijn met malkander vereenigt, en door banden vast gebonden.

En zijn geschikt in twee ryen: d'eerste a II. Fig. bestaat uyt drie, en de tweede uyt vier Beentjes, staande 't agtste van voren buyten d'eerste rye op 't eerste Beentjen van de zelve, regt tegen over den kléyen Vinger.

Twee Beentjes van de eerste rye, maken een hoofdedek, dat t'samengevoegt word met twee ondiepe holligheden, onder in 't eynde van de 3 kleine Pijp, makende de 4 ondiepe Geleding van de Hand: de Voor-hand, en de kleine Pijp zijn t'samen gebonden door een vliezigen band, die de 5 Geleding omvangt.

'T onderste eynde van 't ⁶ Elle-been, is niet t'samen gevoegt met de 7 Voorhand, door een waare Geleding; maar alleen vast gebonden aan 't derde Beentjen der eerste rye door een band, tusschen welke beyde een bewegelijk Kraak-been is; dat schijnt te dienen, als een aangroeyfel, om 't Elle-been eenig-sints te verlengen.

1 Carpus. 2 Metacarpus. 3 Radius. 4 Arthrodia. 5 Articulation. 6 Ulna of Cubitus. 7 Carpus.

De

De Beentjes der Voor-hand staan veel gelijk van buyten, als van binnen de Hand, daar ze van binnen een holligheyt maken tot doorgang der Pezen, die naar de Vingeren gaan, onder een ringwyzen band, die vast is, op d'een zyde aan 't Beentjen, dat buyten zijn rye staat, en aan 't eerste Beentjen der tweede rye, en op d'andere zyde aan 't vierde der tweede rye, om ze te buygen.

Drie Beentjes van d'eerste rye, maken door hun vereeniging een holligheyt, waar in twee der tweede rye ontfangen worden, en een kleine beweging hebben: de andere Beentjes, die met de 1 Na-hand t'samen-voegt zijn, hebben geen of weinig beweging.

De Na-hand bestaat uyt vier Beentjes c. c. c. c. die ongelijk in lengte, en dikte zijn; want die onder den voorsten en midden Vinger staan, zijn langer, en dikker, als de andere, zijnde 't eerste 't langste, en dikste.

In 't midden zijn ze dunder, als aan de eynden, daar ze malkander raken, waar uyt een ruymte ontstaat voor de tusschen-beenige Spieren: van binnen zijn ze hol als een pijp, waar in Merg is: uytwendig zijn ze breeder, als van binnen in de Hand, en zijn by na driekantig.

Tusschen d'eynden in 't midden zijn ze effen, uytwendig een weynig verheven, en na binnen wat gebogen.

Door beyde met Kraak-been bekleede eynden zijn ze t'samen-gevoegt door 't een met de vier Beentjes der tweede rye der 2 Voor-hand, door 3 vaste onderlinge Ontfanging, in twee van welke ('t geen onder den kleinen, en Ring-vinger staat) een zichtbare beweging is.

Door 't ander eynde, dat rondagtig is, zijn ze t'famen-gevoegt met een holligheyt van d'eerste Beentjes der Vingeren, door ondiepe Geleding, en aan beyde eynden met d'andere Beentjes door banden vast gebonden, waar door ze na alle zijden zig kunnen bewegen.

1 Metacarpus. 2 Carpus. 3 Unguiculus Synarthrosis.

De Vingeren zijn vijf, de Duym daar in begrepen, welker middenſte de langſte is, en beſtaan uyt drie Beentjes, die in een rye ſtaan, behalven den Duym, die wat laager ſtaat.

xxxii. Aan 't eynde, daar ze met de Beentjes van de
Tafel. tweede rye der ¹ Na-hand t'ſamengevoegt zijn, zijn
21. Figuur. ze breed, en na 't ander gaande, worden ze allengs-
kens enger, zo dat d'eerſte Beentjes 1. 1. 1. van de drie,
langer, breeder, en dikker zijn, als de tweede 2. 2. 2.
en de tweede, als de derde 3. 3. 3.

Alle zijn ze tamelijk effen, en aan de eynden bekleed met Kraak-been: uytwendig wat bultig; na binnen wat gebogen, en platagtig, tot plaatſing der Pezen, die de Vingeren buygen, en in een kraak-beenige ſcheede leggen, die vaſt gehegt is aan de ſcherpe kanten van de zyden dezer Beentjes.

Alle de Beentjes der Vingeren, daar ze t'ſamen de ² Geleding maken, uytgenomen den Duym, hebben aan 't engſte eynde twee kleine verheventheden, en in 't midden een holligheyt, en aan 't breedſte eynde twee kleine holligheden, en een verheventheyt in 't midden, waar door ze t'ſamengevoegt zijn door ³ onderlinge Ontfanging, en met banden vaſt gebonden, zo dat ze bepaalt zijn, alleen tot de buyging, en d'uytſtrekking.

En zo ze na d'eene of d'andere zyde bewegen, komt dat van de ⁴ Geleding der eerſte Beentjes met die der ⁵ Na-hand, met welke ze t'ſamengevoegt zijn door ⁶ ondiepe Geleding.

De Duym heeft iets byzonders buyten d'andere: want zijn eerſte Beentjen is niet t'ſamengevoegt met het tweede, door ⁷ onderlinge Ontfanging, gelijk in d'andere Vingeren; maar door ondiepe Geleding.

Aan 't uyt-eynde van yder laaſte Beentjen der Vingeren, en Duym, is een kleine verheventheyt als een halve Maan, waar op de Nagels zig vaſt hegten.

De Duym is zo noodzakelijk, dat, als men dien verloren heeft, men zo wel niet meer kan grypen als te

¹ Metacarpus. ² Articulatio. ³ Ginglimus. ⁴ Articulatio.
⁵ Metacarpus. ⁶ Arthrodia. ⁷ Ginglimus.

voren , en fluyt zig toe van onderen na boven, op den zelveu tijd, als de Vingeren zig fluyten van boven na beneden.

De uytleding der Hand is dikwils verzeld met zware toevallen; gelijk groote zwelling, zweering, langfame genezing, en pijn, die van tijd tot tijd weder komt, moeilijke beweging, een *Anchilosis*, om dat de lijnige vogten, die zig uytstorten, ontrent de Geleding verdikken.

Deze zware toevallen by die Uytleding ontstaan uyt 't maakfel der Geleding: want de Pezen over de andere Geledingen gaande, zijn vast aan de naburige deelen, en hier is het tegendeel: want de Peezen over de Geleding der Hand gaande, zijn befloten in een vliezige scheede, aan welk ze niet vast zijn, welke scheede van binnen bestreken is met een lijmig vogt, op dat de Pezen, als de Hoofden der Beenderen zig bewegen, ligter zouden schuyven.

Over de 1 Geleding der Hand gaan niet alleen de Pezen, die de 2 Voor-hand, maar ook die de Vingeren, en Duym bewegen; en by na in de andere Geledingen zijn Spieren, om 't Been der Geleding te bewegen; behalven de Geleding van den Voet, daar in gelijk met de Hand.

In de andere Geledingen gaat 't vleezig deel der Spieren altijd over 't grootste deel der Geleding; maar over die der Hand en Voet gaan niet als Pezen.

HET XVII. HOOFDSTUK.

*Van 't Dye, - Scheen, - en Kuyt-been,
en de Knye-schijf.*

NU volgen d'onderste Ledematen, die in maakfel eenige over eenkomst met de bovenste hebben; zo dat zomtijds Menschen gezien zijn zonder Handen, die wrogtten met de Voeten, dat ze te voren met de Handen deden.

1 Articulatio. 2 Carpus.

F f

Door

Door de onderste Ledematen, verstaat men dat begrepen is van de groote holligheyt of panneken der ongenaamde Beenderen, tot 't eynde der Teenen.

En dat word verdeeld in drie deelen: het ² Dye-been, dat een Been is, gelijk 't ³ Opper-arm-been. Het tweede deel bestaat uyt twee Beenderen, 't ⁴ Scheen- en ⁵ Kuyt-been, gelijk in den Onder-arm. En 't derde is de Voet, die, gelijk de Hand, in drie deelen verdeeld word.

'T eerste is de ⁶ Voor-voet, die uyt zeven; het tweede de ⁷ Na-voet, die uyt vijf: en 't derde zijn de Teenen, die uyt veertien Beenderen bestaan, zonder de Zaad-beentjes.

XXXII.

Tafel.

12. Figuur.

Het Dye-been M is 't grootste, en langste van het Lighaam, van binnen hol als een pijp, waar in het Merg is. Ziet 1. en 12. Fig.

Tusschen zijn dikke eynden is 't by na rond van voren, en ter zyden effen; maar van agteren is een scherpe kant in zijn lengte, die zig over 't midden in twee verdeelt tot onder aan de hoofden, tot vasthegting der Spieren.

Het daalt een weynig schuyns inwaarts na de Knye, waar om men in desselfs Breuk die gestalte niet verdraije, en te regt uyt trekke.

Uytsteekfel.

'T heeft aan 't bovenste eynde (behalven twee andere) een zeer groot schuyns opgaande uytsteekfel, welk opperste deel rond, en het Hoofd genaamt A. word, en met Kraak-been bekleed is, om zig ligter te bewegen. Het deel onmiddelyk agter 't Hoofd is wat enger als den Hals.

Dit Hoofd word ontfangen in 't panneken van 't ⁸ ongenaamt Been, en is met Kraak-been bekleed, en heeft van boven ontrent zijn midden een groeve, waar in een korte, ronde, sterke band, als een koorde zig vast hegt, door welk het Dye-been in 't panneken, dat van voren in den grond een groeve heeft, vast gebonden word: deze band breekt in de uytlee-

1 Ossa innominat. 2 Os Femoris. 3 Os Humeri. 4 Tibia.
5 Fibula. 6 Tarsus. 7 Metatarsus. 8 Os innominat.

dingen

dingen van 't Dye-been meermaals of verslapt te zeet, waarom 't Been herstelt zijnde, in zijn panneken niet kan blyven.

Behalven dien band, is'er nog een vliezige en dik voortkomende rondom aan 't onderste van 't Hoofd, en 't zelve omvangende, hegt zig aan 't pannekens scherpen boord vast.

De schuynse uytgang van 't voorgemelde groot uytsteekfel is oorzaak, dat 't Hoofd van 't ' Dye-been een aanmerkelijken hoek maakt met zijn lighaam, om zig in 't panneken te voegen, dat niet regt aan de zyde staat, waar door de Dye-beenderen verder van malkander staan, tot beter plaatsing der Spieren, en het belet de Dyen tegen malkander te vryven, op dat de 2 Teeldeelen niet beschadigt wierden.

Ontrent 't begin van den Hals, zijn nog twee andere uytsteekfels, waar van 't bovenste, en grootste B *Trochanter major*, of groote Drayer genaamt, zeer oneffen is, en op d'uytwendige zyde wat na agteren staat; tusschen welk uytsteekfel en den Hals van agteren een holligheyt is.

Het minste en onderste staat inwendig, en word na agteren c, *Trochanter minor* genaamt, of kleine Drayer; en ze worden zo geheten, om dat eenige der Spieren, die de Dye bewegen, en half rond drayen, daar in geplant worden.

Het onderste einde van 't Dye-been is breed, dik, xxxii. en eyndigt onder, en agterwaarts met twee rondagti- Tafel. 14. ge, platte, en met Kraak-been bekleede Hoofden D D. en 15. Fig. die in twee holligheden van 't Scheen-been a a 14. guue c c. Fig. ontfangen worden.

Deze Hoofden zijn van malkander gescheyden door twee holligheden, een van voren, die breed en ondiep is, waar in de Knye-schijf ontfangen word; de agterste E is wijd en diep, uyt welker binnenste zyde van 't uyt-en inwendig Hoofd, en een kleine holligheyt twee banden voortkomen, die zig schuyns kruyssen, en vast hegten in een oneffen uytsteekfel van

1 Os Femoris. 2 Partes genital. 3 Os Femoris.

boven op 't Scheen-been b , 14. Fig. waar door 't Dye-been vast gebonden word.

Door de agterste wyde, en diepe holligheyt, gaat na 't Been een groote Zenuw, met de ' Been-ader en Slag-ader, waar op men letten moet, als een Been afgezet, of 't bloed van een voorname Slag-ader moet gestelpt worden; dewijl men op die plaats met een dikken druk-doeck, en band, met een stokjen, dat men toedrayt, de vaten kan drukken, dat'er geen druppel bloed uitloopt; zo dat de Heelmeester tijd heeft, om 't bloed te stelpen, zo door 't vat te binden, als andersints, na dat het diep of ondiep legt, zonder dat 't bloed hem kan beletten, gelijk ik zomtijds heb gedaan.

Zie de manier om dien druk-doeck te leggen in onze verhandeling der voornaamste handwerken der Heelkonst in 't XXXIX. Hoofdstuk.

Onder de Geledingen, die door een rond Hoofd, en een holligheyt geschieden, is 't Dye-been minst de uytleding onderworpen, om dat 't Hoofd zeer groot, en de holligheyt, daar 't in sluyt, diep is. Ook is'er geen Geleding, daar de Spieren sterker, en in meer getal zijn als in deze; en gelijk de Spieren helpen om de Beenderen in hun plaats te houden, zo is'er meer geweld noodig om dit Been te doen uytleeden, als andere, daar de Spieren minder en zwakker zijn, en de Geleding van 't Hoofd niet zo diep geschied. Maar breekt meest altijd dit Been in den hals, om zijn teerheyt, bestaande uyt een spongieuze zelfstandigheyt, die van buyten alleen een zeer dunne beennige korst is.

Als de uytrekking moet gedaan worden tot herstelling van 't uytgeleede Dye-been, moet de band niet boven den Voet; maar aan 't onderste van dit Been boven de Knye gelegd worden.

'T Hoofd van 't Dye-been is in de Kinderen een aangroeyfel, waarom 't door uysterlijk geweld, of dat de Kinderen te vroeg de Beenen gebruyken, ligtelijk kan affcheyden, zo dat het voor een uytleding van

2 Vena & Arter. cranial. 2 Os Femoris.

't Dye

't Dye-been genomen word, welke dwaling een groot beletfel is in de genezing.

'T is zo ook met beyde andere uytsteekfels, die zelf in bejaarden niet altijd in uytsteekfels zijn verandert, zo dat ze door uytterlijk geweld zomtijds van 't lighaam des Beens affcheyden; gelijk *Pareus* verhaalt van een Man van 40. jaren, wiens grootste uytsteekfel of Draijer van 't Been was afgefcheyden.

Zeker Edelman te *Parys*, om zig van de Pokken te doen genezen, onder 't fpreken wandelende in de kamer, breekt zijn Dye-been, dat te voren zeer bedorven was, zonder ongëmak der zachte deelen.

Diergelijk geval van het breken der beide ¹ Dye-beenen verhaalt *Hildanus*.

Ik heb gezien in een gebroken Dye-been, en in zijn lengte doorgezaagt, dat de holligheyt ter plaats van de breuk geheel vervuld was met Weer, zijnde 't voedsaam zap uyt de breuk van 't Been in de holligheyt uytgestort en verhard, dat mogelijk in andere gebroke Beenderen, die hol zijn en Merg hebben, gefchied.

Het Dye-been in een Dogter van 18. jaren bedorven zijnde, gelijk *Hendrik van Roonhuys* verhaalt, en lang geduurt hebbende, is in zijn dikte, wel vier dwerfe vingeren lang afgefcheyden, en uytgetrokken zijnde, is zy weder gezond geworden; zonder dat het Been korter was als 't andere, konnende dat bewegen, en gaan als te voren: zo dat de bederving van zelf gefluit zijnde, is 't ftuk door 't voedsaam zap aan beyde eynden van 't gezonde Been uytgestort, en verhardende, allengskens weg geftooten. Nu volgen 't Scheen-en Kuyt-been, die zig uytftrekken van de Knye tot den Voet.

Het ² Scheenbeen, dat 't grootste is, staat inwendig O, en 't ³ Kuyt-been P, is 't minste, dat uyt- XXXII.
wendig aan de zyde wat na agteren staat, en ze zijn van Tafel.
onderen, en van boven t'famen vereenigt; maar vor- 1. Figuren.
ders van een gefcheyden.

1 Os Femoris. 2 Tibia. 3 Fibula.

F f 3.

Het

Het Scheen-been is van binnen hol voor 't Merg, en driekantig, agter en op beyde zyden plat, de fcherpſte kant is van voren, en die kant alleen bedekt met het 1 Been-vlies, en de Huyd; daarom is 't, als men met iet hards daar op ſlaat, of regen ſtoot, dat zo groote pijn ontſtaat.

xxx. Ta-
fel. 14.
Figuur.

Van boven aan zijn eynde heeft dit Been een breed en dik uytſteekſel, in wiens opperſte deel twee ondiepe holligheden zijn a a, bekleed met Kraak-been, eene aan elke zyde van een in 't midden ſtaande klein oneffen uytſteekſel b, in welke een byzonder plat, rond, en glad Kraak-been legt, waar van zommigen twee maken, dat rondom aan de boorden dezer holligheden vaſt, en dikker is, als in 't midden, daar 't dun, open, van onderen en van boven los legt, en de holligheden wat verdiept.

'T is in beyde deze holligheden, dat d'onderſte platte hoofden van 't 2 Dye-been ontfangen worden op dit Kraak-been, terwijl in tegendeel dat klein oneffen uytſteekſel van 't Scheenbeen b, in d'agterſte wyde diepe holligheyt van 't Dye-been word ontfangen, makende t'ſamen een 3 Geleding van 4 onderlinge Ontfanging, welke, om dat die holligheden breed, ondiep, 't uytſteekſel klein, en de Hoofden van 't Dye-been plat zijn, nauwliks in de holligheden van 't 5 Scheen-been kunnen ſluyten, om dat dit Been ook eenigſints op de zyden kan bewegen.

In die met de Knyen inwaarts gebogen gaan, *Valgi* genaamt, heb ik gezien by den Heer *Ruyſch*, dat de holligheden boven in 't regter, en linker Scheen-been van iemand, die dat gebrek had gehad, en uytwendig gelegen zijn, wel ontrent een dwerſen vinger breed laager geplaatſt waren, als die inwendig ſtonden.

Deze Beenderen worden t'ſamen gebonden door verſcheide banden; d'eerſte zijn twee d. 15. Figuur, die voortkomen van agteren uyt de wyde en diepe holligheyt, en zig ſchuyns kruyſſende, hegten zig in 't

1 Perioſtium. 2 Os Femoris. 3 Articulatio. 4 Ginglymus.
5 Tibia.

kleyn oneffen uytsteekfel, boven in 't midden van 't 1 Scheen-been.

Behalven deze, is 'er nog een band, die de 2 Geleding omvangt f, behalven ter plaats van de Knyeschyf, nog twee andere platte, en smalle, aan elke zyde een.

Ontrent 't opperste deel van dit Been, wat na agteren aan de uytwendige zyde, is een klein plat, met Kraak-been bekleed uytsteekfel c, waar door t' samengevoegt word met 't 3 Kuyt-been.

In 't agterste en opperste deel van 't Scheen-been ontrent 't midden is een gat, waar door een Ader gaat

Van voren ontrent 't opperste deel van dit Been, is een oneffen stomp uytsteekfel, waar over een breede Pees gaat, gemaakt van vier Spieren, die 't Been uytstrekken, en dat zig twee dwerse Vingers daar onder in 't Scheen been vast hegt.

Laat ons nu 't onderste eynde van 't Scheen-been, dat zo dik en breed als 't bovenste niet is, beschouwen, en eerst aanmerken aan de inwendige zyde een uytsteekfel, genaamt d'inwendige Enklauw, d. 14. Figuur.

Onder in 't eynde van dit Been, is een ondiepe met Kraak-been bekleede holligheyt e, in 't midden door een zeer kleine verheventheyt in twee gescheyden; waar in ontfangen word 't eerste Been van den 4 Voorvoet, de 5 Kote genaamt, dat boven in 't midden wat uytgeholt, en aan de zyden wat verheven is, waar uyt een 6 Geleding van 7 onderlinge Ontfanging ontstaat, gelijk de voorgaande, zo dat de Voet om de zelve reden zig op de zyden kan bewegen.

Agter aan de inwendige 8 Enklauw, is een groeve, waar langs twee Peezen gaan van de agterste 9 Scheen-been Spier, na den Voorvoet.

Onder aan de uytwendige zyde van dit Been, is een

1 Tibia. 2 Articulatio. 3 Fibula. 4 Tarsus. 5 Talus. 6 Articulatio. 7 Ginglymus. 8 Malleolus internus. 9 Tibialis posterior.

kleine holligheyt f, waar in 't onderste deel van 't 1 Kuyt-been word ontfangen.

De uytleding van 't 2 Scheen-been, als ze in-of uytwaarts is, kan niet dan onvolkomen zijn, om dat de afgelegentheyt van 't in-en uytwendig deel te wijd, en groot is.

De uytleding van 't Scheen-been, is een *Anchilosis*, of aan een groeiing der Beenderen onderworpen, om dat de banden van binnen in de Geleding zomtijds breken, waar door 't voedzaam zap uytstort, en verhard met 't vogt, dat natuurlijk in de Geleding gevonden word; zo dat men om 't zelve te beletten, eenige dagen, na 't herstelt is, het zagtjes moet bewegen.

Een lijder te *Parijs* zijn Scheen-been gansch bedorven zijnde tot ontrent de eynden, daar 't van 't gezonde afgescheyden was, wierd in 't midden doorgezaagt, en beyde stukken uytgetrokken.

Te vooren in 't XV. Hoofdstuk van deze verhandeling is gezegt, dat het Opper-arm-been zomtijds bestaat uyt twee tafelen, tuschen welke een *Diploe* of tafel-scheydsel gevonden word; dat ook zomtijds zo geschied in 't Scheen-been: en als door een scherp vogt (gelijk ook zomtijds in 't Bekkeneel geschied) een deel van de uytwendige tafel was weg gegeten, als ook de inwendige dwers afgeknaagt word; zo kan de Heelmeester zomtijds de inwendige tafel of pijp, daar 't Merg in is, niet uyttrekken. Zie zo een Voorbeeld in 't VIII. Anatomisch Kabinet van den Heer *Ruysch* in de III. Tafel.

XXXII.
Tafel.
12. Figuur.

Het 3 Kuyt-been B, is veel dunder als 't 4 Scheen-been, en heeft geen eyge beweging, 't is ook eenigzints driekantig; maar wat ongelijker als 't voorgaande. Zie ook P 1. Fig.

Aan beyde eynden is 't dik: aan 't bovenste, dat wat ronder, en gelijk een hoofdeken is g, is een kleine ondiepe holligheyt, waar in een klein uytsteeksel, staande agter aan de uytwendige zyde van 't Scheen-been c, ontfangen word, en zijn daar beyde t' samen-

1 Fibula. 2 Tibia. 3 Fibula. 4 Tibia.

gebon-

gebonden door een band van de naast gelege ¹ Geleding.

Het onderste eynde, dat wat platter is h, maakt de uytwendige ² Enklauw, die wat laager als de inwendige is, om dat dit Been hier laager als 't Scheen-been komt; en boven gaat het zo hoog niet als 't andere, anders zijn ze beyde vaneene lengte: onmiddelijk boven zijn dik plat eynde, word het in een kleine holligheyt ontfangen, staande onder aan de uytwendige zyde van 't Scheen-been f, daar 't vast gebonden is, op dezelve manier als boven.

Het ³ Scheen-en ⁴ Kuyt-been, zijn van onderen en van boven met hun eynden t'samen vereenigt, gelijk 't ⁵ Elle-been, en de ⁶ kleine Pijp; maar vorders van malkander gescheyden, waar uyt een ruymte ontstaat, op welke plaats ze door een vliezigen band, die vast is op d'eene zyde aan 't Kuyt-been, en op d'andere aan een uytwendigen scherpen kant van 't Scheen-been, t'samen gebonden worden, gelijk de Beenderen des Onder-arms: welke ruymte dient tot plaatfing van de Spieren, en door den band worden de voorste Spieren van de agterste gescheyden.

De Dye-Scheen-en Kuyt-beenderen, hebben ontrent hun eynden veele kleine gaatjes van de Opper-, en Onder-arm Beenderen, tot doorgang der Bloed-vaatjes, en Zenuwen, en andere dienften, gezegt in 't III. Hoofdstuk der tegenwoordige Verhandeling.

Als 't Kuyt-been alleen, zonder 't Scheen-been gebroken is, is de breuk dikwils moeilijk te kennen; men moet den Voet naar alle zyden bewegen, waar door de breuk zomtijds gekent word.

Van voren in een holligheyt, daar 't ⁷ Dye-been t'samengevoegt is met 't Scheen-been, staat een plat-agtig, by na rond Been, genaamt de *Knye-schyf* N; ^{xxxii.} in Kinderen is 't Kraak-beenig, en in Bejaarden Beenig. ^{Tafel.}

Dit Been is ontrent twee dwerse Vingeren breed, ^{f. Figuur.} en in 't midden een Vinger dik; maar in den omtrek ^{en 13. Fig.} dunder, en van binnen spongieus.

¹ Articulatio. ² Malleolus. ³ Tibia. ⁴ Fibula. ⁵ Ulna.
⁶ Radius. ⁷ Os Femoris.

F f 5

Aan

Aan de voorste opper-vlakte is het wat oneffen en bultig, daar ook eenige kleine gaatjes zijn tot doorgang der bloed-vaatjes; van agteren is 't bekleed met Kraak-been tot beter beweging; in 't midden heeft het een verheventheyt, die in de holligheyt ontfangen word van 't Dye-been, en aan elke zyde een ondiepe holligheyt, waar in een deel van beyde hoofden des Dye-beens in ontfangen word, zo dat hier een onderlinge Ontfanging is.

Aan 't onderste, en puntige deel, is een sterke, zenuwagtige, breede band vast, die zig met 't andere eynde vast hegt in een stomp uytsteeksel, van voren ontrent 't opperste deel van 't 2 Scheen-been, die belet dit Been niet hooger te klimmen als 't behoort, waar door 't in zijn plaats gehouden word, als ook door een band van 't Dye-been, en een breede Pees, waar aan 't zeer vast is gemaakt uyt de Peezen van vier Spieren, die 't Been uytstrekken.

Dit Been is zo vast niet in zijn plaats, of 't kan wel wat bewogen worden: want als 't Scheen-been word gebogen, word de Knye-schyf neerwaarts, en in 't uytstrekken opwaarts bewogen, dat noodig was, op dat de Spieren niet belet zouden worden in haar werking, welke beweging by na t'eenemaal geschied op 't Dye-been.

De Knye-schyf vermeedert voornamelijk de kragt der Spieren, die 't Been uytstrekken.

Pareus, een der beroemste Heelmeesters van zijn tijd, zegt, dat al die de Knye-schyf gebroken hebben, genezen zynde daar na altijd mank gaan; maar de ondervinding leert het tegendeel.

Een Juffrouw 24. jaren oud, zeer mank aan een zyde gaande, om dat het Dyebeen uyt zijn plaats geraakt was door een inwendige oorzaak, en de Spieren van 't Been eenigzints verlamt, en zwak waren; valt met groot geweld op een blauwen steen, en breekt de Knye-schyf in 't midden dwers door van 't regt gaande Been; ik heb 't bovenste stuk gevoegt by 't andere, en van tijd tot tijd verbonden met een band,

1 Os Femoris, 2 Tibia.

waar

waar door 't in zijn plaats is gebleven. De Lydster heeft 7. weken, 't Been uytgestrekt zijnde, op haar rug te bed gebleven, en is genezen zonder eenig letfel, konnende het Been buygen en uytstrekken, gelijk te voren; maar dat wonder is, gelijk ze voor heen zeer mank gong, gong ze op verre na zo mank nu niet, zo dat de Spieren door de warmte van 'tbedde ('t was in den Winter) zo lang gehouden, versterkt zijn geworden, waar door ze beter gaat, als te voren.

Ik ken een Edele Juffrouw in deze Stadt, die haar Knye-schyf gebroken hebbende, genezen is, gelijk de voorgaande.

Vesalius zegt in zijn Heelkonst, dat dit Been van geen nut is, tot vastigheyt der Geleding, die zo vry is naar 't verlies, als te voren, 't gene hy zegt dikwils ondervonden te hebben.

Riolanus getuigt eenigen gezien te hebben, wier Knye-schyf uytgeleed zijnde, boven op de Knye was gebleven, dat ze daar na niet meer op oneffen plaatsen konden opklimmen, en nederdalen, als te voren.

Ik heb een Vrouw gekend, die haar Knye-schyf gebroken had in vier of vijf stukken, waar van eenige zo hoog getrokken waren op verscheyde plaatsen, dat ze onmogelijk herstelt konden werden, genezen zijnde, had ze moeilijkheyt in 't gaan.

Aangezien de ondervinding leert, dat de Knye-schyf gebroken zijnde, de een Mensch geneest zonder letfel in 't gaan, en de andere niet, zo kan 't geschieden, dat 't voedsaam zap overvloediger zijnde tot 't maken van ¹ Weer, als noodig is, uytstort in de ² Geleding, en verhardende met 't vogt, dat 'er natuurlijk gevonden word, een *Anchilosis* maakt, waar door 't Been na de genezing niet gebogen kan worden, en een beletfel in den gang geeft, en zo dat niet is, zal de Lyder geen letfel hebben.

MijnHeer *Mery* verhaald in de Gedenkschriften der voorgemelde Academie van iemand in 't Gasthuys ge-

¹ Callus. ² Articulatie.

storven, die een *Exostosis* of *Uytwassing* van Been had op de Knye, wegende 20. ponden.

HET XVIII. HOOFDSTUK.

Van den Voet.

Het derde en laatste Deel der onderste Ledematen, is de Voet, welke, gelijk de Hand, verdeeld word in drie deelen, den ¹ Voor-voet, ² Na-voet, en Teenen.

De Voor-voet, 't eerste, en grootste deel des Voets, bestaat uyt zeven Beenderen, verschillende in groote, en gedaante, zijnde van binnen spongicus, gelijk de Beentjes der Voorhand.

XXXII.

Tafel.

16. Figuur.

Vier Beenen zyn'er, die elk een byzonderen naam hebben, ende andere drie worden ³ Wigge-beenderen genaamt e e e, om dat ze als Wiggen tusschen de andere schynen ingeslagen.

De Kote.

XXXII.

Tafel.

12. Figuur.

'T eerste Been des ⁴ Voorvoets word genaamt de ⁵ Kote a, om de gelijkenis met de Note van een kruysboog. Zie ook 1. Fig. Q.

Dit Been is dik en ongelijk; op zommige plaatsen bultig, in andere uytgeholt: na voren uytstekende, op 't eynde wat verheven, en ey-wijs van gedaante, waar door 't ontfangen word in een holligheyt van 't ⁶ schip-wyze Been.

'T heeft zes zyden met Kraak-been bekleed, door welk 't met andere Beenderen t'samen gevoegt is.

De eerste en opperste, die aan de kanten wat verheven, en in 't midden uytgeholt is, word ontfangen van onderen in een ondiepe holligheyt van 't ⁷ Scheen-been, die in 't midden verheven is.

De tweede en derde staan op de zyden, en word de binnenste met de inwendige, en de buytenste met de uytwendige Enklauw t'samengevoegt, welke Enklauwen deze holligheyt van 't Scheen-been zeer helpen

¹ Tarsus. ² Metatarsus. ³ Ossa Cuneiform. ⁴ Tarsus. ⁵ Tarsus. ⁶ Os Naviculare. ⁷ Tibia.

verdiepen , tuffchen welke 't opperfte deel van dit Been als gedoken is , makende zo de 1 Geleding van den Voet

De vierde is uytgeholt , en ftaat agterwaarts ten deele uytwendig van onderen , en ontfangt een verheventheyt van 't Hiel-been , boven welk dit Been geplaatft is.

De vijfde zyde ftaat wat voorwaarts , inwendig van onderen , en is in tegendeel wat verheven , wordende ontfangen in een holligheyt van 't 2 Hiel-been ; zo dat tuffchen beyde die Beenderen , een 3 vaste onderlinge Ontfanging is.

De zesde ftaat op 't eynde , dat van voren uytsteekt , wat verheven , en ey-wijs van gedaante is , en ontfangen word in een holligheyt van 't 4 fchipwyze Been.

Alzo de 5 Kote een Been is , dat de 6 Geleding van den Voet , met 't 7 Scheen-en 8 Kuyt-been maakt , zo ftaat de uytwendige Enklauw , gemaakt van 't onderfte dik en platagtig eynde des Kuyt-beens , laager als de inwendige , en daarom gefchied de uytleding van den Voet meeft altijd inwaarts , of zo ze uytwaarts is , fcheyd gemeenlijk 't Kuyt-van 't Scheen-been , of 't word gebroken.

Het tweede Been van den Voor-voet is 't Hiel-been b ; 't is van binnen zeer spongieus , en 't grootste van den Voor-voet. Zie 1. Fig. R. XXXII. Tafel. 16. T Hiel-been. 16. Figuur.

'T heeft zijn plaats onder 't voorgaande , zijnde ongefchikt van gedaante , op eenige plaatsen uytstekende , en in andere uytgeholt.

In een 9 Geraamte fteekt het van agteren verreuyt , tot fteunfel van 't Lighaam , als men gaat of ftaat ; maar word in een Mensch zo niet gezien om de dikke fterke Pees , die zig in 't agterfte deel van 't Been inplant , en de plaats vervult.

Dit Been is van agteren dikker en breeder , als van voren , en t' famengevoegt met de vierde en vijfde

1. Articulatio. 2 Os Calcis. 3 Ginglymus Sinarth. 4 Os Naviculare. 5 Talus. 6 Articulatio. 7 Tibia. 8 Fibula. 9 Sceloton.

zijde

zijde der ¹ Kote, als ook met 't agterste deel van 't ² Teerling-wyze Been.

Aan zijn inwendige zijde is een groote groeve, door welke eenige Bloed-vaten, Zenuwen en Peezen gaan, die de Teenen helpen buygen.

Aan de uytwendige zijde van den Voet, in een ³ Geraamte, tusschen 't ⁴ Hiel-been, en de Kote is een holligheyt, gemaakt door t' samenkoms van twee andere holligheden: de een in 't onderste der Kote, en de andere in 't opperste, en voorste van 't Hiel-been: die in een Mensch met vet, en een lymige stoffe is vervult, onthouden in vliezige cellekens om de Kraak-beenderen, en banden te besmeeren en buygsaam te houden, by welkers gebrek een gekraak in die Beenderen ontstaat, als men gaat.

Schipwy-
ze Been.

Het derde des Voor-voets is 't ⁵ Schipwyze-been c. zo genaamt, om dat het in zijn agterste deel met een holligheyt, als een schipken, uytgeholt is; waar in 't verheve deel, of zelve zijde der Kote word ontfangen; maar van voren, daar 't wat bultig is, word het t' samengevoegt met de drie ⁶ Wigge-beenderen.

Teerling-
wyze
Been.

Het vierde is 't ⁷ Teerling-wyze Been d, dat zes zeer ongelijke zijden heeft; en staat uytwendig aan den Voet: met zijn agterste deel is 't t' samengevoegt met 't ⁸ Hiel-been; aan de zijde met 't ⁹ Schip-wyze, en een der Wigge-beenderen: en van voren met beyde uytwendige Beenderen van den ¹⁰ Na-voet.

XXXII.
Tafel.
16. Figuur.

De drie Wigge-beenderen e. e. e. verschillen in groote en gedaante: en zijn boven effener als onder: agter zijn ze t' samengevoegt met 't Schipwyze Been, en van voren met de drie eerste Beenderen van den Na-voet: 't eerste en grootste staat aan de inwendige zijde van den Voet, en is dikker onder als boven: het tweede en minste legt in 't midden, en is boven wat breed en dik, maar onder spits afgaande: het derde is 't middelbare, en staat uytwendig, hebbende de zelve gedaante, gelijk 't minste.

¹ Talus. ² Os Cubiform. ³ Sceleton. ⁴ Os Calcis. ⁵ Os Naviculare. ⁶ Ossa Cuneiform. ⁷ Os Cubiform. ⁸ Os Calcis. ⁹ Os Naviculare. ¹⁰ Metatarsus.

Daar

Daar de Beenderen van den Voor-voet met malkander, of met andere t'famengevoegt zijn, zijn ze bekleed met Kraak-been en vast met banden.

De Na-voet bestaat uyt vijf Beenderen 1. 1. 1. 'T eerste, dat op de groote Teen past, is dikker en korter als d'andere, en 't naast volgende is langer als d'andere: van agteren zijn ze dikker, als van voren: en staan agter dicht by een gevoegt, van waar ze voorwaarts gaande, tot aan de Teenen, allengskens van malkander wyken, waar door tusschen de zelve een ruimte ontstaat voor de ¹ tusschen-beenige Spieren, en de Voet word breeder.

Boven zijn ze alle wat bultig, en onder gebogen, zo dat ze t'famengevoegt met den Voor-voet, van onderen een holligheyt maken, die agter wat vermeerdert door de verheventheyt van 't ² Hiel-been.

Alle die Beenderen hebben aan hun voorste eynden ronde, en met Kraak-been bekleede hoofdekens, waar door ze t'famengevoegt zijn in de met Kraak-been bekleede holligheden van d'eerste Beentjes der Teenen, door 3 ondiepe Geleding, en van agteren zijn de eynden grooter en dikker.

'T eerste en dikste, dat op de groote Teen past, word t'famen-gevoegt met 't grootste 4 Wigge-been.

Het tweede word t'famen-gevoegt met 't minste Wigge-been, ook door zijn zijden met de zijden van 't grootste, en middelbare Wigge-been.

Het vierde en vijfde zijn t'famen-gevoegt met 't 5 Teerling-wyze Been, welker laatste, dat op de kleine Teen past, aan de uytwendige zijde, een merkelyk uytsteeksel heeft.

De Teenen bestaan uyt veertien Beentjes, yder uyt drie behalven de groote, die'er twee heeft, grooter als de andere 2. 2. 2. 16. Fig.

De groote Teen heeft twee Beenderen, omdat zijn eerste word gestelt onder die van den ⁶ Na-voet, en

1 Musculi interossei. 2 Os Calcis. 3 Arthrodia. 5 Os Cuneiform. 5 Os Cubiform. 6 Metatarsus.


niet beweegt word, zo dat de Na-voet uyt vijf Beenderen bestaat, tot onderscheyd der Na-hand, die'er vier heeft, om dat 'teerste van den Duym word bewogen op de Beentjes der Voor-hand, gelijk in 't XV. Hoofdstuk van deze verhandeling is gezegt.

De eerste Beentjes der Teenen zijn langer als de volgende: en zijn t' samengevoegt en gebonden met banden, even als die der Vingeren, uytgenomen den Duym, die iets byzonders in zijn t' samenvoeging heeft, en ze zijn van 't zelve maakfel; maar korter en dunder.

Aan 't uyteinde van yder laatste Beentjen der Teenen, is een kleine halve-maans wyze verhevenheit, waar aan de Nagelen zig vast hegten.

I Metacarpus.

UYT-



U Y T L E G G I N G

der

F I G U R E N ,

van de

XXXII. T A F E L.

Waar in vertoont worden de Beenderen ge-
legen onder 't Hoofd.

<i>De 1. Figuur vertoont de Beenderen t' samen gevoegt in hun natuurlijke gestaltenis.</i>	a Het zwaartwyze Kraak-been.
2. 7. Zes Wervel-beenderen des hals, 't eerste ontbreekt.	B Het voorste deel van 't Schouderblad.
8. 19. De Wervel-beenderen des rugs.	C Het Sleutel-been.
20. 24. De Wervel-beenderen der lenden.	b De bovenste Ribbe.
25. 30. De Wervel-beenderen van 't Heylig-been.	D Het Darm-been.
1. 7. De zeven waare Ribben.	E Het Heupe-been.
8. 12. De valsche Ribben.	e Het bekken of ruymte tusschen 't Heupen Heylig-been.
A Het Borst-been.	F Het Schaam-been.
	i Het gat, uyt t' samen - voeging van 't Schaam - en Heupe-been.
	G Het opper Arm-been.
	H Het Elle-been.
	I De kleyne Pyp.
	G g K

K De beentjes der Voor-hand.

L De beentjes der Na-hand.

1. 2. 3. Drie ryen van de beentjes der Vingeren.

M Het Dye-been.

N De Knye-schyf.

m 'T hoofd van 't Dye-been.

n De groote Drayer.

o De kleyne Drayer.

O Het Scheen-been.

P Het Kuyt-been.

Q De beenderen des Voorvoets.

R Het Hiel-been.

S De Beenderen des Navoets.

T De ryen van de Beenderen der Tee-nen.

De 2. Figuur vertoont 't eerste Wervel-been des hals alleen.

aa De bovenste schuynse uytsteekfels.

b b De onderste.

c c De dwerse uytsteekfels.

De 3. Figuur vertoont het tweede Wervel-been van voren gezien.

De 4. Figuur vertoont 't zelve van agteren.

a De Tand.

b 'T agterste uytsteekfel.

De 5. Figuur vertoont een der Wervel-beenderen van den Rug.

De 6. Figuur vertoont een der Lenden.

a Het voorste deel.

b Het agterste deel.

De 7. Figuur vertoont de Ruggraat, uytgenomen 't eerste Wervel-been.

2. 7. De Wervel-beenderen des hals.

8. 19. De Wervel-beenderen van den Rug.

20. 24. De Wervel-beenderen der Lenden.

25. 30. De valsche Wervel-beenderen van 't Heylig-been.

A Het voorste deel van 't Heylig-been.

B 'T agterste deel.

C Het Staart-been.

De 8. Figuur vertoont de agterste, of buytenste

ste zyde van 't Schou-
derblad.

A De Rug van 't
Schouderblad.

B Een groot uytsteek-
fel *Spina* genaamt.

C C Twee hollighe-
den voor twee Spie-
ren.

D Het steunfel van 't
Schouder-blad.

E De bovenste hoek.

F De onderste hoek.

G De Schouder-top,
of *Acromium*.

H Het ravenbeks wy-
ze uytsteekfel.

I De Hals.

De 9. *Figuur* vertoont
het opper-Arm-been.

A Het opper-Arm-
been van voren ge-
zien.

B Het zelve van ag-
teren.

C Des zelfs hoofd.

a Een groef voor
een der hoofden of
peezen der Tweehoof-
dige Spier.

b De inwendige groot-
ste verheventheyt.

c De uytwendige ron-
dagtige verheventheyt.

d d Een groot en kleyn
uytsteekfel.

e De grootste groef.

f De voorste holligheyt.

g De agterste en groot-
ste.

De 10. *Figuur* vertoont
't Ellebeen, en de klei-
ne Pyp.

A De kleine Pyp.

B Het Elle-been.

a Het agterste uyt-
steekfel of bek.

b Het voorste.

c De halfmaans-wyze
holligheyt.

d Een scherp uytsteek-
fel.

e Het plat rond hoof-
deken der kleine Pyp.

f Een kleyn uytsteek-
fel.

h Twee ondiepe hol-
ligheden.

De 11. *Figuur* vertoont
de beenderen der Hand.

a De eerste rye van de
beentjes der Voorhand.

b De tweede rye van
de beentjes der Voor-
hand.

c c c c De vier beent-
jes der Na-hand.

1. 2. 3. Drie ryen van

G g 2 de

de beentjes der Vingeren.

De 12. Figuur vertoont het Dye-been.

A Het hoofd van 't Dye-been met zijn hals.

B De groote Drayer.

C De kleyne Drayer.

DD De onderste hoofden.

E Een wyde, diepe holligheyt, waar in een uytsteekfel van 't Scheen-been word ontfangen.

De 13. Figuur vertoont de Knye-Schyf van voren gezien.

De 14. Figuur vertoont 't Scheen- en Kuyt-been.

A Het Scheen-been.

B Het Kuyt-been.

a a Twee holligheiden, waar in de hoofden van 't Dye-been ontfangen worden
DD.

b Een kleyne uytsteekfel, 't welk ontfangen word in een holligheyt van 't Dye-been E.

c Een kleyne hollig-

heyt.

d De inwendige Enklauw.

e Een holligheyt, waarin de Kote word ontfangen.

f Een kleyne holligheyt aan de zyde.

g Het opperste hoofden van 't Kuyt-been.

h Het onderste, dat platter is, en de uytwendige Enklauw maakt.

De 15. Figuur vertoont de t' samenvoeging van 't Dye-en Scheen-been.

A Het onderste deel van 't Dye-been.

B Het bovenste van 't Scheen-been.

c c Twee rondagtige hoofden van 't Dye-been.

d f Banden, waar door die beenderen worden t' samen gebonden.

De 16. Figuur vertoont de Beenderen van den Voet.

a De Kote.

b Het Hiel-been.

c Het Schipwyze-been.

d Het Teerlingwyze-been.

eee

e e c	De Wigge-been-	voet.
	deren.	2. 2. 2. 2. De beent-
i. i. i. i.	De Been-	jes der Teenen.
	deren van den Na-	

HET XIX. HOOFDSTUK,

Van de Zaad-beentjes.

MEn vind op de 1 Geledingen der Vingeren in 't binnenste der Hand, en onder aan de Teenen, tusschen de banden, en peezen, zekere kleyne, ronde platte beentjes, welke om de gedaante, en groote van het *Bilzen-Zaad*, *Ossa Sefamoidea* genaamt worden.

In jonge Kinderen zyn ze kraak-beenig; maar in Bejaarden beenig: aan de zyde, daar ze vereenigen met de Beenderen, hebben ze een dun Kraak-been, tot ligter beweging.

Twee, die de andere in groote overtreffen, vind men onder aan de 2 Geleding, die gemaakt word door 't rond hoofdeken van 't eerste Been van den 3 Na-voet, met 't eerste van den grooten Teen, waarvan 'er een zo groot is, als een halve groote erwt: die men in de Teenen vind, zyn minder, als die der Vingeren.

Gemeenlyk zyn ze aan d' eerste Geledingen der Vingeren, en Teenen, en aan de tweede, en derde Geleding van den Duym; maar niet aan d' eerste.

Zodanige worden gevonden aan d' uytwendige zyde der Hand, daar 't agtste beentjen der 4 Voor-hand t'samen gevoegt is met 't beentjen der 5 Na-hand, dat op den kleinen Vinger past, als ook in oude luyden, aan d' uytwendige zyde van den Voet, daar 't 6 Teerlings-wyze Been t'samengevoegt is met 't Been van den Na-voet, dat op den kleinen Teen past.

Het getal dezer beentjes is in alle menschen niet

1 Articulationes. 2 Articulatio. 3 Metatarsus. 4 Carpus. 4 Metacarpus. 6 Os Cubiform.

even eens; sommigen tellen 'er tien in de Hand, en zo veel in den Voet: anderen twaalf: zommigen zestien, en anderen wel negentien in de Hand, en zo veel in den Voet.

Dat ongelyk getal ontstaat uyt de kleynheyt dezer Beentjes, die in 't schoon maken der gekookte Beenderen, ligtelyk met de peezen, en banden, kunnen weg genomen worden.

De Zaad-beentjes dienen om de ledige ruymte der ¹ Geleding te vullen, ook om de uytleidingen te beletten, en de peezen in haar plaats te houden, op dat ze zig bewegende, van de ronde hoofdekens der Beentjes niet affchuyven.

HET XX. HOOFDSTUK.

Van 't onderscheyd tusschen de Beenderen van een Vrouw en Man.

VAN te voren is iets gezegt van 't onderscheyd, tusschen de Beenderen van een Vrouw, en Man, dat men hier verder zal uytbreyden.

Naad des
Voor-
hoofds-
been.

Alzo 't Voorhoofds-been in Kinderen, door een ² Naad in twee gescheyden is, tot boven aan den Neus, zo zeggen eenigen, dat het in de Vrouwen altyd zo gescheyden blijft, 't geen onwaar is: want men vind zo wel 't Voorhoofds-been van een Man, als van een Vrouw, door een Naad in twee gescheyden, hoewel 't dikwilder in de Vrouwen, als in de Mannen geschied.

Sleutel-
beende-
ren.

De ³ Sleutel-beenderen zyn in de Vrouwen minder gekromt of gebogen, als in de Mannen, waar door ze den Hals en Boezem schoonder hebben.

De Borst is ook platter in de Vrouwen, als in de Mannen, tot beter plaatsing der Borsten, die in de Vrouwen grooter zyn, als in de Mannen.

Heylig-
been.

Het ⁴ Heylig-been is in de Vrouwen korter, bree-der, en regter, en staat van onderen meer uytwaarts,

¹ Articulatio. ² Sutura. ³ Claviculae. ⁴ Os Sacrum.

gelijk

gelijk ook 't ¹ Staart-been, als in de Mannen. ² De ^{Staart-}Naamlooze Beenderen zijn breeder, en staan onder ^{been, en} meer uytwaarts, in de Vrouwen als Mannen, zo dat ^{Naamloo-}'t Bekken, of groote holligheyt, gemaakt door t'sa- ^{ze Been-}dering. menvoeging dezer Beenderen, met 't Heylig-been, veel ruymmer is, als in de Mannen, op dat de Lytmoeder met de Vrugt beter plaats zou hebben, en als dan door de breedte van 't ³ Darm-been ondersteunt worden, en de Vrugt met minder moeyelijkheid uytgeraken.

De Beenderen van een Man zijn gemeenlijk harder, en grooter, als die van een Vrouw, op alderhande manier gemeten, dat verstaan moet worden, dat de Beenderen van een groot Man grooter zijn, als die van een groote Vrouw.

Ook is 'er een groot onderscheyd tusschen de Beenderen der nieuw-gebore Kinderen, en bejaarde Menschen: want vele Beenderen zijn t'samen gegroeyt in Bejaarden, en in Kinderen van een gescheyden, zo dat in de laatste vele Kraak-beenderen zijn, die in de eerste in Been moeten veranderen.

¹ Os Coccygis. ² Innominat. ³ Os Ilium.

UYT.

U Y T L E G G I N G

der

F I G U R E N,

van de

XXXIII. T A F E L.

Waar in vertoont worden eenige Beenderen
van den Tronk des Lighaams.

*De 1. Figuur vertoont het
Borst-been , vereenigt
met de kraak-beenige
deelen der Ribben.*

ABC Het Borst-been.

A Het bovenste , en
breedste Been.

B Het middelste , en
langste.

C Het onderste , en
kortste.

D Het zwaart - wyze
Kraak-been.

aa Twee holligheden,
waar in de dikste eyn-
den der Sleutel-been-
deren ontfangen wor-
den.


bb Twee andere hol-

ligheden , waar in de
kraak-beenige deelen
der eerste Ribben,
ontfangen worden.

c Een groef tot door-
gang voor de Longe-
pijp.

dd De kraak-beenige
deelen der tweede
Ribben , die ontfan-
gen worden in de hol-
ligheden , gemeen tuf-
schen 't bovenste , en
middelste Been.

ee De kraak-beenige
deelen der Ribben,
die ontfangen worden
in de holligheden van
't middelste , en on-
derste



derfte Been.

ff Tuffchenheden of ruymten , die de kraak-beenige deelen der Ribben op die plaats door hun vereeniging, zomtijds nalaten.

gg Verfcheyde vereenigingen van kraak-beenige deelen der Ribben.

De 2. Figuur vertoont de bovenfte of eerfte Ribbe, die onder en boven plat is.

A De bovenfte oppervlakte.

B Het agterfte eynde of uytfteekfel , waar door ze t'samen gevoegt word in een holligheyt met 't eerfte Wervel-been van den Rug.

C Het voorfte eynde, door welk ze vereenigt is met 't kraak-beenig deel b van de 1. Fig.

D Een tweede uytsteekfel, waar door ze t'samen gevoegt word in een holligheyt van

't dwers uytsteekfel.

De 3. Figuur vertoont de onderfte of laaste Ribbe.

A Het agterfte eynde, door welke ze t'samen gevoegt word met 't Wervel-been.

B Het andere eynde, dat met de naburige niet vereenigt.

De 4. Figuur vertoont 't Heylig-been van agteren gezien.

A Het lighaam van 't Heylig-been.

B B Zyn dwerse uytsteekfels.

C C De bovenfte fchuynse uytsteekfels van 't eerfte valsche Wervel-been.

D Het Staart-been.

aa Vier gaten aan elke zijde, agter en voren.

bb Het vijfde paar Zenuwen des Heylig-beens, die hier uytkomen door een gat aan elke zijde.

d Een drie-hoekige opening.

ee De onvolmaakte

Gg f doorn-

doornagtige uytsteekfels.

f Een opening in 't kanaal van 't Heylig-been, dat in alle zo niet is.

g Een kleyne holligheyt.

h Een grooter.

ikk Twee holligheden tot t'famen-voeging voor 't Naamloos-been.

25. 29. De valsche Wervel - beenderen, die 't Heylig-been uytmaken.

De 5. Figuur vertoont de binnenste opper-vlakte van 't Naamloos-been.

A Het uytgeholt deel van 't Darm-been.

BB De bovenste omtrek van 't Darm-been.

CC Het deel, waar door t'saam-gevoegt word met 't Heylig-been.

DH Het Heupe-been.

EF Het Schaam-been.

E Het deel, door welk 't vereenigt is met 't Heupe-been H.

F Het voorste deel, waar door 't vereenigt is met zijn weergaa boven de Schamelheyt.

G Het groote gat, dat ontstaat door de vereeniging van 't Heupen Schaam-been.

H Het onderste deel van 't Heup- en Naamloos-been.

a a Uytsteekfels van den bovensten omtrek van 't Darm-been.

b Een schuyns loopende groef, waar langs de Zaad-vaten loopen.

c Een scherp uytsteekfel van 't Heupe-been.

d Een lange scherpe kant tot vast-hegting der Buyk-spiere.

De 6. Figuur vertoont de buytenste opper-vlakte van 't Naamloos-been.

A De rug van 't Darm-been.

BB De bovenste omtrek van 't Darm-been, van welke d groot

groote Bil-spier voortkomt.

C Een ruwe streep, van welke de middelste Bil-spier voortkomt.

C Een andere, van welke de kleyne Bil-spier voortkomt.

D H Het Heupe-been.

E F Het Schaam-been.

G Een groot gat, ontstaande door de vereeniging van 't Heup- en Schaam-been.

H Het onderste deel van 't Heup- en Naamloos-been.

I De groote holligheyt of panneken.

a Een groef, die gemeenschap heeft met 't panneken.

b Een scherp uytsteeksel, *Spina* genaamt.

d d Een oneffen uytstekende boord, van welken de Spieren voortkomen, die de Dye inwaarts bewegen.

DE ZESDE VERHANDELING

DER

HEELKONSTIGE ONTLEDING

VAN 'S MENSCHEN LIGHAAM.

VAN DE SPIEREN.

HET I. HOOFDSTUK.

Van de Spieren des Opper-arms.

TE voren in 't VIII. Hoofdstuk der I. Verhandeling is gesproken van 't maaksel, getal, en gebruyk der deelen van de Spier; ook heeft men op verscheyde plaatsen beschreven eenige Spieren

ren in 't byzonder, gelijk de Spieren des Buyks, van den Endel-darm, der Ballen, Midden-rift, Hart, en Aangezigt: zo om dat ze de deelen, in de vorige Verhandelingen beschreven, uytmaken, of zodanige gemeenschap met dezelve hebben, dat zonder de beschryving van hun Spieren, dezelve onvolmaakt zouden geweest hebben: daar is dan overig te beschryven de Spieren van 't Hoofd, Hals, Rug, Lenden, Schouder-bladen, Ribben, en der Ledematen. Maar schoon de waardigheyt der deelen, hun plaatsing, en ordere te voren gehouden, schijnt te vereyffchen, dat men eerst beschryve de spieren des Hoofds, des Hals, en dan de overige van den Tronk, en eyndelijk men kome tot die der Ledematen, zo is 't beter deze Verhandeling te beginnen met de beschryving der spieren van den Opper-arm, zo om dat ze door 't grootste deel van den Tronk uytgestrekt, en onder die, ook eenige van de andere gedoken leggen.

De Spieren des Opper-arms.

De Opper-arm word opwaarts, nederwaarts, voorwaarts, en agterwaarts, en na de Ribben bewogen, door negen spieren.

Driehoekige spier.
XXXIV.
Tafel.
1. Figuur.

De Opper-arm word opwaarts bewogen door twee spieren: de Driehoekige en de Oppergraat-spier. De ¹ Driehoekige spier G, neemt haar begin van 't midden des Sleutel-beens, van 't *Acromium*, en de geheele graat van 't Schouder-blad, en plant zig met een zeer sterke pees, omtrent 't middenste, en uytwendige deel van 't Opper-arm-been. *Stenon* scheidt dezelve in twaalf enkele spieren.

Oppergraat-spier.

De tweede is de ² Opper-graat-spier G 2. Fig. deze vult de holligheyt, boven de graat van 't Schouder-blad, en begint van 't buytenste, en opperste deel des steunsels van 't zelve, ter plaats van den bovensten hoek, en voortgaande, plant zig met een lange breedte pees, die 't hoofd van 't Opper-arm-been omvangt, in 't opperste deel van 't zelve.

De Opper-arm word nederwaarts bewogen door de groote, ronde, en breedste Rug-spier.

Groote ronde.

De ³ groote ronde K 1 Fig. begint van 't uytwen-

1 *Deltoides*. 2 *Supra-spinatus*. 3 *Rotundus Major*.

dig deel van den onderften hoek van 't Schouder-blad, en zijn pees vereenigende met die der breedfte Rug-fpier, plant zig in 't opperfte, en inwendig deel van 't Opper-arm-been.

De ¹ breedfte Rug-fpier, of Aars-krouwer B 2. Fig. ^{Breedfte Rug-fpiers of Aars-krouwer.} neemt haar begin van de kleyne doornagtige uytsteekfels van 't Heylig-been, en der doornagtige uytsteekfels van de Wervel-beenderen der Lenden, der vier onderfte doornagtige van de Wervel-beenderen des Rugs, als mede van den uytwendigen boord van 't ² Darm-been, en bedekt 't uytwendig deel der valfche Ribben, of grootfte des Rugs, en zig vast hegende aan den onderften hoek van 't Schouder-blad, plant zig in by de voorgaande, aan 't opperfte inwendig deel van 't Opper-arm-been. Deze Spier door den verfcheyden loop van haar vezelen, trekt den Arm nederwaarts op verfcheyde manieren.

De Opper-arm word voorwaarts bewogen, door de Borft- en Raven-beks-fpier.

De ³ Borft-fpier F 1. Fig. ^{De Borft-fpier.} neemt haar begin van 't Sleutel-been, van 't Borft-been, en de vijfde, zesde, en zevende waare Ribbe, bedekt by na de helft van de Borft, en plant zig met een korte zenuwagtige pees, aan 't opperfte, en eenigfints uytwendige deel van 't Opper-arm-been, vier dwerfe vingeren onder 't Hoofd, tuffchen de drie-hoekige en twee-hoofdige Spier, en beweegt den Arm voorwaarts.

De ⁴ Ravenbeks-fpier B 1. Fig. ^{De Ravenbeks-fpier.} komt voort van 't Ravenbeks - wyze uytsteekfel van 't Schouder-blad, en plant zig in 't middenfte en inwendig deel des Opper-arm-beens; hare Buyk is langwerpig, en doorboort van de zenuwen, die naar de fpieren van 't ⁵ Elle-been gaan, en beweegt den Arm voorwaarts.

De Opper-arm word agterwaarts bewogen door de Onder-graat-fpier, en de kleyne ronde.

De ⁶ Onder-graat-fpier H 2. Fig. ^{D'Onder-graat-fpier.} neemt haar begin van het fteunfel van 't Schouder-blad, onder de graat, en die gehele holligheyt, en 't bultig deel van 't

¹ Latissimus of Aniscalptor. ² Os Illium. ³ Pectoralis. ⁴ Coracoideus. ⁵ Ulna of Cubitus. ⁶ Infra-spinatus.

Schouder-blad onder de graat vullende, plant zig in 't opperste, en agterste deel van 't Opper-arm-been, en beweegt den Arm agterwaarts.

De kleyne
ronde.

De kleyne ronde I 2. Fig. neemt haar oorspronk van den uytwendigen boord der onderste zyde van 't Schouder-blad, ontrent den onderste hoek, en geplaatst langs de gemelde zyde, plant zig, gelijk de voorgaande, in 't opperste, en agterste deel, van 't Opper-arm-been, en beweegt den Arm agterwaarts.

D'Onder-
schouder-
blads-
spier.

De Opper-arm word na de Ribben bewogen, door de 1 Onderschouderblads-spier K 1. Fig. deze vult het geheele binnenste uytgeholt deel van 't Schouder-blad, en neemt haar oorspronk van binnen van het geheele steunsel van 't Schouder-blad, en plant zig met een breede pees in 't inwendig, en opperste deel van 't Opper-arm-been: deze spier drukt den Arm tegen de Ribben, als men 'er iets onder wil dragen.

Beweging
in 't rond.

Als deze Spieren t'samen werken, d'een agter de andere, bewegen ze den Arm in 't rond.

De reden, dat zo moeyelijk is de uytgeleede Beenderen te herstellen, is, als de Spieren, die behooren tot het Lid, groot, sterk, en veel zijn: want gelijk de Spieren altijd eenigfints in werking zijn, trekken ze 't uytgeleede Been na zig. Zo dan als het Opper-arm-been is uytgeleed, heeft men zomtijds groote moeyte, meest in kloeke Menschen, om die te herstellen, om dat de driehoekige Spier, die groot, en sterk is, benevens d'andere, 't Lid na zig trekt. Als men 't wil herstellen, moet de kragt der Spieren overwonnen worden door een genoegsame uytrekking; zonder dat, kan men 't uytgeleede Been niet herstellen, daarom moeten de Werktuygen, om d'uytgeleede Beenderen te herstellen, een genoegsame uytrekking doen, eer men 't Been kan inbrengen.

I Subscapularis.

HET II. HOOFDSTUK.

Van de Spieren des Schouder-blads.

HET Schouder-blad word opwaarts, nederwaarts, De Spieren van 't Schouder-blad.
 voorwaarts, en agterwaarts bewogen door vier
 eygene Spieren.

De ¹ Opligter van 't Schouder-blad C, komt voort ^{XXXIV.}
 met twee, of drie pezige hoofden, van drie, of vier ^{Tafel.}
 dwerfe uytsteekfels, des tweede, derde, vierde, en ^{1. Fig.}
 vyfde Wervel-beens des Hals, en wat schuyns van vo- ^{D'Oplig-}
 ren na agteren nederdalende, plant zig in den boven- ^{ter van 's}
 sten hoek van 't Schouder-blad, en trekt het op- ^{Schouder-}
 waarts. Zy word genaamt de Spier van gedult, ^{blad of}
 om dat men zelden de Schouders optrekt, ten zy om ^{Spier van}
 te beteekenen, dat ons eenig droevig geval is overge- ^{gedult.}
 komen, waar in men gedult moet hebben.

De tweede is de ² Tafel-, of Monink-kaps-wyze ^{Tafel- of}
 Spier A 2. Fig. zo genaamt, om dat zy met haar ^{Monink-}
 mede-maat een Kapucijne kap gelijkt, ze komt voort ^{kaps-wy-}
 van 't middelste, en zomtijds onderste deel van 't Ag- ^{ze Spier.}
 terhoofds-been, van de zes doornagtige uytsteekfels
 der Wervel-beenderen des Hals, en de negen opperste
 des Rugs. In haar midden is zy vast aan de graat
 van 't Schouder-blad, aan 't *Aeromium*, en 't eynde
 van 't Sleutel-been, aan die zyde. En gelijk de veze-
 len van die Spier verscheyden zijn van loop, zo doen
 ze ook verscheyde bewegingen: want die nederdalen
 van 't Agterhoofds-been, trekken 't Schouder-blad
 schuyns om hoog; die vast zijn aan de doornagtige
 uytsteekfels des Hals, trekken 't na agteren, en die
 voortkomen van de negen opperste des Rugs, trekken
 't Schouder-blad na beneden.

Die het Schouder-blad agterwaarts beweegt, is de ^{De Tar-}
³ vierkante of Tarbot-wyze Spier D 2. Fig. deze ^{bot-wyze}
 legt onder de voorgaande, en komt voort van de ^{Spier.}
 doornagtige uytsteekfels der drie onderste Wervel-

1 Musculus patientia. 2 Trapezius of Cucullaris. 3 Rhomboides.

been-

beenderen des Hals, en der drie bovenste des Rugs, en plant zig uytwendig in het geheele steunfel van 't Schouder-blad, en trekt het agterwaarts.

De kleyne
voorst-
Zaag-
spier.

De vierde is de kleyne voorste Zaag-spiet I 1. Fig. ze legt van voren onder de Borst-spiet, en komt voort met drie, of vier tanden, van 't beenig deel der tweede, derde, en vierde opperste Ribbe, zomtijds van de derde, en vierde, en schuyns opwaarts klimmende, plant zig met een breede pees in 't Ravenbeks-wyze uytsteekfel, en beweegd het Schouder-blad voorwaarts.

HET III. HOOFDSTUK.

Van de Spieren des Hoofds.

Het Hoofd word gebogen, uytgestrekt, en half rond bewogen, door veertien Spieren, zeven aan elke zyde.

De Tepel-
wyze
Spieren.

Het word gebogen door de Tepel-wyze Spieren A 1. Fig. zy komen voort van 't bovenste en buytenste deel van 't Borst-been, en 't voorste van 't Sleutel-been, en schuyns opklimmende, planten zig in 't Tepel-wyze uytsteekfel van 't Slaap-been, waar van ze haar naam draagen.

Het Hoofd word opgeregt, of uytgestrekt door vier Spieren aan elke zyde, waar van twee groote, en twee kleyne zijn.

De Spalk-
wyze
Spier.

De eerste van de groote, is de ² Spalkwyze Spier D 4. Fig. ze komt voort van de doornagtige uytsteekfels der vyf opperste Wervel-beenderen des Rugs, en der drie, of vier opperste des Hals, en plant zig schuyns gaande in 't agterste, en zydelyke deel van 't Agterhoofds-been, agter de Tepel-wyze Spier.

De t'Sa-
menge-
vlogte.

De tweede is de t' 3 Samen-gevlogte E 4. Fig. ze legt onder de voorgaande, neemt haar oorspronk van de dwerse uytsteekfels der zelve Wervel-beenderen, daar de Spalk-wyze spier van komt, en plant zig

1 Serraticus Anticus. 2 Splenius, 3 Complexus.

schuyns

schuyns gaande in 't agterste, en middelste deel van 't Agterhoofds-been, het zelve bekleedende met een breede pees. Die Spieren kruyssen zig schuyns, als van een zyde werkende; zonder de andere, word 't Hoofd na de zyde beweegt; zo dat ze dan t' samen werken om 't Hoofd regt uyt te strekken, of op te regten.

Alzo 't Agterhoofds-been breede peezen heeft van de Tafel-, Spalkwyze-, en t' Saamgevlogte Spieren, zo is 't, dat ze geplettert zijnde, groot ongemak veroorzaken.

De eerste der twee kleyne, is de groote regte ^{De groote} ~~Spier~~ a 5. Fig. neemt haar begin van 't doornagtig uyt-^{regte.} steeksel des tweede Wervel-beens des Hals, en plant zig in 't agterste en zydelijk deel van 't Agterhoofds-been, een weynig onder de inplanting der twee groote; om deze Spieren, heeft 't eerste Wervel-been des Hals geen doornagtig uytsteeksel.

De tweede is de kleyne regte c 5. Fig. ze komt ^{De kleyne} ~~voort~~ van een kleyne oneffe verheventheyt, van het ^{regte.} agterste, en middelste deel van 't eerste Wervel-been des Hals, en plant zig dicht by de voorgaande, onder welke ze legt; als de twee groote en kleyne Spieren aan beyde zyden werken, strekken ze 't Hoofd regt uyt.

De half ronde beweging van 't Hoofd, na de rechter of linker zyde, geschied door de groote en kleyne schuynse Spier.

De groote schuynse Spier d 5. Fig. die men onder ^{De groote} ~~die~~ van 't Hoofd stelt, schoon zy 't zelve niet raakt, ^{schuynse.} neemt haar oorspronk van 't doornagtig uytsteeksel des tweede Wervel-beens des Hals, en plant zig in 't dwerse uytsteeksel van 't eerste.

De kleyne schuynse e 5. Fig. neemt haar begin van ^{De kleyne} ~~'t~~ onderste en zydelijke deel van 't Agterhoofds-been, ^{schuynse.} en plant zig in 't dwerse uytsteeksel van 't eerste Wervel-been des Hals.

HET IV. HOOFDSTUK.

*Van de Spieren des Hals.*Spieren
des Hals.De Onge-
lijkzydige.

DE Hals heeft aan elke zijde vier Spieren, twee, die hem buygen, en twee, die hem uytstrekken.

De eerste der buygers, is de ¹ Ongelijkzydige **D** ¹ Fig. ze komt voort van 't opperste, en middelste deel der eerste Ribbe, met een begin, en met 't andere, van 't binnenste deel des ² Sleutel-beens, ontrent 't *Acromium*, latende een ruymte tusschen beyden, tot doorgang der Vaten; die twee hoofden zig vereenigende, planten zig aan de eynden der dwersse uytsteekfels van drie of vier der bovenste Wervelbeenderen des Hals.

De lange.

De tweede, die den Hals regt na voren buygt, is de lange **E** ¹ Fig. en legt onder den ³ Slok-darm, en begint van 't zydelijk deel des Lighaams der vier bovenste Wervelbeenderen des Rugs, en gelegen tegen die des Hals, plant zig met een korte, sterke pees, in een kleyne verheventheyt, van voren in 't midden van 't eerste Wervel-been.

De uyt-
strekkers
des Hals.
De Graat-
spier.

De Spieren, die den Hals uytstrekken, zyn de Graatige en Dwersse.

De Graat-spier neemt haar oorspronk van de doornagtige uytsteekfels der vyf opperste Wervelbeenderen des Rugs, en plant zig in de zes onderste des Hals.

De dwers-
se.

De Dwersse tweede uytstrekker des Hals, komt voort van de dwersse uytsteekfels der vyf opperste Wervelbeenderen des Rugs, en plant zig in die des Hals. Als een der buygers van den Hals werkt met een der uytstrekkers van een zelfde zyde, word den Hals bewogen na de Schouder van die zyde, en wanneer die Spieren t'samen werken, word den Hals regt gehouden.

¹ Scapula. ² Clavicula. ³ Oesophagus.

HET V. HOOFDSTUK.

Van de Spieren der Lenden en Rug.

DE Lenden worden gebogen, en uytgestrekt door vier spieren aan elke zyde.

Een der buygers, is de vierkante Spier N 1. Fig. De vierkante Spier. eenigen noemen haar de drie-hoekige, ze neemt haar begin van den uytwendigen boord, aan 't opperste deel des Darm-beens, en inwendig deel van 't Heylig-been, en opgaande, plant zig in de dwerse uytsteekfels van de Wervel-beenderen der Lenden, en in de laatste Ribbe.

De Lenden en Rug worden uytgestrekt door de langste, heylige, en half-gratige Spier.

De 1 langste van den Rug O 2. Fig. neemt haar oorspronk van 't bovenste deel des Heylig-beens, Darm-been, en eenige Wervel-beenderen der Lenden: in 't begin is ze zeer verward met de 2 Heylig-lende spier, en vorders opgaande door den Rug, plant zig in de dwerse uytsteekfels van ieder Wervel-been, zomtijds in 't eerste des Hals, en Tepel-wyze uytsteekfel van 't Slaap-been. De langste van den Rug.

De 3 Heylige spier P 2. Fig. is in haar begin vleezig en eng, komt voort (geplaatst onder de voorgaande) van 't agterste des Heylig-beens, en plant zig in de dwerse uytsteekfels van de Wervel-beenderen der Lenden en Rug.

D' 4 half-Gratige o 2. Fig. begint met een breede De half-Gratige. Pees van de doornagtige uytsteekfels van 't Heylig-been, en plant zig in de dwerse Wervel-beenderen des Rugs en Hals.

Als de uytstrekkers t' samen werken, word de Rug-graat regt gehouden, en een der buygers met een der uytstrekkers, of meer t' samen werkende, word 't Lighaam na de zyde gebogen; en in 't rond bewogen, als die Spieren te gelijk, en de een agter de ander werken.

1 Longissimus. 2 Sacro-Lumbus. 3 Sacer. 4 Semi-Spinatus.

H h 2

H E T

HET VI. HOOFDSTUK.

Van de Spieren der Dye.

NU moet men handelen van de Spieren der Dye. De Dye word gebogen, uytgestrekt, inwaarts, uytwaarts, en half rond bewogen.

De buygers zijn drie: de Lende- en Darm-been-spier, en de Lood-verwige.

De Lende-
spier.

De ¹ Lende-spier M 1. Fig. komt voort van 't zydelijk deel der twee laatste Wervel-beenderen des Rugs, en de drie bovenste der Lenden, en nederdalende over de inwendige zyde van 't Darm-been, plant zig met een ronde sterke Pees in de kleine Drayer.

De Darm-
Been-
spier.

De tweede is de ² Darm-been-spier O 1. Fig. ze begint van den inwendigen boord des bovensten omtreks van 't ³ Darm-been, en gelegen op de inwendige oppervlakte, vereenigt haar Pees met de voorgaande, en plant zig in de kleine Drayer.

De Lood-
verwige.

De derde is de Lood-verwige- of Schaam-been-spier, ze komt voort van 't opperste en voorste deel van 't Schaam-been, en plant zig in 't bovenste en inwendig deel van 't Dye-been, een weynig onder den Hals.

De Dye-
uytstrek-
kende
Spieren.

De Dye word uytgestrekt door drie Spieren: de grootste, middelste, en kleyne Bil-spier.

De groote
Bil-spier.

De groote ⁴ Bil-spier Q 2. Fig. is de buytenste, ze begint van den uytwendigen boord des oppersten omtreks van 't Darm-been, van de doornagtige uytsteekfels des Heylig-beens, en van 't Staart-been, en plant zig in 't agterste deel van 't Dye-been, vier dwerse Vingeren onder de groote Drayer.

De mid-
delste.

De middelste Bil-spier R 2. Fig. neemt haar oorspronk van den rug des Darm-beens, en plant zig in 't opperste en uytwendig deel der groote Drayer.

De kleine.

De kleine, die de binnenste is, komt voort van den zelven rug, wat boven 't panneken, en plant

¹ Psoa. ² Musculus Iliacus. ³ Os Ilium. ⁴ Gluteus Major.

zig in een oneffe holligheyt agter de groote Drayer.

Als 'er dwerse of fchuynse, diep gefnedene Wonden in de Bil-spieren voorvallen, moeten ze (de Dye uytgestrekt zijnde tot 't eynde der genezing) toege-naayt werden.

De Dye word inwaarts bewogen door de ¹ Drie-De Drie-
hoofdige spier PQR 1. Fig. gelegen in deszelfs in-^{hoofdige}
wendig deel, ze komt voort met drie beginsels, van
't bovenste, middelste, en onderste deel van 't Schaam-
been, en plant zig met zo veel onderscheyde Peezen
in een scherpen kant, aan 't agterste deel van 't Dye-
been. Van die drie Spieren maken zommigen maar
een.

De Dye word uytwaarts beweegt door vier Spie-
ren, de Peerwyze, de Tweelingen, en de Vierkante.

De ² Peerwyze t 2. Fig. begint van 't opperste en De Peer-
zydelijke deel des Heyligs-, en zydelijke deel des ^{wyze}
Darm-beens, en plant zig in een kleine holligheyt ag-^{spier.}
ter de groote Drayer.

De ³ Tweling-spieren vu 2. Fig. komen voort; De Twee-
de bovenste en onderste van twee kleine verhevenhe-^{ling-spie-}
den aan 't agterste deel van 't Darm-been, en planten ^{ren.}
zig in een kleine holligheyt ontrent de groote Drayer.

De vierkante spier x 2. Fig. neemt haar oorspronk De vier-
van 't dik oneffen uytsteeksel des Heupe-beens, en plant ^{kante}
zig in 't agterste en zydelijke deel van de groote
Drayer.

De Dye word in- en uytwaarts half rond gedrayt
door beyde Stop-spieren, waar van een de in-, en de
andere de uytwendige is.

D'inwendige ⁴ Stop-spier y 2. Fig. komt voort van Inwendi-
den inwendigen omtrek van 't groot gat, dat in 't ^{ge Stop-}
Schaam- en Heupe-been is, 't welk ze stopt, en haar ^{spier.}
Pees, gaande tusschen beyde Tweeling-spieren, plant
zig in een kleine holligheyt ontrent de groote Drayer,
en drayt de Dye half rond uytwaarts.

De uytwendige Stop-spier T 1. Fig. neemt haar Uytwen-
oorspronk van den uytwendigen omtrek van het voor-^{dige Stop-}
gemelde gat, en eyndigt op de zelve plaats met de ^{spier.}

1 Triceps. 2 Pyriformis. 3 Gemelli. 4 Obturator Internus.

voorgaande, en drayt de Dye half rond inwaarts.

In 't XVI. Hoofdstuk der voorgaande Verhandeling is gezegt, dat het ' Dye-been minder uytleding onderworpen is als andere Beenen, om zijn diepe Geleding, en vele en zware Spieren, waar by komt de sterkte der Banden; maar zo die Spieren helpen om 't Been in zijn plaats te houden, zo zijn ze ook, als 't uytgeleed of gebroken is, een groot beletfel om het te herstellen, om dat ze 't Been sterk na zig trekken.

I Os Femoris.

U Y T L E G G I N G

der


F I G U R E N,


van de

XXXIV. T A F E L.

Waar in vertoont worden de Spieren van den Tronk des Opper-arms en Dye.

<i>De 1. Figuur vertoont de Spieren, die gezien worden in 't voorste deel des Lighaams.</i>		D	De Ongelijk-zydige spier.
A	De Tepel-wyze spier in haar plaats.	E	De Lange spier.
B	Dezelve uyt haar plaats.	F	De Borst-spier.
C	De Verduldige spier.	G	De Drie-hoekige spier.
		h	De Ravenbeks-wyze spier.
		H	De voorste groote





te Zaag - spier.
I De voorſte kleyne
 Zaag - ſpier.
i De onder - Sleutel-
 beens ſpier.
K De onder - Schou-
 der-blads ſpier.
L De groote ronde
 ſpier.
M De Lende-ſpier.
N De Vierkante ſpier.
I De uytwendige tuſ-
 ſchen-Ribbig ſpiere.
nn De inwendige tuſ-
 ſchen-Ribbig ſpiere.
O De Darm-beens ſpier.
P Q R De Drie-hoof-
 dige ſpier.
S Het Dye-been aan
 elke zyde.
T De buytenſte Stop-
 ſpier.
V De inwendige groo-
 te ſpier , tot het
 Scheen - been beho-
 rende.
De 2. Figuur verſtoont de
Spieren van 't agterſte
deel.
A. De Monink-kaps-
 wyze ſpier.
B De Breede ſpier.
C De Verduldige ſpier.
D De Tarbot-wyze
 ſpier.

E De Spalk - wyze
 ſpier.
F Een deel van de
 t'Saamgevlogte ſpier.
G De Opper-graat
 ſpier.
H De Onder-graat
 ſpier.
I De kleine ronde
 ſpier.
K De groote ronde
 ſpier.
L Een deel van de
 voorſte groote Zaag-
 ſpier.
M De agterſte on-
 derſte Zaag-ſpier na
 buyten omgeſlagen.
N De Heylig - lende
 ſpier.
O De langſte Rug-
 ſpier.
o De half-gratige ſpier
 buytenwaarts getrok-
 ken.
P De Heylige ſpier
 ontrent haar oor-
 ſpronk ontbloot.
Q De groote Bil-ſpier
 buyten haar plaats.
q q De plaats, waar van
 zy afgeſneden is.
R De middelſte Bil-
 ſpier.
H h 4 **S** De

S De kleine Bil-
spier.

t De Peer-wyze spier.

vu De Tweeling-spie-
ren.

x De Vierkante spier.

y De inwendige Stop-
spier.

*De 3. Figuur A vertoont
het Borst-been, met de
Drie-hoekige spier, die
verbetert is in de 2.
Fig. van de XXXV.
Tafel.*

*De 4. Figuur vertoont het
grootste deel der Spie-
ren, die in de 2. Fig.
gezien worden.*

A Het bovenste deel
van de Heylig-lende
spier ter zyden ge-
trokken, op dat men
de binnenste Peezen
zou zien.

B Het bovenste deel
der langste spier des
Rugs, ter zijden ge-
trokken, op dat men
de Peezen kon zien.

C Een deel van de

half-gratige spier in
haar plaats.

c De agterste bovenste
Zaag-spier.

D De Spalk - wyze
spier ter zyden ge-
trokken.

E De t' Samengevlog-
te spier.

F De groote regte
spier.

i Eenige peezige veze-
len, waar door de
langste van de Rug-
en Heylig-lende spier
t' samen gebonden
worden.

*De 5. Figuur vertoont het
Hoofd met eenige Wer-
vel-beenderen des Hals,
van agteren gezien.*

a De groote regte spier
in haar plaats.

b De groote regte spier
buyten haar plaats.

c De kleine regte spier.

d De groote schuynse
spier.

e De kleine schuynse
spier.

HET VII. HOOFDSTUK.

Van de Spieren der Borst, dienende tot de Ademing.

DE spieren der Borst zyn tweederley: want eenige verwyden ze, en dienen tot de in-ademing, en andere verengen de Borst, en dienen tot de uyt-ademing.

Die de Borst verwyden, zyn de ¹ in- en uyt-wendige tusschen-Ribbige spieren, zo genaamt, om dat ze tusschen de Ribben geplaatst zyn: de ² onder-Sleutelbeens spier, de opperste agterste ³ Zaag-spiet, en de groote ⁴ Zaag-spiet, waar by 't ⁵ Midden-rift gevoegt word.

D'uytwendige tusschen-Ribbige spieren II 1. Fig. XXXV. komen voort van 't uytwendige deel der onderste boorden van de bovenste Ribben, en schuyns van agteren na voren gaande, planten zig in 't uytwendig deel der opperste boorden van de onderste Ribben. Tafel. Spieren dienende tot de in-ademing.

De inwendige tusschen-Ribbige spieren ff 3. Fig. beginnen van 't binnenste deel der onderste boorden van de bovenste Ribben, en schuyns van voren na agteren gaande, planten zig in 't binnenste deel van den bovensten boord van de onderste Ribben, zo dat ze met haar vezelen malkander door-kruyssen: waar uyt blykt, als men tusschen de Ribben een bekwame opening moet maken, om het Bloed uyt te laten, men altijd eenige van der zelve vezelen dwers moet afsnyden.

De inwendige tusschen-Ribbige spieren strekken zig uyt, tot voren tusschen de kraak-beenige deelen der Ribben, en de uytwendige komen tot aan dezelve, en aan 't bovenste der Borst zo verre niet; van deze Spieren zyn 'er aan elke zyde twee-en-twintig.

De onder-Sleutelbeens spier i 1. Fig. komt voort Onder-Sleutelbeens spier.

1 Musculi Intercoftales. 2 Subolavius. 3 Serratus posticus superior. 4 Serratus Major. 5 Diaphragma.

H h 5

van

van 't onderste en binnenste deel des Sleutel-beens, en schuyns voorwaarts gaande, plant zig in 't opperste deel der bovenste Ribbe.

Agterste
bovenste
Zaag-
spier.

De agterste bovenste ¹ Zaag-spiet C 4. Fig. XXXIV. Tafel, in haar natuurlijke plaats, legt onder de Tarbots-wyze spiet, en begint met een breede Pees van de doornagtige uytsteekfels der drie onderste Wervel-beenderen des Hals, en eerste des Rugs, en plant zig met zijn tanden in den bovensten boord der vier bovenste Ribben.

XXXIV.
Tafel.
Groote
Zaag-
spier.

De groote ² Zaag-spiet H 1. Fig. komt voort van 't binnenste deel des steunfels van 't Schouder-blad, en plant zig met verscheide tanden in de vyf onderste waare Ribben, en twee opperste valsche: deze Spiet is zeer vleezig, en met haar tanden gevoegt tusschen die der schuyns nederdalende Spiet des Buyks.

XXXV.
Tafel.

By die Spieten voegt den Heer *Verheyen* eenige andere spierige deelen ee 1. Fig. die hy zegt gevonden te hebben: deze nemen haar oorspronk van de dwerse uytsteekfels der elf bovenste Wervel-beenderen des Rugs, en 't onderste des Hals, en planten zig yder in een byzondere Ribbe, in een on-effenheyt, alwaar ze beginnen te krommen.

Boven dien zegt hy nog vier andere, zomtijds maar drie, gevonden te hebben, die langer waren als de voorgaande ff 1. Fig. deze komen voort van de dwerse uytsteekfels van het zevende, agtste, negende, en tiende Wervel-been des Rugs, en planten zig in de vier onderste Ribben, en hy noemt die de 3 boven-Ribbige spierige deelen, om dat ze voortkomen van een hooger plaats, als de Ribben, die ze op- en uytwaarts bewegen.

Deze Spieten, voor zo veel ze de Ribben op- en uytwaarts bewegen, en de Borst verwyden, dienen tot de in-ademing.

De Spieten, die de Borst verenigen, en tot de uyt-ademing dienen, zijn de Heylig-lende spiet, de agterste onderste Zaag-spiet, en de Drie-hoekige spiet.

¹ Serratus posticus superior. ² Serratus Major. ³ Supra-costales.

De

Tafel.
De Hey-
lig lende
fpiet.

De agter-
fte onder-
fte Zaag-
fpiet.

De Drie- hockige.

Binnen-
Ribbige
spieren.

spier 2

4 Sterno-costales. 5 Antagonistas.

spier, en 1 Borst-beens Ribbige-spiere met de binnen-Ribbige, voor zo veel ze de Ribben nederwaarts trekken, verenigen de Borst, en dienen tot de uyt-ademing.

x Sterno-costales.

U Y T L E G G I N G

der

F I G U R E N ,

van de

XXXV. T A F E L

Waar in verthoont worden de meeste Spieren, dienende tot de in-ademing.

De 1. Figuur verthoont eenige Spieren, die tot de in-ademing dienen, en geplaatst zyn in 't agterste deel van 't Lighaam, benevens eenige andere.

A A Zekere deelen, die de Spieren bedekken, ter zyden omgekeert.

B De agterste bovenste Zaag-spier, ter zyden omgeslagen.

C De Spalk - wyze spier.

D De agterste onderste Zaag-spier in haar natuurlijke plaats.


E F G Eenige deelen van 't agterste des Buyks.

H De agterste onderste Zaag-spier ter zyden omgeslagen.

I I De uytwendige tusschen-Ribbige spieren.

aa De Ribben.

bb De Heylig - lende spier, welkers peezen zig





zig planten in al de Ribben. a b c d e f De Borst-beens Ribbige - spieren.

c c De langste Rugspier, welkers peezen zig planten in de dwerse uytsteekfels van de Wervel-beenderen des Rugs. De 3. Figuur vertoont de binnen-Ribbige, en inwendige tusschen-Ribbige spieren.

d De Half-gratige spier, welkers peezen zig planten in de dwerse uytsteekfels van de Wervel - beenderen des Rugs. A De buytenste deelen omgeslagen.

B B De Ribben.

C C De Lighamen der Wervel-beenderen.

a De groote Slag-ader geopent.

b De ongepaarde Ader.

c Een drie-voudig haakjen, oplichtende de tusschen-Ribbige Ader, slag-Ader, en Zenuw.

d d De binnen-Ribbige spieren, die over de naast-gelege Ribbe eyndigen.

ee De binnen-Ribbige spieren, die zig in de naast-gelege Ribbe planten.

ff De inwendige tusschen - Ribbige spieren.

g g Het Ribbe-vlies in zyn geheel, maar naagteren afgescheyden.

De twee andere Figuren vertoonen eenige Spieren, dienende tot de uyt-ademing, die geplaatst zijn aan 't voorste deel van 't Lighaam.

De 2. Figuur vertoont de Spieren binnen aan elke zyde van 't Borst-been.

A Het Borst-been.

B B De kraak-beenige deelen der Ribben, aan elke zyde door-gesneden.

HET

HET VIII. HOOFDSTUK.

*Van de Spieren des Onder-arms
en der Voor-hand.*

IN 't XIV. Hoofdstuk der voorgaande Verhandel-
ling is gezegt, dat de Onder-arm bestaat uyt twee
Beenderen: 't ¹ Elle-been, en de ² kleine Pijp. Het
Elle-been is t'samen gevoegt met 't Opper-arm-been,
door ³ onderlinge Ontfanging, en heeft tweederley
beweging: de buyging, en de uytstrekking; en de
kleine Pijp, t'samengevoegt met 't Opper-arm-been,
en 't Elle-been, door ⁴ ondiepe Geledingen, kan in-
en uyt-waarts half rond bewogen worden.

De Onder-arm word gebogen door twee Spieren:
de Twee-hoofdige en inwendige Arm-spier.

De Twee-
hoofdige
spier.
XXXVI.
Tafel.

De ⁵ Twee-hoofdige spier E. i. Fig. zo genaamt
van haar twee Peezen, komt voort met eene van 't
⁶ Ravenbeks-wyze uytsteekfel, en met de andere van
den kraak-beenigen boord der ondiepe holligheyt des
Schouder-blads, alwaar ze legt in een lange groeve
van 't Opper-arm-been: deze Spier nederwaarts gaan-
de aan 't voorste deel des Opper-arms, met een dik-
ken vleezigen buyk, plant zig met een dunne sterke
Pees in een kleine oneffe verheventheyt, aan 't opper-
ste en binnenste deel der kleine Pijp.

Alzo de Pees der Twee-hoofdige spier legt onder
de ⁷ midden-Ader, zo moet men die niet quetsen in
't Bloed-trekken, om dat daar zware toevallen op
volgen: als groote pijn, zwelling, ontsteking, gedur-
rige koorts, en zo die toevallen niet haast gestut
worden, volgen Spier-trekkingen, Onzinnigheyt,
versterving van den Arm, en de Dood. Wanneer die
Pees gequett is zijnde genezen is, voelt men op die
plaats, dat de huyd daaraan vast kleeft, om dat by
de genezing iets van de Pees afscheyd, gelijk geschied

¹ Ulna. ² Radius. ³ Ginglimus. ⁴ Arthrodia. ⁵ Biceps.
⁶ Apophysis coracoides. ⁷ Mediana.

in de ontbloote Beenderen; waar uyt Vlees groeyende, zig met de Huyd vereenigt, zo dat die twee deelen aan malkander vast gehegt zijn.

Tusschen de Twee-hoofdige en Drie-hoekige spier, aan de uytwendige zyde des Opper-arms, in een kleine holligheyt, is de plaats, daar men d'Etter-dragten stelt, welke tusschenheyt der Spieren ligt gevoelt word, als men met de eene Hand den Onder-arm buygt en uytstrekt, en met den Duym van de andere Hand voelt.

De tweede buyger van den Onder-arm is d'inwendige Arm-spier F F 1. Fig. ze legt onder de voor-^{D'inwendige Arm-spier.}gaande, en komt voort van 't middelste en voorste deel des Opper-arm-beens, waar aan zy zeer vast is, en plant zig in 't bovenste inwendig zydelijk deel van de 1 kleine Pijp, en 't 2 Elle-been.

Als die Spieren, van voren gelegen aan den Opperarm, dwers afgekapt of gesneden zijn, moet de Wonde, den Onder-arm gebogen zijnde, toegenaayt worden, even als gezegt is in de Verhandeling der Voornaamste Handwerken der Heelkonst, in 't VI. Hoofdstuk, en door een Sluyer of Servet aan de Borst gedragen worden; maar alle vier, of vyf dagen, moet hy zagtjes uytgestrekt en gebogen worden, om de *Anchilosis* te beletten, terwijl iemand d'onderste lippe der Wonde tegen houd, op dat de draad niet doorscheure.

De Onder-arm word uytgestrekt door vier Spieren: de lange, korte, uytwendige Arm-spier, en de Opleggende.

De 3 lange G 1. Fig. en C 2. Fig. heeft twee be-^{De lange}ginsels, met 't een komt zy voort van den uytwendigen boord der onderste zyde of kant ontrent den hals van 't Schouder-blad, en met 't andere van ontrent 't hoofd des Opper-arm-beens, en nederwaarts gaande, plant zig in 't agterste en opperste deel van 't Elle-been, met een breede sterke Pees.

De 4 korte H 1. Fig. begint van 't agterste en op-^{De korte}

1 Radius. 2 Ulna of Cubitus, 3 Longus. 4 Brevis.

perste

perstè deel des Opper-arm-beens, en plant zig by de voorgaande.

De uyt-
wendige
Arm-
spier.

De uytwendige 1 Arm-spier I 1. Fig. komt voort, by na op de zelve plaats der voorgaande, en plant zig by die twee.

Deze drie Spieren maken t'samen een breede Pees, die geplant word in 't agterste uytsteeksel van 't 2 Elle-been, *Olecranon* genaamt; en gelijk die Pees alleen met de Huyd is bekleed, zo gevoelt men zo groote pijn, als men op die plaats valt, of men met iets hard's geslagen word.

Die drie Spieren, gelegen agter aan den Opper-arm, dwers door gekapt zijnde, moet de Wonde (den Arm uytgestrekt zijnde) toegenaayt, en zo gedragen worden.

De Op-
leggende.

De vierde Spier, die den Onder-arm uytstrekt, is de 3 Opleggende C 3. Fig. ze is de kleynste van de vier, deze komt voort van 't onderste, en uytwendig deel des 4 Opper-arm-beens, en gaande tusschen beyde de Beenderen des Opper-arms, plant zig in 't agterste en zydelijke deel van 't Elle-been, twee of drie dwerse Vingeren onder 't *Olecranon*.

De Onder-arm word inwaarts half rond bewogen door twee Spieren: de ronde en vierkante.

De ronde.

De ronde K 1. Fig. begint van 't inwendig uytsteeksel van 't Opper-arm-been, en schuyns voortgaande, plant zig met een vliezige breede Pees ontrent 't middelste en uytwendig deel van de kleine Pijp.

De vier-
kante.

De vierkante D 4. Fig. komt voort van 't onderste en binnenste deel van 't Elle-been, en plant zig met een Pees, zo breed als haar begin, in 't onderste en uytwendig deel der kleine Pijp: deze Spier legt digt by de Voorhand, onder al de andere.

De Onder-arm word uytwaarts half rond gedraayt door twee Spieren: de lange en korte.

De lange.

De lange M 1. Fig. begint drie of vier dwerse Vingeren boven 't uytwendig klein uytsteeksel van 't Opper-arm-been, en geplaatst op en langs de kleine

2 *Brachii externus*. 2 *Ulna*. 3 *Anconeus*. 3 *Os Humeri*. 4 *Longus*.

Pijp

Pijp, plant zig in 't onderste en binnenste deel van dit Been.

De ¹ korte N. 1. Fig. is zeer vast aan 't Been, en De korte komt voort van 't klein uytwendig uytsteekfel des Opper-arm-beens, en plant zig in 't bovenste en binnenste deel van de kleine Pijp.

De Voor-hand word zydelings in- of uytwaarts bewogen.

De Spieren, die de ² Voor-hand buygen, zijn drie: de Palm-spier, binnenste Elle-beens, en binnenste Spier van de kleine Pijp, zo genaamt, om dat ze binnen den Onder-arm tegen die Beenderen leggen.

De ³ Palm-spier O 1. Fig. word niet altijd gevonden, en legt inwendig aan den Onder-arm, en komt voort, onder van 't inwendig uytsteekfel des Opper-arm-beens, met een vleezig begin, en in een lange dunne Pees veranderende, gaat ze boven den ringwyzen band a 1. Fig. daar zy zig in een breede Pees o uytbreyd in de huyd, binnen in de Hand. Eenigen willen dat ze dient om de huyd binnen in de Hand te rimpelen.

De binnenste ⁴ Elle-beens spier P p 1. Fig. begint onder van 't inwendig uytsteekfel des Opper-arm-beens, en gaande onder den ringwyzen band, plant zig met een sterke Pees in 't beentjen der Voor-hand, dat buyten de rye staat.

De binnenste Spier van de kleine Pijp Q 1. Fig. komt voort van 't zelve uytsteekfel, als de voorgaande, en geplaatst volgens de lengte der kleine Pijp, gaat onder den ringwyzen band, en plant zig in 't beentjen der ⁶ Na-hand, dat onder den Wys-vinger staat.

De Voor-hand word uytgestrekt door drie Spieren: de buytenste Elle-beens spier, en buytenste lange, en korte Spier van de kleine Pijp.

De buytenste Elle-beens spier K 2. Fig. komt voort van 't uytwendig uytsteekfel aan 't onderste deel des Opper-arm-beens, en plant zig onder den ringwy-

De Palm-spier.

xxxvi. Tafel.

De binnenste Elle-beens spier.

De binnenste Spier van de kleine Pijp.

Buitenste Elle-beens spier.

1 Brevis. 2 Carpus. 3 Musculus palmaris, 4 Cubitus internus, 5 Os Humeri, 6 Metacarpus.

zen Band in 't beentjen der Na-hand, dat onder den kleinen Vinger staat.

Buitenſte
lange Spier
van de
kleine
Pijp.

De buytenſte lange ¹ Spier van de kleine Pijp D 2. Fig. begint een duym breed boven 't uytwendig uytſteekſel, aan 't onderſte deel des Opper-arm-beens, en geplaatſt langs 't buytenſte deel der kleine Pijp, plant zig met een lange Pees onder den ringwyzen band, in 't beentjen der Na-hand, dat onder den Wys-vinger ſtaat.

Korte
Spier.

De ² korte Spier Q 2. Fig. om dat ze wat korter is als de voorgaande, komt voort van 't uytwendig uytſteekſel des ³ Opper-arm-beens, en geplaatſt langs 't buytenſte deel der ⁴ kleine Pijp, plant zig onder den ringwyzen band, in 't Beentjen der ⁵ Na-hand, dat onder den Middel-vinger ſtaat.

Als de binnenſte en buytenſte Elle-beens ſpieren werken, word de Hand op de zyde van 't Lighaam af bewogen, en als de binnenſte Spier van de kleine Pijp, met de buytenſte lange, en korte werkt, word de Hand op de zijde na 't Lighaam toe bewogen.

HET IX. HOOFDSTUK.

Van de Spieren der Vingeren.

DE Vingeren worden gebogen, uytgeſtrekt, en na, of van den Duym bewogen.

De Spieren, die de Vingeren buygen en uytſtrekken, zijn gemeene, te weten: als ze verſcheyde Vingeren buygen, of uytſtrekken, en eygen, als ze maar een buygen, of uytſtrekken.

De gemeene Spieren, die de Vingeren buygen, zijn twee, de ⁶ verheve en ⁷ diepe, of de ⁸ doorgeboorde en ⁹ doorboorder.

XXXVI.

Tafel.

De verhe-
ve Spier, of
doorge-
boorde.

De verheve R. 1. Fig. zo genaamt, om dat zy hooger als de volgende legt, begint van 't inwendig

¹ Radius longus. ² Brevis. ³ Os Humeri. ⁴ Radius. ⁵ Metacarpus. ⁶ Sublimis. ⁷ Profundus. ⁸ Perforatus. ⁹ Perforans.

uyt-

uytsteekfel des onderfte deels des ¹ Opper-arm-beens; en nederwaarts gaande, verdeeld zig ontrent de ² Voor-hand in vier Peezen, die onder den ringwyzen band gaande, rrr 1. Fig. zig planten ontrent 't begin van het tweede beentjen van elken Vinger, yder met een aan 't eynde gesplete of doorgeboorde Pees cccc 5. Fig.

Ontrent de Voor-hand, eer die Peezen gaan onder den ringwyzen band, komt zomtijds aan een derzelve een rond, of langwerpig klein, hard, en onpyne-lijk gezwel, datmen *Ganglion* of *Pees-knoop* noemt, dat meermaals van moeyelijke genezing is, om dat de stoffe, die 't veroorzaakt, koud, aardagtig en qua-lijk te verteeren is, en men 't, door sterk te drukken, of te slaan, niet altijd kan breken, 't welk het beste middel is.

De ³ diepe Spier, of doorboorder S 1. Fig. legt ^{De diepe} dieper, en onder de voorgaande, begint van 't op- ^{Spier.} perste, en binnenste deel des ⁴ Elle-beens en ⁵ kleine Pijp, en verdeeld zig omtrent de Voor-hand in vier Peezen, die onder den ringwyzen band gaan, en verders onder door de gesplete Peezen geboord hebbende fff 1. Fig. planten zig in 't laatste beentjen van elken Vinger.

Deze Peezen zijn sterk, en besloten in een vliezi-ge scheede, die in de Vingeren eenigfints kraak-bee-nig, en uytgestrekt is tot aan 't eynde der Vingeren, om dat, daar de Peezen van de eene Spier door de andere gaan, een langwerpige opening is, ziet op den kleinen Vinger c 5. Fig. op dat de scheede de vrye be-weging der Peezen niet zou beletten; en is die schee-de van binnen doorzaayd met vele kleine kliertjes, die een oly-agtig vogt van 't Bloed afscheyden, om dezelve te besmeeren, en de Peezen zagt en buygsaam te houden; en dient die scheede, als de Vingeren sterk gebogen worden, datze voorwaarts buyten haar plaats niet wyken.

Daar is maar een gemeene Spier, die de Vingeren

¹ Os Humeri. ² Carpus. ³ Profundus. ⁴ Ulna of Cubitus.
⁵ Radius.

De groote
uytstrek-
ker.

uytstrekt, genaamt de groote Uytstrekker E 2. Fig. zy komt voort van 't uytwendig uytsteeksel des onderste deels des ¹ Opper-arm-beens, en verdeeld zig, gelijk de buygers, in vier Peezen, die onder den ringwyzen band, en op den rug der Hand gaande, planten zig in 't laatste beentjen van elken Vinger eeee.

De Pees-knoopen komen meer aan de Peezen van de groote Uytstrekker, als aan die der verheve Spier.

De Spieren, die de Vingeren na den Duym bewegen, zijn de ² Worm-wyze, en de inwendige tusschen-beenige Spieren.

De Worm-
wyze
spiertjes.

De Worm-wyze spiertjes ee 5. Fig. zo genaamt, om de gelijkenis met de Pier-wormen, zijn vier, gelegen binnen in de Hand, en beginnen van de vliezige scheede der Peezen van de diepe Spier, en schuyns gaande, planten zig met een kleine zenuwagtige Pees, aan 't inwendig zijdelyk deel in 't eerste Beentjen van elken Vinger. Eenigen willen dat die Spiertjes dienen, om de eerste ³ Geleding der Vingeren te buygen.

De in-
wendige
tusschen-
beenige
Spieren.

De inwendige ⁴ tusschen-beenige Spiertjes, zo genaamt, om dat ze aan de inwendige zyde der Hand, tusschen de beentjes der ⁵ Na-hand leggen, zijn drie a a a 6. Fig. en komen voort van 't uytwendig zijdelyk deel der drie eerste beentjes van de Na-hand, en haar Peezen vereenigende met drie der Worm-wyze, planten zig aan 't inwendig zijdelyk deel, in 't eerste beentjen van den middel-, ring-, en kleynen Vinger.

De uyt-
wendige
tusschen-
beenige.

Die de Vingeren van den Duym af, of uytwaarts bewegen, zijnde uytwendige tusschen-beenige Spieren, die ook drie zijn a a a 7. Fig. deze komen voort van 't inwendig zijdelyk deel van 't tweede, derde, en vierde beentjen der Na-hand, en planten zig aan 't uytwendig zijdelyk deel in 't eerste Beentjen van den voorsten, middelsten, en ring-Vinger.

¹ Os Humeri. ² Lumbricales. ³ Articulation. ⁴ Interossei.
⁵ Carpus.

Als

Als de in- en uytwendige tusschen-beenige Spieren e' samen werken, worden de Vingeren digt tegen mal- kander gesloten.

Behalven een Pees, die de voorste Vinger krijgt van de groote Uytstrekker, heeft zy nog twee eygene Spieren: een, die hem opregt, een, die hem na den Duym beweegt.

Die hem opregt, als men na iet wil wyzen I i 2. Fig. begint van 't middelste en uytwendig deel des Elle-beens, en plant zig zomtjids met een dubbele Pees in 't laatste beentjen van dien Vinger, genaamt ^{De Wy-} _{zer.} de ¹ Wyzer.

Die hem na den Duym beweegt, legt tusschen 't eerste been van den Duym, en eerste der ² Na-hand a 6. Fig. zy begint van 't voorste deel van het eerste been van den Duym, en plant zig aan 't inwendig zydelijk deel in 't eerste beentjen van den voorsten Vinger: deze Spier word klaar gezien, als men den voorsten Vinger over den Duym brengt, en sterk buygt, dan is hy opgezwollen.

Behalven een Pees, die de kleyne Vinger krijgt van de groote Uytstrekker, heeft hy nog twee eygene Spieren; een, die hem uytstrekt, en een, die hem van de andere Vingeren af beweegt. Die hem helpt uyt- strekken O 2. Fig. komt voort van 't opperste, en uytwendig deel der ³ kleine Pijp, en verdeelt zig zomtjids in twee Peezen, die onder den ringwyzen band gaande, zig planten in 't laatste beentjen van den kleinen Vinger.

Die hem van de andere Vingeren af beweegt a 7. ^{Onder-} _{palm} Fig. is de ^{Spier.} _{Spier.} Onder-palm-spier, of *Hypotenar*, en begint van 't beentjen der ⁴ Voor-hand, dat buyten zijn rye staat, en van dat der Na-hand, gelegen onder den kleinen Vinger, en plant zig uytwendig in zijn eerste beentjen.

De Duym word gebogen, uytgestrekt, na, en van ^{Spieren} _{van den} de andere Vingeren af bewogen, door zijne eygene ^{Duym.} _{Spieren.}

Die hem buygt T t 1. Fig. komt voort van onzent ^{De buy-} _{ger.}

1 Indicator. 2 Metacarpus. 3 Radius. 4 Carpus.

't opperste, en inwendige deel der kleine Pijp, en gaande onder den ringwyzen band, plant zig in 't laatste beentjen van den Duym.

Lange
Spier.

De Duym word uytgestrekt door de lange, en korte Spier F 2. Fig. de lange begint van 't opperste en uytwendig deel van 't Elle-been, en onder den ringwyzen band gaande, plant zig in 't tweede beentjen van den Duym.

De korte.

De korte N 2. Fig. komt voort een weynig onder de voorgaande, en gaande onder den ringwyzen band, plant zig in 't laatste beentjen van den Duym. Deze Spier verdeeld zig zomtjids in vier Peezen, waar van drie na den Duym, en een na den voorsten Vinger gaan.

Duym-
Palm-
spier.

De Duym word van de andere Vingeren af bewogen, door de Duym- 2 Palm-spier A B 5. Fig. dat maar eene Spier is, die aan 't binnenste der Hand verheven, en 3 Venus-berg genaamt word; ze begint van 't beentjen der Voor-hand, daar de Duym mede t' samen gevoegt is, en een andere by gelegen, als ook van den ringwyzen band, en plant zig in 't tweede beentjen van den Duym.

De tegen-
Palm-
spier.

De Duym word na de andere Vingeren bewogen door de 4 tegen-Palm spier c 5. Fig. die komt voort van de beentjes der 5 Na-hand, die onder den middel en voorsten Vinger staan, en plant zig in 't eerste been van den Duym.

Panaritium of *Vyt* komt aan 't einde der Vingeren, of Duym, waar by zware toevallen komen, veroorzaakt door een heet scherp uytgevloeit vogt, dat 't 6 Been-vlies, of de Pees besloten in de scheede, knaagt en prikkelt.

Daar is een ringwyze band, waar onder al de Peezen na de Vingeren gaan, behalven de Palm-spier, die 'er boven over gaat, en yder Peesje is besloten in een vliezige scheede, die van binnen aan de Vingeren eenigfints kraak-beenig is.

Als de *Vyt* aan den Duym komt, is de pijn maar

1 Ulna. 2 Tenar. 3 Mons Veneris. 4 Antitenar. 5 Metacarpus. 6 Periostium.

aan den Duym , en niet aan de andere Vingeren , en word niet verder gevoelt als tot 't midden van den Onder-arm ; in plaats , als 't gebrek aan de andere Vingeren is , strekt de pijn zig uyt tot binnen den Elleboog : om dat de Duym zijn eygene Spieren heeft , die van 't middelste van den Onder-arm voortkomen ; en in tegendeel zijn de Spieren , die de Vingeren buygen , gemeen aan al de Vingeren , zo dat als een der Vingeren lijd , ze alle lijden , en de pijn moer zig tot aan 't inwendig uytsteekfel des ¹ Opper-armbeens uytstrekken , om dat de Spieren , die de Vingeren buygen , van daar voortkomen.

Wanneer de *Vyt* aan een der Vingeren is , en het scherpe vogt in de scheede onthouden , is 'er groote pijn aan al de Vingeren , maar grooter aan die , waar in 't quaad , en kleine zwelling is ; maar weynig pijn is 'er , en groote zwelling binnen in de palm van de Hand.

In den ringwijzen band is groote pijn , en kleine zwelling ; eyndelijk , zo strekt de pijn en zwelling zig uyt tot aan 't binnenste van den Elleboog.

Die toevallen ontstaan , om dat de scheede , waar in de Peezen zijn besloten , die de Vingeren buygen , eenigfints kraak-beenig is , en zig niet kan uytrekken , zo dat het scherpe vogt , onthouden in dezelve , de Peeze drukt , en perst , waar uyt groote pijn ontstaat , en kleine zwelling.

In 't binnenste der Hand is weynig pijn , en groote zwelling , om dat de scheede , waar in de Peezen zijn , niet kraak-beenig , maar dun en vliezig is , zo dat ze zig kunnen uytrekken , waar uyt de groote zwelling met weynig pijn ontstaat.

In den ringwijzen band is groote pijn , en kleine zwelling , om dat die band hardagtig zijnde , niet genoeg zig kan uytrekken , en de Peezen drukt ; en zo veel te meer , om dat ze door de ontsteking zeer gezwollen zijn , waar uyt groote pijn ontstaat met kleine zwelling.

De pijn , als ook de zwelling , strekt zig uyt tot

¹ Os Humeri.

't inwendig uytsteekfel van 't onderste deel des Opper-arm-beens, door de ontsteking van de Peezen, die komt tot de Spieren, die van daar voortkomen, en in korten tijd zeer kunnen opzwellen, om dat haar vlies dun is, en ligt kan uytrekken.

De stoffe in de scheede breekt zomtijds door na buyten, en dan moet ze geopent worden, om de stoffe, die 'er nog in is, uytgang te geven.

Zo de stoffe haar zit-plaats had onder de scheede, tusschen 't Been-vlies en 't Been, dat men weet door de scherpe Koorts, Onzinnigheyt, en Bezwijmingen, zo moet men op de zijde van den Vinger, tot op 't been, een opening maken, zonder de Pees te quetsen.

De Peezen, die de Vingeren uytstrekken, worden zomtijds dwers afgesneden, en dan kan men de Vingeren niet opregten: zo dat ze dan (de Vingeren sterk opgeheven en uytgestrekt zijnde, zo blijven moeten tot het eynde der genezing) aan een gehegt moeten worden.

UYT.



U Y T L E G G I N G

der

F I G U R E N ,

van de

XXXVI. T A F E L.

Waar in vertoont worden de Spieren van den
Onder-arm, en de Hand.

<i>De 1. Figuur vertoont de voorste zyde des Arms.</i>	
A Het Schouder-blad, bedekt met de onder-Schouder-blads spier.	I De uytwendige Arm-spier.
B Een der uytsteekfels met zijn banden.	K De ronde.
C Het Opper-arm-been.	l De vierkante.
D De Raven-beks spier.	M De lange.
E De Twee-hoofdige spier.	N De korte.
E F De inwendige Arm-spier.	O o De Palm-spier.
G De lange uytstrekker.	P p De binnenste Elle-beens spier.
H De korte uytstrekker.	Q De binnenste Spier van de kleine Pijp.
	R De verheve, of doorgeboorde.
	r r r Der zelve Peezen.
	S De diepe, of doorboorder.
	fff Haar Peezen.
	T t De buyger van den Duym.
	Ii 5 V De

V De uytstrekker.

a De ringwyze band.

*De 2. Figuur vertoont de
agterste zijde van den
Arm.*

A De rug van 't
Schouder-blad.

BCGHMP S V Het
zelve, gelijk in de 1.
Figuur.

D Q De uytwendige
lange, en korte Spier
van de kleine Pijp.

E De groote uytstrek-
ker.

eee Haar Peezen.

K De uytwendige El-
le-beens spier.

F N De lange en
korte uytstrekker van
den Duym.

Ii De opregter van
den Wys-vinger.

L Een deel van 't El-
le-been met den band,
waar door 't aan de
kleine Pijp gebonden
is.

O De eyge uytstrek-
ker van den kleinen
Vinger.

De 3. Figuur vertoont

A Een deel van 't Op-
per-arm-been.

B Beyde deelen der
Onder-arm-beende-
ren.

C De opleggende
Spier.

De 4. Figuur vertoont

A Het Elle-been.

B De kleine Pijp.

C Den band.

D De vierkante Spier.

*De 5. Figuur vertoont
de Hand met eenige
van haar Spieren.*

AB De Duym-Palm-
spier is maar een.

C De Duym tegen de
Palm-spier.

aa De Peezen van de
doorgeboorde Spier.

bb De Peezen van de
doorboorder.

cc De plaats, daar de
Peezen van d'eene
Spier, door de ge-
splete eynden van de
andere gaan.

d In den kleinen Vin-
ger de scheede in haar
geheel, waar door de
Peezen in haar plaats
gehouden worden.

ee De Worm-wyze
spieltjes.

*De 6. Figuur vertoont
d'in-*

d'inwendige tuffchen-beenige Spieren, binnen in de Hand.	De 7. Figuur vertoont dezelfde Spieren aan den rug van de Hand.
aa De inwendige tuffchen-beenige Spieren.	aa De uytwendige tuffchen-beenige Spieren.
bb De bovenfte eynden der uytwendige tuffchen-beenige Spieren.	bb De bovenfte eynden der inwendige tuffchen-beenige Spieren.

HET X. HOOFDSTUK.

Van de Spieren des Scheen-beens en Voor-voets.

HET ¹ Scheen-been word gebogen, en uytgestrekt, inwaarts na, en van 't ander Been uytwaarts af bewogen.

De Spieren, die 't Scheen-been buygen, zijn vier: Buygers de twee-hoofdige, half-vliezige, half-zenuwagtige, en de smalle Spier.

De ² twee-hoofdige F F 2. Fig. komt voort met 't een begin van 't dik stomp uytsteekfel des Heupe-beens, en met 't andere van 't agterfte en middelste deel des Dye-beens: deze twee t' samen komende, maken een platte Pees, die zig plant in 't opperste, en agterfte deel van 't Kuyt-been.

De ³ half-vliezige G 2. Fig. begint van 't voorge-melde dik stomp uytsteekfel, met een vliezig begin, en word aanstonts een dikke vleezige Spier, met een dikke korte Pees, die zig plant in 't opperste, en agterfte deel van 't Scheen-been.

De half-zenuwagtige H 2. Fig. komt voort van 't dik stomp uytsteekfel des Heupe-beens, en plant zig

¹ Tibia. ² Biceps. ³ Semi-membranosus.

met

met een lange Pees in 't opperste inwendig deel van 't 1 Scheen-been, meer als vier dwerse Vingeren onder 't opperste eynde.

De smalle. De 2 smalle Spier K 2. Fig. begint van 't voorste, en onderste deel van 't 3 Schaam-been, en tot een lange Pees wordende, plant zig in 't opperste inwendig deel van 't Scheen-been.

De uytstrekkers van 't Scheen-been. Het Scheen-been word uytgestrekt door vier Spieren: de regte, twee groote, een inwendige en uytwendige, en de Dye-been spier.

De 4 regte F 1. Fig. komt voort van 't voorste, en onderste uytsteekfel des 5 Darm-beens, dat een weynig boven 't panneken staat, en nederwaarts gaande, vereenigt haar Pees met die der drie volgende Spieren.

De inwendige groote. De inwendige groote E H 1. Fig. begint van de kleine 6 Drayer, en beslaat het inwendig deel van de Dye.

De uytwendige groote. De uytwendige groote G 1. Fig. komt voort van de groote Drayer, en beslaat 't uytwendig deel.

De Dye-been spier. De 7 Dye-been spier H 1. Fig. begint van 't voorste deel van het 8 Dye-been, tusschen beyde Drayers, en legt onder de regte, zeer vast gehegt aan 't Dye-been.

Die vier Spieren maken van onderen ontrent de Knye, een breede, dikke, sterke Pees, die over de Knye-schyf gaat, waar aan ze vast is, en plant zig in 't Scheen-been, twee dwerse Vingeren onder 't stomp uytsteekfel, staande van voren ontrent 't opperste deel van dat Been.

Als men een Been moet afzetten, zeggen veelen dat het moet geschieden vier dwerse Vingers onder de 9 Geleding; maar dan zou men in de Peezen snijden, die laager gaan, en na de Operatie, zou door de zweering 't Been ligt bloot raken, en moeten afscheiden: dit ongemak kan men voorkomen, als men 't Been afzet, ten minsten zes dwerse Vingeren onder de Geleding, om dat men dan meer in 't vlees is,

1 Tibia. 2 Gracilis. 3 Os Pubis. 4 Rectus. 5 Os Ilium.
6 Trochanter. 7 Cruræus. 8 Os Femoris. 9 Articulatio.

dat

dat het Been bedekt met de huyd , en die lengte een vast steunfel geeft op 't houte-been.

Het ¹ Scheen-been word na 't andere inwaarts bewogen, door de lange ² Snyders-spiet, C 1. Fig. zo ^{Snyders} genaamt, om dat de Kleermakers door die Spiet de ^{Spiet} Beenen kruyssen: ze komt voort van 't voorste, en bovenste uytsteeksel des Darm-beens, en van voren aan 't inwendig deel, schuyns nederdalende, plant zig in 't opperste inwendig deel van 't Scheen-been: onder die Spiet legt de ³ Been-ader, en Slag-ader, met een groote Zenuw, die na 't Been, en den Voet gaan.

En daarom moet men zeer voorzigtig zijn, als men daar ontrent moet snijden. *Hildanus* in 't ³de. Deel zijner Aanmerkingen de 82ste., verhaald dat een Quakzalver willende een gezwel weg nemen, staande bin-nens Beens, aan de Dye van een Heer, de Been-ader af-sneed, waar door hy quam te sterven.

Tusschen die Spiet, en de inwendige groote, in een holligheyt, die men voelt vier dwerse Vingers boven de ⁴ Geleding, aan 't binnenste deel der Dye, stelt men d'Etter-dragten.

Het ⁵ Scheen-been word uytwaarts van 't andere af bewogen door de vliezige en Knye-spiet.

De vliezige of ⁶ breede Windel-spiet D 1. Fig. be-vliezige dekt uytwendig al de Spieren van de Dye, en begint ^{Spiet} gantsch vleezig van 't opperste, en voorste uytsteeksel des ⁷ Darm-beens, en aanstonts tot een breede vliezige sterke Pees wordende, omvangt de Spieren, waar van te voren is gezegt, en plant zig in 't opperste, en uytwendig deel van 't ⁸ Kuyt-been.

Als onder die breede Pees een ⁹ Etter-gezwel komt, moet men de Etter niet te lang daar in laten, door dien ze d'onder-gelege Spieren en Vliezen eer zal ver-teeren, als door die sterke Pees na buyten uyt bre-ken, daar om moet men 't gezwel vroeg openen; en zo de Etter door 't al te lang verblijf tusschen de Spie-ren in gelooopen was, moet men die Pees in de leng-te, zo groot de holligheyt van 't gezwel is, open

¹ Tibia. ² Sartorius. ³ Vena & Arteria cruralis. ⁴ Articulatio.
⁵ Tibia. ⁶ Fascia lata. ⁷ Os illium. ⁸ Fibula. ⁹ Abscessus.

snyden, en de Vliezen met de Vingeren los maken, op dat de etter van de Spieren zou uytloopen.

De Knye-
spier.

De ¹ Knye-spier B 3. Fig. begint onder van 't uytwendig hoofd van 't ² Dye-been, en schuyns gelegen op 't ³ Scheen- en ⁴ Kuyt-been, plant van agteren regt tegen over de Knye zig in 't opperste, en inwendig deel van 't Scheen-been.

Als agter aan de Dye dwerse diep-gesnede Wonden voorvallen, moeten ze (het Been gebogen zijnde tot 't eynde der genezing) toegenaayt worden, op de manier, gelijk ik heb gezegt in mijn Verhandeling der voornaamste Handwerken der Heelkonst in 't VI. Hoofdstuk; maar zo ze in 't voorste deel waren, moet het Been uytgestrekt leggen.

De ⁵ Voor-voet word gebogen, uytgestrekt, en zydelings, in- en uytwaarts bewogen.

Buygers
des Voor-
voets.

Voorste
Scheen-
beens
spier.

De Voor-voet word gebogen door twee Spieren: de voorste Scheen-, en Kuyt-beens spier.

De voorste ⁶ Scheen-beens spier K 1. Fig. komt voort van 't opperste en voorste deel van 't Scheen-been, en over 't midden van dat Been gekomen zijnde, word zy tot een lange Pees, die onder den ringwyzen band gaande, gelijk in de Hand, in twee Peezen verdeeld word, en de eene plant zig in 't eerste Wigge-been, en de andere in 't been van den Na-voet, dat onder den grooten Teen staat.

Voorste
Kuyt-
beens
spier.

De voorste ⁷ Kuyt-beens spier Q 1. Fig. begint van 't uytwendig en middelste deel van dat Been, en gaande onder den ringwyzen band, agter den uytwendigen Enklauw, plant zig in 't been van den ⁸ Na-voet, dat onder den kleinen Teen staat.

Deze twee Spieren, die zig planten aan beyde zyden van den Voet, buygen dien na voren opwaarts.

Uytstrek-
kers des
Voor-
voets.

De Voor-voet word uytgestrekt door vyf Spieren: twee Kuyt-spieren, een uyt- en inwendige, de Plank-spier, en een agterste Scheen- en Kuyt-beens spier.

De uytwendige Kuyt-spier, gemeenlijk ⁹ Tweelin-

¹ Popliteus. ² Os Femoris. ³ Tibia. ⁴ Fibula. ⁵ Tarsus.
⁶ Tibialis anticus. ⁷ Peronæus anticus. ⁸ Metatarsus. ⁹ Gemelli.
gen

gen genaamt, leggen de een nevens de andere NN 2. Fig. ze is regt een twee-hoofdige Spier, die voortkomt met twee beginsels, agter van beyde hoofden, aan 't onderste deel van 't Dye-been, en t'samen verenigende, maken beneden een breede Pees, die vermengt word met die der volgende Spier.

Le inwendige Kuyt-spier o o 2. Fig. legt onder de uytwendige, is zeer dik, en lang, begint van 't opperste, en agterste deel van 't Scheen- en Kuyt-been, en nederdalende, maakt met de voorgaande Spier, een zeer groote Pees, die zig plant in 't agterste deel van 't Hiel-been.

Inwendige Kuyt-spier.

Deze word gemeenlijk de Koorde van *Achilles*, en van *Hippokrates* de groote Pees genaamt.

Men heeft geloofd dat de Wonden van die Pees doodelijk waren, maar d'ondervinding leert het tegendeel; als ze dwers afgesneden is, moet de Voet uytgestrekt gehouden, en de cynden aan een genaayt worden, gelijk ik heb gezegt in 't voorgaande Hoofdstuk van de Peezen der uytstrekters van de Vingeren.

Tusschen de Kuyt-spieren, en 't Scheen-been, aan 't binnenste deel van 't Been, vier dwerse Vingeren onder de Knye, worden ook Etter-dragten gestelt.

Als 'er diepe dwers gesnede Wonden in die Spieren voorvallen, moeten ze ('t Been gebogen zijnde tot 't eynde der genezing) toegenaayt worden, en zomtijds moet men 't Been uytstrekken; om reden, gelijk te voren in 't VIII. Hoofdstuk, ter gelegentheyt van de Wonden der Spieren, of buygers des Onder-arms, gezegt is.

De 2 Plank-spier A 3. Fig. geplaatst tusschen de twee voorgaande, begint vleezig van 't uytwendig hoofd van het onderste deel van 't 3 Dye-been, en aanstonts tot een lange dunne Pees wordende, gaat schuyns nederwaarts, en plant zig in 't 4 Hiel-been, digt by de voorgaande groote Pees. Men heeft die Spier zo genaamt, om dat zy een breede Pees maak-

De Plank-spier.

1 Tibia. 2 Plantaris. 3 Os Femoris. 4 Os Calcis.

re onder aan de plank van den Voet, gelijk de Palm-spier in de Hand; maar de breede Pees, die midden door de plank des Voets gaat, word niet gemaakt van de Plank-spier, maar van die groote Pees der Kuyt-spiere.

Agterste
Scheen-
been-spier.

De agterste ¹ Scheen-been spier S 2. Fig. komt voort van 't opperste en agterste deel des Scheen-beens, en is vast aan 't Kuyt-been, en den vliezigen band, die beyde Beenderen t' samen-bind: ze gaat na den Voet in een groeve van 't Scheen-been, agter den inwendigen Enklauw, en plant zig met twee Peezen in 't Schipwyze, en in 't eerste Wigge-been.

Agterste
Kuyt-been
spier.

De vijfde en laatste dezer uytstrekkers is de agterste ² Kuyt-been spier U 2. Fig. ze begint van 't opperste, en agterste deel des Kuyt-beens, en gaande onder den ringwyzen band, agter den uytwendigen Enklauw met haar Pees, verzeld door de voorste, plant zig in 't uytwendig zydelijk deel van 't Teerling-wyze been, en zomtjids in 't been van den Na-voet, dat onder den kleynen Teen staat. Deze Spieren strekken den Voet uyt na beneden agterwaarts.

Als de voorste en agterste Scheen-been spier t' samen werkt, word de Voet zydelings inwaarts bewogen, en als beyde Kuyt-beens spieren t' samen werken, word hy zydelings uytwaarts bewogen.

HET XI. HOOFDSTUK.

Van de Spieren der Teenen.

DE Teenen worden gebogen, uytgestrekt, zydeling in- en uytwaarts bewogen door gemeene, en eygene Spieren, gelijk van de Vingeren gezegt is.

De vier kleine worden gebogen door de 3 doorboorder en 4 doorgeboorde, of de lange en korte.

De lange T 2. Fig. komt voort van 't opperste en inwendig deel van het Scheen- en Kuyt been, ze gaat

Spieren,
die de vier
kleine
Teenen
buigen.
De lange.

¹ Tibicrus posticus. ² Peronaeus posticus. ³ Perforans. ⁴ Perforatus.
onder

onder den ringwyzen band, agter den inwendigen Enkluuw, in een groeve van 't Hielbeen, en verdeeld in vier Peezen, plant zy zig door de gesplete eynden van de volgende, in 't laatste beentjen der vier kleine Teenen.

De korte V 2. Fig. begint van 't onderste, en inwendig deel van 't Hiel-been, verdeeld zig in vier Peezen, die aan de eynden zijn gespleten, tot doorgang van de Peezen der voorgaande, en plant zig in 't tweede beentjen der voorgemelde Teenen.

De vier kleine Teenen worden uytgestrekt door een lange en korte Spier.

Uytstrek-
kers.

De lange M 1. Fig. komt voort van 't opperste en voorste deel van het Scheen-been, en nederdalende langs 't Kuyt-been, verdeeld zig ontrent den Voorvoet in vier Peezen, die onder den ringwyzen band gaande, zig planten in 't tweede en derde beentjen der vier kleine Teenen m m.

Delange.

De korte N 1. Fig. begint van 't Hiel-been, en 't opperste uytwendig deel der Kote, en verdeeld zig in vier Peezen, die zig planten in 't eerste beentjen der voorgemelde Teenen n n.

De vier kleine Teenen worden zydelings inwaarts bewogen door de Worm-wyze, en inwendige Tusschen-beenige Spieren.

De vier ² Worm-wyze spiertjes komen voort van de Peezen der lange buyger, en van een plat stukje vlees onder in de plank van den Voet; en haar Peezen vereenigende met die der inwendige Tusschen-beenige, planten zig in 't inwendig zydelijk deel der vier eerste beentjes der vier kleine Teenen. Eenigen willen, dat die Spiertjes de eerste Geleding der vier kleine Teenen buygen.

De vier inwendige ³ tusschen-beenige Spieren, zijn de onderste, die na de plank van den Voet leggen, en beginnen van 't uytwendig zydelijk deel van het eerste, tweede, derde, en vierde been van den ⁴ Na-voet, en planten zig in 't inwendig zydelijk deel van 't eerste been der vier kleine Teenen.

1 Talus. 2 Lumbricales. 3 Interossei. 4 Metatarsus.

Kk

De

De vier eerste Teenen worden zydelings uytwaarts bewogen door de uytwendige tusschen-beenige Spieren: ze komen voort van 't inwendig zydelijk deel des tweede, derde, vierde, en vijfde beens van den Na-voet; en planten zig in 't inwendig zydelijk deel der vier eerste Teenen.

De groote Teen word gebogen, uytgestrekt, zydeling in-, en uyt-waarts bewogen door zijn eygene Spieren.

De buyger R 2. Fig. begint van ontrent 't opperste, en agterste deel van 't ² Kuyt been, en agter den inwendigen Enklauw gaande, plant zig met haar lange Pees in 't laatste been van den grooten Teen.

De uytstrekker I 1. Fig. komt voort van ontrent 't opperste, en voorste deel van het Kuyt-been, en verdeeld zig ontrent den ³ Voor-voet in twee Peezen; en plant zig in de beenderen van den grooten Teen.

De Spier, die de groote Teen zydelings inwaarts beweegt D 4. Fig. begint van 't inwendig zydelijk deel van 't Hiel- en ⁴ Schip-wyze been, en geplaatst op 't been van den Na-voet, dat onder den grooten Teen staat, plant zig in zijn twee Beenderen.

Die den grooten Teen zydelings uytwaarts beweegt, behevens een der uytwendige Tusschen-beenige, komt voort van 't been van den Na-voet, dat onder den kleinen Teen staat, en schuyns gaande over de andere Beenderen, plant zig wat inwaarts in 't eerste been van den grooten Teen.

Die den kleinen Teen zydelings uytwaarts beweegt B 4. Fig. komt voort van 't uytwendig zydelijk deel van 't Been van den Na-voet, dat onder den kleinen Teen staat, en plant zig in 't uytwendig zydelijk deel der beenderen van den kleinen Teen.

Men moet zomtjids snijden onder in de plank van den Voet, om verscheyde oorzaken; de gemeene dek-selen op die plaats zijn zeer hard, dik en vet, waar onder nog een breede Pees is A 4. Fig. die een uytbreyding is van de groote Pees, of koorde van *Achilles*, die zeer sterk en zo breed niet is, als de Voet, de-

1 Metatarsus. 2 Fibula. 3 Tarsus. 4 Os Naviculare.

wyl



wyl ze door 't midden van den Voet in zijn lengte gaat; en 't is aan de zyden van die Pees, dat men in de lengte snyden moet, voornamelijk aan de zyde vanden kleinen Teen, dewyl aan de andere de Pees loopt, die den grooten Teen buygt. Dit heeft plaats, als men diepe insnydingen doen moet.

Den Heelmeeſter moet altoos zeer voorzigtig zijn, om de vezelen niet dwers, maar te snyden in haar lengte, zo veel mogelijk is, voornamelijk in de opperſte en onderſte Ledematen, of Armen en Beenen, daar mees al de Spieren in haar lengte loopen, en daarom moet hy kennis hebben van dit deel der Ontleding, als ook van den loop der groote Vaten.

U Y T L E G G I N G

der

F I G U R E N,

van de

XXXVII. T A F E L.

In welke afgebeeld worden de Spieren van de Scheen, en Voet.

<i>De 1. Figuur vertoont de</i>		C	De Snyderſ-pier.
<i>Scheen van voren gezien.</i>		D	De vliezige, of bree-
			de Windel-pier.
A	Het opperſte deel van 't Darm-been.	EH	De inwendige groote Pier.
B	Plaats van de kleine Drayer.	F	De regte Pier.
		G	De uytwendige
		Kk 2	groo-

groote Spier.

H De Dye-been spier.

Ii De uytstrekker van den grooten Teen, die twee Peezen heeft.

K De voorste Scheen-been spier.

L Het Scheen-been.

M De lange uytstrekker der vier kleine Teenen.

m m Haar Peezen.

N De korte uytstrekker der voorgemelde Teenen.

n n Haar Peezen.

OP De agterste Kuyt-been spier, die dubbeld was.

Q De voorste Kuyt-been spier.

R De agterste Scheen-been spier.

De 2. Figuur vertoont de Scheen van agteren.

A De groote Draayer.

B Een uytsteeksel van 't Heupe-been.

C De inwendige Stop-spier.

D De uytwendige groote Spier.

E De Dye-spieren zig duysterlijk vertonende.

FF De Twee-hoofdige spier.

G De half-vliezige.

H De half-zenuwagtige.

I Een deel van de Drie-hoofdige spier van de Dye.

K De smalle spier.

L De verdeeling der Zenuwen.

M De Snyders spier.

NN De uytwendige Kuyt-spier, Tweelingen genaamt.

o o De inwendige Kuyt-spier.

Q De groote Pees, of koorde van *Achilles*.

R De buyger van den grooten Teen.

S De agterste Scheen-been spier.

T De lange buyger der vier kleine Teenen.

V De korte buyger der zelve Teenen.

U De agterste Kuyt-been spier.

De 3. Figuur vertoont de Scheen van agteren, met een deel van 't Dye-been, zijnde de Kuyt-

Kuyt-spiere weg genomen.

- A De Plank-spier.
- B De Knye-spier.
- C De lange buyger der vier kleine Teenen.
- D De agterste Scheenbeen spier.
- E De buyger van den grooten Teen.
- F G De agterste Kuytbeen spier, die dubbel was.

De 4. Figuur verthoont eenige Spieren van de Teenen uyt Spigelius.

- A Een breede Pees in de plank van den Voet, dat een uyt-

breyding is van de groote Pees, of koorde van *Achilles*.

- B Een Spier, die den kleinen Teen zydelings uytwaarts beweegt.

- C De korte buyger der vier kleine Teenen.

- D Een Spier, die den grooten Teen zydelings inwaarts beweegt.

- E F Iet van de tusschen-beenige Spieren.

- G De buyger van den grooten Teen.

- H Een van de Wormwyze Spiertjes.

ZE.

DE ZEVENDE VERHANDELING

DER

HEELKONSTIGE ONTLEDING

VAN 'S MENSCHEN LIGHAAM.

VAN DE VERDEELING

DER VATEN.

HET I. HOOFDSTUK.

Van de verdeling der groote Slag-ader.

IN de I. Verhandeling is van de Aderen, Slag-aderen, en Zenuwen, zo veel ze tot de ¹ Een-daantige deelen behooren, gesproken, benevens haar maakfel, en gebruyk: ook is op verscheide plaatsen gewag gemaakt van haar verspreyding in 't een of 't ander deel: zo dat overig is te spreken van de voornaamste verdeelingen der voorgemelde Vaten.

Twee
Slag-ade-
ren.

In 's Menschen Lighaam zijn twee voorname Slag-aderen: de ² groote, en ³ Long Slag-ader, zo dat de Slag-aderen, in 't een, of 't ander deel gevonden, komen van den tronk of tak van de een of andere dezer Slag-aderen.

Tronk der
groote
Slag-ader.
XXXVIII.
Tafel.
1. Figuur.

De groote Slag-ader A uyt de linker holligheyt van 't Hart gaande met een grooten tronk, geeft onder de halve Maans-wyze klap-vliezen de twee Kroon-Slag-aderen van 't Hart aa.

Buyten 't Harte-zakjen zijnde gekomen, klimt ze onverdeeld, ontrent de lengte van vier dwerse Vin-

¹ Partes similes. ² Aorta. ³ Arteria pulmonaria.

geren,

geren, regt na boven, daar de nederdalende groote Nederda-
 Slag-ader B C zig na de linker zyde nederwaarts lende
 buygt, terwyl een grooten tak van den voorgemel- groote
 den tronk by na regt op klimt. Slag-ader.

Van 't begin der groote nederdalende Slag-ader,
 komt voort de linker onder ¹ Sleutel-been Slag-ader D, Linker
 en tusschen deze, en den gemelden grooten tak komt onder-
 voort de linker ² Krop Slag-ader b. Sleutel-
 been Slag-

Die groote tak zijnde opgeklimmen ontrent de ader.
 lengte van anderhalven Vinger, verdeeld zig in de
 regter Krop- b en onder-Sleutel-been Slag-ader L. Regter.

De onder-Sleutel-been Slag-aderen ontrent haar be-
 gin, brengen van onderen voort de twee, drie, of vier
 bovenste tusschen-Ribbige Slag-aderen, door een tak Bovenste
 n. De andere tusschen-Ribbige Slag-aderen komen tusschen-
 voort van de nederdalende groote Slag-ader. Ribbige
 Slag-

Van onderen van 't begin der onder-Sleutel-beens aderen.
 Slag-aderen komen de ³ Midden-schots, of beter ge- Midden-
 zegt Midden-rifts Slag-aderen: van welke ziet het rifts Slag-
 III. Hoofdstuk van de IV. Verhandeling. aderen.

Van 't voorste deel der onder-Sleutel-beens Slag-
 aderen, komen de Mam-Slagaderen m, die onder 't Mam-
 Borst-been nederdalende, eenige takjes geven aan Slag-
 de uytwendige deelen, voornamelijk in de Vrouwen, aderen.
 aan de Mammen, en omtrent het ⁴ Zwaard-wyze
 Kraak-been, geven ze weder eenige takjes aan de
 Mammen; cyndelijk zig verspreydende in de Buyk-
 spieren, vereenigen zy door vele ⁵ inmondingen, met
 de Lenden-, en boven-Buyks Slag-aderen.

Vorders komen van de onder-Sleutel-beens Slag-
 aderen, de Hals-, of ⁶ Wervel-Slag-aderen c c, en Hals- of
 na dat ze eenige takjes, zo na onder als boven, aan Wervel-
 de Spieren gegeven hebben, gaan ze buyten de hol- Slag-
 ligheyt der Borst, daar ze Oxel-Slag-aderen genaamt aderen,
 worden.

Door den Hals klimmen na 't Hoofd vier Slag-a-
 deren: de ⁷ Krop-Slag-aderen, en de Hals, of Wervel- Krop-
 Slag-aderen. Slag-
 aderen.

1 Arteria subclavia. 2 Arteria carotis. 3 Mediastina. 4 Cartilago
 ensiformis. 5 Inosculationes. 6 Vertebrales. 7 Carotides.

De Krop-Slag-aderen , die de grootste zijn bb , klimmen opwaarts aan de zyden der Longe-pijp , daar men met den Vinger dezelve voelt kloppen , en ze geven daar in 't voor by gaan eenige takjes ook aan de nabuurige deelen ; maar aan 't hoofd gekomen zijnde , verdeelen ze zig in de inwendige ee , en de uytwendige Krop-Slag-aderen dd.

Uytwen-
dige Krop-
Slag-
aderen.

De uytwendige Krop-Slag-aderen opklimmende , verdeelen zig in vier voorname takken 1. 2. 3. 4.

De eerste verspreyd zig in de spieren van 't Tong-been , Tong , en in 't binnenste der Keel.

De tweede gaat in de spieren der Lippen , en 1 Twee-buykige.

De derde maakt de 2 Slaap-Slag-aderen , waar van de grootste nederwaarts loopt , langs 't onderste Kaak-been na de Tandén.

De vierde gaat na de agterste spieren van den Hals , Hoofd , en vorders in de huyd van 't Agter-hoofd.

Zomtijds moet een Heelmeeſter de Slaap-Slag-ader openen , waar toe hy moet nemen die 't ſterkſt klopt , 't welk door een enkele opening , gelijk in een gemeene lating , kan , en mag gedaan worden , om dat ze op een Been legt , op welk ze kan toegedrukt worden met dikke druk-doekjes , die gedurig vergroten- de , en met een bequamen band vaſt bindende , na dat men eerſt een Plaaſter dik van *Maſtik* beſmeert , zo groot als een Schellink , en aan 't vuur week ge- maakt zijnde , op de opening gelegd heeft.

Inwendi-
ge.

Van de inwendige 3 Krop-Slag-aderen , eerze in 't 4 Bekkeneel gaan , komt een takje voort , dat door een gat van 't Wigge-been na 't dikke Herſſen-vlies gaat.

De zelve in 't Bekkeneel gaande , booren door 't dikke Herſſen-vlies , en vereenigen onder aan den grond van de Herſſenen met malkander , makende eenen tronk.

De 5 Wervel-Slag-aderen cc , die de kleinſte zijn , worden zo genaamt , om dat ze door de gaten van

1 Digaſtricus. 2 Arteria temporales. 3 Carotides. 4 Cranium.
5 Arteria vertebrales.

de dwerse uytsteekfels Hals-Wervel-beenderen gaan.

Na dat die Slag-aderen eenige takjes i i aan 't Rug-^{Rug-merg} merg en de naburige deelen gegeven hebben, gaan ze ^{Slag-aderen.} door 't groote gat van 't Agter-hoofds-been, en 't dikke Herffen-vlies doorboorende, vereenigen onder 't verlangde Herffen-merg met malkander, en maken eenen tronk, welke beyde met malkander vereenigende, een eenzaam vat maken. Zie de 4. Fig. d XXIV. Tafel. Van welker agterste deel een tak f voortkomt, die op 't Rug-merg nederdalende, met de andere takjes op een wonderlijke manier vereenigt. Zie de 3. en 5. Fig. XXVI. Tafel.

Hoe de voorgemelde Slag-aderen zig in de Herffen verspreyden, zie het V. Hoofdstuk van de IV. Verhandeling.

De onder-Sleutel-beens Slag-aderen buyten de holligheyt der Borst gekomen zijnde, worden Oxel-^{Oxel-} Slag-aderen genaamt, en verdeelen zig in twee tak-^{Slag-aderen.} ken EF, welker laatste, om dat hy kleinder is, de tak, en de andere de tronk kan genaamt worden.

Van 't begin van den tak F, komt de uytwendige Schouder-blads Slag-ader o, die zig in verscheyde takjes verdeeld.

Ook word die groote tak F verdeeld in drie kleinere, ft v, welker tak f weder in drie, en meer andere verdeeld word, die zig in de spieren, en andere naburige deelen verspreyden, gelijk ook de tak v, die in twee takken verdeeld zijnde, zig in de naaft gelege deelen verspreyd. Maar de tak t, die langs 't buytenste deel des Opper-arms loopt, schijnt na veel takken aan de naburige deelen gegeven te hebben, ontrent de vouw van den Arm te eyndigen.

De tronk E voortgebragt hebbende de inwendige Schouder-blads Slag-ader p, de bovenste Borst Slag-^{Verdee-} ader g, en de onderste r, loopt nederwaarts, nevens ^{ling der} de by gelege Zenuw, na 't midden der vouw van den ^{Slag-} Elleboog, gevende in 't voor by gaan eenige takjes ^{aderen} door den ^{Arm.} x x aan de naburige deelen.

Ontrent de vouw van den Elleboog verdeeld hy zig

1 Subclaviæ.

K k 5

in

in twee takken GH, welker laatste langs de kleine Pijp des Onder-arms, na de ¹ Voor-hand loopt, 't welk de Slag-ader is, daar de Pols gevoelt word, gevende in 't voor by gaan eenige takjes x.

Over de Voor-hand gekomen zijnde, geeft hy eenige takjes xy aan de spieren van den Duym, voornamelijk een in-, en uytwendigen tak.

Het overige van dien tak loopt tusschen den Duym, en Wys-vinger weder na de palm der Hand, en geeft in 't voor by gaan aan den Duym een takjen z, en aan den Wys-vinger een takjen 5, 't overige na de Voor-hand loopende, vereenigt zig door veele inmondingen met de andere Slag-aderen.

De tak G, die de grootste is van de verdeeling des tronks, brengt een grooten tak voort 3, die voor het meeste door de Spieren opwaarts te rug loopt, en verdeeld word in twee by na gelijke Slag-aderen IK.

De Slag-ader K brengt voort den tak u, die verspreyd word in de spieren, die de Vingeren buygen: ook word dezelve Slag-ader verdeeld in twee takken w, welker binnenste tusschen 't ² Elle-been, en de ³ kleine Pijp loopende, zig verspreyd in de naburige spieren, die de Voor-hand, en Vingeren bewegen.

De Slag-ader I nevens 't Elle-been nederdalende, geeft wederzyds veel takken u, en zo haast zy over de Voor-hand komt, zend ze een grooten tak 7 na 't buytenste deel van den kleinen Vinger, en een ander na de tegen-overige zyde, die met een tak H door inmonding vereenigt word, gevende ook een byzonderen tak 6 aan de ruymte tusschen de beentjes der Na-hand, die zig over al in de palm der Hand verspreyd; het overige vanden grooten tak I, word allengskens na den Duym toe gebogen, daar hy de buyging 8 maakt, en weder met den tak H vereenigt, gevende verders drie takken, die zig elk in twee verdeelen, en aan de zyden van de Vingeren loopen 9 9.

¹ Carpus. ² Ulna of Cubitus. ³ Radius.

*De Verdeeling der groote nederdalende
Slag-ader.*

De nederdalende groote Slag-ader brengt voort de ^{Longe-}Longe-^{pijps Slag-}pijps-Slag-ader b, die zomtijds ontrent 't ^{ader.}begin, en ook wel eenige dwerse Vingeren laager af-^{XXXVIII.}komt: ze is meermaals dubbeld. Ziet de beschryving ^{Tafel.}in 't IX. Hoofdstuk van de III. Verhandeling. ^{1. Figuur.}

Aan beyde zyden eenigfints van agteren, komen voort agt, negen, of tien ² tusschen-Ribbige Slag-^{Tusschen-}aderen c c, na dat 'er meerder of minder van de ³ on-^{Ribbige}der-Sleutel-beens Slag-aderen komen; dikwils komen ^{Slag-}aderen. 'er meer van de regter als linker zyde.

Na deze volgen de Lende-Slag-aderen t t. ^{Lende-}

Wat voorwaarts onder de tusschen-Ribbige, komt de ⁴ Midden-rifts Slag-ader d, die zomtijds enkel, ^{Slag-}dan dubbeld is, en ook van de ⁵ Buyk-Slag-ader ^{aderen.}voortkomt. ^{Midden-}rifts Slag-aderen.

De Buyk-Slag-ader e komt voort uyt de groote ^{Buyk-}nederdalende Slag-ader, onder 't Midden-rift, en ^{Slag-ader.}verdeeld zig aanstonts in een regter en linker tak.

Van den regter tak komen de regter Maag-Slag-^{Haar ver-}ader f, en de regter Net-Slag-ader i; de regter Al-^{deeling.}vlees Slag-ader, die van den twaalf-vingerigen Darm, van de Gal-blaas l, en van de Lever m.

Van den linker tak komen de linker Maag-Slag-aderen h h, die van 't Net i, van de Maag en 't Net ! en eenige kleine, die na 't Alvlees gaan: ook word de Milt-Slag-ader k voor het grootste deel in de Milt verspreyd.

Een weynig laager van voren, begint de bovenste ⁶ Darm-scheyl Slag-ader n; deze verdeeld zig in veel ^{Darm-}takken, die loopen door 't Scheyl na al de dunne ^{scheyl}Darmen; maar eerze tot dezelve komen, vereenigen ^{Slag-aderen.}ze met malkander, en maken vele bogen p, van wel-

1 Arteria bronchialis. 2 Intercostales. 3 Subclavia. 4 Arteria Diaphragmatica. 5 Celiaca. 6 Mesenterica.

ke ontelbare takjes komen qq, die zig in de Darmen verspreyden.

Nier-Slag-aderen. Na deze volgen de Nier-Slag-aderen ss, d'Uytmelkende genaamt, zijnde de linker hooger, als de regter.

Vet, en zwarte Gal-doosjes Slag-ader. De vet-, en swarte Gal-doosjes Slag-ader p, komt in zommige Menschen van de Uytmelkende, in andere wat hooger, en de laatste meermaals van die der Lenden.

Zaad-Slag-aderen. De Zaad-Slag-aderen v v komen ook van voren uyt. **Lende-Slag-aderen.** Aan de zyden volgen de Lende-Slag-aderen t r. **Onderste Darm-Slag-ader.** Wat laager komt voort de onderste ¹ Darm-scheyl Slag-ader u, welkers takken zig verspreyden in de dikke Darmen, waar van een, die langs den ² Endel-darm na den Aars loopt, de inwendige Speen-Slag-ader genaamt word.

Heup-Slag-ader. Ook word de tronk ontrent het begin van 't Heylig-been, van voren over d'Ader gaande, verdeeld in twee grootetakken, ³ Heup-Slag-aderen genaamt w w, die na de Dyen, en vorders nederdalen. Zie de I. Fig. van de 12. 15. en 16. Tafel.

Heylige Slag-ader. Ter plaats der verdeeling, ziet men de Heylige Slag-ader x, die dikwils eenzaam tusschen de Heup-Slag-aderen, en zomtjids een aan elke zyde, uyt dezelve voortkomen.

Elke Heup-Slag-ader werd verdeeld in de inwendige a a, die de kleinste, en de uytwendige, die de grootste is v v.

Navel-Slag-aderen. Ontrent die verdeeling komen de grootste Heup-Slag-ader, de Navel-Slag-aderen in de Vrugt y, een aan elke zyde.

Onder-buyks Slag-aderen. Van de inwendige Heup-Slag-aderen, komen de ⁴ onder-Buyks-Slag-aderen d v, die na den Endel-darm gaan, uytwendige Speen-Slag-aderen genaamt, en ook na de Blaas, en Teel-deelen, voornamelijk in de Vrouwen: als mede na de Spieren der naburige deelen e.

Uitwendige Speen-Slag-aderen. Vorders, eer de uytwendige Heup-Slag-aderen tot

¹ Arteria mesenterica inferior. ² Intestinum Rectum. ³ Arteriae Iliacæ. ⁴ Hypogastricæ.

de Dye komen , geven ze de ¹ Opper-buyks Slag-^{Opper-}aderen ^ε , die opwaarts gaande na de Spieren des ^{buyks} Buyks , en inwendige deelen , door verscheyde ² in-^{Slag-}mondningen , met de Mam-Slag-aderen vereenigen ^η.

Een weynig laager komt de Schaam-Slag-ader ^θ. ^{Schaam-}

De uytwendige Heup-Slag-aderen tot de Dye ge-^{Slag-ader.} komen zijnde , worden ³ Dye-Slag-aderen genaamt , ^{Dye-Slag-}van welkers tronk veel takken voortkomen , die na de ^{aderen.} Spieren loopen , en onder andere de uytwendige Dye-^{Uytwen-}spier Slag-ader B ². Fig. dat een zeer groote tak is , ^{dige Dye-}die van de uytwendige zyde afkomende , van onde-^{ader.}ren in twee verdeeld word a b , van welke een na den tronk neygt , en de andere zijn weg vervolgt na beneden , en worden beyde ontrent de Knye verdeeld in veel takken d d.

Van den tronk of Dye-Slag-ader komen veele tak-
ken , waar van een groote is , die de inwendige Dye-^{Inwendi-}spier Slag-ader C genaamt word , en een andere de ^{ge Dye-}Knye-Slag-ader c. ^{Spier Slag-}

Daar na nederdalende met den tronk der Ader , en ^{Knye-}Zenuw , van agteren tusschen beyde de hoofden van 't ^{Slag-}onderste deel des ⁴ Dye-beens , en hier , en daar veel ^{aderen.} takken gevende , word ze verdeeld in twee by na gelijke deelen e , in de inwendige , en f de uytwendige Scheen-Slag-ader , welker laatste den vliezigen band , die beyde Beenderen t' samen bind , doorboorende , uytwendig nevens 't ⁵ Scheen-been loopt na den Voet , en hier en daar veel takken K gevende , voornamelijk aan 't agterste , en uytwendig deel des Voets , brengt een grooten tak voort m , die zig verspreyd in 't opperste deel van den ⁶ Voor-voet , ⁷ Navoet , en eenige Teenen : ook word de tak n , vereenigt met den grootsten tak van de tweede verdeling.

De tak e , die de grootste is van de eerste verdeling , twee of drie dwerse Vingeren voortgegaan zijnde , verdeeld zig in twee andere gh , welker laatste en kleynste de ⁸ Kuyt-Slag-ader is , die na veele tak-

¹ Epigastricæ. ² Inosculationes. ³ Arteriæ crurales. ⁴ Os Femoris. ⁵ Tibia. ⁶ Tarsus. ⁷ Metatarsus. ⁸ Arteria suralis.

jes voortgebragt te hebben, over zijn midden zig in twee verdeeld i, die, eerze tot den Voet komen, schijnen te verdwijnen.


De grootste tak g, geeft eenige takjes aan de agterste deelen l, en gaat nevens de inwendige knoezel, ontrent de Hiel na de plank des Voets; maar word, eer hy daar komt, ook in twee verdeeld, waar van de kleinste na den grooten Teen gaat, en geeft eenige takken o, die zig uytwendig verspreyden; de andere geeft eenige takken uytwendig aan 't agterste deel van de Hiel p, terwijl hy diep inwaarts gaande, gelijk na den kleinen Teen, veel kleine takjes geeft q, aan de naburige deelen: en van daar wederkeerende onder de Beenderen, gaat hy nevens den grooten Teen opwaarts, en vereenigt zig met den tak f, of de andere van de eerste verdeeling, makende t' samen den boog nq, uyt welke verscheyde takjes voortkomen, die zig ontrent de Teenen in twee verdeelen, en aan de zyden van dezelve zig verspreyden r.

Zo een Slag-ader in de Dye, Arm, of Been, zal toegebonden worden, moet het altijd boven de opening geschieden: het tegendeel word in den Hals, en 't Hoofd gedaan; maar om dat 'er kleinder takjes zijn, die gemeenschap hebben met de groote, is men zomtijds genoodzaakt dezelve onder en boven de opening toe te binden: ook moet men de Slag-ader eerst ontblooten, eer men ze kan toebinden, en 't moet zeer voorzigtig gedaan worden: en als die maar ten deele gequetst is, willen eenigen dat men ze zal af-snijden; maar 't is beter die toe te binden.

De Slag-aderen zijn onderworpen zeker gebrek, genaamt *Aneurisma*, of *Slag-ader-spat*, dat in veele deelen van 't Lighaam komt: gelijk aan 't Hoofd, Hals, Schouder, onder den Oxel, in de Lies, en andere deelen, daar groote Slag-aderen gevonden worden.

Jonge Heelmeesters moeten die gezwollen niet openen, meenende datze vol etter zijn; (gelijk de waare *Aneurisma* zig gemeenlijk vertoont) zo als *Parvus* verhaalt van zo een gezwel, dat iemand opende aan een Priester, op de Geleding der Schouder, waar

van



van hy ftierf door de Bloedftorting, eer hy daar by kon komen. Ik heb over vele Jaren in de Stad *Yperen* een Dogter bezogt, die een *Aneurisma* had op den Arm, uyt een lating; zeven Jaar geleden: het gezwel was ten minften zo groot als een Hennen Ey, en hard als Kraak-been; behalven in 't midden een plaats, die zo groot was als een Stuyver, en zeer zagt. Drie Heelmeesters openden 't zelve; en geen kennis hebbende om dat gebrek te behandelen, is de Lijdfter haast gestorven.

U Y T L E G G I N G

der

F I G U R E N ,

van de

XXXVIII. T A F E L.

In welke vertoont word de tronk van de groote Slag-ader met haar voornaamfte takken.

<i>De i. Figuur vertoont den tronk der groote Slag-ader, met de bovenfte takken tot de Dyen.</i>	BC De nederdalende groote Slag-ader.
A De tronk der groote Slag-ader, opgaande uyt de linker holligheyt van 't Hart.	D De linker onder Sleutel-been Slag-ader.
aa De Kroon-Slag-aderen.	bb De Krop-Slag-aderen.
	cc De Wervel-Slag-aderen.
	dd De

dd De uytwendige Krop-Slag-aderen.

1 Eerste tak na de Tong.

2 Tweede tak na de spieren der Lippen.

3 Derde tak na de Slapen.

4 Vierde tak na de spieren des Hals.

ee De inwendige Krop-Slag-aderen.

f De plaats, daar de inwendige Krop-Slag-aderen in 't Bekkeneel gaan.

g De vereeniging der Krop-Slag-aderen met de Wervel - Slag-aderen.

h De Slag-aderen van 't Rug-merg.

ii De takken der Wervel-Slag-aderen.

k De Spier-Slag-ader van den Hals.

mm De Mam-Slag-ader.

nn De bovenste tusschen-Ribbige Slag-aderen.

o De uytwendige Schouder-blads Slag-ader.

E De tronk van de Oxel-Slag-ader.

F De groote tak van dezelve.

p De inwendige Schouder-blads Slag-ader.

q De bovenste Borst-Slag-ader.

r De onderste Borst-Slag-ader.

f De Slag-ader van de Driehoekige spier.

s Twee Slag-aderen voor de spieren van den Elleboog, en naburige deelen.

t Volherding van den tak F tot aan den Elleboog.

x Takken van den tronk van den Oper-arm voor de naastgelege deelen.

G Slag-ader van 't Elle-been.

H Slag-ader van de kleine Pijp.

o Takken van Slag-aderen, die na boven te rug keeren.

I Een tak der Ellebeens Slag-ader.

K De andere tak voor de Spieren, die de Vin-

Vingeren buygen, en uytstrekken.

uw Takken van de Slag-ader K voor de zelve Spieren.

μ Kleine takjes van de Elle-beens Slag-ader.

λ Takken der kleine Pijp Slag-ader.

x Derzelve uytwendige takken voor de Spieren van den Duym.

y De inwendige tak.

z Slag-ader, die door den Duym loopt.

5 Slag-ader, die door den Wys-vinger loopt.

6 Boog-wyze loop der Slag-ader.

7 Slag-ader voor den kleinen Vinger.

8 Andere boog-wyze loop der Slag-ader.

99 Slag-aderen der Vingeren.

L De regter onder-Sleutel-been Slag-ader.

Door de volgende Letteren worden de onderste Slag-aderen aangewezen.

B De nederdalende groote Slag-ader geopent, op dat de mondekens der tusschen-Ribbige, en Longepijps Slagaderen gezien wierden.

b Longe-pijps Slag-ader, die dikwils dubbel is.

c c Tusschen-Ribbige Slag-aderen.

d Slag-ader van 't Midden-rift afgesneden.

e De Buyk-Slag-ader te hoog afgebeeld.

f Regter Maag-Slag-ader.

g Slag-ader van 't Alvlees, en den twaalfvingerigen Darm.

h h Linker Slag-aderen van de Maag.

i Net-Slag-ader.

! De Maag- en Net-Slag-ader.

k De Milt-Slag-ader afgesneden.

l Op de regter zyde, de Gal-blaas-Slag-ader.

m De Lever-Slag-ader.

Ll

n De

n De bovenste Darm-
 fcheyl Slag-ader.
 o o Derzelve afgefne-
 de takken.
 p Takken, die na de
 Darmen loopen, en
 als bogen maken.
 q q Takken, die na de
 Darmen gaan.
 r De Vet-Slag-ader.
 ff De Nier-Slag-ade-
 ren.
 tt De Lende-Slag-a-
 deren.
 v v De Zaad-Slag-ade-
 ren.
 w w De Heup-Slag-
 aderen.
 x De heylige Slag-
 ader.
 aa De inwendige Heup-
 Slag-aderen.
 n n De uytwendige
 Heup-Slag-aderen.
 c Derzelve takken na
 de uytwendige deelen
 gaande.
 y d De onder-Buyks
 Slag-aderen.
 y Haar takken voor
 de Blaas en Teel-
 deelen.
 d Andere voor de
 Aars - Speen - Slag-
 aderen.

e e De opper-Buyks
 Slag-aderen.
 n Haar vereeniging met
 de Mam-Slag-aderen.
 g De Schaam-Slag-
 aderen.
De 2. Figuur vertoont
 A De Dye-Slag-ader.
 B De uytwendige Dye-
 spier-Slag-ader.
 C De inwendige Dye-
 spier-Slag-ader.
 a b De verdeeling der
 Spier-Slag-ader.
 c c Verscheide takken
 der Dye-Slag-ader,
 en onder die de Knye-
 Slag-ader.
 d d Takken van de
 uytwendige Dye-Slag-
 ader.
 e De inwendige Scheen-
 Slag-ader.
 f De uytwendige
 Scheen-Slag-ader.
 g Vervolg der inwen-
 dige Scheen-Slag-
 ader.
 h De Kuyt-Slag-ader.
 i Verdeeling der Kuyt-
 Slag-ader.
 k l Slag-aderen van de
 Kuyt, en naburige
 deelen.
 m Slag-

m Slag-aderen , die boven op den Voet loopen.

n Slag-ader , die na de plank des Voets gaat.

o Slag-aderen , die op 't opperste en uytwendig deel des Voets loopen.

p Slag-aderen , die na de Hiel gaan.

q Boogwyze loop van de eene Slag-ader na de andere.

r Takken , die na de Teenen gaan.

D Den Voet , op dat men de Slag-aderen zien zou.

HET II. HOOFDSTUK.

Van de verdeeling der holle Ader.

XXXIX.
Tafel.

DE ¹ holle Ader A , komt uyt de regter hollig-^{1. Figuur.} heyt van 't Hart , met een wyden mond , en ^{De holle} brengt voort de Kroon-ader a. ^{Ader.}

Eer de holle Ader uyt 't Harte-zakjen gaat , word ze verdeeld in twee tronken: de bovenste holle Ader ^{Bovenste,} C , en de onderste B : de eerste 't Harte-zakjen door-^{en onder-} boorende , gaat onverdeeld by na tot aan de Keel , en ^{ste holle} geeft aan de regter zyde , ^{Ader.}

De ² ongepaarde Ader D , die redelijk groot is : ^{Ongepaar-} deze aan den regter kant wat afwykende , en geplaatst ^{de Ader.} langs de zyde der Wervel-beenderen , brengt voort in de tusschen-ruymte der agt onderste Ribben , aan beyde zyden , de ³ tusschen-Ribbige Aderen b b. Deze ^{Tusschen-} komen in zommige , onmiddelijk van den tronk der ^{Ribbige.} ongepaarde Ader ; en in andere , ziet men eerst een tak , die de tusschen-Ribbige Aderen voortbrengt. Ider dezer Aderen vereenigt zig met de naast-gelegene door verscheyde ⁴ inmondingen : en eyndelijk , worden de onderste takken der ongepaarde Ader geplant in de Lende- , en zomtijds in de Nier-aderen.

¹ Vena cava. ² Azygos. ³ Vena intercostales. ⁴ Inosculationes.

Longe-
pijps Ader.
Midden-
schots
Ader.

Onder-
Sleutel-
beens
Aderen.

Een weynig onder den uytgang der ongepaarde Ader, toont den Heer *Bourdon* den uytgang der Longepijps Ader a. Van voren uyt de holle Ader, komt de ¹ Midden-schots Ader b, die na 't Midden-schot, en Harte-zakjen gaat.

Den tronk of bovenste holle Ader, word ontrént de Keel verdeeld in twee onder-Sleutel-beens Aderen.

Uyt het voorste deel der onder-Sleutel-beens Aderen, komen andere Midden-schots Aderen c c, beter gezegt bovenste Midden-rifts Aderen, die verdeeld zijn met Slag-aderen van dien naam.

Bovenste
tuffchen-
Ribbige.

Van de uytwendige zyde der onder-Sleutel-beens Aderen, ontrént haar begin, komen de bovenste tuffchen-Ribbige Aderen ll, met een enkelen tak, die zig verdeeld in twee, of drie andere, in de tuffchen-ruymten der bovenste Ribben, daar die van de ongepaarde Ader ontbreken.

Mam-ade-
ren.

Ook komen van 't onderste, en voorste der onder-Sleutel-beens Aderen, de Mam-aderen mm, verzeld met de Slag-aderen van dien naam: en verder de bovenste Spier-ader n.

Van elke onder-Sleutel-beens Ader komen vier Aderen.

Uitwendi-
ge Krop-
aderen.

De eerste zijn de uytwendige ² Krop-aderen dd, die aan de zyden des Hals onder de Huyd opklimmen, en in haar loop zeer over een komen met de uytwendige Krop-Slag-aderen. Onder de Kin worden twee groote takken door inmonding vereenigt, zo dat men geen eynde ziet.

Als in een ³ Keel-ontsteking de uytwendige Krop-ader zal geopent werden, moet iemand met den Duym boven de onder-Sleutel-been Ader, aan de eene zyde, op dezelve drukken, en een ander op de andere, en die openen.

Maar als die Ader moet geopent worden in andere gevallen, word niet belet dat de Lijder ademt: maar aan 't onderste des Hals word een gemeene laat-band gelegd, die word van voren aan 't ⁴ Strotten-hoofd

¹ Vena mediastina. ² Venæ jugulares. ³ Angina. ⁴ Larynx.

roegestrikt, zo dat de Lijder kan ademen, en beyde de voorste Vingeren daar tusschen gebragt worden, als dan den band trekkende, word met den Duym, die vry is, op den band gedrukt, ter plaats van de Ader, die opzwellende, geopent word, terwijl den Lijder ademt, om dat de Longe-pijp niet geperst word.

De tweede zijn de inwendige ¹ Krop-aderen ^{Inwendige Krop-aderen.} ee, die nevens de Longe-pijp, digt by de inwendige Krop-slag-aderen opklimmen, aan welk ze eenige takjes geven, ook aan de Spieren van 't Strotten-hoofd, Tong-been, Tong, Tandén, en andere deelen: ze worden verdeeld in twee takken, van welke de grootste h gaat na de zydelijke *Sinus* van 't dikke Hersen-vlies, met welk ze vereenigt is. De kleinste geven eenige takjes aan de ² Slijm-klier, en gaan, nevens twee takken van de inwendige Krop-slag-aderen, door een gat aan elke zyde van 't ³ Wigge-been, zig op de zyden in 't dikke Hersen-vlies versprey-dende.

Ook vereenigen de takjes der Krop-aderen door ⁴ inmonding dikwils met malkander, zo dat het vogt ^{Inmon-dingen der Aderen.} gespuyt in een der zydelijke *Sinus*, door de uytwendige Krop-ader uyt loopt.

De derde zijn de Hals-, of Wervel-aderen ff: ze loopen opwaarts door de gaten van de dwerse uyt-steekfels des Hals Wervel-beenderen, en vereenigen ^{Hals- of Wervel-aderen.} zig door twee gaten van 't Agterhoofds-been met de zydelijke *Sinus* van 't dikke Hersen-vlies.

Die Aderen worden van eenige de *Sinus* der Wervel-beenderen genaamt.

De vierde Aderen zijn de bovenste Spier-aderen oo, ^{Bovenste Spier-aderen.} loopende na de Spieren des Hals, Hoofds, en uytwendige deelen.

De ⁵ onder-Sleutel-beens Aderen uyt de Borst gaande, worden Oxel-aderen genaamt; maar eer ze uytgaan, geven ze van boven de inwendige Schouder-blads-ader ⁶, en de uytwendige p.

¹ Venæ jugulares internæ. ² Glandula pituitaria. ³ Os sphenoides. ⁴ Inosculatio. ⁵ Venæ subclaviæ.

Oxel-
aderen.

Hoofd-
ader.
Lever-
ader.

Ook worden de Oxel-aderen, ontrent het begin des Opper-arms verdeeld in twee takken: den bovensten en kleinften; de ¹ Hoofd-ader G, en de onderste grootste F de ² Lever-ader.

Van de Lever-ader komen twee Borst-aderen q, zijnde de bovenste ook uyt den tronk, eer die verdeeld is.

De Hoofd-ader word verdeeld in den uytwendigen tak H, en den inwendigen I.

De uytwendige vereenigt zig omtrent de ³ Voorhand met de andere van de Lever-ader, van welke eenige takjes voortkomen, die na de Vingeren gaan, voornamelijk na den ring- en kleinen Vinger; gelijk

Milt-ader. ook de ⁴ Milt-ader u.

Middel-
ader.

De inwendige tak vereenigt zig ontrent den Elleboog met de Lever-ader, waar uyt ontstaat de ⁵ Middeld-ader, die in 't Ader-laten dikwils word geopent; en alzo onder die Ader de Pees legt der ⁶ Twee-hoofdige Spier, en een der buygers van den Onder-arm, zo moet men die in 't openen niet quetsen, om de zware toevallen.

Ontrent de Pees der Borst-spier, word de Lever-ader verdeeld in drie takken.

De binnenste L tot den Elle-boog komende, en verzeld met de Zenuw, verdwijnt allengskens.

De tweede M, gelegen na de buyten zyde, word aan haar plaats de diepe genaamt, en verdeeld zig ontrent 't midden des Onder-arms, in twee andere Q R, welke uytwendige R in den Duym, wys-, en middel-Vinger zig verspreyd, ook in den uytwendigen Q, en middel-, ring-, en kleinen Vinger: en worden deze Aderen in de Hand vereenigt.

De derde en grootste tak der Lever-ader K, de ⁷ onder-huyds Ader genaamt, word ontrent 't inwendig uytsteekfel van 't onderste deel des ⁸ Opper-armbeens verdeeld in twee takken N O, welke eerste N onder 't ⁹ Elle-been nederdalende, ontrent de ¹⁰ Voor-

¹ Cephalica. ² Basilica. ³ Carpus. ⁴ Salvatella. ⁵ Mediana.
⁶ Biceps. ⁷ Subcutanea. ⁸ Os Humeri. ⁹ Ulna of Cubitus.
¹⁰ Carpus.

hand vereenigt word met den uytwendigen tak van de Hoofd-ader.

De tweede gaat schuyns na de kleine Pijp van den Onder-arm, en vereenigt zig met de Middel-ader, waar uyt ontstaat de Lever-ader o, die dikwils in 't Ader-laten word geopent, lopende na den Duym en voorsten Vinger.

Alzo onder de Lever-ader, een Slag-ader, en een voorname Zenuw legt, moet men in 't openen van die Ader, de een of de ander niet quetsen: zelden word de Zenuw geraakt, nogtans verhaalt *Paré*, dat in 't Ader-laten van Koning *Karel* de IX. ze wierd gesteken, en hy had daar langen tijd ongemak aan, na dat men zelf met groote moeyte veele zware toevallen, die 'er by quamen, gestuit hadde.

Dat een Heelmeester door ongeluk de Slag-ader heeft geopent, kan hy weten aan 't schoon en rood Bloed, dat met geweld, en al hortende 'er uyt springt, 't welk gemeenlijk geschied, als de opening groot en 't Bloed onbelemmert uyt springt: maar als de opening klein is, komt gemeenlijk een zwelling in den omtrek der Wonde, om dat 't Bloed onder de Huyd de Vet-blaasjes indringt; dan moet hy aanstonts den Duym op de opening leggen, eer dat meer Bloed onder de Huyd uytstort, de band los maken, en 't Bloed stelpen, gelijk gezegt is in mijn Verhandeling van de voornaamste Handwerken der Heelkonst in 't XXVI. Hoofdstuk; daar ook getoont word, hoe men in de Operatie van de *Aneurisma*, of *Slag-ader-spat*, de Slag-ader zal toebinden.

Een toeval, dat zomtijds by 't Ader-laten komt, is een *Thrombus*, veroorzaakt door 't Bloed, dat onder de Huyd uytstort, en dat geschied op drie manieren.

Eerst, om dat de opening in de Ader, niet regt tegen over die van de Huyd is, waar door 't Bloed ten deele belet word, vry, en onbelemmert uyt re loopen, zo dat men genoodzaakt is het onder de Huyd uyt te storten.

Ten tweeden, om dat de Ader dwers doorgesteken

is, zo dat 't Bloed, door de agterste opening uytloopende, rondom de Ader uytstort.

Ten derden, om dat de opening in de Ader grooter is, als die in de Huyd, zo dat het Bloed uyt de Ader komende, niet ras genoeg door de kleine opening van de Huyd kon henen gaan, waar door men 't onder de Huyd moet uytstorten.

De verdeeling der onderste holle Ader.

Onderste
holle
Ader.
Midden-
rifts-ader.

De onderste ¹ holle Ader B, 't Harte-zakjen doorboorende, loopt zonder eenige takken in de holligheyt der Borst te geven, na 't ² Midden-rift, waar aan ze in 't doorgaan, op elke zyde een merkelyken tak geeft cc, en ze gaat dan met een grooten tak in 't bovenste deel derzelver, maar niet diep, en verdeeld zig in drie, zomtijds in vier groote takken cc, die zig in ontelbare kleine verdeelen.

Lende-,
Nier-, en
Zaad-
aderen.

De onderste holle Ader, drie of vier dwerse Vingers onder 't Midden-rift zijnde gekomen, voegt zig tegen de Lende-Wervel-beenderen, nevens de groote nederdalende Slag-ader, en geeft daar aan elke zijde de opperste Lende-aderen d, en zwarte Gal-doosjes-aderen ee, de Nier-aderen DD, en de Zaad-aderen gf, welker linker voortkomt van de linker Nier-ader, en de regter g, onmiddelyk van den tronk der onderste holle Ader.

Na deze volgen aan elke zyde, de onderste Lende-aderen hh.

Heup-
aderen.

Hier gaat de onderste holle Ader, allengskens onder de groote nederdalende Slag-ader, en word verdeeld ontrent 't Heylig-been in beyde de Heup-aderen EE, van welkers begin, dikwils aan elke zyde, de heylige Ader, en zomtijds eenzaam tusschen beyde uytkomt.

In- en uit-
wendigen
tak.

Ook worden de Heup-aderen verdeeld, in een inwendigen tak F, en een uytwendigen G.

Onder-
buyks-,
Schaam-,

Van de inwendige komen de 3 onder-Buyks-aderen K, de 4 Schaam-aderen o, en de uytwendige

1 Vena cava. 2 Diaphragma. 3 Vena hypogastrica. 4 Pudenda.

Speen-

Speen-aderen 1 : andere takken worden verspreyd in ^{en Speen-} de naburige deelen. ^{aderen.}

Van den uytwendigen tak, eer hy tot de Dye komt, zijn herkomstig de ¹ opper-Buyks-aderen n, en de in- ^{Opper-}wendige ² Darm-beens-aderen m. ^{Buyks-} ^{aderen.}

De Heup-aderen, tot de Dye gekomen zijnde, worden Dye-aderen genaamt, en verdeeld in twee takken; Dye-ade- een inwendige en kleinste H, en uytwendige grootste ^{ten.} I, die den tronk moet wezen.

De inwendige tak, de Moeder-ader *Saphena* ge- naamt, loopt na beneden onder de Huyd en 't Vet, aan de inwendige zyde der Dye, en 't Been, tot aan den inwendigen Enklauw, daar hy met andere tak- ken door vele inmondigen vereenigt. Die Ader word dikwils geopent voor de gebreken der Lyf- moeder.

Van den tronk of uytwendigen tak, komen behal- ven veel kleine,

Eerst de bovenste, en kleinste Heup-aderen p, wel- ^{Bovenste} kers takken, opwaarts, onderwaarts, en zydelijk, ^{Heup-} in de deelen onttrent de ³ Geleding der Dye zig ver- ^{aderen.} spreiden.

Ten tweeden, de inwendige Spier-ader K, die ^{Inwendig} zig voornamelijk verspreyd in de Spieren van de ^{ge Spier-} Dye. ^{ader.}

Ten derden, de ⁴ Knye-ader, die tweederley begin ^{Knye-} heeft L L, welke hier, en daar in 't nederdalen, ee- ^{ader.} nige takken gevende, zig verspreyd in de uytwendige en agterste zyde des Voets.

Ook geeft dezelve tronk I, de Kuyt-ader M, en ^{Kuyt-} de groote Heup-ader N, die na den Voet gaande, zig ^{ader.} met malkander, en met andere dikwils door inmon- ding vereenigen.

Eyndelijk word denzelven tronk, onttrent 't mid- den van 't Been, verdeeld in veele naamlooze takken, van welke de voornaamste zig verspreyden tot in 't eynde des Voets, en vereenigen zo onder malkander, als met de voorgaande, door vele inmondigen. ^{Inmona-}

De loop der takken, zo van de Aderen als Slag- ^{dingen.}

1 Epigastrica. 2 Iliaca. 3 Articulatio. 4 Poplitea.

aderen, en de vereeniging, verschilt niet alleen in verscheide onderwerpen; maar ook in 't zelfde, zo dat ze anders in den regter, als linker Voet loopen, en vereenigen; 't welk ook geschied in de Handen, schoon 't verschil in de grootste takken zo groot niet is.

Zo een Ader in de Dye, Been, of Arm moet toegebonden worden, moet het altijd onder de opening geschieden, die van den Hals en 't Hoofd in tegendeel: 't geene ik in 't I. Hoofdstuk van deze Verhandeling gezegt heb, rakende zekere omstandigheden in het binden der Slag-aderen, moet ook plaats hebben in 't binden der Aderen.

HET III. HOOFDSTUK.

De verdeeling der Poort-ader.

DE Poort-ader, gelijk gezegt is in 't XIV. Hoofdstuk der II. Verhandeling, gaat niet uyt den Buyk; maar word aan beyde zyden verdeeld in ontelbare takken, waar van eenige in de Lever, en de andere in de meeste Ingewanden des Buyks verspreyd worden: de tronk, of 't middelste deel is zeer kort, en uytgestrekt van 't holle gedeelte der Lever, na beneden.

Dienst
van de
bovenste
takken
der Poort-
ader.

De takken der Poort-ader verspreyd door de Lever, zijn gelijk Slag-aderen, om dat ze de stoffe van de Gal, na de kliertjes der Lever voeren, en waarschijnlijk ook 't voedsel; maar 't grootste deel van 't Bloed, dat door den tronk loopt, gaat in de takjes der holle Ader.

Der on-
derste
takken.

De onderste takken, die verspreyd zijn in eenige Ingewanden des Buyks, ontfangen 't Bloed van de Slag-aderen, en voeren 't na den tronk, gelijk de takken doen der Ader van de Long, en van de holle Ader, zo dat de Poort-ader, om haar maaksel, en

gebruik , de middel-maat houd tuffchen de andere Aderen, en Slag-aderen.

De tronk der Poort-ader A , na de Lever gaande, ^{xxxix.} is zeer ruym, en een *Sinus* genaamt, word verdeeld ^{Tafel.} in twee groote takken BC; uyt deze ruymte gaat ^{2. Figuur.} een kleine tak D, na 't bultige deel der Lever; maar yder groote tak word in zijn begin verdeeld in twee andere, zo dat de tronk der Poort-ader, in den ingang van de Lever, gelijk in vijf takken verdeeld is, ^{Verdeeling door de Lever.} en die weder in ontelbare kleinder, door de Lever zig verspreyden.

Onder de takken der Poort-ader, die 't Bloed in de andere deelen der Slag-aderen ontfangen, en in den tronk brengen, zijn eerst de Gal-blaas-aderen a, die over al in de Gal-blaas verspreyd zijn. ^{Aderen der Gal-blaas.}

Dan volgt de Maag-ader c, die voornamelijk door 't bovenste deel derzelve verspreyd is. ^{Maag-ader.}

Ook in zommige de Ader d, van den ² twaalfvingerigen Darm, van welke in 't vervolg zal gesproken worden. ^{Twaalfvingerigen Darm-ader.}

Daar na word de tronk verdeeld in twee takken, in den linker, den bovensten, en kleinsten F, en den regter, en ondersten, en grootsten E.

De linker tak, of Milt-ader, loopt in een groeve van 't ³ Al-vlees na de Milt, en brengt voort, nederwaarts, zomtijds de inwendige Speen-ader l, die na de dikke Darmen, en voornamelijk na den Endeldarm gaat; maar zomtijds komt die Ader van 't begin van den regter tak, of tuffchen beyde. ^{De inwendige Speen-ader.}

De Speen-ader, in 't Latijn *Hæmorrhoidalis* geheten, om dat ze Bloed drupt, en in eenige Menschen ontrent den Aars opzwelt, en geopent zijnde, Bloed stort, word de inwendige genaamt, tot onderscheyd van die, welke van de inwendige Heup-aderen voort komen.

Van de zelve Milt-ader, komen boven twee Maag-aderen e, een kleine, en groote, die met de bovenste de Kroon-ader ff van de Maag maken; van welke ^{Kroon-ader der Maag.} ziet het VII. Hoofdstuk der II. Verhandeling. Ook

1 Vena portæ. 2 Duodena. 3 Pancreas.

Linker
Net-ade-
ren.
Net-
Maag-
aderen.

word de Milt-ader verdeeld in twee takken, den bo-
vensten, en ondersten, die zig beyde in de Milt ver-
spreyden. Maar de onderste geeft in 't voorby gaan,
eenige takken aan 't Net, de linker Net-aderen g g,
en die aan 't Net en de Maag gemeen zijn, Net-
Maag-aderen h, welke zomtijds voortkomen van de
Milt-ader zelf voor de verdeeling.

De bovenste tak, daar hy in de Milt gaat, geeft
eenige takken aan de Maag, die 't korte Vat i ge-
naamt zijn.

De regter tak der ¹ Poort-ader E, geeft, eer hy
zig verdeeld, een tak aan 't Net, de regter Net-ader
m, en een aan 't ² Alvlees, die daar van zijn naam
heeft, dewelke zig dan verspreyden in 't Alvlees en
in 't Net.

Ook word de regter tak verdeeld in drie groote
³ Darmscheyl-aderen n n n, die tusschen de verdubbe-
ling van 't ⁴ Darmscheyl na de Darmen gaande, al-
lengskens in kleinder verdeeld worden: en gekomen
zijnde ontrent de Darmen, vereenigen zy zydelings
met malkander, makende gelijk verscheyde bogen,
van welke veel takjes afkomen, die zig in de Darmen
verspreyden.


Men ziet in de Vrugt, aan 't holle gedeelte der
Lever voortkomen, een aderagtig Kanaal, uyt de
ruyme holligheyt of *Sinus* der Poort-ader, regt tegen
over den ingang der Navel-ader b, in denzelven *Si-
nus*; dit Kanaal schuyns opgaande, zonder eenige tak-
ken te geven, plant zig in de onderste holle Ader, on-
middelijk onder 't ⁵ Midden-rift.

Door dat Kanaal gaat het Bloed, komende uyt de
⁶ Moeder-koek, door de Navel-ader, voorzien met
lugt-deeltjes, over de onderste holle Ader, en word
vermengt met 't Bloed, dat weder keert van de on-
derste deelen, na dat de voeding is verrigt.

Dit Bloed verzien met lugt-deeltjes, loopt voor 't
meeste deel door 't Ovale gat, na 't linker Oor, en
holligheyt van 't Hart, zonder door de Longen te

¹ Vena portæ. ² Pancreas. ³ Meseraicæ. ⁴ Mesenterium.
⁵ Diaphragma. ⁶ Placenta.





gaan; om dat ongebore Kinderen niet ademen, en 't ander deel, eerst in 't regter Oor, met een deel van 't nederdalende, en dan in de regter holligheyt gekomen zijnde, word gedreven in de Long-Slag-ader, van waar 't grootste deel loopt door 't Slag-aderlijk Kanaal, na de nederdalende groote Slag-ader, zonder door de Longen te gaan, om dezelve reden, als te voren: zo dat het Bloed in de ongebore Kinderen, door drie byzondere wegen loopt, om dat ze in 't Lighaam van de Moeder niet ademen: maar als ze zijn geboren, en ademen, loopt het Bloed allengskens door de Longen, en deze wegen fluyten, hoewel men in bejaarde Menschen, zomtijds 't Ovale gat open heeft gevonden.

U Y T L E G G I N G

der

F I G U R E N,

van de

XXXIX. T A F E L.

De Verdeeling der Aderen.

<i>De 1. Figuur vertoont de verdeeling der holle Ader.</i>	C De bovenste holle Ader.
A De wyden mond	B De onderste holle Ader.
der holle Ader, aan	D De ongepaarde Ader.
de regter holligheyt van 't Hart.	E De onder-Sleutelbeens Aderen.

a De

- | | | | |
|----|---------------------------|----|-----------------------|
| a | De Kroon-ader. | | schen - Ribbige Ader- |
| bb | De onderste tuf- | | ren. |
| | schen - Ribbige Ader- | mm | De Mam-aderen. |
| | ren. | nn | De onderste Spier- |
| o | De Midden-schots | | aderen. |
| | Ader. | oo | De Hals-Spier-ade- |
| cc | Andere Midden- | | ren. |
| | schots Aderen, beter | pp | De Schouder-blads- |
| | bovenste Middel-rifts | | Spier-aderen. |
| | Aderen geheten. | qq | De bovenste en on- |
| dd | De uytwendige | | derste Borst-ader. |
| | Krop-aderen. | r | Verscheyde takjes |
| ee | Inwendige Krop- | | loopende door den |
| | aderen. | | Opper-arm. |
| ff | De Wervel-aderen. | ff | Andere door den |
| gg | Een tak van de in- | | Onder-arm. |
| | wendige Krop-ader, | tt | Verscheyde veree- |
| | die na de Slym-klier, | | nigingen der Aderen. |
| | en 't dikke Herflen- | v | De Milt-ader. |
| | vlies gaat, afgesne- | uu | Veele takken van |
| | den. | | Aderen, die door de |
| h | De inwendige Krop- | | Hand loopen. |
| | ader, daar ze zig veree- | F | De Lever-ader. |
| | nigt met de zydelijke | G | De Hoofd-ader. |
| | <i>Sinus</i> van 't dikke | H | De uytwendige tak |
| | Herflen-vlies. | | der Hoofd-ader. |
| !! | De voorste takken | I | De middel-Ader. |
| | van de uytwendige | K | De Onderhuyds-a- |
| | Krop-aderen. | | der. |
| i | De Voorhoofds Ader. | L | De binnenste tak |
| k | De agterste takken | | der Lever-ader. |
| | der uytwendige Krop- | M | De diepe Ader. |
| | aderen. | N | De grootste tak der |
| ll | De bovenste tuf- | | Onderhuyds-ader. |

O De Lever-ader, die zomtijds geopent word in 't Ader-laten, gelijk ook de tak H en I.

P Vervolg der Lever-ader.

Q De inwendige tak der diepe Ader.

R De uytwendige tak.

a Vereenigingen der Aderen.

De volgende Letteren toonen de verdeeling der onderfte holle Ader.

B De tronk der onderfte holle Ader.

CC De Lever-aderen.

DD De Nier-aderen.

cc De Midden-rifts Aderen.

dd De bovenfte Lende-aderen.

ee De Vet-aderen.

fg De Zaad-aderen.

hh De onderfte Lende-aderen.

ii De heilige Aderen.

EE De Heup- of Darm-beens Aderen.

F De inwendige Heup-aderen.

G De uytwendige.

H De Moeder-ader.

I De Dye-ader.

k De Onderbuyks-ader.

l De uytwendige Speen-ader.

m Takken van de inwendige Heup-ader.

n De Opperbuyks-ader.

o De Schaam-ader.

p De kleine Heup-ader.

K De inwendige Spier-ader.

LL De Knye-ader.

M De Kuyt-ader.

N De groote Heup-ader.

q Een tak van de Moeder-ader, die gemeenlijk geopent word in 't Ader-laten.

De 2. Figuur vertoont de verdeeling der Poort-ader.

A De tronk der Poort-ader.

BCD Takken; die verspreyd zijn in de Lever.

E De regter tak der Poort-ader.

F De linker tak.

aa De

- | | |
|--|--|
| <p>aa De twee Gal-blaas-
aderen.</p> <p>b De Navel-ader, die
ten deele in de Poort-
ader, en ten deele in
een tak van de holle
Ader gaat.</p> <p>c De regter Maag-
ader.</p> <p>d De twaalf-vingerigen
Darm-ader.</p> <p>e De linker Maag-
aderen.</p> <p>ff De Maag-kroon-
ader.</p> <p>gg De linker Net-</p> | <p>aderen.</p> <p>h De Maag-net-ader.</p> <p>i De Maag-aderen, die
't korte Vat genaamt
worden.</p> <p>k De Milt-aderen.</p> <p>l De inwendige Speen-
ader.</p> <p>m De regter Net-
ader.</p> <p>nn De Darm-scheyls
Aderen, die ontrent
de Darmen door haar
vereenigingen, of in-
mondigen, gelijk ver-
scheyde bogen maken.</p> |
|--|--|

HET IV. HOOFDSTUK.

*Van de verdeeling der Zenuwen, en eerst van
die onmiddelijk uyt het Bekkeneel
voortkomen.*

Binnen 't ¹ Bekkeneel komen voort uyt 't verlang-
de Herffen-merg tien paar Zenuwen, gelijk in 't
V. Hoofdstuk van de IV. Verhandeling is gezegt, zo
dat alleen overig is dezelve te vervolgen.

De Reuk-
zenuwen. De takjes der Reuk-zenuwen, 't eerste paar, door
de gaatjes van 't ² Zeef-been gaande, verspreyden zig
in 't Vlies, dat van binnen de holligheden van den
Neus, en de andere holligheden van 't Voorhoofds-
been bekleed.

Gezigt-
zenuwen. Van de Gezigt-zenuwen, het tweede paar, komen
eenige vliezen van de Oogen.

1 Cranium. 2 Os cribrosum.

De

De Zenuw van 't derde paar A 2. Fig. buyten 't ^{XL. Tafel.} Bekkeneel gekomen zijnde, loopt na 't Oog, en word ^{2. Figuur.} verdeeld in vier takken, die zig verspreyden in vier ^{Oog-be-} wegende. Spieren van 't Oog: de hoogmoedige a, de nederige b, de nahalende c, en onderste schuynse d; ook gaan eenige takjes na 't Hoorn- en Druyf-bezie-vlies c.

De Zenuwen van 't vierde paar B g 2. Fig. schij- ^{De lijdens-} den zig geheel in de Katrol-spier te verspreyden. ^{de.}

De Zenuw van 't vijfde paar B 3. Fig. word on- ^{Verdee-} trent haar begin verdeeld in twee takken C D, van ^{ling van 't} welke de agterste door een gat van 't Wigge-been ^{viijfde} gaande, daalt na 't onderste Kaak-been, en zig in paar. veele takjes verdeeld, van welke een gaat na de Oorklieren b, na de Vleugel-wyze spieren c, na de Knauw-spieren de, na 't agterste deel der Tong f, na de Tong g, en na de deelen onder de Tong h.

Ook van den grooten tak I 3. Fig. aan 't onderste Kaak-been gekomen zijnde, komt een tak voort, die in een gat van 't agterste, en binnenste deel van 't zelve gaat, en geeft aan yder tand een takjen; en van voren door een ander uytkomende, geeft aan de onderste Lip het takjen i, en aan de Kin een takjen k.

De andere groote tak van 't vijfde paar C 3. Fig. gaat een deel weegs onder 't dikke ¹ Herssen-vlies, aan de zyde der ² Turkse zadel; gevende regt over de ³ Slijm-klier eenige takjes aan de ⁴ Krop-Slagaderen; en vereenigt zig met de Zenuw van 't zesde paar, van waar ontrent hy een, en zomtjids twee takken geeft a, welke met een tak van 't zesde paar, die wederkeert, vereenigt zijnde, voortbrengt 't begin der tusschen-Ribbiga Zenuw K.

Van den zelvengrooten tak C komt een kleinder E, welkers takjens o in 't Tand-vlees, en p in 't Verhemelt zig verspreyden.

Daar na word 't grootste gedeelte van den tak c, verdeeld in drie kleinder F G H.

a Superbus. b Humilis. c Adducens. d Obliquus inferior.

b Glandulae parotides. c Musculi alares. d Masseter.

1 Dura Mater. 2 Sella turcica. 3 Glandula pituitaria. 4 Arteriae parotides.

M m

E n

En word de tak F weder verdeeld in vier takken 1. 2. 3. 4. van welke 1. aan de inwendige zyde van 't ¹ Oog-hol loopende, na de holligheden van den Neus gaat, 2. ook na de Voorhoofst-spiere, 3. en 4. loopen na de klieren van 't Oog en Oog-schelen.

De tak G, verspreyd zig in de Oog-schelen, en naburige deelen.

De tak H, geeft aan de ² Knauw-spier den tak l, aan de Neus-spiere, den tak m, en aan de bovenste Lip, den tak n.

Het zesde
paar.

De Zenuw van 't zesde paar A 3. Fig. word by na geheel verspreyd in de ³ verontweerdige Spier.

Het zevende
paar.

Het zevende paar Zenuwen heeft een harden en zachten tak: de zachte verspreyd zig in een gat van 't ⁴ Steen-been, in 't inwendig Oor, en dient tot 't Geheer; maar de harde tak uyt 't ⁵ Bekkeneel gaande, door een gat agter 't ⁶ Priem-wyze uytsteekfel, verspreyd zig in de Spiere van 't Oor, Tong-been, Tong, Lippen, Voorhoofd, en Oog-schelen.

't Inwendig Oor krijgt eenige takjes van 't vyfde paar: en uytwendig van 't eerste, of tweede paar des Hals.

Het agtste
paar.

Om dat 't agtste paar zig zeer verre verspreyd, zal daar van gesproken worden in 't volgende Hoofdstuk.

Het negende
paar.

Het negende paar is zomtijds in 't begin van yder Zenuw in twee verdeeld, die aanstonts t' samen vereenigende, gaat door de geheele Tong, om, zo men meent, die te bewegen.

De Zenuw van 't tiende paar, geeft op elke zyde twee takjes aan de bovenste vlegting der ⁷ rufschen-Ribbige Zenuw. Maar 't voornaamste deel nederdalende, vereenigt zig met een takjen van 't negende paar, en eenige takjes aan de Spiere des Hals gevende, verspreyd zig in de Borst-beens-Tong-spier.

¹ Orbita. ² Masseter. ³ Indignatorius. ⁴ Os petrosum. ⁵ Cranium. ⁶ Apophyses styloides. ⁷ Nervus intercostalis.

HET V. HOOFDSTUK.

De verdeeling der Zenuwen van 't agtste, vijfde, en zesde paar, na de onderste deelen.

Het agtste of dwalende paar gaat uyt 't Bekke-^{Agste of} neel door dezelve gaten, daar de zydelijke ^{Sidwalende} ^{paar.} ^{nus} vereenigen met de inwendige ¹ Krop-aderen, verzeld met de Rug-mergs Zenuw, die in 't vervolg haast afscheydende, loopt na de Spieren van 't Schouder-blad ⁶. Dit paar eenige takjes gevende aan de Spieren van den Slok-darm, en andere van de tusschen-Ribbige Zenuw ontfangende, maakt de ² Zenuw-knoops-vlegting A, uyt welke eenige takjes a gaan ^{XL. Tafel.} na 't ^{1.} ^{Figuur.} ³ Strotten-hoofd.

In die Zenuwen, aan de zyde der ⁴ Longe-pijp nederdalende, in 't begin van de holligheyt der Borst, is een tweede Zenuw-knoops-vlegting B, uyt welke ^{Een ander} veel takjes b gaan na 't Harte-zakjen, Hart, Ooren, ^{re vleg-} tronken der Bloed-vaten; en onder andere een groote tak C, nederdalende na de Hart-zenuw-vlegting F.

Van die tweede vlegting des agtste paars, komt de regter wederkeerende Zenuw D; maar de linker ^E ^{Weder-} ^{keerende} ^E komt van den tronk, welker laatste, de nederdalende groote Slag-ader, en de eerste de onder-Sleutelbeens Slag-ader omvangende, loopen beyde opwaarts aan de zyde der Longe-pijp, en eenige takjes aan dezelve gevende, verspreyden zig in de Spieren van 't Strotten-hoofd.

By na regt over 't begin der nederdalende groote Slag-ader, gaat een andere groote tak c na 't Hart, die in twee verdeeld zijnde, word de Long-ader omvangen van de kleinste; de groote, de tegen-overige ontmoetende, geven t'samen veele takjes aan de zelfstandigheyt van 't Hart d.

De Hart-zenuw-vlegting F word gemaakt voor 't Hart-ze-
¹ Jugulares. ² Plexus nervosus. ³ Larynx. ⁴ Aspera arteria. ^{naw-vleg-}
M m 2 groot-ting.

grootste deel van de takjes der ¹ tusschen-Ribbige Zenuw; maar 't kleinste deel van den tak des agtste paars c.

De tak e van de Hart-vlegting omvangt de Long-Slag-ader; maar 't grootste deel word verspreyd in des Harts zelfstandigheyt f.

Zenuwen der Longen. De tronk van 't agtste paar nederdalende, geeft op beyde zyden aan de Longen, regt over 't Hart, vele takjes g, die tot aan de takken der ² Longe-pijp, Aderen, en Slag-aderen gekomen zijnde, dezelve verzellen, en hier, en daar omvangen: ook gaan ontrent die plaats eenige takjes h na den Slok-darm.

Zenuwen van den Slok-darm. Daar na word de tronk van 't agtste paar aan de zyden van den ³ Slok-darm, yder verdeeld in twee takken: een inwendigen G, en uytwendigen H. De inwendige takken t samen vereenigende, maken een eenzamen tronk, gelijk ook wat laager de uytwendige, en verspreyden zig met vele takjes in de Maag I.

Zenuwen der Maag. Van de Maag-zenuwen gaan eenige takjes na de ondergelegene Zenuw-vlegtingen; daar volgens Willis, 't agtste paar eyndigt.

De andere tronk, of tusschen-Ribbige Zenuw, zo genaamt, om dat zy aan 't begin der Ribben loopende, uyt elke tusschen-plaats een tak ontfangt van de Rug-mergs Zenuwen.

Boventste Zenuw-knoop. Deze uyt 't Bekkeneel gaande, maakt een ⁴ olyfwyzen Zenuw-knoop i, gelijkende dien van 't agtste paar, uyt welke een groote tak komt, die na de by gelege vlegting gaat, en een kleine, die verspreyd word in de Sluyt-spier van den Slok-darm.

Een andere grotere. Die tronk nederdalende nevens de Wervel-beenderen, heeft in 't midden des Hals een andere Zenuw-knoops-vlegting K, veel grooter als de voorgaande, die veel groote takken ontfangt van de naburige Rug-mergs Zenuwen k; van dezen knoop gaan vele takjes na den Slok-darm, en Longe-pijp l, maar een derzelve, de grootste, vereenigt zig met de wederkeerende Zenuw; van dien knoop gaan twee groote tak-

¹ Nervus intercostalis.

⁴ Corpus olivare.

² Aspera arteria.

³ Oesophagus.

ken na de Hart-vlegting, by welke wat laager een derde komt l.

Van dezen knoop, gaat de tronk, of tusschen-Rib-
bige Zenuw, nederwaarts na 't Sleutel-been, en om-
vangt de onder-Sleutel-been Slag-ader M: in de hol-
ligheyt der Borst gekomen zijnde, maakt hy den Ze-
nuw-knoop N, die drie of vier takken ontfangt van
de naast boven gelegene Rug-mergs Zenuwen, welker
bovensten op den weg de inwendige ' Krop-Slag-ader
m omvangt. Maar de tronk aan de zyden der Wer-
vel-beenderen nederdalende, ontfangt uyt yder Ze-
nuw-knoop $\epsilon\epsilon$ der Rug-mergs Zenuwen, een tak nn,
tot aan 't Heylig-been: ook loopen die Zenuwen aan
den ondersten boord der Ribben na voren, en ver-
spreyden zig in de tusschen-Ribbige Spieren.

Tusschen-
Ribbige
Zenuw-
knoops
vlegting.

De tronk in de holligheyt des Buyks komende,
geeft regt over de Maag, aan elke zyde, een grooten
tak P, die na 't Darm-scheyl gaande, de voornaam-
ste Zenuw-vlegtingen van den Buyk maakt.

Zenuw-
vlegtingen
des Buyks.

De Zenuw-vlegtingen zijn: de Milt-vlegting S, de
Lever-vlegting T, twee Nier-vlegtingen V, de groo-
te Darm-scheyls vlegting U, en onder in 't Bekken
twee kleine XY.

Die vlegtingen worden gemaakt door den tak P of
Darm-scheyls Zenuw, die verdeeld word in twee
groote takken, welker grootste Q boven na de Maag
zig buygende, en aanstonts zig verspreyden, maakt
de vlegting S, uyt welke, gelijk vier bondelkens van
Vezelen, 1 na de Maag, 2 na de Milt, 3 na de Le-
ver-vlegting, 4 na de groote van 't Darm - scheyl
gaan.

In de regter zyde komt de tak, of Darm-scheyls
Zenuw P wat laager van den tronk der tusschen-Rib-
bige Zenuw, en word even, gelijk in de linker zyde,
verdeeld in twee takken, welker bovenste o voor een
groot deel de Lever-vlegting T maakt, uyt welke een
groote bondel Vezelen p na de Lever gaat, die de
Bloed-vaten verzellende, de Slag-ader gelijk met een
net bekleeden, en in de Gal-blaas, Gal-buizen, twaalf-

Gal-blaas
Zenuwen.

1 Arteria carotis.

M m 3

vin-

vingerigen Darm, en regter mond der Maag zig verspreyden: ook gaan eenige takjes zig ombuygende na ¹t Al-vlees; en heeft die vlegting ook gemeenschap met die der Milt, Darm-scheyls, en naast gelege Nier-vlegting.

Nier-Zenuw-vlegting.

De onderste Darm-scheyls tak R, maakt met een, of twee nieuwe takjes van de tusschen-Ribbige Zenuw aan elke zyde, de vlegting V, uyt welke veele takjes W na de Nieren loopen, die de Bloed-vaten, by na gelijk in de Lever verzellende, Net-wys bekleeden; en gaan van die vlegting ook aan elke zyde, eenige takjes na de groote vlegting, en van de regter zyde, na die der Lever, en van de linker na de Milt-vlegting.

Groote Darm-scheyls-vlegting.

De groote Darm-scheyls-vlegting U, is gemaakt uyt takjes van verscheide vlegtingen, die hier t'samen komen, en haar takjes door 't Darm-scheyl verspreyden, en de Bloed-vaten verzellen tot in de Darmen ¹r: ook gaan andere na de groote nederdalende Slagader, en na de Eyer-nesten der Vrouwen.

Vlegting van 't Bekken.

Wat laager als de Nieren, daalt de tusschen-Ribbige Zenuw, aan beyde zyden inwaarts neygende, na ²t Heylig-been, en maakt ontrent deszelfs begin, met eenige takken der Rug-mergs Zenuwen ¹t, de onderste vlegting des Buyks Y, uyt welke de grootste tak, wat opklimmende na een ander by gelegen, de alderkleinste vlegting maakt X.

Uyt yder van die twee vlegtingen, gaat een tak na de groote Darm-scheyls-vlegting U, die op den weg, aan 't begin van den ² Endel-, en aan den ³ Karteldarm eenige takjes v geeft: boven dien gaat van de onderste vlegting, een andere tak langs 't agterste deel van den Endel-darm na den Aars, en geeft op den weg aan dezelve veele takjes u.

De tusschen-Ribbige Zenuw nederdalende, geeft eenige takjes aan de Pis-leyders, en 't overige in kleine takjes verdeeld zynde, word verspreyd in de Sluytspier van den Aars, en naburige deelen.

¹ Pancreas. ² Intestinum rectum. ³ Colon.

HET

HET VI. HOOFDSTUK.

De verdeeling der Zenuwen, die uyt 't Rug-merg voortkomen.

DE meeste Ontleders zeggen, dat 'er dertig paar Zenuwen uyt 't Rug-, of Rug-graat-merg voortkomen: zeven in den Hals 1. 7. twaalf in den Rug 8. XL. Tafel; 19. vyf in de Lenden 20. 24. en zes in 't Heylig-been 4. Figuur. 25. 30. en tellen 't eerste paar des Hals uyt te komen tusschen 't Bekkeneel, en eerste Wervel-been des Hals, en de andere zo vervolgens; maar also dat paar behoort tot 't tiende van 't verlangde Hersen-merg, moeten ze onder die van 't Rug-merg niet getelt worden.

Zo dan 't eerste paar des Hals komt uyt, niet op Zenuwen de zijden door een gat; maar van voren, en van ag- des Hals. teren, tusschen 't eerste, en tweede Wervel-been, om dat op de zyden van d'eerste twee Wervel-beenderen, uyt hun t'samenvoeging, geen gaten ontstaan, gelijk in al de andere waare Wervel-beenderen. De voorste Zenuw loopt in de Huyd van 't aangezigt, en de agterste gaat na de huyd van 't Hoofd, en regte, ook schuynse Spieren.

Van 't tweede, vijfde, zesde, zevende paar des Hals, eerste, en tweede des Rugs, komen de Armezenuwen, welke met de Zenuwen der Dye beschreven zullen worden.

De andere Zenuwen des Hals worden verspreyd in de Spieren van 't Hoofd, Hals, en Schouderblad.

De Zenuwen des Rugs, welker eerste paar uyt-Zenuwen komt tusschen 't eerste en tweede Wervel-been des des Rugs. Rugs, worden verdeeld in een voorsten en agtersten tak.

De voorste loopen aan de onderste boorden der Ribben, behalven eenige der laatste, die wat laager loo-
1 Medulla oblongata.

pen, en worden voor 't meeste deel verspreyd in 't
 1 Ribbe-vlies, tusschen-Ribbigen, en Buyk-spiere, en
 andere, die op de Borst leggen.

Der Len-
 den.

'T eerste paar der Lenden komt uyt, tusschen 't
 eerste en tweede Wervel-been der Lenden, en geeft
 aan elke zyde een tak aan 't onderste deel van 't
 2 Midden-rift g.

Van 't tweede paar h gaan eenige Zenuwen na de
 Teel-deelen.

Dye-Ze-
 nuwen.

Van dat paar, en drie volgende, beginnen de Dye-
 zenuwen, van welke eenige takken na de Lenden, en
 naburige deelen gaan.

Van 't
 Heylig-
 been.

Uyt 't Merg van 't Heylig-been, komen gemeen-
 lijk voort vijf paar Zenuwen, en een eenzaame Ze-
 nuw, van agteren, onder door 't gat in 't midden,
 en dat door vier, en zomtjids vijf gaten aan elke zy-
 de, die van voren na agteren doorgaan, en worden
 verdeeld, eer ze uytkomen, in een voorsten en agter-
 sten tak, die dan door de voorste, en agterste gaten
 uytkomen: als maar vier gaten aan elke zyde in 't
 Heylig-been zijn, komt 't vijfde paar uyt op de zy-
 den, agter onder door 't gat in 't midden: de drie,
 of vier bovenste paren, gaan by na geheel na de Dyen,
 en de andere worden verspreyd in de Spiere des Aars,
 Schaamte, en andere naburige deelen.

Van de
 Armen.

De Zenuwen der Armen komen van 't tweede,
 vijfde, zesde, zevende paar des Hals, en van het
 eerste en tweede des Rugs, en worden niet verre van
 haar begin verscheydelyk vereenigt F, en verdeeld in
 zes takken a b c d e f.

Haar ver-
 deeling.

De eerste Arm-zenuw a, is de kortste, en word
 voornamelyk verspreyd in de Huyd, en 3 drie-hoeki-
 ge Spier.

De andere b geeft een tak aan de 4 twee-hoofdige
 Spier, en vereenigt zig ontrent 't midden des Opper-
 arms met een derden tak, en die weder verlaatende,
 loopt zy buytewaarts, en word in 't vouwen van den
 Arm verdeeld in drie takken: d'eerste loopt langs de

1 Membrana pleura.
 4 Biceps.

2 Diaphragma.

3 Deltoides.

klei-

kleine Onder-arm-pijp na den Duym; de tweede blijft by na in 't midden des Arms; de derde by den tak der Lever-ader leggende, gaat na de Voor-hand, en verspreyd zig in de Hand.

De derde Arm-zenuw c, verspreyd zig in de Spieren des Arms, en is ontrent het midden van den Op-per-arm vereenigt met de tweede Arm-zenuw, en na de Hand gaande, word ze voornamelijk verspreyd in de buytenste zyde.

De vierde d is de alderdikste, en word ontrent den vouw des Arms verdeeld in twee takken, en gaat de eene na de kleine Onder-arm-pijp, de andere na de groote, en ze geven vele takken aan de naast gelegene Spieren, voornamelijk aan de Uytstrekke van den Onder-arm, en Vingeren: ook loopen eenige takken na den Duym, en naast gelegene Vingeren.

De Arm-zenuw e, eenige takjes gevende aan de Spieren van den Arm, word ontrent den vouw van den Arm verdeeld in twee takken; de eene gaat aan de inwendige zyde des Onder-arms, en de andere tusschen de groote en kleine Pijp na de ¹ Voor-hand, en in de Hand by malkander komende, verspreyden ze zig in den middel-, ring-, en kleinen Vinger.

De zesde en laatste Arm-zenuw f, is korter als de vier voorgaande, en word het meeste verspreyd in 't Vet-vlies, en de Huyd.

De Midden-rifts Zenuw, komt met drie takken van drie der Arm-zenuwen; de eerste en grootste komt van 't tweede paar des Hals, en tweede van den Rug. Die drie takken vereenigen tot een tronk E, en on-verdeeld in de holligheyt der Borst langs 't Midden-schot loopende tot 't ² Midden-rift, word ze verdeeld in vier takken, die zig in 't vleezig, en peezig deel verspreyden.

De Dye-zenuwen ontstaan uyt zes, of zeven paar Zenuwen: van drie, de opperste der Lenden, en vier, de opperste, of drie van 't Heylig-been.

De eerste Dye-zenuw i, komt van 't tweede of der-

¹ Carpus. ² Diaphragma.

de paar der Lenden; deze is kort, en verspreyd zig in de Spieren van de Dye.

De tweede k, loopt na de Knye, en verspreyd zig meest in de Huyd, en naburige deelen.

De derde vereenigt zig met drie, of vier, die uyt 't Heylig-been komen tot een tronk I, dat de grootste is van het Lighaam, en na den Voet loopende, geeft ze eenige takjes aan de Huyd, en Spieren van 't Been, en word in 't agterste deel der Dye, ontrent de Knye verdeeld in twee takken, een inwendigen K, en uytwendigen L.

De inwendige langs 't Kuyt-been nederdalende, geeft vele takken aan de Spieren des Voets, en Teenen, en voorby de inwendige Enklauw gekomen zijnde, verspreyd zig in de plank des Voets, en in de groote, en naast gelegene Teenen.

De uytwendige tak loopt in 't buytenste deel van 't Been, en geeft eenige takken aan de naast gelegene Spieren van 't Kuyt-been, en loopt ontrent de buytenste Enklauw, na 't eynde des Voets, en verspreyd zig met vele takjes in de uytwendige zyde.

UYT.



U Y T L E G G I N G

der

F I G U R E N ,

van de

XL. T A F E L.

De 1. Figuur vertoont de verdeeling der zes laatste paren der Hersenen, voornamelijk 't vijfde, zesde, en agtste paar: als ook eenige Rug-mergs Zenuwen.

5. 6. 7. 8. 9. 10. De zes laatste paren der Zenuwen van de Hersenen.

A De bovenste Zenuw-knoops-vlegting van 't agtste paar.

a Takken van die vlegting na 't Strotten-hoofd gaande.

B De tweede Zenuw-knoops-vlegting van 't zelve paar.

C Een groote tak na

de Hart - vlegting gaande.

D De regter wederkeerende Zenuw.

E E De linker.

c Een tak na de Longvaten gaande.

d Zenuwen na de zelfstandigheyt van 't Hart gaande.

F De Hart - zenuw-vlegting.

e Een Zenuw van de Hart - vlegting, de Long-Slag-ader omvangende.

f De Zenuwen van de Hart-zenuw-vlegting in 't Hart gaande.

g Zenuwen na de Long gaande.

h Zenuwen, die na den

den Slok-darm wederkeeren.

G De binnenste Maag-zenuw.

H De buytenste.

I Zenuwen door de vliezen der Maag loopende.

De volgende Letteren vertoonen de takken der tusschen-Ribbige Zenuw.

A Boven: de Zenuw-knoops-vlegting der tusschen-Ribbige Zenuw.

*** L** De tronk der tusschen-Ribbige, en die van 't agtste paar by malkander nederdalende.

K Een andere groote Zenuw-knoops-vlegting van den tusschen-Ribbigen tronk.

k Rug-mergs Zenuwen na die vlegting gaande.

a Het Strotten-hoofd.

C De Rug-mergs Zenuw, die 't agtste paar uyt 't Bekkeneel komende verzeld, en afscheydende loopt na

de Spieren van 't Schouder-blad.

d d Zenuwen van 't zevende paar na de uytwendige deelen gaande.

e e Zenuw-knoops-vlegtingen, die gemaakt worden van de Rug-mergs Zenuwen, komende uyt de Wervel-beenderen des Rugs en Lenden.

g De Zenuwen der Armen.

u Zenuwen na de Spieren des Hals gaande.

u Zenuwen, die van de vlegting **K** na den Slok-darm, en Longe-pijp gaan.

u De groote Slag-ader, vertoont volgens *Willis*.

v De Longe-pijp.

L Twee groote Zenuwen na de Hart-vlegting gaande.

l De derde onderste.

M De Zenuw, die de onderste Sleutel-been Slag-ader omvangt.

N De tusschen-Ribbige

- bigge Zenuw-knoops-
vlegting.
- m Een Zenuw uyt
het Rug-merg des
Hals, die de inwen-
dige Krop-Slag-ader
omvangt.
- n n Takjes van de Rug-
mergs Zenuwen, die
na de tusschen-Rib-
bigge gaan.
- * Opwaarts zijn oor-
spronk.
- P Een Zenuw van den
tusschen - Ribbigen
tronk, de Midden-
riffs Zenuw genaamt.
- Q Zijn groote tak na
de vlegting S gaan-
de.
- R De Zenuw na de
vlegting V gaande.
- S De Milt-zenuw-
vlegting.
- T De Lever-zenuw-
vlegting.
- V De Nier-zenuw-
vlegting.
- U De groote Darm-
scheyls-vlegting.
- W Zenuwen der Nie-
ren.
- X Y Twee kleine vleg-
tingen.
- i. 2. 3. 4. Vier bon-
delkens van Vezelen,
die na de Maag-,
Milt-, Lever-vleg-
ting, en groote Darm-
scheyls-vlegting gaan.
- o Een Zenuw van den
Darm-scheyls tak na
de Lever-vlegting
gaande.
- p Zenuwen der Le-
ver.
- q Zenuwen van 't Al-
vlees.
- r r Zenuwen van de
groote vlegting na de
Darmen gaande.
- f Twee Zenuwen van
de tusschen-Ribbige
Zenuw na de Nier-
vlegting gaande.
- t t Takken van de
Rug-mergs Zenuwen
na de vlegting van 't
Bekken gaande.
- v Een tak uyt de
vlegting van 't Bek-
ken na de groote
vlegting van 't Darm-
scheyl gaande.
- u Zenuwen, die in
den Endel-darm loo-
pen.
- w x y Zenuwen na de
Blaas.

Blaas, Sluyt-spier des Aars, Klieren der Lies, en andere naburige deelen gaande.

De 2. Figuur vertoont de Zenuwen van 't derde paar en eenige andere.

A De Zenuw van 't derde paar na vier Spieren van 't Oog gaande.

B De lijdende Zenuw.

C De Zenuw van 't zefde paar.

D De Zenuw van 't vijfde paar.

E Zijn Oog-tak, die verdeeld word in **F G**.

F Een tak na den inwendigen hoek van 't Oog gaande, die verspreyd word in de Klieren, en Oogschelen.

G Een tak na den uytwendigen hoek van 't Oog gaande.

a b c d Vier takken van 't derde paar na vier Spieren van 't Oog gaande.

e Takjes van 't zelfde paar, na 't Hoorn-, en Druyf-bezie-vlies

gaande.

f Een tak van 't zefde paar na de afkeerende Spier van 't Oog gaande.

g Een takjen na de Katrol-spier gaande.

H De tak van 't vijfde paar, die na 't onderste Kaak-been gaat, afgesneden.

I Een tak van 't zelfde paar na 't Verhemelt gaande.

K De derde tak na 't bovenste Kaak-been gaande.

De 3. Figuur vertoont de verdeeling van 't vijfde, en zefde paar na de bovenste deelen.

A Zenuw van 't zefde paar.

B Tronk van 't vijfde paar.

C D Twee der grootste takken van 't vijfde paar.

a Twee takjes van 't vijfde, en een van 't zefde paar, die zig ombuygen, en vereenigen om 't begin te maken der tusschen-

Rib-

Ribbighe Zenuw.

b Een tak van 't agtste paar na de Oor-klieren gaande.

c De tak na de Vleugel - wyze - uytsteekfels-spiere gaande.

d Een tak na de Knauw-spier gaande.

f g Takken in de Tong gaande.

h Een tak na de ondergelegene deelen der Tong gaande.

i Zenuw, die in 't onderste Kaak-been gaat, van welke af komt

i Een takjen na de onderste Lip gaande.

k Een ander na de Kin gaande.

E Een tak van de groote Zenuw na 't binnenste van den Mond gaande.

F Een tak gaande na de deelen ontrent 't Oog gelegen.

G Een tak na de Oogschelen, en buytenste klier van 't Oog gaande.

H Een tak na 't bo-

venste Kaak-been gaande.

i Een tak van de Zenuw F na de holligheyt van den Neus gaande.

2 Een tak na de Spieren van 't Voorhoofd gaande.

3. 4 Eenige takken na de Oogschelen, en binnenste klieren van 't Oog gaande.

l Een tak uyt H na de Knauw-spier gaande.

m Een tak na de Neus-spiere gaande.

n Takjes na de bovenste Lip gaande.

o Een takjen uyt E na 't Tand-vlees.

p Andere na 't Verhemelt.

q Takjes van 't zesde paar na de afkeerende Spier van 't Oog gaande.

De 4. Figuur vertoont de verdeling der voornaamste Rug- of Ruggraat-mergs Zenuwen.

1. 7. Zeven paar Zenuwen des Hals.

8. 19. Twaalf paar des Rugs.

20. 24. Vijf der Lenden.

25. 30. Vijf paar en half van 't Heyligbeen.

A A Een deel der kleine Herffenen.

B Het verlangde Herffen-merg.

C Het Rug- of Ruggraat-merg, bekleed met het dunne Herffen-vlies.

D De twee andere vliezen aan de zyden omgeslagen.

E De Midden-rifts-zenuw.

F De Zenuwen van den Arm verfcheydelyk vereenigt.

a b c d e f Zes takken

van de Arm-zenuwen.

G Takken van de Zenuwen in de Hand loopende.

g Een Zenuw na 't onderfte deel van 't Midden-rift gaande.

h Een tak na de Teeldeelen gaande.

i k Twee korte Dye-zenuwen.

H De Zenuwen van 't Lende- en Heyligbeens-merg tot een tronk vereenigt, en de Dye-zenuw makende.

I De tronk der Dye-zenuw.

K De inwendige tak der Dye-zenuw.

L De uytwendige tak der Dye-zenuw.

HET VII. HOOFDSTUK.

Van de Nagelen.

IN de Inleyding is gezegt, dat in 't ontleeden van 's Menschen Lighaam, de ¹ Opper-huyd 't eerste deel is, dat doorgesneden word, en gelijk die bestaat uit een zagt, en hard deel, welker laatste de Nage-

² Epidermis,

len

len zijn, zullen we daar mede deze beschryving der Ontleeding eyndigen.

De Nagelen staan aan de eynden der Vingeren en Teenen, en schijnen van dezelve zelfstandigheyt te wezen als de Hoornen; zo dat men eenigzints kan zeggen, dat de Nagelen platte, en doorzigtige Hoornen zijn: van buyten zijn ze bultig, en van binnen uytgehoekt.

De Nagelen komen voort van de Zenuw-tepeltjes der Huyd, welke in 't Net-wyze Lighaam uytpuylen, en met veel Vezelen in de Opperhuyd eyndigen, zo dat ze niet anders schijnen te wezen als een verharde Opperhuyd, bestaande uyt een vergadering van zeer sijne buysjes, die van de Zenuw-tepeltjes beginnen, en t' samen gelijmt worden met een Zout-agtig vogt, welk aangroeyende, ze op malkander in de lengte uytgestrekt leggen, tot aan 't eynde der Vingeren en Teenen.

De Vezelen, waar uyt ze bestaan, zijn zeer zichtbaar in de Nagelen der Vogelen, Leeuwen, Beeren, en scheiden ligt van malkander, als men ze in 't water laat weeken.

De Nagelen zijn dikker aan de eynden, als aan den wortel, om dat de Vezelen, die van de Zenuw-tepeltjes voortkomen, eyndigen, en zig vereenigen aan 't eynde der Vingeren, waarom ze ook zo vast zijn aan de ondergelege Huyd.

De witte plekken, die zomtjds gezien worden aan den wortel van den Nagel, en daar na aan 't eynde, zijn, omdat die plekken geduurig voortgestooten worden door 't aankomende voedsel, dat de buysjes krygen.

Als de Nagel door een toeval afgevallen is, ziet men gemeenlijk dat de nieuwe Nagel te gelijk voortkomt, om dat de buysjes, die van de Zenuw-tepeltjes af komen, en door een Zout-agtig vogt aan malkander gelijmt worden, te gelijk aangroeyen.

De groote pijn, als 'er iet scherps tusschen de Nagelen gesteken word, of als ze door geweld afge-

scheurt worden van de ondergelege Huyd, is, om dat hun begin zagt, en aan de Zenuw-tepeltjes vast is, die eygentlijk 't werktuyg van 't gevoel zijn; zo dat de scheidung der Nagelen niet kan geschieden, zonder ze te quetsen, en groote pijn te veroorzaken.

En gelijk men ziet, als de Zenuw-tepeltjes vernietigt zijn, dat de Huyd haar gevoel verliest, zo kan men ook twifelen als ze vernietigt zijn ter plaats van de Nagelen, of 'er dan nog nieuwe Nagelen groeyen.

De Nagelen groeyen altoos, en daarom moeten ze afgesneden worden, na dat ze de uyt-eynden der Vingeren passeren. Zomtijds groeyen de Nagelen van Handen, en Voeten zo lang, en dik, dat ze veel eer gelijken de Hoornen van een Dier.

De Nagelen bedekken de Zenuw-tepeltjes op die plaats, gelijk de Opperhuyd doet op andere plaatsen, op dat ze niet zouden beschadigt worden, ook tot vastigheyt aan de eynden der Vingeren, als men iet wil opvatten, en tot vermaak in 't krabben, gelijk *Plato* verhaalt van *Sokrates*, dat hy een byzonder genoege had in zig te krabben, als hy het zap van de dolle Kervel zou drinken.

Ik heb dikwils ondervonden dat de Nagel van den grooten Teen door zijn zijden in 't Vlees groeyde, waar uyt groote pijn ontstond, en 't Vlees op de Nagel groeyde, 't welk ik te vergeefs met gebrande Aluyn tragte weg te nemen, zo men niet eerst de Nagel, die in 't Vlees stak, met een sny-mesken, gelijk ik dikwils gedaan heb, voorzigtig af snyd, en 't stukken met een Pincette zagtjes afscheurt, dat zeer pijnlijk is.

Eenige raaden, 't gebrek genezen zijnde, om dat het niet zou weder komen, alle Maand eens den Nagel in 't midden te schrappen met een stukje Glas, tot dat hy dun is, en voor 't gevoel van den Vinger wykt.

Verscheide geloofweerdige Schryvers getuygen, dat Menschen gestorven zijn van quetsing der Nagelen.

Aldus

Aldus is 't gestel van 's Menschen Lighaam beschreven, dat wonderbaar Gebouw, Gods laatste, en schoonste werk, een kleyne Wereld, bestaande uyt vaste, en vloeybare deelen, welker geene groote, en kleine buyzen zijn, waar door deze onophoudelijk omloopen: zo dat als de eerste geheel, en open, en de tweede, warm, dun, en vloeybaar zijn, het leven, en de gezondheid bestaan; maar in tegendeel de ziekte, en de stilstand der vloeybare, de dood te weeg brengen.

BLAD

BLAD - W Y Z E R

Der voornaamste zaaken, die in dit Werk
werden verhandeld.

A.

A Anbeelt, een beentje
van het Oor, 319
A Aangroeyzel wat,
342
— zijn gebruyk, ibid.
Aars hoe veel Spieren heeft,
67, 68
Adams-appel wat is, 213
Ader wat is, 19
— hoe veel voorname A-
deren 'er zijn, ibid.
— haar gebruyk, 10
— hoe veel rokken heeft,
11
Holle Ader, 531
— waarom zo gehe-
ten, 196
Bovenste en onderste holle A-
der, 531
Ongepaarde Ader, ibid.
Tusschen - Ribbige Aderen,
ibid.
Longe-pijps-ader, 532
Midden-schots-ader, ibid.
Onder-Sleutel-beens Aderen,
ibid.
Bovenste tusschen Ribbige A-
deren, ibid.
Mam-aderen, ibid.
Uytwendige Krop-aderen,
ibid.
Krop-ader hoe geopent werd,
ibid.

Onder-buyks Schaam - en
Speen-aderen, 537
Opper-buyks Aderen, ibid.
Dye-aderen, ibid.
Bovenste Heup-aderen, ibid.
Inwendige Spier-ader, ibid.
Knye-ader, ibid.
Kuyt-ader, ibid.
Poort-ader, hoe zig verdeeld,
538
Aderen der Gal-blaas, 539
Maag-ader, ibid.
Twaalf-vingerige Darm-a-
der, ibid.
Inwendige Speen-ader, ibid.
Maag-aderen, ibid.
Kroon-ader der Maag, ibid.
Linker Net-aderen, 540
Maag-aderen, ibid.
Aderen in de Herffenen dun-
der als in andere deelen, 245
Kroon-ader waar van daan
begint, 202
— heeft geen klap-vliezen, ib.
Long-ader wat diensst aan-
brengt, 196
— wat doet, 228
Melk-aderen waar van daan
beginnen, 77
— wat zijn, en van
wien eerst uytegevonden, 82
— waar haar oor-
spronk nemen, 83
— hoe veelerley soort,
ibid.
Melk-

Melk-aderen of in de dikke
 Darmen gevonden worden, ibid.
 ——— waar toe zijn, 84
 Inwendige Krop-aderen, 532
 Hals- of Wervel-aderen, 533
 Bovenste Spier-aderen, ibid.
 Oxel-aderen, 534
 Hoofd-ader, ibid.
 Lever-ader, ibid.
 ——— waarom voorzigtig
 moet geopent werden, 535
 Milt-ader, 534
 Middel-ader, ibid.
 Slag-ader, hoe weten dat
 geopent is, 535
 Onderste holle Ader, 536
 Midden-rifts Ader, ibid.
 Lende-, Nier-, en Zaad-ade-
 ren, ibid.
 Heup-aderen, en hoe ver-
 deelt, ibid.
 Slag-ader, watis, 9
 Longe-pijps-takken Slag-
 ader wat te weeg brengt, 229
 Navel-Slag-aderen, 524
 Onder-buyks Slag-aderen,
ibid.
 Uytwendige Speen-Slag-ade-
 ren, ibid.
 Opper-buyks Slag-aderen,
525
 Schaam-Slag-ader, ibid.
 Dye-Slag-aderen, ibid.
 Uytwendige Dye-spier Slag-
 ader, ibid.
 Inwendige Dye-spier Slag-
 ader, ibid.
 Knye-Slag-aderen, 525
 Slaap-Slag-ader hoe te ope-
 nen, 520

Welke twee de voornaamste
 Slag-aderen zijn, 9
 ——— waarom klopt, ibid.
 ——— gebruik, ib.
 ——— hoe veel en welke
 rokken heeft, 12
 ——— derzelver wonde ge-
 vaarlijker als van een A-
 der, 14
 Groote Slag-ader waar toe,
196
 ——— dezelve beschreven,
518
 Nederdalende groote Slag-a-
 der, 519
 Linker onder-Sleutel-been
 Slag-ader, ibid.
 Rechter onder-Sleutel-been
 Slag-ader, ibid.
 Bovenste tusschen-Ribbige
 Slag-aderen, ibid.
 Midden-rifts Slag-ader, ibid.
 Mam-Slag-ader, 519
 Hals- of Wervel-Slag-ader,
ibid.
 Krop-Slag-aderen, 519, 520
 Uytwendige Krop-Slag-ade-
 ren, ibid.
 Inwendige Krop-Slag-aderen,
ibid.
 Wervel-Slag-aderen, waarom
 zo genaamt, 520, 521
 Oxel-Slag-aderen, ibid.
 Slag-aderen in den Arm, 521,
522
 Longe-pijps Slag-ader, 523
 Tusschen-Ribbige Slag-ade-
 ren, ibid.
 Lende-Slag-aderen, ibid.
 Midden-rifts Slag-aderen, ib.
 Nn 3 Buyk.

Buyk-Slag-ader, 523
 Darm-scheyl-Slag-ader, ibid.
 Nier-Slag-aderen, 524
 Vet en zwarte Gal-doosjes
 Slag-ader, ibid.
 Zaad-Slag-ader, ibid.
 Lende-Slag-aderen, ibid.
 Onderste Darm-Slag-ader, ibid.
 Heup-Slag-ader, ibid.
 Heilige Slag-ader, ibid.
 Slag-ader-spat hoe behandeld
 moet werden, 526
 Slag-ader hoe toegebonden, ibid.
 Long-Slag-ader waarom zo
 genaamt, 196
 — wat is, 228
 Alvlees wat is, en deszelfs
 kouleur, 99
 — zijn gedaante en groo-
 te, ibid.
 — waar van daan Vaten
 en Zenuwen heeft, 99, 100
 — zijn gebruyk, ibid.
 Amandelen waarom zo ge-
 heten, 336
 — hebben een holligheyt, ibid.
 — waar van daan Vaten
 ontfangen, ibid.
 — worden ontstoken en
 raken aan't zweren, ibid.
 — waar toe dienen, ibid.
 Anchylosis wat, 245

B.

B Allen wat en hoe groot
 zijn, 123
 — zonder dezelve kon men
 te Roome niet getuygen, ibid.
 — niet als in de uysterste
 noodzakelijkhéyt weg te
 nemen, ibid.
 — hoe veel rokken, en wel-
 ke hebben, 123, 124, 125,
 126
 — waar van daan haar va-
 ten, 127, 128
 — gebruyk, 129
 Banden wat gebreken onder-
 worpen, 349, 350
 Baring waarom gemakkely-
 ker geschied, 352
 Barst van 't Bekkeneel, hoe
 voor een naad kan geno-
 men werden. 375
 Bastagtige zelfstandigheyt der
 Herffenen, wat is, 248
 Been-breuk in de losse Gele-
 ding, waar van oorzaak,
 347
 Been wat is, 4
 — welk roder is, ibid.
 — hoe gemaakt, ibid.
 — des zelfs merg, ibid.
 — heeft een Been-vlies,
 waar in het gevoelen be-
 staat, ibid.
 — zijn gebruyk, ibid.
 — wort zomtijts zeer zagt,
 en

en door een voorbeeld aan-
getoont, ibid.
Borst-been beschreven, 425
— deszelfs gebruyk, 426
Darm-been beschreven, en
waarom zo geheren, 436
Darm-beenderen, of in zwa-
re baring van malkanderen
scheuren, 438
Dye-been beschreven, 450,
451
— waarom minst de
uytleding onderworpen, 452
— uytgeleed, waarom
niet ligt te herstellen, 486
Heupe-been beschreven, 437
Plat-beentjen welk, 381
Kaak-beenderen beschreven,
384
— waar toe dienen,
390
Kaak-been, onderste, alleen
beweeglijk, 278
— hoe veel Spieren
tot beweging heeft, ibid.
— opperste welk, 383
— bestaat uyt negen
Beenderen, ibid.
— opperste hoe t' sa-
men gevoegt, 385
— heeft een groote
holligheyt,
— onderste, beschre-
ven, 388
— in Kinderen in twee
gescheyden, ibid.
Kraak-been wat is, 6
— waar meest gevon-
den, ibid.

— zijn gebruyk, ibid.
Kraak-beenderen van het
Strotten-hoofd hoe bewo-
gen, 217
Opper-hoofds-beenderen
waarom zo geheren, 366
— derzelver gedaan-
te, ibid.
— hoe t'samen ge-
voegt, ibid.
— waarom uytgeholt,
367
— waarom hun won-
den gevaarlijk, ibid.
Achter-hoofds-been welk,
368
— in jonge Kinderen
bestaat het uyt vier Been-
deren, die met den tijd een
werden, ibid.
— deszelfs gedaante en
t'samenvoeging, ibid.
— heeft vier aanmerke-
lijke holligheden, 369
Heilig-been waarom in de
Vrouwen korter en regter,
470
— waar uit t'samen
gestelt, 421
— in Kinderen uyt ver-
scheyde Beenderen bestaan-
de, ibid.
— in Bejaarde maakt het
een Been, ibid.
— waarom zo genoemd,
ibid.
— zijn gedaante, ibid.
— hoe veel holligheden
heeft, 422
— hoe veel uytsteekfels en
N n 4 gaten

gaten het heeft, 423
 — zijn gebruyk, ibid.
 — deszelfs breuk gevaar-
 lijk, 424
 Elle-been waarom zo ge-
 naamt, 441
 — beschreven, 442, 444
 — hoe t'famen gevoegt,
 ibid.
 Opper-arm-been hoedanig,
 439, 440
 — op wat wyze uyt-
 geleed wert, 440
 — hoedanig deszelfs
 bovenste deel is, ibid.
 — hoe gebroken zyn-
 de, moet behandelt wer-
 den, 441
 — hoe t'famen ge-
 voegt, 442
 Onder-arms-beenderen hoe
 veele, en welke, 441
 Kuyt-been beschreven, 456
 Naamlooze Beenderen hoe
 veel, en hoedanig, 435
 — bestaan in Kinderen
 uyt drie Beenderen, en heb-
 ben drie namen, ibid.
 — holligheyt van die
 Beenderen by een *Azynnate*
 vergeleken, ibid.
 Neus-beenderen welke, en hoe
 zijn t'famen gevoegt,
 383
 Tong-been hoe, en waarom
 in het Grieks zo geheten,
 327
 — in Kinderen, en Bejaar-
 den uyt hoe veele Beentjes
 bestaat, ibid.

— waar legt, 328
 — door hoe veel Spieren
 bewogen, ibid.
 — welke die Spieren zijn,
 en hoe geheten, 328,
 329
 Schaam-been beschreven,
 437
 Scheen-been beschreven, 454
 — uytleding onvolkomen
 onderworpen, 456
 Spongieuze Beenderkens heb-
 ben verscheide cellekens,
 307
 Spongiagtige Beenderkens
 welke, 380
 — zijn zeer dun, ibid.
 Slaap-beenderen waar leggen,
 372
 — 't onderste deel dier
 Beenderen, waarom Staart-
 been genaamt, ibid.
 — hoe veel uytsteekfels
 hebben, 373
 Sleutel-beenderen waarom zo
 genaamt, 433
 — hoe lang, ibid.
 — waarom in de Vrou-
 wen zo krom niet als in
 de Mannen, ibid.
 — hoe t'famen gevoegt,
 434
 — hun gebruyk, ibid.
 — waarom gebroken, en
 herstelt zijnde, niet in hun
 plaats blyven, ibid.
 Voorhoofds-been heeft twee
 holligheden, 347
 — hoedanig, 360
 — in Kinderen in twee ge-
 schey-

ſcheyden, ibid.
 — waar in het zelve iemand
 ligtelijk kan doodgeſto-
 ken werden, 361
 Voorhoofts-been hoe t'ſamen
 gevoegt, ibid.
 — heeft aan zijn onder-
 ſte deel vier uytſteekfels,
 ibid.
 — ook heeft het drie
 gaten, en waar die zijn,
 362
 — ook ziet men twee
 holligheden in het zelve,
 ibid.
 — waarom is uytgeholt,
 ibid.
 Schouder-bladen beſchreven,
 432
 — hoe veel uytſteekfels
 hebben, ibid.
 Schiltwyze Kraak-been hoe-
 danig, 213
 Spleet-makende Kraak-been-
 deren waar leggen, en wat
 maken, 214
 Sleutel-beenderen waarom in
 de Vrouwen minder ge-
 kromt, 470
 Staart-been beſchreven, 424
 — hoe gebroken of uyt-
 geleed zijnde, herſtelt word,
 ibid.
 Steen-been, een deel van 't
 Slaap-been, wat hollighe-
 den heeft, 316
 Wervel-beenderen uyt hoe
 veel deelen beſtaan, 410
 — hoedanig die deelen
 zijn, ibid.

— wat gaten hebben,
 ibid.
 — waarom ware en
 onware, 411
 — hoe t'ſamen ge-
 voegt, ibid.
 Eerſte Wervel-been, waarom
Atlas genaamt, 415, 516
 — hoedanig is, ibid.
 Tweede Wervel-been waar-
 om *Epistropheus* geheten,
 ibid.
 Wervel-beenderen des Hals
 minder, en vaſter van maak-
 ſel als van den Rug, 417
 — des Rugs hoe veel,
 418
 — der Lendenen hoe
 veel, 418
 Wigge-been heeft twee groo-
 re holligheden, 307
 — waarom zo geheten,
 376
 — in Kinderen beſtaat het
 uyt vier Beenderen, 377
 — met wat Beenderen het
 is t'ſamen gevoegt, ibid.
 — hoe veel uytſteekfels
 heeft, ibid.
 — uyt hoe veel tafels be-
 ſtaat, 378
 Ringwyze Kraak-been waar-
 om zo geheten, 214
 Wang-beenderen waarom zo
 geheten, 383
 — hoedanig zijn,
 384
 Zaad-beentjes waarom zo ge-
 heten, 469
 — hoedanig in oude en
 Nn 5 jonge

jonge Menschen, 469
 — waar ze gevonden werden, ibid.
 — hun getal, ibid.
 — waar toe zijn, 470
 Zeef-been waarom zo genaamt, 380
 — waar legt, ibid.
 — bestaat uyt verscheyde deelen, ibid.
 Beenderen waar zonder eenig middel t' samen gevoegt, 349
 — van oude Menschen waarom ligt breken, 355
 — of uyt 't Merg gevoed worden, 356
 — worden uyt 't Bloed gevoed, 357
 — van 't Bekkeneel, die het eigene zijn, hoe veel, 360
 — t' samen gevoegt door onderlinge ontfanging waarom zo ligt niet uytleden, 445
 Bekken wat is, 116
 — welke plaats is, 438
 Bekkeneel wat gedaante heeft, 358
 — uyt hoe veel Beenderen bestaat, 359
 — deszelfs Beenderen hebben twee tafels, ibid.
 — waarom van Been, 409
 Billen in de Herffenen wat zijn, 259
 Ballen in de Herffenen wat zijn, ibid.

Bint-vlies waarom zo genaamt, 290
 Blaas wat is, en waar legt, 118
 — hoe verdeeld, ibid.
 — hoe veel vliezen heeft, ibid.
 — aan wat deelen vast, 119
 — hoe veel openingen heeft, 120
 — hoe de Pis in die opgehouden, ibid.
 — haar gebruyk, 121
 — waar van daan vaten krijgt, 122
 Blinde Darm waarom dien naam draagt, 65
 Bloet waarom trager in de Aderen als Slag-aderen loopt, 12, 13
 — meer vloeit 'er door de Slag-aderen, ibid.
 — waarom gekent dat het uyt een Slag-ader voortkomt, ibid.
 — waarom door de Longen loopt, 204
 — in het wateragtig vogt van het Oog hoe weggenomen, 297
 Borst hoe bepaalt, 180
 — hoe het voorste deel van die, en hoe het agterste geheten, ibid.
 — haar holligheyt hoedanig, ibid.
 — haar deelen, 181
 Borst- of Chyl-buys waar vast en hoe loopt, 89

Borst

Borst-klier hoe verdeeld, *ibid.*
 — der zelve inplanting, *ibid.*
 — gewond, dodelyk, 87
 — in een Mensch gezien, 88
 — haar gebruyk, 91
 — klier wat is, 192
 — haar vaten, *ibid.*
 — in jonge Kinderen zeer zagt, *ibid.*
 — hoe verdeelt, *ibid.*
 — derzelve gebruyk, *ibid.*
 Borst waarom in de Vrouwen plat, 470
 Breuk welke volkomen en onvolkomen, 5
 — waar ontstaan kan, 52
 Buysks voorste deel waarom zagt en zonder Beenderen, 32

Bult hoe ontstaat, 414

C.

CAtaractie wat is, 294
 Cellekens-wyze rok onder de huyt der Roede wat is, 139
 Cellen hoe in den Karteldarm worden gemaakt, 66
 Chyl-wegen hoe te vinden, 86
 Chyl-zakje met de buys van wien ontdekt, 84
 — waar uyt bestaat, en hoe groot, *ibid.*
 — zijn gebruyk, 91

D.

DIeren, welke Sleutel-beenen hebben, 434
 Doolhof uyt hoe veel kanalen bestaat, 324
 Dood uyt zwelling en verharding der Klieren van den Slok-darm, 233
 Druyf-bezie-vlies waarom zo genoemd, 291
 — kan in twee vliezen werden verdeeld, *ibid.*
 Duym heeft iets byzonders, 448
 — waarom noodzakelyk, *ibid.*

E.

EYer-nesten der Vrouwen waar leggen, 158
 — hoe aan de Lyfmoeder vast, *ibid.*
 — haar gedaante, grootte en zelfstandigheyt, 159
 Eyeren der Vrouwen hoedanig zijn, *ibid.*
 — hoe vrugtbaar werden, 160
 Endel-darm waar begint, en eyndigt, 67
 — waar in de Mannen, waar in de Vrouwen vast is, *ibid.*
 Etter-borst waar uyt ontstaat, 110
 — hoe geschied, 230
 Etter-dragten waar gestelt, 495
 Etter-

Erter of in de Pens-zak of
holligheyt des Buyks is,
hoe te onderscheyden. 52
Exostosis wat is, 344

F.

Fontein op het Hoofd, wel-
ke plaats in nieuw-gebo-
re Kinderen, 367

G.

Gal waar afgescheyden, 109

Gal-blaas wat is, 106

— gedaante en vast-heg-
ting, ibid.

— hoe veel takken heeft,
106, 107

— heeft een slymige korst
tegen de scherphelyt van de
Gal, ibid.

— waar van daan vaten
heeft, ibid.

— hoe veelerley Gal-buy-
zen heeft, 107, 108

Gal-doosjes waarom zo gehe-
ten, 117

— hun plaats, gedaan-
te en groote, ibid.

— hun Vaten en Ze-
nuwen, 117

— gebruyk, 118

Gehoor-weg hoe gemaakt,
314

— hoedanig is, en hoe
gaat, 315

— gesloten door een
vlies, hoe geopent word,
ibid.

Geleding wat is, 346

— hoe veelerley, 347

----- losse wat is, en
driederley, ibid.

----- vaste, driederley,
348

Geraamte hoe verdeeld, 358

Gestaltenis der Beenen hoe
veelerley, 342 & seq.

Gestreepte Lichamen welke
zijn, 249, 258

Glas-agtig vogt waarom zo
geheten, en wat ruymte
van het Oog vervult, 295

Glazen tafel des Bekkeneels
waarom zo geheten, ibid.

H.

HAmer hoe veel deelen
heeft, 318

— en Aanbeelt ontfangen
malkander, 319

Hairen waar toe dienen, 241

Hair-vlegt wat is, 241

Hand hoe verdeeld. 446

Voor-hand hoe veel beentjes
heeft, ibid.

— en hoedanig die
beentjes zijn, ibid.

Na-hand hoe veel beentjes
heeft, 447

— en hoedanig die
beentjes zijn, ibid.

Hanen-hoofst wat is, 131

Harde

Harde Herffen-vlies wat is, 242
 ————— derzelver hegting, en over al dubbeld, 243
 ————— fcheyt de groote Herffenen van agteren van de kleine, ibid.
 ————— tuffchen haar verdubbeling zijn vier groote Aderen, ibid.
 ————— welke eygene vaten heeft, 245
 ————— haar gebruyk, 246
 Harte-zakjen wat is, 193
 ————— uyt wat vliezen beftaat, ibid.
 ————— zijn gedaante, ibid.
 ————— op wat wyze aan de deelen vatt, ibid.
 ————— waar van daan vatten heeft, ibid.
 ————— wat dienft het aan 't Hart doet, 194
 Hart hoedanig, en waar in den Mensch legt, ibid.
 ---- zijn gedaante, vlies, en hegting, 195
 ---- hoeveel holligheden heeft, ibid.
 ---- dezelve hoe van een gefcheyden, ibid.
 ---- heeft Oren, en waar toe, 196
 ---- heeft verfcheyde klapvliezen, 196, 197
 ---- waarom in zijn regter holligheyt zekere vliezige deelen heeft, 200
 ---- deszelfs zelfftandigheyt, ibid.

---- hoe veelerley Slangrings-wyze vezelen heeft, 200
 ---- deszelfs Oren hoe gemaakt, 201, 202
 ---- heeft zijn eygene Bloedvaten, 202
 ---- zijn gebruyk, 203
 ---- waar van daan Zenuwen ontfangt, ibid.
 ---- waarom deszelfs linker holligheyt dikker van vlees, 204
 Hart-pijn waarom zo geheten, 62
 Hazemont wat voor een gebrek, en waar komt, 277
 Heefcheyt in 't fpreken waar van daan, 337
 Helder-fcheytsel waarom zo geheten, 249
 Herffenen waarom in den Mensch zeer groot, 247
 ————— haar gedaante en zelfftandigheyt, ibid.
 ————— haar holligheden hoedanig zijn, en hoe te vinden, 248
 ————— welker Slag-aderen zijn, 253
 ————— haar gebruyk, 265, 266
 Verlangde Herffen-merg wat is, 250
 ————— waar van daan zijn oorsprong neemt, ibid.
 Hoek-naat hoe loopt, en welke Beenderen 't famenvoegt, 351
 Holligheden waar toe in den Neus,

Neus, 298
 Holligheyt, vijfde, zesde,
 en zevende in het Oor,
 welke, 325, 326
 Hoofd wat voor gedaante
 heeft, 239
 — hoe verdeelt, ibid.
 — deszelfs houdene en ge-
 houdene deelen, 240
 — uyt welke Beenderen be-
 staat, 358
 Hoofd-pijn waar van daan,
 352
 Hoofd van 't Dye-been waar-
 om ligtelijk afscheyd, 452
 Hoorn-vlies hoedanig is, 290
 Huys als een Slek-huys te Sy-
 rakuse waarom van Denys,
 den Tyran, gemaakt, 324
 Huyt wat is, en waar uyt
 bestaat, 33
 — hoe veelerley zweet-gaat-
 jes heeft, ibid.
 — haar gebruyk, 34

K.

K Anker wat is, 183
 Kameron der Gezigt-ze-
 nuwen waarom zo geheten,
 259
 Kartel-darm hoe loopt, 66
 — heeft zeer veel cellen,
 en waar toe die, ibid.
 Keel-gat waar toe dient, 235
 — hoe veel Spieren heeft,
 ibid.
 Keyzerlyke snede hoe ge-
 schiet, 35
 Kinderen waarom zonder

Tanden ter werelt komen,
 390
 Kittelaar wat is, 169
 — derzelver Beenen,
 Voorhuyt, en andere Va-
 ten, 170
 Klap-vliezen waarom aan de
 monden der Aderen en
 Slag-aderen in het Hart,
 196
 — hoe gespannen en
 los gelaten werden, 197
 Klap-vlies tusschen de dunne
 en dikke Darmen waar toe,
 74
 Kleine Herffenen wat zijn,
 260
 — haar zelfstandigheyt,
 ibid.
 — hoe aan het ver-
 langde Herffen-merg vast
 gemaakt, 261
 — haar gebruyk, 266
 Kleine pijp van den Onder-
 arm hoe legt, 443
 — hoedanig is, ibid.
 — derzelve onderste
 eynde hoe zig beweegt, 444
 — hoe gebroken aan
 het onderste eynde behan-
 delt moet werden, 445
 Klier wat is, en hoe ver-
 deeld, 20
 — hoe veel vaten heeft, ibid.
 — haar gebruyk, 21
 Klieren omtrent de spleet van
 't Strotten-hoofd waar toe
 dienen, 216
 Knie-schijf hoedanig, 457
 458
 Knie-

Knie-schijf waar toe dient, 458
 Koorde-danffers waarom het
 Lighaam zo ligt kunnen
 buygen, 420
 Korte vat waarom zo ge-
 noemt, en wat voor ge-
 bruik heeft, 61
 Kroon-naat waarom zo ge-
 heten, hoe loopt, en wel-
 ke Beenderen t'samen ver-
 enigt, 350
 Kroon-vaten in het Hart
 waarom zo genaamt, 202
 Krop-gezwellen waar van
 daan, 217
 Kristallyne vogt hoedanig is, 294

L.

L Elleken wat is, 335
 — door hoe veel Spie-
 ren bewogen, ibid.
 — heeft twee banden, ibid.
 — kan verlengen, ver-
 flappen, zwellen, en ont-
 stoken werden, 336
 — hoe dat quaat te ge-
 nezen, ibid.
 — waar toe dient, ibid.
 Lever wat is, plaats en ge-
 daante, 103
 ---- hoedanig, en hoe groot, 104
 ---- op wat wijs vast gehegt, ibid.
 ---- volgt in de in-ademing
 het Midden-rift, 105

---- haar zelfstandigheyt en
 vaten, 105, 106, 108
 ---- haar gebruyk, 109
 ---- gequetst, wat tekenen
 en gevolgen, 110
 Lijf-moeder wat is, 152
 — haar plaats en ge-
 daante, ibid.
 — groote, holligheyt,
 en inwendige mont, 153
 — kan wonderbaar
 werden uytgerekt, ibid.
 — hoe veel vliezen
 heeft, 153, 154
 — hoe verknoght, ibid.
 — hoe veel banden
 heeft, ibid.
 — hoe de banden ne-
 derdalen, en waar toe die-
 nen, 155
 — waar toe is, ibid.
 — een wonderlijk ge-
 val overgekomen, 157
 — waar van daan Va-
 ten en Zenuwen heeft, 166,
 167
 Lippen wat Spieren hebben, 275, 276
 Lip-knopen verzuymt ver-
 oorzaken Kankers, 280, 281
 — hoe te genezen, 281
 Long wat is, 221
 ---- hoe vast gehegt en ver-
 deeld, ibid.
 ---- haar gedaante en zelf-
 standigheyt, 222
 ---- hoe veel vliezen heeft, 226
 ---- groeyt aan zommige de-
 len vast, 227
 Longe-

Longe-pijp wat is, 213
 — hoe verdeelt, ibid.
 — haar hoofd bestaat
 uyt vijf Kraak-beenderen,
 ibid.
 — derzelver tronk be-
 staande uyt Kraak-beende-
 ren, 219
 — van welke vliezen
 bekleet, 220
 — waar geopent moet
 werden, 221
 Lugt-gezwel in de Longe-pijp
 hoedanig, 220

M.

M Aag wat is, 57
 — heeft twee openin-
 gen, 58
 — hoe ruym, ibid.
 — hoe veel takken, en wel-
 ke heeft, 59, 60
 — heeft vouwen, en waar
 die uyt voortkomen, en tot
 welk gebruyk die zijn, 60,
 61
 — wat voor Vaten en Ze-
 nuwen heeft, en waar van
 daan die spruyten, ibid.
 — haar gebruyk, 62
 — gequetst, wat toevallen
 'er zijn, 63
 Mammen wat zijn, 181
 — waar uyt bestaan,
 182
 — haar vaten, ibid.
 — waarom op die veel

vet legt, 183
 Mank-gaan waar uyt ont-
 staat, 439
 Melk-buysjes waar toe, 183
 — hoe loopen, ibid.
 Merg der Beenderen waar uyt
 t'samen gestelt, 353
 — het heeft gevoelen,
 ibid.
 — waar gevonden,
 354
 — deszelfs gebruyk,
 354, 355
 — of met de Maan-
 wassing vermeerdert, 355
 Merg-agtige zelfstandigheyt
 der Hersenen wat is, 248
 Midden-rift hoe legt, 184
 — gedaante, en hoe
 veel Spieren heeft, 185
 — waar van daan Va-
 ten krijgt, 186
 — haar beweging twe-
 derley, 187
 — gequetst zijnde, wat
 tekenen en gevolg, ibid.
 Midden-schot wat is, 191
 — zijn vaten, ibid.
 — verdeeld de Borst in
 twee holligheden, ibid.
 — tusschen zijn ver-
 dubbeling kan een ontste-
 king komen, ibid.
 Milt wat is, 101
 — gedaante, groote, en
 vasthegting, ibid.
 — hoe veel vliezen heeft,
 ibid.
 — haar inwendige gestalte
 bestaat uyt veele vliezige
 blaas-

blaaskens, 102
Milt, waar van daan Vaten
en Zenuwen heeft, ibid.
— derzelver gebruyk, ibid.
— kan in de Honden uyt-
gesneden werden, 103
— gequetst, wat tekenen
en gevolgen, ibid.

N.

NAamloze vlies waarom
zo geheten, 290
Naat wat is, 348
— hoe verdeeld, 350
— ware wat is, ibid.
— valsche welke, 351
Naden wat gebruyk hebben,
352
Op de Naden waarom niet te
trepaneren, 353
Nagelen waar staan, 561
— waar uyt voortkomen,
ibid.
— waarom dikker aan de
einden, als aan den wor-
tel, ibid.
Navel wat is, 35
— wat voor gezwel on-
derworpen, ibid.
— hoe veel en welke breu-
ken kan hebben, ibid. 36
Net wat is, en waarom zo
geheten, 54
— hoe veel vliezen heeft,
55
— waarom in de Navel-
breuken met de Darmen
uytkomt, ibid.
— waar van daan Aderen en

Slag-aderen heeft, ibid.
— deszelfs gebruyk, ibid.
Net-wyze vlegting waar uyt
bestaat, en hoe zig ver-
deeld, 258
— vlies hoedanig is,
293
Neus hoe verdeeld, 297
— wat deel is, ibid.
— in twee holligheden ge-
scheyden, 298
— waarom dun en zonder
vet, 303
— deszelfs bovenste deel
heeft verscheyde Beenderen,
en is onbewegelijk, ibid.
— deszelfs onderste deel is
Kraak-been-agtig, en be-
weegbaar, ibid.
— welke Spieren heeft,
304
— hoe veel Kraak-beende-
ren ontfangt, ibid.
— waar van daan Vaten
krijgt, 305
Nieren wat zijn, en waar
leggen, 113
— haar groote en ge-
daante, ibid.
— hoedanig in nieuw-
gebore Kinderen, ibid.
— hoe veel Vliezen heb-
ben, 114
— haar hegting en zelf-
standigheyt, ibid.
— haar Vaten, Uyt-
melkende geheten, waar
van daan, ibid.
— Zenuwen, waar haar
oorspronk, 115
O.

Nie:

Nieren haar gebruyk, 116
 — gequetst, wat tekenen
 geven, ibid.
 Nugtere Darm waarom dien
 naam heeft, 64
 — waar legt, ibid.
 Nymfen wat zijn, 171
 — haar dienst, ibid.

O.

O Gen waar leggen, 282
 — hoe verdeeld wer-
 den, ibid.
 — hoe veel Spieren hebben,
 287. & seq.
 — en welke haar namen
 zijn, ibid.
 — hoe veel Vliezen heb-
 ben, 289
 — hoe veel Vogten heb-
 ben, 293. & seq.
 — waar van daan Vaten
 hebben, 295
 — hoe veel Zenuwen heb-
 ben, 296
 — Vezelen waar toe
 strekken, ibid.
 — Vogten waar toe die-
 nen, ibid.
 Oog-appel waar toe, 292
 — agter denzelven
 komt een Vlies, ibid.
 Oog-hol wat is, 282
 Oog-klieren waar toe, 286
 Oog-schelen hoe veel, 282
 — waar uyt bestaan,
 283
 — aan haar boorden
 is een boog-wys Kraak-

beentje, ibid.
 — hoe veel Spieren
 hebben, ibid.
 — waar toe dienen,
 284
 — aan een gegroeyt
 hoe te helpen, ibid.
 — hebben kliertjes
 waar toe, 286
 Omgewonde Darm waarom
 zo geheten, 64
 — waar legt, ibid.
 Omloop van de vogten van
 het Oog of geschiedt,
 295
 Onderste Ledematen wat zijn,
 450
 — hoe worden ver-
 deeld, ibid.
 Oor-klieren hoe veel, 281
 — hebben een aanmer-
 kelijk uytlozend vat, ibid.
 — waar van daan Va-
 ten hebben, 281, 282
 Oor hoe verdeeld, 314
 — zijn bovenste en onderste
 deel, en andere, hoe ge-
 naamt, ibid.
 — uytwendig hoe t'samen
 gestelt, ibid.
 — hoe veel holligheden
 heeft, 316
 — is ontstekingen onder-
 worpen, die van een quaat
 gevolg kunnen zijn, 322
 — waar van daan Vaten
 heeft, 326
 — uytwendig waar toe,
 ibid.
 Opper-huyd wat is, 32
 Op-

Oppervlucht haar gebruyk, 32
 Opper-klootjes wat zijn, en
 hoe gemaakt, 129
 — Vaten waar van
 daan, 130
 Oude Menschen waarom ster-
 ven, 355
 Ovale gat wat is, 204

P.

P Anne-vlies wat is, 241
 — derzelver gebruyk,
 ibid.
 — gequetst, waarom 't
 harde Herffen-vlies ont-
 steekt, ibid.
 — met de Pees van de
 Voor- en Agter-hoofte
 Spieren geplettert, veroor-
 zaakt zware toevallen, 242
 — waarom in een Tre-
 paan zo verre moet afge-
 sneden werden als de boven
 delen, ibid.
 Pees wat is, 21
 Pees-knoop wat is, 499
 — hoe best te genezen,
 ibid.
 Pens-zak wat gedaante heeft,
 46
 — hoe vast gehegt, ibid.
 — deszelfs doorboring,
 50
 — is dubbeld, ibid.
 — welke uytsteekfels
 heeft, ibid.
 — waar van Vaten en
 Zenuwen heeft, 52
 — deszelfs gebruyk, ib.

Pijl-naat waarom zo ge-
 naamt, en welke Beende-
 ren t'samen voegt, 351
 Pis-leyders wat zijn, 115
 — hoe veel, ibid.
 — Vaten waar van daan,
 116
 — gewont, wat tekenen,
 117
 Pis-schagt, wat is, 121
 — verschilt in lengte
 van de Vrouwen, ibid.
 — waar van daan Va-
 ten ontfangt, 122
 Pluymen op 't Oor-gat ge-
 legt hoe door de Lugt weg
 gedreven, 322

R.

R Egenboog wat is, 291
 — legt onbelem-
 mert in 't wateragtige vogt,
 292
 Reuks werktuyg welk, 303
 Reuk-zenuwen waar van ko-
 men, 305
 Ribbe-vlies welke delen be-
 kleet, 187
 — is dubbeld, ibid.
 — heeft eenige zigt-
 bare gaten, 188
 — waar van daan Va-
 ten ontfangt, ibid.
 — waarom de inwen-
 dige oppervlakte van de
 Borst effen maakt, ibid.
 — ontstoken wat naam
 heeft, ibid.
 — etter in het zelve
 Oo 2 knaagt

kraagt zomtjids de tuf-
fchen - Ribbige Spieren
door, 188
Ribben hoe veel, 427
— beschreven, 428, 429
— haar gebruyk, 430
— hoe op een gebroke
Ribbe een Lugt-gezwel en
Etter-borst volgt, 431
Ring-wyze agterfte spleet-
makende Kraak-beens Spie-
ren, waar van daan ko-
men, 218
— openen de spleet,
ibid.
Ring-wyze boven spleet-
makende Kraak-beens Spie-
ren, waar van oorsprong
nemen, ibid.
— fluyten de spleet,
ibid.
Ring-wyze spleet-makende
zydelijke Kraak-beens Spie-
ren, waar van haar oorsprong
hebben, ibid.
— verwyden de spleet,
ibid.
Ring-Schilt-wyze voorfte
Kraak-beens Spieren, waar
van herkomstig, ibid.
— trekken het Schilt-
wyze Kraak-been agter-
waarts, ibid.
Roede wat is, 136
— delen en middenfchot,
ibid. 137
— derzelver hoofd zeer ge-
voelig, 140
— hoe bedekt, 141
— aan het zelve gefchiet

de Befnijdenis, ibid.
— waar van daan Vaten
heeft, 143
— heeft groote Zenuwen,
en waar van daan die ko-
men, 146
— hoe veel Spieren heeft,
146, 147
— heeft aan zijn bovenfte
deel een bant, en waar toe,
ibid.
Rook van Tabak hoe door't
Oor-gat kan uytvliegen,
322
Rug-graat hoe genaamt, 409
— in vier delen verdeelt,
ibid.
— hoe op zyde bewo-
gen kan worden, 412
— haar gedaante, 413
Rug-merg wat is, 267
— waar derzelver klie-
rige zelfftandigheyt legt,
ibid.
— welke Vliezen heeft,
268
— waar van daan Vaten
heeft, ibid.
— zijn gebruyk, 269

S.

Schede der Lijf-moeder
wat is, 162
— haar plaats en gedaante,
ibid.
— lengte en zelfftandig-
heyt, 163
— heeft vele rimpelen, ib.
— heeft vier vleezige ver-
he-

- heventheden, tekens van
de Maagdom, 164, 165
Schelp van het Oor hoe ge-
maakt, 314
— wat is, en waarom zo
genaamt, 323
— hoe veel openingen
heeft, ibid.
Schenkels van 't verlangde
Herssen-merg wat zijn,
259
Schouder-bladeren hoe t'fa-
men-gevoegt, 433
— hoe de Geleding
maken, ibid.
Schub-naat waarom zo gehe-
ren, hoe loopt, en welke
Beenderen t'famen voegt,
351, 352
Sinus hoe veel, en welke zijn,
243, 244
Slek-huys waarom zo gehe-
ren, en beschreven, 323
Slok-darm wat is, en waar
legt, 233
— hoe ruym, en welke
klieren heeft, ibid.
— uyt hoe veel en wel-
ke rokken bestaat, ibid.
234
— begin hoe genoemd,
235
— waar toe diend, 236
Snij-tanden waarom zo ge-
naamt, 395
Snot-vlies verflapt, wat onge-
mak baart, 306
Spier wat is, en hoe veel de-
len heeft, 21, 22
— hoe veelerley is, 23
— kragt van waar, 24
— waar door t'famen ge-
trokken, ibid.
— waar toe diend, 25
— verflapping en verlen-
ging waar in bestaat, ibid.
— hoe ophoud te werken,
27
— hoe veel haar beweging
is, ibid. 28
Sluit-spier aan den Aars waar
toe, 68
Slaap-spier waarom zo gehe-
ren, 278
Knauw-spier wat doet, 279
Onder-huydige Spier hoe 't
Kaak-been beweegt, 279
Twee-huykige Spier beweegt
het Kaak-been neerwaarts,
279
Vleugel inwendige en uyt-
wendige Spier waar zig in
het Kaak-been inplant,
280
Drie-hoekige Spier beschre-
ven, 476
Opper-graat-spier wat is,
ibid.
Groote ronde Spier welke,
ibid.
Aars - krouwer hoedanige
Spier, 477
Borst-spier beschreven, ibid.
Ravenbeks-spier welke, ibid.
Onder-graat-spier hoedanig,
ibid.
Kleine ronde Spier beschre-
ven, 478
Onder-Schouder-blads Spier
welke, ibid.
O o 3 Spier

Spier van Gedult waarom zo geheten en welke, 479	Drie-hoofdige Spier, 485
Monik - kaps - wyze Spier	Peerwyze Spier, ibid.
waarom zo geheten, en welke, ibid.	Vierkante Spier, ibid.
Tarbot-wyze Spier welke, ibid.	Inwendige Stop-spier, ibid.
Zaag-spier hoedanig, 480	Uytwendige Stop-spier, ibid.
Spalk-wyze Spier hoedanig, 480	Kleine Bil-spier hoedanig, 488
t' Samen-gevlogte Spier be- schreven, ibid.	Onder-Sleutelbeens Spier, 489
Groote regte Spier welke, 481	Agterste bovenste Zaag-spier, 490
Kleine regte hoedanig, ibid.	Groote Zaag-spier, ibid.
Grote schuynse Spier beschre- ven, ibid.	Heilig-lende-spier, 491
Kleine schuynse Spier welke, ibid.	Agterste onderste Zaag-spier, ibid.
Ongelykzydige Spier welke, 482	Drie-hoekige Spier, ibid.
Lange Spier des Hals hoeda- nig, ibid.	Twee-hoofdige Spier, 494
Graat-spier beschreven, ibid.	Inwendige Arm-spier, 495
Dwerfse Spier des Hals hoe- danig, ibid.	Lange Spier des Arms, ibid.
Vierkante Spier welke, 483	Korte Spier des Arms, ibid.
Langste Spier van den Rug hoedanig, ibid.	Uytwendige Arm-spier, 496
Half-gratige Spier hoedanig, ibid.	Opleggende Spier, 496
Lende-spier welke, 484	Ronde Spier van den Onder- arm, ibid.
Darmbeen - spier hoedanig, ibid.	Vierkante Spier van den On- der-arm, ibid.
Loodverwige Spier beschre- ven, ibid.	Lange Spier van den Onder- arm, ibid.
Grote Bil-spier hoedanig, ibid.	Korte Spier van den Onder- arm, 497
Middelste Bil - spier welke, ibid.	Binnenste Ellebeens - spier, ibid.
	Binnenste Spier van de klei- ne Pijp, ibid.
	Buytenste Ellebeens - spier, ibid.
	Buytenste lange Spier van de kleine Pijp, 498
	Korte Spier van de kleyne Pijp, ibid.
	Verheve Spier, ibid.
	Die-

Diepe Spier , 499
 Onder-palm-spier , 501
 Lange Spier van den Duym , 502
 Korte Spier van den Duym , ibid.
 Duym-palm-spier , ibid.
 Tegen-palm-spier , ibid.
 Twee-hoofdige Spier van 't Scheen-been , 507
 Half-vliezige Spier , ibid.
 Half-zenuwagtige Spier , ibid.
 Smalle Spier , 508
 Inwendige groote Spier van 't Scheen-been , ibid.
 Uytwendige groote Spier van 't Scheen-been , ibid.
 Dye-been Spier , ibid.
 Snyders Spier , 509
 ——— waarom zo geheten , ibid.
 Vliezige of brede Windel-spier , ibid.
 Etter-gezwel onder de brede Pees van de Windel-spier waarom aanstonts moet geopent werden , ibid.
 Knye-spier , 510
 Voorste Scheen-beens Spier , ibid.
 Voorste Kuyt-beens Spier , ibid.
 Inwendige Kuyt-spier , 511
 Plank-spier , ibid.
 Agterste Scheen-beens Spier , 512
 Agterste Kuyt-beens Spier , ibid.
 Lange Spier der Teenen , ibid.

Korte Spier van de Teenen 513
 Lange Spier van de kleine Teenen , ibid.
 Spieren des Buys hoe veel en welke , 38 & seq.
 ——— waar van daan Bloedvaten hebben , 43
 ——— waar toe dienen , 44
 Spieren van de Kraak-beenderen van het Strottenhoofd hoe verdeeld , en hoe veel , 217
 Schiltwyze spleet-makende Kraak-beens Spieren waar leggen , 218
 ——— sluyten de spleet , ibid.
 Hoofst-keel-gats Spieren waar van daan , 235
 ——— trekken het Keelgat na agteren , ibid.
 Wigge-been Keel-gats Spieren waarom zo geheten , ibid.
 ——— trekken 't Keelgat na om hoog , ibid.
 Spieren tot de beentjes van het Oor welke , 320
 Tepel-wyze Spieren welke , 480
 Tweeling-spieren , 484
 Uytwendige tusschen-Ribbige Spieren , 489
 Inwendige tusschen-Ribbige Spieren , ibid.
 Spieren , welke van Verheyen gevonden , 490
 Binnen-Ribbige Spieren , 491
 Q a 4 104

Inwendige tuffchen - beenige
 Spieren, 500
 Uytwendige tuffchen-beenige
 Spieren, ibid.
 Worm-wyze Spiertjes, 501
 — waarom zo gehe-
 ten, ibid.
 Tweelingen Spieren van den
 Voor-voet, 510
 — waarom zo ge-
 naamt, 511
 Tong - been Schilt - wyze
 Kraak-beens Spieren waar-
 om zo geheten, 218
 — trekken het Kraak-
 been opwaarts, ibid.
 Worm-wyze Spiertjes van de
 kleine Tenen, 513
 Inwendige tuffchen - beenige
 Spiertjes van de kleine Te-
 nen, ibid.
 Spyker-wyze invoeging wat
 is, 349
 Spraak, die verandert is, hoe
 te helpen, 387
 Steen aan de regte zyde van
 de Longe-pijp gevonden,
 232
 Stegel-reep, een beentje van
 het Oor, 319
 Strot-lapken waarom dien
 naam heeft, 214
 — waar toe een band
 heeft, 215
 — waarom altijd regt
 over einde staat, ibid.
 Strotten-hoofst uyt hoe veel
 Kraak-beenderen bestaat,
 213
 — hoe veel Vliezen
 heeft, 219

T.

TAnd ongevoelig en ge-
 voelig hoe, 400
 Hondstanden waar toe die-
 nen, 396
 Maal-tanden waarom zo ge-
 heten, en wat doen, ibid.
 Tandens wanneer komen, 391
 — hoe gemaakt werden,
 ibid.
 — hoe anders gevoet wer-
 den als andere Beenen,
 392
 — waarom de eerste in de
 Kinderen geen wortelen
 hebben, ibid.
 — welke in het Kaakbeen
 eerst uytkomen, 393
 — wanneer en waarom
 vernieuwen, 394
 — waar van daan hun
 Vaten en Zenuwen heb-
 ben, ibid.
 — hoe werden verdeeld,
 395
 — uyt hoe veel delen be-
 staan, ibid.
 — hun verrotting in het
 onderste Kaakbeen wat
 baart, 400
 — hoe veel Operatien op
 die gedaan werden, ibid.
 Tafels des Bekkeneels hoe
 vele, 359
 Tant-vlees wat is, 334
 Teel-deelen welke in de Man-
 nen zijn, 123
 — der Vrouwen uyt-
 wen-

wendige welke, 168
 Buyger van den groten Teen, 514
 Uytstrekker van den grooten Teen, ibid.
 Tekenen dat de wonden door-
 gaan tot in de holligheden
 van het Voorhoofst-been, 364
 Tenen uyt hoe veel Beenderen
 bestaan, 463
 Tepel waar toe dient, 182
 — is van een scherp ge-
 voel, ibid.
 Tepel-wyze Lighamen waar-
 om zo geheten, 114
 Thrombus op wat wyze ver-
 oorzaakt, 535, 537
 Tong hoe vast gehegt en uyt
 wat deelen bestaat, 330
 — hoe veel Spieren heeft,
 en welke die zyn, 330,
 331
 — waar uyt bestaat, ibid.
 — heeft verscheyde Vlie-
 zen, Klieren, en Tepel-
 tjes, 332
 — waar van daan Vaten
 ontfangt, ibid.
 Traan-klier waar legt, 285
 — kan tot zweren ra-
 ken, en hoe genezen word,
 ibid.
 Traan-stippen wat zijn, 286
 Trommel-vlies hoedanig, 316
 — wat gebruyk heeft,
 326
 Trompetten der Lyf-moeder
 waarom zo geheten, 160
 — hoe veel, ibid.

— haar vast-hegting
 zelfstandigheyt, en ge-
 bruyk, 161
 Trompet-spier waar toe
 dient, 275
 Tronk des Lighaams waar
 uyt bestaat, 409
 Twaalf - vingerigen Darm
 waarom zo genoemd, en
 waar begint, 64

V.

Vallende Ziekte waar
 van herkomstig, 352
 Valsche Ribben waarom zo
 genaamt, 428
 Varolius brug wat is, 261
 Vaten der Long verzellen
 malkander, 229
 Vensters in het Oor welke
 zijn, 318
 Venus-berg wat is, 169
 Ver wat is, en waar gevon-
 den, 36
 — deszelfs gebruyk, 37
 Vezelen wat zijn, 2
 — hoe verdeelt werden,
 ibid.
 — haar gebruyk, 3
 Vingeren hoe veel zijn, en
 beschreven, 448
 Vijt waar komt, 502
 — hoe ontstaat, ibid.
 — waar zwaarder en niet
 zwaarder, 503
 Vlees hoe veelerley, en wat
 is, 19
 Vlezig Vlies in den Mensch
 niet gevonden, 37
 O o 5 Groo-

Groote Darm-scheyls Vleg-
ting, 550
Vlegting van 't Bekken,
ibid.
Vlies wat is, 7
— hoe onderscheiden, ibid.
— welke de voornaamste
zijn, ibid.
— haar gebruyk, 8
— vast, komt 't zyde-
wee, 228
— wat voor Vaten heeft,
ibid. 230
Dunne Herffen-vlies wat deel-
len omvangt en bekleet,
46
Voet, en in hoe veel deelen
verdeelt, 460
Voor-voet hoe veel Beenen
heeft, ibid.
— beschreven, ibid.
Na-voet uyt hoe veel Beenen
bestaat, 463
Voorhoofd hoe veel Spieren
heeft, 274
Voorstanders wat zijn, 132
— groote en zelfstan-
digheyt, ibid.
— zitplaats van de
Druypert, 132, 133
— waar van daan Va-
ten ontfangen, 134
— hun dienst, ibid.
— nieuwe van wien
uytgevonden, 134, 135
— wat derzelver ge-
bruyk is, 135
Vrouwen waarom minder
Steen hebben als de Man-
nen, 122

Vrugt waarom de Lyf-moe-
der verlaat, 155, 156
Uytleding der Hant wat toe-
vallen heeft, 449
— waar uyt die toe-
vallen bestaan, ibid.
Uytsteeksel in 't Been wat,
342
— zijn gebruyk, ibid.
Uytwendige Tafel van 't
Bekkeneel hoe gevoet, 357

W.

W Angen wat deelen zijn,
275
Ware Ribben waarom zo ge-
heten, 428
Water-breuk hoe komt, en te
genezen, 125
Waterig vogt waarom dien
naam heeft, 293
— kan herstelt wor-
den, ibid.
Water-vaten wat zijn, 15
— van wien gevonden,
ibid.
— waarom Klap-vlie-
zen hebben, ibid.
— hoe worden inge-
plant, ibid.
— hoe gevonden, 16
— hun Water hoeda-
nig, ibid.
Weer-agtig Lighaam wat is,
247
Wegen na de holligheyt des
Neus welke, 386
Welfzel wat is, 248
Welf-

Welfzel waarom zo genaamt, 249
 Witte Linie wat is, 39
 Winkbrauwen wat zijn en
 waar toe strekken, 284
 Wijngaart-rank-wyze lig-
 haam waarom zo geheten, 129
 Wonde in het Strotten-hoofst
 beneemt de spraak, 219
 ——— waarom gevaarlijk, ibid.
 Wonden der Long wanneer
 dodelijk, 230
 Wormwys afhangfel wat is, 65
 ——— waar toe, 74
 Worrelen der Tanden waar
 toe hol, 397

Z.

Zaad-blaasjes wat zijn, 131
 ——— hun gedaante en
 groote, ibid.
 ——— waar eyndigen, ibid.
 ——— hun gebruyk, 134
 Zakjen in de Mannen hoe ver-
 deeld, 124
 ——— deszelfs middenschor, ibid.
 ——— is een Lugt-gezwel on-
 derworpen, ibid.
 ——— heeft een Water-breuk, ibid.
 ——— deszelfs dienst, ibid.
 Zant-kloot wat is, 127

't Zamengroeying hoe veeler-
 ley, 348
 't Zamenvoeging der Beende-
 ren hoe veelerley, 346
 ——— die vleezig is, waar, 349
 ——— kraak - beëdig en
 bandig, waar, ibid.
 Zenuwen wat zijn, 16
 ——— of 'er een holligheyt
 in is, ibid.
 ——— haar oorspronk, 17
 ——— hoe veelerley zelf-
 standigheyt, ibid.
 ——— 't buytenste en bin-
 nenste Vlies, en Merg van
 die waar toe, ibid.
 ——— hoe verdeeld kon-
 nen werden, 18
 ——— haar gebruyk, ibid.
 Reuk-zenuwen, 544
 Gezigt-zenuwen, ibid.
 Oog-bewegende, 545
 Lijdende, ibid.
 Zenuw van 't vijfde paar, ibid.
 ——— zefde paar, 546
 ——— zevende paar, ibid.
 ——— negende paar, ibid.
 ——— agfte of dwalende
 paar, 547
 ——— wederkerende, ibid.
 Hart-Zenuw-vlegting, ibid.
 Zenuwen der Long, 548
 ——— van den Slok-darm, ibid.
 ——— der Maag, ibid.
 Tuffchen - Ribbige Zenuw-
 knoops-ylegting, 549
 Ze-

B L A D - W Y Z E R.

Zenuw-vlegting des Buyks,	549	Zenuwen uyt 't verlangde	
Gal-blaas Zenuwen,	550	Herffen-merg voortkomen-	
Nier-Zenuw-vlegting,	ibid.	de hoe veel, en welke,	250
Zenuwen des Hals,	551		& seq.
— hoe veel in het		Ouden hoe veel Zenuwen	
Rug-graat-merg voortko-		van 't verlangde Herffen-	
men,	ibid.	merg stelden,	252
— des Rugs,	ibid.	Zenuwen hoe veel uyt het	
— der Lenden,	552	Rug - merg voortkomen,	268
Dye-Zenuwen,	552, 553	— der Oogen verftopt,	
Zenuwen van 't Heilig-been,	552	maaken een blindheyt in een	
— der Armen,	ibid.	Oog,	296
Midden-rifts Zenuwen,	553	Zware toevallen waarom op	
		't Ader-laten komen,	494

E Y N D E.

By denselven JAN VANDER DEYSTER zijn
ook nog te bekomen eenige weynige Ex-
emplaren van de *Heelkonst* door *J. Palfijn*, en
Oog-siektens, en verders veelerhande andere
Medicijnse Boeken.

C 2^h

